











Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.257





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CMAAGL 1.7.257



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.257







1.7. 252
A T

DE PLANTIS
Epitome vtilissima,
PETRI ANDREAE
MATTHIOLI SENEN-
SIS, MEDICI EXCEL-
lentissimi, &c.

NOVIS PLANE, ET AD VIVVM EXPRESSIS ICO-
nibus, descriptionibusq; longè & pluribus & accuratiorib. nunc primum
diligenter aucta, & locupletata, à

D. IOACHIMO CAMERARIO, MEDICO CELE-
berrimo inclytæ Reip. Noribergensis.

COMPENDIVM IN EORVM MAXIME GRATIAM ATQVE
vsum adornatum, qui plantis conquirendis & indagandis student; ac, quæ de eis plurib.
à Matthiolo in Dioscoridem disputantur, breviter descripta simul de-
pictaq; oculis subijcere cupiunt.

ACCESSIT, PRÆTER INDICEM QVAM EXACTISSI-
mum, liber singularis de itinere ab vrbe Verona in Baldum montem plantarum
ad rem medicam facientium feracissimum, auctore


FRANCISCO CALCEOLARIO, PHARMACOPOEO VERONENSI.



M. D.

LXXXVI.

Cum gratia & privilegio S. Cæsareæ Maiestatis ad hæc specialiter concessis.
FRANCOFVRTI AD MOENVM.



ILLVSTRISSIMO
PRINCIPI AC DOMINO
DN. MAVRICIO, LANTGRAVIO

Hassia, Comiti in Catzenelnbogen, Dietz, Zigenhan & Nida, &c. Domino suo
clementissimo,
S. D.

ILLVSTRISSE Princeps, Domine
clementissime, Quamquam iam dudum
nihil prius neque antiquius habuerim,
quam (sicuti multis receperam) Latinum
opus Botanologicū collectum a me nō exi-
guis laboribus & sumptibus, tam ex inchoatis lucubratio-
nibus Medici & Philosophi praestantiſſ. D. Conradi Gesne-
ri. p. m. quā meis observationibus proprijs quamplurimis,
tandē elaborando perficere atq; in publicū dare: hoc tamen
meum institutum huc vsq; variae occupationes multaeq; a-
liae causae retardarunt & quominus id ad optatum finem
perduceretur, impediuerunt. Cum vero imprimis, Illu-
striſſ. princeps, D. parens vester, Dominus meus clemen-
tiſſimus, pro sua Celsitud. singulari erga rem herbariam,
affectione, cuius ut est peritiſſ. ita etiam amantiſſima &
benigniſſima in me voluntate, quam nunquam satis pra-
dicare animo subiectiſſimo possum, me hac in parte muni-
fica liberalitate non parum adiunxit, ac simul etiam ali-
) (2 quoties

Epistola

quoties à me postulauerit, ut in cepto opere sedulo pergerem, illudq; omnibus modis vrgerem, erubesco profecto nonnihil, ut verum fatear, quod nondum ipsius Celsitud. aliorumq; expectationi, quod tamen non mea culpa sed alijs remoris nonnullis subinde interuenientibus accidit, satisfacere potuerim. Interea autē, ne videar plane malum nomen (quod sane cupio à me esse lōgissimum) promissi huius admonere me ipsum, & illius loco, hoc aliunde desumptū specimen, Epitomen videlicet plantarū olim ab Excellentiss. Petro Andrea Matthiolo p. m. editam, & nunc rogatu amicorum & typographi à me pluribus in locis auctam nouisq; typis exornatam, ad V. Ill. CL. mittere statui, submisisse orans ut V. Ill. CL. quam in sua ineunte iam etate, quemadmodum ad omnes liberales artes & praeclara studia, ita quoq; ad utilissimam cognitionem stirpium, aliarumq; rerum naturalium peculiari quadam inclinatione ferri & exemplo paterno duci omnes norunt, mihiq; est perspectum, meo nomine apud Illustriss. principem Dominum parentem Vestrum, Dominum meum clementiss. intercedere, ipsiusq; Cels. persuadere non grauetur, me, quod dicitur, omnem lapidem moturum esse, ut primo quoq; tempore promissum opus, Deo adiuuante, absolua-
tur atq; in lucem prodeat. Præterea etiam ab V. Ill. CL. submisisse peto atq; contendo, ut hanc exiguam meam opellam hilari benignoq; vultu accipere & me sua benignitatis fauore, sicuti hucusque Clementiss. fecit, impoſterum quoq; complecti ac me sibi commendatum habere non dedigne-

Dedicatoria.

dignetur. Quod superest, ego Deum opt. max. dies no-
tesq; orare non desinam, ut V. Illustr. & praeclariss. indoli
suo spiritu semper aſsit, & laudatiſs. cursum uniuersae vi-
tae una cum illustriſs. principe Domino patre suo, Domino
& meccenate meo clementiſs. ac cateris illustriſsimae Do-
mus Hassiaca principibus saluam & incolumem in omni
prosperitate conseruare quam diutiſs. velit. Bene va-
leat V. Ill. CL. Norimb. Cal. Martij Anno Christi.
1586.

V. Ill. CL.

deditiſs.

Ioachimus Camerarius M.D.

):(3

SERENIS-

SERENISSIMO PRINCIPI
FERDINANDO ARCHIDUCI
AVSTRIAE, DUCI BVRGVNDIAE,
*Ec. Comiti Tyrolis, Ec. Domino
suo clementissimo.*



AMETSI ingrauescente iam ætate decreuissem SERENISS. PRINCEPS, omisiss studiis ac lucubrationibus, quod vitæ reliquū erat, in otio atq; animi, & corporis tranquillitate transigere, cū tamen ab ipsis primordiis à natura sim factus, qui semper putē, si tantum possem, studiosam iuuare posteritatem, non potui meam non immutare sententiam, nec multorum precibus non indulgere. Nam cū non pauci, qui discendæ medicæ materiæ, magno ac feruenti tenentur desiderio, me sepe rogarent, vt in eorum gratiam atq; vsum Compendium conscriberem, in quo plantarum icones cum nominibus, & compendiosa earum historia extarent, vt eo duce quæcunque loca vbi stirpes proueniant, tutò ad eas noscendas indagandasq; adire possent, ne de sua ipsorum in me confidentia frustrarentur, Compendium hoc in eorum vsum conscribere decreui, quod quamuis succincto ac Laconico sermone conscriptum videatur, erit tamen (ni fallor) & gratum, & perutile, non solū ijs, qui indagandis, noscendisq; simplicibus medicamentis, nauant operam, sed ijs quoque, qui hanc facultatem iam adepti, publicè morbis omnibus passim medentur. Siquidem in hoc plantarum Compendio non solum earundem omnium nomina, diuersarum nationum idiomate conscripta spectabuntur, & historiæ, ac quibus o-

NCI-
DVCI
IAE,

decreuif-
missis stu-
ta reliquū
is tranquil
is primor
per putē, si
non potui
in precibus
læ medicæ
me sepe ro-
dium con-
inibus, &
e quæcun-
scendas in-
ne confiden
vsum con-
conico ser-
llor) & gra-
noscendisq;
ijs quoque,
is omnibus
Compendio
arum natio-
oriæ, ac qui-
bus o-

bus oriatur in locis, vt à me studiosi postulabant. Sed etiam
qualitates cum primæ, tum secundæ, ac tertiæ & omnium
quoque vires, ac singularia quædam nostra auxilia compen-
diosè descripta sunt. Cæterum vbi quispiā plura, melioraq;
legere concupierit, ad nostra amplissima in Dioscoridem
commentaria se conferre poterit, vbi (vt spero) quæ deside-
rabit, inueniet. Atqui cum in adeo magnam molem opus
illud excreuerit, vt haud commodè hinc inde circūferri pos-
sit, non sanè absque ratione rogarunt me studiosi, de quibus
diximus, vt Compendium conscriberem: quod cum rectè
factum iri cognouerim, eò quoque libentius ad eum con-
scribendum me appuli, vt noscat futura posteritas quot mo-
dis Matthioli illam iuuare contenderit. Verum quoniam
apud omnes scriptores mos inualuit, vt sub magnorū Prin-
cipum, Heroumq; nominibus, & auspicijs, sua scripta quicq;
in lucem producant, cum ego quoque id ipsum institutum
semper sequutus, haud alijs iustius, & rectius compen-
dium hoc meum consacrare potui, quàm tuæ Amplissimæ
Celsitudini, quod iam in sextum decimum annum in eius
corporis cura (quæ sua est clementia, & optima de me opi-
nio) primarij Medici munere fungar. Huc accedit, quod
quicquid est meæ substantiæ, & facultatum, id sanè omne
tuæ Celsitudini acceptum referre possum. Quin etiam eius-
dem liberalitate, beneficentia ac dilectione foueor, sub-
stantor, & alor. Siquidem hæc me multis modis, si haud ad
reponendam gratiam, saltem ad declarandam gratitudi-
nem, vel gratitudinis conatum me reum statuunt: quare
cum Celsitudini tuæ mea hæc, qualiacunque sint, ei iure de-
beantur, eam suppliciter peto, vt hæc meas lucubrationes,
& plantarum veluti manipulare libellum alacriter ac be-

);(4 nignè

nignè excipere, meq; in hac laboribus confecta atate, suo
patrocinio, gratia, & fauore prosequi, ac tueri non desinat.
Vicissim ego, quæ fidelem seruitorem, & Clientem decent,
summa fide, ac voluntate, pro virili mea vsque ad occasum
vitæ meæ me præstiturum polliceor, meq; totum tuæ Cel-
situdini dedo, ac voueo: quam Deus Opt. Max. incolumem,
& modis omnibus florentem quàm diutissime conseruet.

E. Sereniss. Celsitud. tuæ

Fidelis & humilis Seruator

Petrus Andreas Matthiolus.

BENE-

etate, suo
on desinat,
m decent,
loccasum
tua Cel-
olumem,
nseruet.

Matthiolus.

BENE.

BENEVOLO LECTORI IOACHIMUS
Camerarius Medicus, S. D.

INGVLARIS amor & innata quedam propensio ad cognitio-
nem rerum naturalium, imprimis verò erga studium rei herba-
ria, ex quo non solum liberalis admodum oblectatio, & ingenua
voluptas percipi, sed etiam utilitas atque fructus non exiguus ad
Medicum imprimis peruenire solet, me incitarunt, quo semper nullis labori-
bus aut sumptibus pro ratione mearum facultatum parcendo studuerim, hoc
tam praeclarum ^{in illis} qua proficui, excolere, atque etiam pro virili illustrare.
Quae causa fuit, ut ante aliquot annos, opera & humanitate eximia Cl. V. D.
Casparis VVolfij Medici Tigurini doctissimi, cōsecutus fuerim Opus istud am-
plum & laboriosum (quamuis solummodo adhuc inchoatum & sparsim minu-
tioribus in cartis quamplurimis annotatum) quod seculi nostri (ut verè qui-
dam vir doctus illum nominare consuevit) alter Plinius, Doctiss. vir D. Con-
radus Gesnerus p. m. iam dudum in manibus habuit. Idg. in ordinem redige-
re, elaborare & proprijs meis obseruationibus additis, tandem ad utilitatem
communem in publicum dare iam pridem constitui, à quo meo proposito, acce-
dentibus praesertim amicorum multorum, qui editionem hanc expetunt, quo-
tidianis adhortationibus, me nullis alijs rebus auocari patiar.

Cum verò hac in parte varia occupationes & longiores nonnullae meae supe-
riorum annorum peregrinationes, non parum impediendi mihi obiecerint,
quo minus extremam manum huic operi imponerem, in ista autem bibliotheca
herbaria D. Gesneri aliquot plantarum icones partim iam sculptas, partim
solummodo delineatas reperissem: quidam non solum artis Medicæ peritis, sed
etiam nonnulli magni nominis viri videret, à me postularunt, ut reli-
quam partem typorum, et si profecto maxima pars adhuc cōcinnanda restabat,
eodem modo curarem parari, atque interea dum alterum volumen, de quo su-
perius dixi, absolueretur, hanc Epitomen Excellentiss. Medici Petri Andreae
Matthioli, &c. (cum illius exempla apud nos pauca inuenirentur, & typo-
graphi ideo ea recudere cuperent) auctam prodire in lucem sinerem.

Quaquam verò in eiusmodi scriptis aliorum expoliendis, certis de causis
non libenter verser, atque in illa multum temporis mihi insumendum non ex-
istimem (neq. mihi aliorum de illis ignota sunt iudicia) sed potius ad proprias
lucubrationes, qualescung. sane illa sint, elaborandas me conuertere totis viri-
bus studeam: tamen alijs hanc editionem à me requirentibus honestè hoc offi-
cium denegare non potui, omnino mihi persuadens, beneuolum lectorem can-
dido animo, dum meliora, volente Deo, consequantur, hosce meos labores ac-
pturum,

A D L E C T O R E M.

pturum, meq; pro sua humanitate ad reliqua que in manib. habeo recte absol-
uenda, libenter esse adiuturum, quod equidem, vt faciat, illum magnopero-
rogatum velim.

Quam assidua autem diligentia & accurata in inspectione opus sit, in pictori-
bus & sculptoribus recte instruendis, qui (vt hoc & simile genus artificum so-
let) prater alia mirifica ac sepe numero permolesta vitia, potissimum idio-
tismi quadam laborant, & ego ad fastidium vsque iam pridem sum expertus, &
norunt alij, quibus cum eiusmodi ingeniis aliquid fuit negotij. Nisi enim quis-
piam continuo illis asit, eosq; instiget, urgeat atq; instruat, ne elegantia nescio
quam, nimirum qualem ipsi somniant, affectet potius quam genuine proprie-
tati stirpium animum aduertant, vel negligentius etiam sepe numero tractet,
atq; peruertant omnia, facillime aliquid deprauari & naturalem gratiam atq;
formam amittere solet.

Cum vero aliorum negotiorum multitudo, & crebre ad exteros auocatio-
nes me illis preesto semper esse minime permisissent (quamuis ante operis absolu-
tionem, nam initio mecum esse non illi fuit concessum, perdoctus & diligens
admodum iuuenis M. Ioach. Iungermannus mee sororis filius ad hanc partem
Medicine illustrandam plane natus, mihi vt plurimum vsui fuerit) non caue-
ri ideo potuit, quin interdum, vbi praesertim aegrotos examinare peritiores
singula voluerint, aliquid desiderari vel etiam reprehendi queat, quemadmo-
dum, exempli causa ingenua quadam confessione ipsemet quaedam hic breuiter
indicare non dubitauit. Acori folia mucronata magis esse par erat. Phumaius
caule altiore indiget. Flores Iasmini quinis plerumq; folijs ornantur. Cedri ma-
ioris coni caelum spectare perhibentur. Chamacerasi folijs minutas crenas abo-
leuit sculptor. Siliqua Ceratia fructus binos ternos aut plures sepe numero con-
iunctos producit. Sycomori 2. folia nimis acuminata pinguntur. Sesami effi-
gies nusquam acurata inuenitur, eius folia inferiora tripartita fere herbam
cannabinam emulantur, flores nonnihil cum digitali & antirrhino commu-
ne habent, vt nuper obseruauimus in siccis Syriacis Clariss. viri Domini D. Leon-
hardi Rauwolfii, quas ipsemet pro singulari nostra amicitia liberaliter mihi
communicauit. Flores Xyli non exquisitè picti pleniores esse debebāt. Auricula
muris folia iusto tenuiora & acutiora sunt, totius plantae iconem aliquando me-
liorem exhibebimus. Melanthium sylvestre alterum cornicula plerumq; graci-
liora, & curuiora, & admodum nonnunquam profert. Oblongam capsulam semi-
num Canna Indica, qualis pingitur, nondum vidi, triplicem enim, qualem
Ricinus, vt plurimum gignit, & quasi spinosam, sed non pungentem. Flores
framonia viriusque pentagoni tantum visuntur, & potissimum in altera spe-
cie, quam Daturam vocant, plures tam fructus quam flores desiderantur, &

ordo

ordo foliorum ramulorumq; turbatus pictoris incuriam arguit. Eiusdem negligentia argumenta sunt in Ricino omisso geniculi. Et si quæ sunt alia.

Horum omnium nomine confido beneuolum lectorem facile me habiturum excusatum, vel etiam meam qualemcunq; diligẽtiam esse approbaturũ. Quod si Deus Opt. Max. vitam mihi & plusculum temporis quam hucusque factum est, atq; alia tã de vñ largitus fuerit, nihil in me laboris, studij aut opera desiderari patiar, vt promissa reliqua in hoc genere primo quog; tempore à me expediantur & cum alijs communicentur.


Videbit autem mediocriter in cognitione herbaria versatus, plantarũ icones, quantum fieri ob commemoratas causas potuit, nos studuisse, imitari in hoc CL. V. D. Conradi Gesneri institutum, non solum integras, quod ab alijs quog; antea sepe est factitatum, sed præcipuas quog; earum partes, vt sunt radices, caudices, caules, cortices, folia, flores, semina, fructus tam exterius quam interius ante oculos quasi per anatomiam quandam proponere. Vtinam verò plures typi essent non nihil grandiores à D. Gesnero facti. Sed cum id à me postea mutari non potuerit, in ceteris eadem forma necessario fuit sequenda. Ceterum vbi nota asterisci est apposta, de meo id esse additum profiteor. Omitti verò etiam quasdam stirpes, cum descriptionibus suis contigit, partim quod nobis vel nondum visæ, vel ad manus non essent, ideoq; exactè pingi non possent. Partim quo caueremus ne nimium auctus liber modum excederet. In animo tamen habemus alteram quog; partem concinnare, in qua illæ, quas modo excludi necesse fuerat inter alias plures, locum inueniẽt suum. Interea hæc ipsa beneuolus lector æqui boniq; consulere & meos conatus in posterum promouere & ab obtrectatoribus quibus tã mouendi potius quam tã mouendi cordi est, moribus defendere vt velit, etiam atque etiam peto. Vale.

IRIS.

o recte absol-
magnopero-

it, in pictori-
artificum so-
um idioz voquo-
expertus, &
si enim quis-
gãntiã nescio
ina proprie-
nero tractet,
gratiam atq;

ros auocatio-
peris absolu-
& diligens
hanc partem
it non caue-
re peritiores
quemadmo-
hic breuiter
Phu maius
r. Cedri ma-
crenas abo-
numero con-
Sesami effi-
erè herbanz
ino commu-
ni D. Leon-
raliter mihi
it. Auricula
iquãdo me-
rung, graci-
sulam semi-
im, qualem
tem. Flores
n altera spe-
rantur, &
ordo



NOMINA.

IRIS, Græcè *ἰρις*.] Arabicè, *Asmeni iuni*, & *Aierfa*.] Italicè, *Giglio celeste*, & *Giglio pa-*
nona [20.] Germanicè, *Blaw gilgen*, *Beisrouh*, vnd *Himmel Schwertel*.] Hispa-
 nicè, *Lirio Cardeno*.] Gallicè, *Glazeul*, & *Flambe*.] Boemicè, & Polonicè, *Kofarec*.

IRIS.



GENERA.

Alterum domesticum, alterum sylvestre, MATT.
 Illius tres numerantur species, versicolor,
 lutea, candida. Huius tantum duæ, Maior, &
 Minor.

FORMA.

Folia gladios referunt, flores versicolores Idem.
 Iridis cœlestis modo habentur, caules læues,
 cubitales, radices albicantes, solidæ, genicu-
 latæ, numerosis inferna sede agnatis.

LOCVS.

Nascitur in hortis, & Viridarijs.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccit ordine secundo. Inci- Auicenn.
 dit, abstergit, trahit, aperit, concoquit, deij-
 cit, emollit. Sarcotica est, acris, amara, & o-
 dorata.

VIRES.

Radix ex aceto pota, Serpantium morfi- DIOSC.
 bus aduersatur. Recens ex melle subdita par- Gal.
 tus extrahit: cocta, & illita strumas, veteresq; Auicenn,
 duritias emollit: cum rosaceo autem, & ace-
 to capitis dolores mulcet. Ex melle illita cum
 albo veratro, maculas in facie delet. Huius
 succus porus aquas extrahit, quin etiam bi-
 lem crassam, & pituitam, ex hydromelite se-
 ptem drach. pondere potus. Eiusdem deco-
 ctum tineas ventris pellit, menses, & vrinas
 ciet, dentium dolores mulcet, & pectus ex-
 purgat. Arida farina, cum cinnamomi, & MATT.

Anethi pondere dimidio, & croci momento, testium tumores, doloresque
 tollit, vbi coccineo panno, albo meraco infuso excipiatur, & calidum appona-
 tur. Hemorrhoidas foru eijcit. Radicis succus naribus infusus cerebrum à pi-
 tuita mitificè purgat. Potum radicis decoctum obstructions aperit, præfer-
 tim vbi crassa fuerit impacta materia. renum calculos eijcit. Datur potandum
 commodissime Ictericis & aqua intercutem laborantibus. Eadem in passo de-
 cocta & cum hordeacea farina illita, parotidas bellè discutiunt.

A

IRIS

z

N O M I N A.

Iris Sylvestris maior, Græcis, *Ἰρις ἀγροικη*.] Italis, *Giglio a Turro saluatico*.] Germanis, *Wild blau Eilgen*.] Gallis, *Elambe Sauvage*.

IRIS SYLVESTRIS
MAIOR.

F O R M A.

MATT. Folia, caules, flores, radix, perinde ac in domestica habentur, verum minora, & rudiora.

L O C V S.

Idem. Nascitur in saxosis collibus, & asperis locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit, & siccit, valentius tamen quam domestica.

V I R E S.

Idem. Easdem cum domestica vires habet, sed acriores, ac etiam valentiores.



Iris.

[Curro saluatico.]

NOMINA.

Iris Sylvestris minor, Græcis *ἱρίς ἀγρία μικρά*.] Italis, *Giglio a Curro piccolo*.] An
quidam falso Iridem Illiricam vocant.

IRIS SYLVESTRIS MINOR.



FORMA.

Folia habet Gladioli pau- MATT.
lo longiora, radicem tenu-
em, subrufescentem, inodo-
ram, & graminis fere modo
repentem, caulem breuem,
florem ceteris minorem, o-
dore Armenici mali, purpu-
reum, & aureis quibusdam
lineis varium.

LOCVS.

Nascitur in montibus, col- Idem.
libus, & pratis.

QUALITATES.

Excalfacit, & extenuat or- MATT.
dine primo, aut secundo in-
choante.

VIRE.

Præstat eadem, quæ cate- Idem.
ra Iridis genera, minori ta-
men efficacia. Fit è floribus

oleum, quo quidam vtiliter vtuntur, ad tumentes ex partu mammas, & ad
testium inflammationes.

A 2

*CHA-

IRIS.

*CHAMÆIRIS vel Iris humilis, Græce χαμῖσις.

CHAMÆIRIS.

FORMA.

Longiora & angustiora
Gladiolo fereq; graminea
habet folia, radicem nodo-
sam, tenuem, utq; reliquæ
Irides, repentem, flores par-
uos, pulcre variegatos, odo-
re pruni maturi, sine caule
ferè, inter folia eminentes.

LOCVS.

Passim in pratis Austria-
cis ad radices montium sitis
prouenit, & propter venu-
statem floris in hortis ali-
tur.

QUALITATES.

Calore cæteris non ce-
dit & potissimum foliorum
vrendi vis insignis est.

VIRES.

Et hæc cum præcedenti-
um viribus cōueniunt. Sed
caute est agendum, propter
vim nimium causticam.*



Aco-

NOMINA.

ACORVM, Græcis ἀκρόν] Mauritanis, *Vage, aut Vgi.*] Italis, *Acoro*; vulgò *perpèram calamo Aromatico.*] Germanis, *Ralmus.*] Boemis *Prust Vuorec.*] Polonis, *Tatarskie, Ziele.*

ACORVM.

FORMA.

Folia habet Iridis, angustiora tamen: radices non dissimiles complicatas, nō in rectum, sed obliquum actas, & summo cespite sparsas, geniculis interceptas. gustu acres; amaraq; odore haud ingrato.

Numerosis infima sede capillamentis.

LOCVS.

Nascitur in Ponto, Colchide, & Galatia.

QUALITATES.

Radix exsiccatur, & siccat Auicenna, ordine tertio, incidit, aperit, prouocat, & acris est, amara, atq; etiam odorata.

VIRES.

Pota radix vrinam, menses, & secundas trahit: lateris dolores tollit: locinorosos, & lienosos iuuat: Pectori quoq; prodest: vrinæ stillicidijs, & a serpente demorsis mirificè auxiliatur, hocq; præsertim nomine in Antidotis additur.

tum mirificè commendat: decoctæ radicis vapor hianti ore exceptus tussim sanat.

CENSURA.

Proculdubio aberrant, qui Acorum calamum odoratum esse existimant, quemadmodum & qui Galangam Acorum faciunt.

ACORVM falsum, Græcis *Pseudācoron*.] Italis, *Giglio giallo*, & *Acoro bastardo*.] Germanis, *Geel Effen*.] Gallis, *Flambe de Riuieres*.] Boëmis, *Košatec žuti falešni*.] Polonis, *Mieć*.] Konne Kor *Żenie*.

ACORVM FALSVM.

F O R M A.

MATT. Folij est Iridis longioribus, quemadmodum & caulibus, & floribus, qui tamē haud versicolores, sed lutei spectantur, differunt tamen facie, quippe quod minores sint, & angustioribus folijs. Radice nritur Iridis maiore duriorēq; subrubente, & inodora.

L O C V S.

MATT. Nascitur in palustribus, & aquosis.

Q U A L I T A T E S.

Radix, cuius tantum est usus, exiccat, sed non nisi parum excalfacit. Nulla enim est acridine prædita: attenuat, roborat, resoluit.

V I R E S.

Constat multorum experimento, valere pseudoacorum, propria sua ipsius vi, ad omnes nervorum, & cerebri affectus.



MEVM,

NOMINA.

7

MEVM, Græcis Μην. Arabicis, Mu. Italis, Imperatrice. Germanis, Beerwurh.

MEVM.



FORMA.

Folij & caule anetho simi- DIOSC.
lis est, binum ferme cubito-
rum altitudine attollitur, spar-
sis in obliquum rectumq; ra-
dicibus, longis tenuibus, odo-
ratis linguamque excalfacien-
tibus.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & MATT.
collibus apricis. Optimum af-
fertur ex Gargano Apuliæ mō-
te. In Hispania & Macedonia
copiosum.

QUALITATES.

Excalfacit ordinetertio, & Gal.lib 7.
siccat secundo, incidit, dige- simp. me.
rit, aperit.

VIREs.

Radix ventriculi flatus dis- DIOSC.
cutit, ictis à serpentibus miri-
ficè subuenit. Feruefacta radix

ex aqua, vel trita citra coctionem præclusos renes, & farctam quoque pituito-
sis excrementis, vesicam, atque urinæ difficultatem expedit: quin etiam ventri-
culi flatus discutit: Torminibus, vterinis affectibus, articulorumque cruciati-
bus medetur. Auxiliatur quoq; pectoris fluxionibus ex velle delincta: Menfes
pellit in deflectionibus addita. Infantium pubi illita urinam mouet: caput attam-
en dolore afficit, vbi copiosius sumatur.

A 4

*MYT-

bastardo.] Ger-
ti fale[m].] Po-



ruorum, & ce-

MEVM,

*MYTTELINA, Meum alpinum, vel Caros alpinus, alijs Sefeli Creticum.]
Helvetijs Muntty vel Mutteren.

MYTTELINA.

F O R M A.

Folia profert non ita tenuia vt Meum, nec tam lata vt Caros, sed medio quodam modo se habentia, nata ex radice quandoque minimi digiti crassitiem æquante, vt plurimum tamen minore, superiore parte barbata odorata & cum acrimonia dulci, vt Mei vel Dauici cretici. umbellam gerit florum ex albo purpureiscentium.

L O C U S.

Nascitur in alpib⁹, in monte Glarona & alibi in Heluetia.

Q U A L I T A T E S E T
V I R E S.

Facile coniectu fuerit ex-calfacere huius plantæ radicem, aromatica cum sit. Condiunt ea lactarij Colostra & recoctam suam Glaronenses & Valesij. Eius pabulo in montibus vacca plurimum & optimum lac reddunt.*



C Y P E.

eli Creticum.]

A.



mum lac red-

CYPER-

NOMINA.

9

CYPERVS, Radix oblonga, Plinio Cyperis, Græcis κύπερος, ἰσχυρότης, ἰσχυρότης, ἰσχυρότης.] Afris Saherade.] Italis, Cipro.] Germanis, Wilder Galgan.] Hispanis, Iuncia anellanada.] Gallis, Souchet.] Boemis Galgan plancy.

CYPERVS.



* GENERA.

Duo genera Cyperi habentur, quorum differentia potior in radice, Dioscorides tertium addit, quod curcuma putatur.

FORMA

Cyperus planta est, quæ por-
raceis ferme provenit folijs,
longioribus tamen & exilioribus,
caulem edit cubitalem, &
nonnunquam maiorem, angulosum, alba intus medulla, ut in iunco, in cuius cacumine folia sunt minora, stellarum modo radiantia, inter quæ semen prodit spicatum herbacei coloris. Radices illi sunt subnigræ, coherentes, oblongis oleis similes, aliquando etiam longæ galangæ modo, quo fit ut hoc cyperi genus à nonnullis appellatur sylvestris galanga.*

LOCVS.

Nascitur hoc cyperi genus prope Timaui fontes, in lapideis finibus.

QUALITATES.

Radix absque morfu exsiccatur, & exiecat, quin etiam roboretur, Galen. 7. simp. mc.

rat, & adstringit: ac simul incidit & aperit. Eupolitica est, & odorata.

VIRE.

* Radices vlcibus quæ præ nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirifice profunt, vlcibus item oris conueniunt, & calculo vexatis congruunt, & urinam mensesque prouocant.*

A 5

CYPERVS

* *Cyperus rotundus*, Græcis κύπερος. ὑβήρηλος.] Germanis Runder wilder
Galgant.] Æthiopibus nostro tempore Arabico vocabulo Soed dicitur.

CYPERUS ROTUNDUS.

FORMA.

DIOSC. Folia fert porraceis proxima, sed longiora & exiliora, Caulem odorati iunci cubitalem aut maiorem, angulosum, in cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur. Radices contiguas inter se oleis oblongis rotundisq; similes, nigro colore, suavi odore, amaro gustu.

LOCVS.

In lacunosis & palustribus nascitur.

QUALITATES.

Et huic calidavis inest.

VIRES.

Venarum spiracula laxat, urinam ciet, Ad calculos aquamq; subtercutem vtilissime bibitur. Adversus Scorpionum ictus remedio est. Per frigerationibus vulvæ & præclusionibus fori prodest, Pellit menses, Contra ulcera oris etiam si depascant vorentq; farina eius efficax est. Malagmatis calfacientibus & vnguentorum spissamentis adijci solet.*

CARDA-



Runder wilder
dicitur.

VS.



nes, Contra
agmatis calfa-


CARDA-

N O M I N A.

II

CARDAMOMVM, Græcis Καρδάμωμον.] Mauritanis, Cordumeni.] Italis, Carda-
momo.] Germanis, Cardamomelin.] Hispanis, Grana de paraíso.] Officinis, Mele-
geta, & grana paradisi.

CARDAMOMVM.



GENERA.

Tria ad nos afferuntur ge- MATT.
nera: Maius, Mediū, & Minus.

FORMA MAIORIS.

Maiores capitulum fici, seu
pyri faciem refert: semine in-
tus subrufescente, anguloso-
que: Medium folliculo con-
tegitur oblongo, triquetro,
striatoque, in quo semen est
oblongum, colore minus ru-
fescente. Minus minore con-
stat capitulo, ipsoque triangu-
lari: semine subrotundo, aspe-
riusculoque: semen omnibus
acre & odoratum: maioris ta-
men acrius, & odoratius. Mi-
nus, ut medium acedinis ve-
hementia superat, ita, & odo-
ris fragrantia.

Idem.

LOCVS.

Affertur in Europam ex A- Idem.
lexandria Ægypti, ac etiam à
Lusitanis ex India Orientali.

QUALITATES.

Semen facultatis est admo Gal. 7.
dum calidæ, non tamen vsque simp. me.

adeo, ut nascitur, sed quanto
suauius, magisque fragrans est, tanto imbecillior ei calida facultas est: quin etiam
quiddam amaritudinis respicit. Caterum hæc Galenus de suo scribit Cardamomo. MATT.

VIREs.

Datur ex aqua comitialibus, Ischiadicis, vuls, resolutis, torminosisque, & cō- DIOSC.
tra latas ventris tincas: ex vino verò renum affectibus, vrinæ difficultatibus,
scorpionum ictibus, ac cæterorum venenosorum animalium, auxiliatur: Idem
cum radicis lauri drachma potum, calculos comminuit.

CENSURA.

Cum in vulgari Cardamomo, quo passim utimur, nihil sit amaroris, nec eius
odor caput feriat, nec semen fractu contumax sit, affirmare quidem nō ausim,
hoc nostrum, esse illud, cuius antiquiores meminerunt.

NAR-

NARDVS Indica siue spica Nardi, Græcè *Nárdos*, *Nárdov sáyis*.] Mauritanis, *Stumbel*, siue *Senbel*.] Germanis, *Epifenarde*.] Italis, *Spico*, & *Spigonardo*.] Hispanis, *Azumbar*, aut *Espige fil*.] Gallis, *Aspic de vitre mer*.] Boemis, *Nardus Indiansky*.

F O R M A.

DIOSC. Spica non est, quæ in cul-
Gal. morum summitate oritur: Sed
MATT. radix quæ spicæ figuram habet.
Complures enim ab vna basi
oriuntur spicæ, perinde ac in
lilij aut allij radice, verum ca-
pillaceæ, & comosæ, colore
ferrugineo, pluribus ima par-
te capillamentis, odore haud
iniucundo.

L O C V S.

DIOSC. Nascitur in India in monti-
bus, & circa Gangem fluiuium.

Q U A L I T A T E S.

Gal. s. Excalfacit ordine primo, &
simp. me. siccatur secundo completo: Ad-
stringit, extergit, & aperit.

V I R E S.

DIOSC. Potavrinæ elicit, & aluum
sistit, cohibet subposita vteri
quascunque fluxiones. Præstat
ad ventriculi erosiones, & flatus. Medetur spleneticis, & iocinorosis, atque et-
iam ictericos iuuat. Auxiliatur eius decoctum in deflectionibus, vteri inflam-
mationibus: præstat & ad glabras oculorum genas, siquidem densiore pilo eas
cohonestat. Additur in antidotis: & vritur in fictili nono ad ocularia medica-
menta.

C E L T I-



NOMINA.

13

CELTICANARDVS, siue Spica Celtica, Græcis, Νάρδος κελτική.] Italis, Spica Celtica.] Germanis, Celtischer Nardus.] Gallicè, Nardus Gaulois.] Boemis, Celtika Nardus.

NARDVS CELTICA.

FORMA.

Exigua planta est, folijs oblongis, colore flauo, sed languido, floribus luteis. Caule tenui, & imbecilli, radice squamosa, Spicæ faciem referente, è qua tenues, & numerosæ prodeunt fibræ.

DIOSC.
MATT.

LOCVS.

Nascitur in Luguriæ montibus, in Istria, & in Carinthia, & Styriæ alpibus.

QUALITATES.

Excalfacit magis quam Indica, minus vero siccatur.

Gal. lib. 8.
simp. mc.

VIRE.

Eadem omnia præstat quæ Indica, & Syriaca: sed vehementius urinam cit, & stomacho utilior est, auxiliatur Iocinoris inflammationibus, & felle suffusus. Bibitur ex ab-

DIOSC.
Gal.

sinthij decocto ad ventriculi inflammationes, & ex meraco aduersus lienis, renum, & vesicæ vitia, & venenatos ictus.

* SPICA



] Mauritanis,
nardo.] Hispa-
rdus Indiansky.



is, atque et-
teri inflam-
ore pilo eas
ria medica-

CELTIC-

* *SPICA Celtica* fastigiato flosculorum ordine à præcedente differens. *Appi-*
ctus etiam *Hirculus* est & alia quæpiam cognata planta.

F O R M A.

Differt à superiore, quod
 cauliculi nō vt illi glabri sint,
 nec flosculi in umbellam con-
 gesti, sed ramuli aliquot, & ad
 horum exortus foliola adna-
 scuntur, ita vt cōtinua serie su-
 periora longitudine superata
 ab inferioribus vna cum infi-
 dentibus flosculis frequenti-
 bus, tendant in fastigium. Ra-
 dix non discrepat, sed squamo-
 sa quoq; est, transuersaq; vlti-
 ma parte veluti abrupta aut
 præmorsa, ab eius infima par-
 te tantum fibræ deorsum ten-
 dunt alias simplici ordine, ali-
 as duplici triplicique, quod ra-
 rius est, & tunc ordine pertur-
 bato.

DIOSC. * *Hirculus* huic vere similis
 est sed odore graui, herba can-
 didior sine cauliculo. minori-
 bus folijs, radice neque amara
 neq; odorata.

† Cognata est *Planta Spica*
Celtica odore, sapore & folio-
 rum figura. sed radix cōspicua
 in tantilla plantula ad minimi
 digiti crassitudinem accedit sine squamis, fibræ in ima tantum eius parte sub-
 sunt.

L O C V S.

Nascitur hæc *Celtica* *Nardi* species in montibus prope *Sedunum* & alibi.
Hirculus cum *Celtica* *Nardo* quæ eo adulterari solet, apportatur. Plantula au-
 tem peculiaris illa à *Calceolario* quondam pro vero *Folio* missa est.*

NARDVS



ferens. Appi-



parte sub-

m & alibi.
lantula au-

NARDVS

NOMINA.

NARDVS montana, Græcis Νάρδος ὀρεινή. Italis, *Nardo Montana*.

15

NARDVS MONTANA.



FORMA.

Folia habet maioris Phu, MATT.
sed minora: caulem spithamæ
longitudine, umbellam puni-
ceo colore. Radices duas An-
toræ, aut testiculi modo, * &
interdum plures * subnigri-
cantes, ac fibratas, odore Phu,
aut Afari.

LOCVS.

Nascitur in Dalmatiæ mon- DIOSC.
tibus, & Cilicia. MATT.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccat, sed cæ- Gal. lib. 8.
teris longe minus. simp. mc.

VIRES.

Isdem cum cæteris viribus DIOSC.
poller. Sed illis quoq; ad cæ- Gal.
tera est imbecillior.

*NARDVS

*NARDVS MONTANA longius radicata. Græcis Νάρδος βουνὴ μακρορίζα.

Habetur differentia quædam huius montanæ Nardi in radicibus potissimum, quæ interdum oblongæ visuntur, vt ex hac icone ex ipsa veritate desumpta patet.*



PSEUDO-

PSEVI
kana



berat. L
& illiti
liatur, à
latitia fl
liquia c
lat, illin

Qui
mnino

NOMINA.

17

PSEVDONARDVS, seu Nardus Italica. [Italica, Spigo.] Gallis, *Aspic.* Boemis, *Spi-kanard domaci.*

PSEVDONARDVS SIVE NARDVS ITALICA.



GENERA.

Alterum mas, alterum fœ- MATT.
mina, quæ propriè Lauendula
vocatur.

FORMA.

Mas folio constat latiore, MATT.
longiore, robustiore, albidio-
re; quam fœmina. Tota plan-
ta fruticosa est, ac lignosa ros-
marini modo, folijs numero-
sis, longiusculis, cauliculis te-
nuibus, angulosis, dodrante
longioribus, spicatos flores ge-
rentibus, purpureos, & odore
fragrantes, verum adeo acuto,
ut nares feriat.

LOCVS.

Nascitur in collibus, & locis MATT.
saxosis, à Sole illustratis. & feri-
tur in hortis.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccit ordine MATT.
secundo completo: Aperit, at-
tenuat, resoluit, concoquit.

VIREs.

Confert omnibus frigidis MATT.
cerebri affectibus. vètriculum
roborat, & Iecur ab infarctu li-

berat. Lienosos iuuat, vterum calefacit, & menses ciet. Flores ex vino decocti,
& illiti vrinam pellunt, & flatus dissolunt. Eorundem decoctum ictericis auxi-
liatur, à iocinoris infarctu affectis, additis Marrubio, & Fœniculi radicibus. Stil-
latina florum aqua pota, amissam reddit loquelam: Præstat eadem ad animi de-
liquia cum pota, tum naribus, & arterijs admota. Oleum quod è floribus distil-
lat, illinitur vbi excalfacere sit opus.

CENSURA.

Qui hanc plantam, aut lauendulam, Cneoron album esse contendunt, o-
mnino hallucinantur.

B

PSEUDO-

PSEUDO-

PSEVDONARDVS. Fœmina siue Lanendula.] Italis, *Lauanda*.] Germanis, *Sauendel*.] Gallis, *Lauande*.] Boemis, *Lauendula*.

PSEVDONARDVS FOEMINA
SIVE LAVENDVLA.

FORMA.

MATT. Planta est fruticosa, pseudo-
nardo similis, sed folijs angu-
stiorib⁹, brevioribus, tenuio-
ribusq³. Floribus pariter pur-
pureis, atque spicatis, sed pa-
tentioribus, & mitiore satis o-
dore, ac magis grato.

LOCVS.

Idem. Oritur sponte in collibus
saxosis, & apricis, sed plerum-
que in hortis, & viridarijs co-
litur.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, & extenuat, mi-
tius tamen quàm pseudonar-
dus.

VIRES.

Idem. Ea omnia potest, quæ mas-
Pseudonardus. Atqui pecu-
liariter vestibus interposita, eas à tinearum rosione vendicat, & odoratas red-
dit.


CENSURA.

Ridendo tenentur errore, qui Lauendulam Cneoron album esse fatentur.

ASA-



ASARV
ro, &
ret.] B



& bilem
mores. C
Radices f
diu fuerit

Decip

NOMINA.

19

ASARVM, Græcis, *Ασάριον*, ac etiam *Νάδος άγία*.] Arabibus, *Asarum*.] Italis, *Asaro*. & *Baccara*.] Germanis, *Haselwur*.] Hispanis, *Asarabaccara*.] Gallis, *Cubaret*.] Boemis, ac pariter Polonis, *Kopytnik*.

ASARVM.

FORMA.

Folij est hederaceis, ro. MATT. tundioribus tamen, ac minoribus, prælongis nitentibus pediculis, floribus purpureis, cytini effigie, semine vinaceorum nucleis simili, cauliculis angulosis, radicibus numerosis, geniculatis, tenuibus, & odoratis.

LOCVS.

Prouenit in vmbrosis mon DIOSCO. tibus. In syluis, alijsq; opacis MATT. locis.

QUALITATES.

Excalfacit ordine secundo, Mel. & siccat tertio, aperit, attenuat, resoluit, incidit, acris est, subamara, & odorata.

VIRES.

Vrinam cit, hydropicos, & DIOSCO. ischiadicos iuuat. Pota alui, Mel. & vomitiones ciēt; pituitam,

& bilem deijcit. Facit quoq; ad iocinoris, & lienis infarctus & ad scyrthosos tumores. Confert quoq; diurnis febribus ab obstructionibus prouenientibus. Radices senis drachmis ex mulso potæ menses trahunt. Oleum in quo Asarum diu fuerit insolutum, vna cum Ladano spinæ dorsi illitum sudores prouocat.

CENSURA.

Decipiuntur, qui Asarum, & Baccharem nihil inter se differre contendunt.

B 2

ASA-



ASARINA, Græcis *A'sagivn.* Italis, *Asarina.*

F O R M A.

ASARINA.

MATT. Folij provenit Afari, rotundioribus tamen; scabris, leuiter circumferratis, humi accubantibus; cauliculis hirsutis: Floribus melinis anthemidis modo. sed minoribus. Radices mittit tenues, longasq; summatellure vagantes, acuto gustu, quadam cum leuiuscula amaritudine.

L O C V S.

Idem. Prouenit in montibus.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit, & ficit, quin etiam attenuat, incidit, aperit, & modicè abstergit.

V I R E S.

Idem. Herba ipsa, cum radicibus pota drachmę pōdere ex multa, siue oxymelite, aluum exoluit, ducitq; crassam pituitam, & acres humores: quare præfertur rei herbariæ peritis ad Gallicæ luis dolores, & articulares morbos: Datur quoq; commode hydropicis, & ictericis: Sunt etiam qui ad comitiales eam commendent, & ad neruorum resolutiones. Citur in urina, & mensis, & intestinorum animalia necat.



PHV,

PHV, G
Terua
Polon



ficcit secu

Phu ma
ris compu
& asthma,
quodd veni
num, in qu
internoru

NOMINA.

21

PHV, Græcis ποδὶν ἄγρια Νόξος.] Mauritanis, Fu.] Italis, *Valeriana*.] Hispanis, *Yerua benedetta*.] Germanis, *Waldrian*.] Boemis, *Kostlyk*.] Gallis, *Valerienne*.] Polonis, *Koslek*.

PHV.

GENERA.

Genera habentur tria, Ma- MATT.
ius, Minus, Minimum.

FORMA.

Maius folia fert olus attri seu DIOSC.
Elaphobosci: caulem cubita- MATT.
lem, aut proceriorem, læuem,
cauum, & purpurascentem ge-
niculatumq; , umbellâ ex pur-
pura albicantem, radicem mi-
nimi digiti crassitudine, adna-
tis inferiori parte fibris, subfla-
uo colore, odore graui, simul
& iucundo, nardum æmulan-
tibus.

LOCYS.

Nascitur in montibus, ac et- MATT.
iam campis, vliginoso solo.

QUALITATES.

Excalfacit excessu primo, & Gal. lib. 8.
siccat secundo completo. Aperit, attenuat, concoquit, & prouocat. simp. mc.
Auicenna.

VIREs.

Plu maioris radix vrinam, & menses cit, hausta flatus pellit, auxiliatur late- DIOSC.
ris compunctionibus. Præstat quoque aduersus stranguriam, veterem tussim, MATT.
& asthma, cum dulci radice, vuis passis, & Aniso decocta. Miscetur Antidotis,
quodd venenatis bestiis, & pesti resistat: oculorum claritatem adiuuat, vbi vi-
num, in quo decocta fuerit, guttatim instilletur. Additur quoq; in potionibus
internorum vulnere.

B 3

PHV



dolores,
cis: Sunt
ones. Cit

PHV,

PHV minus, Græcè *φούμικρον*.] Italis, *Valeriana minore*.] Germanis, *Gemein Valerian*.] Hispanis, *Terna benedetta*.] Gallis, *Valerienne des prez*.] Boemis, *Kopitnik*.

PHV MINVS.

FORMA.

MATT. Folijs prouenit Fraxino, aut Sorbo similibus, nigricantibus, humi stratis: caulibus maiori similibus, sed longioribus. Umbella etiam simili, aut paulo minore: radicibus numerosis albicantibus, odore cum quadam grauitate iucundo.

LOCVS.

MATT. Nascitur humecto solo.

QUALITATES

Idem. Excalfacit, & siccatur valentius, quam maius.

VIRES.

Idem. Radix viribus omnibus prædita est, quibus & maior, gustu tamen acrior est: quo fit, ut maiori aperiendi, attenuandi que sit facultate. Nam & venenis magis resistit. Peculiariter autem valent eius radices ad testium tumores à frigiditate, aut flatu genitos: si in vino decoquantur: & vapore fumi suffiantur testes.



PHV

NOMINA.

23

Phv minimum, siue Valeriana montana aut palustris. [Italis, *Valeriana minima*.]
Germanis, Klein Valdrian.

PHV MINIMUM.



FORMA.

Folio est maioris effigie, sed MATT.
admodum minore, cauliculis
angulosis, dodrantalibus, fo-
lijs vtrinque per interualla emer-
gentibus. Umbella in cacumi-
ne exigua, colore subpurpureo.
Radice tenui, praelonga tamen,
& numerosis capillamentis fi-
brata, iucundi odoris.

LOCVS.

Nascitur in montibus & pla-
nicie vliginosa solo. Idem.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccit, sed ca-
teris minus. Idem.

VIREs.

Vires sunt illi, quæ cæteris e-
adem, sed longè imbecilliores. Idem.

B 4 *PHV

**Phy peregrinum*. *Valeriana rubra*, alijs *Polemonij species*, nonnullis *Been rubrum*, vel *Ocymastrum Valerianthon*.] *Parisienfib. Phu latifolium*.] Germ. fremder *Baldrian*/Gespöretter *Baldrian*.

PHY PEREGRINVM.

FORMA.

Caulib. oritur ab eadem radice, quæ crassiuscula est, alba & odorata, pluribus, duorum dodrantum altitudine, aut maioribus, lauibus, geniculatis, subcandidis, folijs latis, oblongis, in acutum desinentibus, pulcre virentibus. Flosculi oblongi, tenues, rubetes eleganti purpura, caudati in caulicum fastigijs racematim diggeruntur stipanturque dense admodum, è quibus semina fiunt plumosa vt in cæteris *Valerianis*.

LOCVS.

Circa *Pisam Italiae* in ædificijs antiquis oritur, nec non in mœnjs. Apud nos non nisi in hortis visenda.


QUALITATES.

Radix odorata dulcis cum grata acrimonia aliqua ac minima ferè amaritudine calida est in secundo gradu, sicca in primi sine.

APPENDIX.

Non desunt, qui putent esse *Narcissum* *Virgilij* in *Georg.* & *Columelle* in hortorum cultu, cui *Dioscorides Flores Phu* comparauit.*

CASSIA



CASSIA solutiva, siue Ægyptia Siliqua. [Officinis, *simpliciter Cassia*.] Italis, *Cassia*. [Gallis, *Casse laxative*.] Boemis, *Cassia*.

CASSIA SOLUTIVA.



FORMA.

Arbor qui Cassiam profert, MATT. procera est, folio siliqua acutiore, solida, ac compacta materie, pullo intus colore, cortice cinericio, radicibus magnis. Siliquas profert, sesquicubitales, teretes, ligneo putamine, sed tenui, ac fragili; colore in rubrum nigricante, nigra, pingui, dulciq; intus medulla, semine siliquæ omnino simili.

LOCVS.

Prouenit in Ægypto, sed pri MATT. mastenet, quæ circa Cayrum shabetur.

QUALITATES.

Pulpa exsiccatur, & hume- Mef. cat ordine primo, resoluit, & edat dolores.

VIRES.

Sanguinem mundat, bilisq; feruorem extinguit, aluum item commodissimè citat, vrinæ difficultatibus mirificè auxiliatur. Bilem & pituitam excernit, pectus, & fauces mulcet. Renes expedit, addita præsertim dulci radice. Frequenter denotata, calculos in renibus renasci prohibet. Auxiliatur biliosa febre affectis, scilicet tamen operatur addito Hieræ puluere. Exterius illita Erysipelas extinguit, & cæteras, quæ cute tenus habentur inflammationes. Sumenda parum ante cibum. Nam si secus sumatur, facillè in nutrimentum transit.

*CASSIA poëtica Monspelienſium.] Hiſpaniſ Guardalobo.

CASSIA MONSPELIENSIVM.

F O R M A.

Paruus eſt frutex Sparti caule ſtriato, folijs Lini, ſucculentis, colore nigricante, qui tamen nonnunquam ad ſeſqui cubiti altitudinem attollitur. Fert floſculos multiplices herbaceos flauſcentes, olei floribus ſimiles, ad foliorum exortus prodeuntes, & fructum deinde alparagi marini æmulum, initio oblongum, in tres floris appendices deſinētem, qui matureſcit autumnō, & rotundior fit, Auguſto menſe rubescens, pulpa glutinoſa, ſapore & odore ingrato. Radix cortice craſſo, fulco vel ſubruſſo prædita eſt.

L O C V S.

In Romano, Narbonenſi agro vbere prouenit, & alibi paſſim in Galloprovincia iuxta ſepes & oliuetorum margines, Nec non in Hiſpania vulgaris eſt.

Q U A L I T A T E S.

Nihil fere aromatici habet, ſed radix valide aſtringit.

V I R E S.

Quidam vruntur radicis cortice in obſtuctione iecoris.*

*COSTI



*COSTI RADICES.



Varia radicū genera pro co-
sto ad nos afferūtur, quorum
quædam hic appingere libuit.
A. Costus est amaruspharma-
copolarum, levis, alb^o intus,
medulla per medium magna,
lineis in cortice trāsuerfis, in-
grato admodum & vitioso sa-
pore, medicato tamen. B. Co-
sti radix dodſāralis ferè, dura,
insipidia, subdulcis, inodora,
gravis, solidissima, tortuosa,
inæqualis, rugosa nonnihil,
fuscaq; foris, serra si seces, in-
tus laevis, plana politaq; est, si-
milis ferè rhapsantica vulgo
dicta, id est, centauro maiori,
cui cognatam plantam esse
crediderim. In medio partem
modice cauam & in ea mate-
riam alienam & terreum ali-
quid inuenire est, nescio an se-
cundum naturam, vel potius
vitio quodam. Radix certe
mihi inutilis & afferri indigna
videtur. Ne vltā quidem olet,
cum succum reddit, præ duri-
tie cultro fragilis est, minime

autem tenax. Macerata in aqua breui mollis euadit, & colore pallida. D. Costi
pharmacopolarum species maior, solida, ponderosa & crassa radice, lineis à
centro radicis ad superficiem ductis apparentibus multis, species videtur cen-
taurei maioris, etsi odorem eius nō habet, saporem vero subduleem. E. Costus
Lusitanicus qui iridem redolet, digiti crassitudine, aut paulo crassior, superfi-
cies è ruffo ad fuscum tendit, aliquando subalbicat, substantia intus alba, laxa
raraq; est & friabilis. F. Costi caulis pars infima, canna striata foris, intus multa
medulla alba infarcta. G. Costus Arabicus. Omnino Zinziberi cognata radix
videtur substantia & figura, habet & filamenta intus, sed maior crassiorque est
& minus acris ac subamara, & suum quendam peculiarem saporera inter man-
dendum ostendit, color foris fuscus ferè, intus albicat, & ad luteum inclinat.
Teredines etiam vt Zinziber sentit. *

COSTVS

COSTVS vulgaris, Officinis, Costus, sed perperam.] Italis, Costo bastardo, & Costo di Puglia.

F O R M A.

MATT. Folij exit pastinacæ domesticæ maioribus, dē floribusq; crispis, & asperiusculis, humi procūbentibus, caule cubitali, rotundo, geniculato, ramo foq; Umbellas in summitate gerit, floribus melinis. Semine nudo, ac subrotundo. Radice nititur vegeta, cortice crasso, ac carnolo, colore subalbicante, nō sine splendore.

L O C V S.

Idem. Nasclitur in Apulia, monte Gargano.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit, & siccit ordine secundo cōpleto. Aperit, abstergit, incidit, attenuat. Amara est, & acris.

V I R E S.

Idem. Præstant (vt referunt, qui ad nos comportant) Pseudocostli radices ad omnes cerebri, & neruorum frigidus affectus, ad pectoris vitia, & ad ventriculi cruciatus, & viscerum omnium obstructions, & ad renum, vesicæ, & vteri morbos. Ideoq; auxiliantur diutino capitis dolore affectis, verriginosis, comitialibus, stupidis, veteriosis, conuulsis, resolutis, asthmaticis, ruffientibus, ictericis, & hydropicis. Eadem status pellunt, vermes necant, vrinam ducunt, calculos pellunt, menses, & partus ciēt. Infunduntur earundem decocta, ad coli cruciatus, & coxendicum affectus.

I V N C V S



IVNCVS odoratus, Græcis, Σχοινὸς ἀρωματικός.] Arabibus, Adcher.] Italis, Squin-
anto.] Germanis, Camelschew.] Hispanis, Paya de mequa.] Gallis, Squimanthum,
& pasture de Camely.] Boemis, Sirij Vuonne.

IVNCVS ODORATVS



FORMA.

Folia profert caricis vel zæ
robustiora, tamen sursum spe-
ctantia, & sese stipantia. Cul-
mos edit zæ modo, genicu-
lato, & flores in summitate
odoratos. Radicē habet ima
parte villosam, odoratamq;

LOCVS.

Nascitur cum in Arabia, & Theoph.
Syria, tū in campestribus, &
pascuis, tum etiā vbi stagnan-
tes aquæ siccantur.

QUALITATES.

Modicè excalfacit, modi- Gal. s.
ceq; adstringit, nec plane à te- simp. mc.
nuitatis natura alienus est. A- MATT.
perit, digerit, pellit, incidit,
excoquit, modicè adstringit.

VIREs.

Cit vrinam, & menses, fla- DIOSC.
tus resoluit, & venarum spirac-
ula laxat. E potius flores meden-
tur cruenta expuentib⁹, quin
etiam ventriculi, pulmonis,
iecinoris, renum, & vteri do-
loribus. Radix adstringenti-
or est. Datur eadem vtiliter a-
liquot diebus potanda cum

pipere, hydropicis, atque conuulsis. Decoquitur ex gallinaceo iure tota plan- MATT.
ta, fitque hinc potus admodum vtilis fœminis, quæ vteri doloribus in puerpe-
rijs laborant. Miscetur antidotis.

CENSURA.

Manifesto tenentur errore, qui contendunt Schœnianthum, quo vtimur, ef-
se supposititium.

CALA-

CALAMVS odoratus, Græcis κάλαμος ἀρωματικός. Italis, Calamo aromatico.

F O R M A

CALAMVS ODORATVS.

DIOSC. * Melior est fuluus, dense geniculatus & qui assulosè frangitur, lentus in mandendo cum aliqua acrimonia.*

L O C V S.

Theoph. Nascitur in India, quin etiam in Iudæa,
DIOSC. trans Libanum montem.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 8. Modicè excalfacit, modicèq; adstringit,
simp. mc. nec planè à tenuitatis natura alienus est. A-
perit, incidit, ac pellit.

V I R E S.

DIOSC. Vrinam potu ciet, quare decoquitur ad
potiones cum apij semine ad hydropes: re-
num vitia, & vrine stillicidium. Menfes tum
potus: tum in deflectionibus additus pellit:
suffitur vt iliter tussientibus, cum per se,
tum cum resina Terebinthina, hausto per
arundinem, aut infundibulum fumo. Ex-
petitur ab vnguentarijs ad eorum odora-
menta, nam & suffitionibus odoratis, & vn-
guentis adijcitur.


C E N S V R A.

MATT. Acori radices sunt, quæ in Myropolij calami odorati vicem præstant. Siqui-
dem odoratus calamus iam diu periit: verùm eadem Acori radices rectè admo-
dum eius loco supponi possunt.

* A P P E N D I X.

Hæc frustula Calami odorati, quæ appinxi, cum pulcrè conuenirent Diosco-
ridis descriptioni, à doctissimo viro Bernardo Paludano Frisio, ex Syria & Ægy-
pto reduce mihi & domino C. Clusio liberaliter communicata sunt.*

M V S C V S



NOMINA.

31

Myscv's, Græcis, Βελόν η απαλό γυν.] Aphris, Axnech, aut Vſnee.] Italis, Mosco.] Germanis, Mosß.] Boemis, & Polonis, Mech.

MVSCVS ARDOREVS

FORMA.

Capillacea est materia, ex MATT. annosis plerumq; arboribus dependens, colore subalbicante, ac incano.

LOCVS.

Nascitur in quercubus, po MATT. pulo, cedro, picea, pinu, abiete, larice, & alijs quandoq; arboribus.

QUALITATES.

Refrigerat, sed parum, & Galen. 6. propinquum est fere medijs. simp. mc. Adstringit, digeritq;.

VIRES.

Huius disutum ex vino plu Gal. ribus dieb⁹ paratum, & hau- Serap. stum somnum inducit, ven- MATT. triculum roborat, vomitiones, & aluum cohibet. Recens decerptus, & oleo rosa-

à calore exortos mirifice mulcet. Sanguinem è vulneribus, manantem compeſcit impositus arcteque adalligatus. Expetitur quernus, lariceus, ac etiam abiegnus vnguentarijs ad pulueres odoratos parandos, quos Cyprios vocant.

MVSCVS



MVSCVS terrestris. [Ital. *Mosco terrestre*.] Germanis *Deerlap*.

MVSCVS TERRESTRIS.

F O R M A.

MATT. Longas viticulas, funiculi instar gignit, oblongis numerosissimisq; foliolis vndiq; stipatas, quæ sæpe ad septem, octoq; vlnarum longitudinem protendantur, compluribus vtrinq; adnatis ramulis. Serpit humi, nititurq; radicibus capillaribus plurimis, ex ipsis viticulis prodeuntibus, hederæ modo. Gignit quoq; Iunio mense in ramusculorum cacumine Iulos, Corylaceis ferè similes, subflauo colore.

L O C V S.

Idem. Nascitur in syluis, sabulosis, & inuijs locis, interfata.

FACULTATES ET
VIREs.

MATT. Præstat eius decoctum ex albo meraco paratum, ad frangendos, educendosq; renum calculos. Decoctus in aqua, & deinde contusus, mulcet admotus, & inflammationes, & earum dolores: proinde non desunt qui hoc auxilium vsurpent ad calidam podagram. Superioris ætatis Pharmacopæi diu hac planta vsi sunt, manifesto errore, Celticæ Nardivice,



CRO-

NOMINA.

33

CROCVM, siue Crocus, Græcis, Κρόκος. Arabis, Zabafaran, siue Zafaran. Italis, Zaffarano. Germanis, Safran. Hispanis, Azafran. Gallis, Zaffran. Boemis, Sfran. Polonis, Szafran.

CROCVM.



FORMA.

Comosis prouenit folijs, MATT. longis, angustis, capillaceis, planis, non rotundis, Tragopogoni modo: Floribus purpureis, Colchico similibus, rubentibus intus staminibus, inter aureas quasdam ligulas exortis: Radice nititur bulbosa.

LOCVS.

Seritur in campis, & hortis, Idem. bulbis tantum transpositis.

QUALITATES.

Excalfacit excessu secundo, Gal. 7. & exiccat primo, quin etiam simp. me. frigidi, terreiq; nonnihil ob- DIOSC. tinet. Aperit, pellit, digerit, roborat, & emollit.

VIRES.

Elegantem colorem præ- DIOSC. stat: ex passo potum crapulam arcet. Ex humano lacte illitum oculorum fluxiones cohibet. Additur in potionibus, quæ interaneorum causa temperantur. ad vuluæ etiam, sedisq; cataplasmata vtiliter inditur. Venerem stimulat, vtile & aurium collectionibus. Lætitiam affert, ob id additur v- MATT. tiliter medicamentis ad cor facientibus. Sunt qui scribant exitiosum esse crocum tribus drachmis in aqua potum. Vrinam mouet radix ex passo pota.

C

*CRO-

Hæc est facies croci vbi defloruit. Folia enim ipsius confestim longiora fieri incipiunt, nec amplius erecta consistunt, sed circumcirca in humum funduntur, atq; sic per totam hyemem delitescunt sub niuib; donec estate ingruente subinde contabescant.

Approximus hic quoq; radicem hirsuto inuolucro exutam, vt gemini sibi inuicem insidentes bulbi appareant.*



HELENI-

NOMINA.

35

HELENIVM, Græcis, ἡλένιον. Arabibus, *Iafin*, siue *Rafen*. Vulgò officinis, *Enula campana*. Italis, *Tella Enoa*, siue *Enola*. Germanis, *Mant*. Hispanis, *Rai de Alla*. Gallis, *Aulned*. Boemis, *Vuoman*. Polonis, *Oman*.

HELENIVM.

FORMA.

MATT.



Folia habet Verbasco maiora, latiora, longioraq; hirsuta, & in acutum desinentia: caulē profert magnum, hirsutū: flores aureos Chrysanthemi modo, sed maiores: semen verbasci simile, tactu pruritus faciens. Radice nititur magna, vegeta, crassa;q; intus alba, & exterius nigricante, subacri, & amaro sapore.

LOCVS.

Loca amat Vliginosa.

Idem.

QUALITATES.

Excalfacit, non tamen primo gustatur: verum calida, & sicca est, cum recrementitia humiditate. Aperit, prouocat, concoquit, incidit.

Gal. lib. 6.
simp. me.
MATT.

VIRE.

DIOSC.

Potum radice decoctum menses, & vrinas ciet. Auxiliatur omnibus pectoris affectibus in eclegmate sumpta, ob idq; datur asthmaticis, & suspiriosis: Eadem flatus pellit, & demorsos a serpente iuuat. Stomacho quoq; vtilis est in passo condita. Præcordijs medetur, & ventris tineas necat, illinuntur tum radix, tum folia, ad coxendicos affectus. Aqua à radicibus destillata, maculas in facie delet, & cutis nitorem conciliat.

C 2

GELSI-

GELSIMINVM, vel Iasminum, Arabibus, *Zambach*, siue *Sambach* aut *Iesemin*.] Italis, *Gelsimino*.] Germ. *Deielseben*.

GELSIMINVM.

F O R M A.

MATT. Viticulosa, sarmentosaq; est planta, & topiario operi, umbraculisque contexendis peridonea. A radice viticulæ oriuntur longæ, flexiles, lentæ, viridesq; è quibus oblonga prodeunt folia, septena ex vno pediculo, mollia, & in acutum definentia, flores mittit modo cædidos, modo cæruleos, modo flavos, lilij parui effigie, odoris perquam iucundi acutiq;.

L O C V S.

Idem. Amat amēnos, & calidos tractus, habeturq; in viridarijs, & hortis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Flores excalfaciunt, & siccant ordine secundo.

V I R E S.

Serap. Præstat oleum, quod inso-

Mef.

MATT.

latis in eo floribus paratur, ad omnes frigidos dolores, excalfacit enim & laxat. Illinitur quoq; vtiliter mulieribus, ad frigidos vteri cruciatus, frigidosq; quoscunq; neruorum, & articulorum affectus.

C E N S V R A.

Aberrant, qui putant Iasminum vnguentum antiquis parari solitum, ex nostrate Gelsimino.

* GELSI-



NOMINA.

37

* GELSIMINVM Catalonicum. Vel Chamægelsiminum grandiflorum per-
mænum.] Germ. Fremdd Veielreben/oder Jasminen mit grossen Blumen.

GELSIMINVM CATALONICVM.

FORMA.



Humilius est & nequaquam
scandit, furculosis ramulis vix
cubito vel sesquicubito lon-
gioribus, folijs Iasmini vulga-
ris minoribus, nigrioribus &
rotundioribus, floresque fert
grandiores vulgaris quadru-
plo maiores & rariores, super-
ne candidos, inferne parum
subrubentes, odore acriori &
suaviori, floret autumnus & fe-
rè per totam hyemem. Inferi
solet in vulgare, & sic com-
mode propagatur.

LOCVS.

Alitur studiose in vrceis
pensilibus.

C 3

STYRAX,

STYRAX, Græcis, Στράξ.] Arabibus, Mehn siue Astarach.] Officinis, Storax cala-
mira.] Italis, Storace.] Hispanis, Efforaque.

STYRAX.

F O R M A.

MATT. Styracis planta cotonea ma-
lo similis est, folijs tamen mi-
noribus solidis, robustis, sub-
rotundis, lentis ramorum sur-
culis. Flores habet albicantes,
Auratie mali haud longè dis-
similes. Baccas longis pedicu-
lis nitentes, albicante lanugi-
ne obductas, prominente an-
teriore parte cacumine.

L O C U S.

DIOSC. Nascitur in Syria, Iudæaq;
MATT. circa Gabala, & Marathunta,
quin etiam Pisidiam, Cilici-
am, & Cassium Seleuciæ mon-
tem. Nascitur quoq; in Roma-
no agro circa Tybur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 8. Excalfacit Styracis lachry-
simp. me. ma ordine secundo, & desic-
cat primo. Emollit conco-
quit, resoluit.



V I R E S.

DIOSC. Styracis lachryma medetur tussi, destillationibus, rucedini, grauedini, & v-
teri præclusionibus, duritiibusq;. Menses cit, cum illita, tum pota, aluum quo-
que emollit, si exiguum cum Resina Terebinthina, catapotij modo deuore-
MATT. tur. Cum autem sit odorata, sufficitur odoris gratia, & vnguentarijs expetitur
ad odoramenta. Oleum ex ea paratum, hæc omnia valentius præstat.


P I N V S.

NOMINA.

39

PINVS, Græcè Πίνος.] Arabicè, *Sonabar.*] Italicè, *Pino.*] Germanicè, *Tichtenbaum.*] Hispanicè, *Pino.*] Gallis, *Pin.*] Boemis, *Barouice.*] Polonis, *Sofzna.*

PINVS.



GENERA.

Domesticum, Montanum, MATT.
Maritimum.

FORMA.

Domestica pinus, numerosos fundit ramos, superiori caudicis parte, circumuagantes, comosis, ac robustis folijs, longis, angustis, numerosis, & in cacumine aculeatis. Nuces edit magnas, ponderosas, compactas, solidasq; oblongis intus nucleis, duro crassoq; putamine obductis, gustu dulci, ac iucundo.

Idem.

LOCVS.

Copiosa habetur, in agro Rauennate, non longe ab Adriatici maris litore. Habetur etiam & in alijs Italiae locis, & praesertim in Cœnobiorum hortis, & viridarijs.

Idem.

QUALITATES.

Cortex exsiccat: folia refrigerant, resina autem exsiccit, discutit, & purgat, emollit.

DIOSC.

VIRES.

Tufa, & illita folia inflammant.

DIOSC.

mationes prohibent. Suffitus cortex partus, & secundas eijcit, potus verò aluum sistit, & urinā ciet: Foliorum ex aceto decoctum, vtiliter colluitur in dentium dolore; praestat idem, & nucis cortex, quin etiam ligni ipsius tæda. Virides aciculæ contritæ, & ex meraco potæ, cordis dolorem sedant. Nuclei boni, crassiq; succi sunt, & multum nutriunt, sed non faciliè concoquantur. Impinguant, Venerem sollicitant, tabidos, resolutos, & stupidos iuuant, & renum, & vesicæ vlcera sanant.

Gal. 2. de facul. aliment,

C 4

PINVS

PINVS sylvestris, Græcè, *πινος ἄγρια*.] Italicè, *Pino salatico*.] Germanis, *Wildstehenbaum*.] Gallicè, *Pin sauvage*.

PINVS SYLVESTRIS MONTANA.

GENERA.

MATT. Alterum montanum, alterum maritimum : Huius duæ habentur species : illius autem tres.

FORMA PRIMÆ.

Idem. Prima in montano genere eadem ferè, quæ domesticæ facies est, coma tamè breviori, folijs rudioribus, & acutioribus. Nuces edit Cupressinis paulò crassiores, longiores, & in acutum desinentes, resinofas, autumno dehiscentes.

LOCVS.

Idem. Nascitur in montibus, & cliuosis locis.

QUALITATES.

Idem. Cortex, siccior præstat facultate, vt resina, calidior quam domesticæ.



VIREs.

Idem. Folia, cortex, resina, nuces eadem præstare possunt, quæ in domestica diximus, ac etiam valentius. Nucum recentium succus, vuluam angustiorē reddit: infusus, & mammas, nimis in virginibus extuberantes, cohibet. Idem præstat stillatitia earum aqua, sed non adeo valenter.

CENSURA.

Non desunt qui pinum montanum hanc, Dioscoridis piccam esse contendunt, sed proculdubio hallucinantur.


Hanc

N O M I N A.

41

Hanc Ananienſes in Tridentino agro appellant Mugo. Latinis, Pinus Sylveſtris repens dicitur. at Græcis, quod ſtipite careat, rectè *αἰτὺς ἀστύλης* vocari poterit.

PINUS SYLVESTRIS ALTERA,
MUGO DICTA.



F O R M A.

Caudicem nullum edit, ſed MATT. humo tenus ramos à radice fundit, qui lōgo tractu repunt. Fructum proferit prædictæ ſimilem, vegetiorē tamen paulo, reſinoſum, nec inodorum, nullo intus nucleo, qui mandi poſſit.

L O C V S.

Nascitur plurimum in ſummis montium cacuminibus. Idem. nos eam primū vidimus in Rauena, Ananienſium monte.

Q U A L I T A T E S.

Huic eadem ſunt qualitates, quæ cæteris pini generibus. Idem.

V I R E S.

Iſdem quoq; viribus poſter, quibus & cætera pinorum genera. Incolæ ramis vtuntur ad vaſa vinaria cingenda, circulis inde paratis. Idem.

G s

PLINIUS

PLINIUS PINVM Tarentinam appellat, Ananienfium & Rhetorum fylva-
ni homines Cembro, & Cermolo.

PINVS SYLVESTRIS
CEMBRO.

F O R M A.

MATT.

Speciosa adolescit proce-
ritate, facie alijs haud abfimi-
li, spiffiori tamen, ac tenuio-
ri coma: Strobilis piceis cra-
ffitudine fimilibus, breviori-
bus tamen: subpurpurafcen-
tibus, fragilibusque: Nuces
concludit triquetras, dome-
fticis longè minores, fractu
faciles, utpotè quæ dentibus
facile rumpuntur. Inest his
nucleus puillus, dulcis, albi-
cans, subrufa cõtectus mem-
brana, non ingratus efui. Re-
finam caudex fundit albam,
& odoratam.



L O C V S.

Idem.

Nascitur copiosa in Ty-
rolenfi Comitatu, ac alijs cir-
cumstantibus montibus in
Vulturenæ alpibus.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Qualitate à cæteris Pini
generibus non variat.

V I R E S.

Idem.

Eædem profecto quæ cæteris: Tabulis ex ea paratis ad hypocausta extruen-
da maximè vtuntur Germani, odoris gratia: ac etiam ad alia ædium ornamenta.

PINVS

NOMINA.

43

PINVS Maritima, Græcis βαλάνια πίτυς. Italis, Pino marino.

PINVS MARITIMÆ PRIMVM GENVS.



FORMA.

Folia habet angusta, prælonga, raraq; in capillamenti modum protensa, squamosis vbiq; ramis, lulis sursum spectantibus. Conos edit cæteris sylvestribus longiores, crassioresq; præduros, nucamentis in acutum extuberantibus, in quibus inanes concluduntur nucs.

LOCVS.

Prouenit in Maritimis Italiæ, Agro cum Pisano, tum Senensi, & (vt audio) apud Calabros.

Idem.

QUALITATES.

Cortex eius mitius exiccat minusque resina excalfacit quam cæterorum sylvestrium.

Idem.

VIREs.

Eadem quæ cæteris illi sunt facultates. Utuntur incolæ pinguißima eius materie ad nocturnas faces.

Idem.

Eadem

Eadem quæ alteri.

PINVS MARITIMÆ SECVN-
DVM GENVS.

F O R M A.

MATT. Comosior huic opaciorq;
quàm alterius, sed breuiori-
bus capillamentis. Strobilos
profert maiores, lōgiores, du-
riores, ac pulchriores, promi-
nentibus vndiquaq; nucamen-
tis, vacuis intus nucibus, ac su-
peruacuis.

L O C V S.


Idem. Nascitur haud longè à ma-
ri, iisdem ferè vt altera locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. A cæteris qualitate haud
differre videtur.

V I R E S.

Idem. Viribus ab alijs minime dif-
crepat.



L A R I X.

LARIX, Græcis Λάριξ.] Italis, Larice.] Germanis, Lerchenbaum.] Gallis, Melze, siue Meleze.

LARIX.



FORMA.

Arbor est eximie procerita. MATT.
tis. materie æterna, cortice
perquam crasso, in rimas de-
hiscente, & intus rubente: Ra-
mos emittit circa caudicem
ferè totam: extremitatibus fa-
licis modo lentis, sublateo co-
lore: odore nõ iniucundo: fo-
lijs gregatim circum ramulos
prodeuntibus, densis, oblon-
gis, mollibus, comosis: Conos
edit Cupressinis æmulos, mol-
liores tamen, flores purpure-
os, & odoratos. Resinam fun-
dit liquidã, ac copiosam, quin
etiam Agaricum gignit.

LOCVS.

Prouenit in montibus, & Idem.
cliuosis locis. Larice abũdant
Tridentinæ alpes: & circum-
stantia loca.

QUALITATES.

Cortex siccatur pini modo: MATT.
Resina excoctatur, atque minus
quàm pinea, & abiegna.

VIRES.

Refina aluum ducit, abster- Idem.
git, prouocat, aperit, glutinat, attrahit, Suppuratos, & tabidos iuuat; delinẽta
purulenta extrahit. Renes, & vesicam expurgat, calculos expellit: deuorata ar-
ticulorum dolores lenit. Gonorrhæam sistit addito succino, & corallio, aut ca-
phura momento, oleum ex ea distillatum cum ad plura vtile, tum maxime vul-
neribus glutinandis, & neruorum affectibus.

CENSURA.

Qui Laricem nostratem non esse legitimam dicunt hallucinantur: & qui Vi- MATT.
truuius, & Cæsaris commentarijs addicti, Laricem igne haud quaque comburi
posse negant. cum tamen eius materies resinosa ceteris resiniferis plantis ha-
beat. antiquorum omnium testimonio qui de ea scripserunt.

LARI-

Vt accuratius indicarentur ramorum tubercula è quibus conferunt enascuntur folia, non inutile putauimus fore, separatim ramulum hic appingere, cum depicta præcedens arbor, vt proportio non violaretur, necessario illud in spaciū angustius contractum exhibeat obscurius.*



P I C E A,

NOMINA.

47

PICEA, Græcis πεύκη.] Italis, Pezzo.] Germanis, Nor Fannenbaum.] Hispanis, pino negro.] Gallis, Pesse, Pignet, siue Garipoolr.

PICEA.

FORMA



Facie est Abietis adeo emu- MATT.
la, vt Syluanos quandoq; fal-
lat. Est tamen nigrioribus fo-
lijs, latioribus, læuoribus,
mollioribusq; ac minus acu-
leatis. Hæc ramos circum-
qua; vestit atq; operit. Co-
nos edit Spithamæ longitu-
dine: fragili nuçamentorum
congerie, in quibus semen
concluditur. omnino inutile.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & Idem.
syluis.

QUALITATES.

Siccat cortex, adstringit, DIOSC.
Pini modo, ita resina pari fa-
cultate exalfacit.

VIREs.

Ea omnia præstat, quæ pi- DIOSC.
nus, etsi Resina ignobilior MATT.
est, & minus efficax. Materies cum ad ædium, nauiumque fabricas, tum ad vasa
vinaria, & alia domestica vtensilia aptissima habetur. Cortex coriarijs expetitur
ad densanda coria.

ABTES

ABIES Græcis, ἐλάτη.] Italis, *Abiet*, *Abete*, & *Abeto*, *Ανεξο*, *Auedia*, *Crouat*.] Germanis, *Dannenbaum*/weiß *Dannen*.] Gallis, *Sapin*, *Sap*, *Vergno*. Hispanis, *Abeto*.

ABIES.

FORMA.

MATT. Piceam tota facie æmuletur, angustioribus tamen folijs, & aduersa parte candidantibus. Resinam fundit liquidam, larignæ similem, quam lachrymam abiegnam vocant: splendidiore tamen, & gustatu amariorem, ac odoratiorem multò. Gignitur lachryma intra corticem excitato tumore, quo resecto, collachrymat. Annosæ arbores incanæ spectantur, ob dependentes vndiq; mulcicommas.

LOCVS.

MATT. Nascitur in altis montibus, inter larices, & Piceas.

QUALITATES.

MATT. Cortex exiccat Piceæ, & Pinus modo. Lachryma verò magis quàm Larigna exalfacit, & eadem præstat valentius. glutinat mirificè recentia vulnera, & præsertim caluariæ, vbi tamen cerebri membrana haud detecta appareat. Iuuat sumpta semuncia pondere Ischiadicos, podagricos, ac calculosos: quin & Asthmaticos, suspiriosos, ac purulentos.



* ABIETIS

* AEIETIS PARTICVLÆ.



Particulas hasce separati-
m exhibere volui vt abun-
dè satisfaceret herbariæ reistu-
diosis. A. Ramulus est cum
folijs veteribus & nouis, &
squammulis quoq; circa in-
itia surculorum nouorum.
B. Flores crocei, bicolores,
qui paulò ante solstitium e-
mergūt. C. Conus nouellus
& imperfectus. D. Con^o per-
fectus, qui sursum versus cre-
scit, minime pendulus, ape-
riturque vere, decidit verò
rursus ex arbore quando fo-
lia incipiūt emergere. E. Co-
ni scapus à laminis nudus.
F. Laminæ conis, item lingu-
læ, nucleus, & semen. *

D LENTI-

LENTISCVS, Græcis *Ξύπος*.] Mauritanis, *Daru*.] Italis, *Lentisco*.] Hispanis, *Mata aut Arueira*.] Gallis, *Lentig*.] Germanis, *Mastixbaum*.

FORMA.

MATT. Folij est Myrto proximis, octonis exvno processu prodeuntibus, saturatè virentibus, ac perpetuis: cortice subrufo. Fructum profert racemosum, rubentemque invuè modum, è quo oleum elicitur: corniculos quoque gignit, in quibus liquor est limpidus, pusillis refertus culicibus. Resinam quoque fundit, quam Mastichen vocant, grumofam, duramque, sed omnium præstantissimam.

Locvs.

Idem. Nasceitur plurima in Chio, Creta, Cypro, & alijs Aegæi maris insulis: quin etiam in Italia, & præsertim in Hetruria, & Campania.

QUALITATES.

Gale. li. 7. Planta exiccat secundo or-
fimp. mc. dine completo, aut tertio in-
DIO SC cipiente: in caliditatis autem
& frigiditatis differentia, medium tenet, adstringit, roborat, resoluit. Resina hæc omnia potest, at præter hæc emollit, & exalfacit.

LENTISCVS.



VIRES.

DIO SC. Lentiscus auxiliatur sanguinem reiicientibus, dysentericis, mensium profluuijs sedisque & vteri procidentijs. Idem caua vlcera explet, ossa ferruminat, vrinam pellit, dentes commotos firmat. Oleum è baccis pressum adstringit, & præscripta omnia potest. Resina autem præter hæc peculiariter tussi veteri medetur, stomachichos iuuat, & durities emollit. Eadem commansa pituitam elicit, & halitum commendat. Articulorum frigidis dolores tollit atque mulcet, si cum cumino, salvia, & Lauri baccis illinatur.

TEREBIN-

NOMINA.

51

TEREBINTHVS, Græcis *τέριυνθος*.] Arabibus, *Baton, Botin, aut Albotin*.] Italis, *Terebinto*.] Gallis, *Terbentin*.

TEREBINTHVS.



FORMA.

Folij est Fraxini, crassio- MATT.
ribus, pinguioribus, & ro-
tundioribus, Cotino proxi-
mis: materie Lentisco haud
ab simili, perinde ac cortice.
Floret oleo modo, & fructus
rubentes, racemososque ge-
rit: cornicula quoque edit
rubentia, caprinis haud mi-
nora, liquore quodam, & cu-
licibus referta: vt in Lenti-
sco. Resinam fundit liqui-
dam & odoratam, Larignæ
aut Abiegnæ similem, cete-
risque præstantiorem, Len-
tiscina excepta.

LOCVS.

Prouenit in Syria, Cy- DIOSC.
pro, Lapidia, & multis Italiae MATT.
locis: habetur & Romæ, in
antiquarum domorum rui-
nis. Nascitur & in Tridenti-
nis montibus: saxosa enim &
calida amat loca.

QUALITATES.

Folia, cortex, & fructus Galen. 3.
exaltant, & siccant ordine secundo, adstringunt, roborant, repellunt, con-
trahunt. Resina verò exaltant, extrahit, emollit, abstergit, deijcit. sim. med. MATT.

VIRES.

Arida bacca potæ vrinam cient, & lienosos iuuat. Resina hausta vnciæ pon- Gal.
dere renes expedit, & vesicam, & articulorum morbis auxiliatur. Medetur ea- DIOSC.
dem delincta tussientibus, tabidis, suppuratisque, crassa, purulentaque expe-
ctorat: scabiem & lepram sanat, aluum emollit, vrinā cit, vulnera & vlcera pur-
gat, & carne replet. Additur in antidotis.

D 2 CVPRES-

CYPRESSVS, Græcis *κυπάρισσος*.] Arabibus, *Saro*, *sive Sero*.] Italis, *Cipresso*.] Gal-
lis, *Cypres*.] Germanis, *Cipressen*.] Hispanis, *Cipres*.] Boëmis, *Cyprijs*.

GENERA.

Duum est generum. Mas
alterum, alterum Fœmina.
Hæc fastigiato est culmine.
Illa ramos in latum spargit.

FORMA.

MATT. Vtraq; procera rectaque,
caudice glabro, & ramos in
summitate tantum habens.
Folijs virescens perperuis, Sabinæ
bacciferæ proximis. Con-
nos gerit Lariceis æmulus,
solidiores tamē compactio-
resque, in quibus minutum
concluditur semē. Resinam
fundit liquidā sed modicam,
odore haud ingrato. Ligni
materies solida, spectabilis,
& suauiter odorata.

LOCVS.

Idem. Plurima in Creta sponte
nascitur, aquosos odit tra-
ctus, & colles, & mōtes amat.

QUALITATES.

Galen. 7. Coni folia & germina ex-
simp. me. iccant, absq; insigni acrimo-
nia, & per quā moderatē ex-
calfaciūt. Adstringit Cupres-
sus omnib. suis partibus, ro-
borat, glutinat, & resoluit.

Diosc.

Folia ex passio & mirrhæ exiguo pota, vesicæ rheumatismis, & vrinæ difficul-
tati auxiliantur: pilulæ autem ex vino tuscæ dantur commodissimè potandæ dif-
entericis, tussientibus & orthopnea affectis, sanguinemque reiicientibus. En-
terocellas tam potu, quam illitu reprimunt. Pilulæ, cum arboris coma suffite,
culices abigunt: folia trita & imposita vulnera conglutinant. Sanguinē suppri-
munt: trita ex aceto capillum tingunt. Illinuntur per se, aut cum hordeacea fa-
rina, ignibus sacris, vlceribus, quæ serpunt, carbunculis, & oculorum inflam-
mationibus: ad mora cum cerato stomachum corroborant. Pilularū decoctum
ex aceto paratum dentium rheumatismos cohibet. Earundem & mulorum
vnguium cinis oleo myrtino exceptus opitulatur illitis capillorum defluuijs.

MATT.

LYNPIE-



VIRES.

NOMINA.

53

IVNIPERVS, Græcis, *ἀρκευθία*.] Arabibus, *Arconas*, siue *Archenchas*.] Italis, *Ginepro*.] Germanis, *Beetholster* siue *Krametbaum*.] Hispanis, *Enebro*.] Gallis, *Geneure*.] Boëmis, *Ialaunec*.] Polonis, *Zolaunec*.

IVNIPERVS.



GENERA.

Duo eius genera: Alterum DIOSC. maius, alterum minus.

FORMA.

Folio utraq; est aculeato, MATT. longiusculo, & angusto: ligni materies dura, compactaq; ac odorata: Baccas edit ceruleas, copiosas, erui magnitudine, odore haud ingrato: Resinam quoq; fundit mastiche haud absimilem, quam Arabes Sandaracem vocant.

LOCVS.

Nascitur in collibus, ac et- Pli. lib. 16. iam montibus, arido præfer- cap. 18. tim tractu.

QUALITATES.

Excalfacit & siccatur ordine Galen. 6. tertio: Baccæ tamen siccant simp. me. ordine tantum primo. At- MATT. tenuat, aperit, digerit, resoluit, adstringit, roborat.

VIRE.

Bibuntur folia, aut eorum MATT.

succus vtiliter contra Viperarum morsus. Earundem decoctum menses elicit, & vrinas: Baccæ stomacho viles: Præstant eadem contra pectoris vitia, tussim, inflationesque. Resina suffita, aut aspersa destillationes sistit: hausta verò mensium abundantiam cohibet, tineas ventris necat, resolutis nervis medetur. & sanguinis excreationes suppressit, quin etiam fluentes hæmorrhoidas: In solutionibus dentium addita dolorem mulcet, quod & baccarum decoctum ex vino efficit. Carbores è Iuniperi ligno paratos, & suo ipsius cinere sepultos, integro anno ignem fouere Chymistæ promittunt.

D 3

*IVNIPE-

*LYNIPERVVS maior, in Galloprouincia Cade vocata.

LYNIPERVVS MAIOR.

FORMA.

Folio est alterius Iuniperi maiore, acuto, pungēte, bacca triplo maiore, resinosa. Lignum suavis est odoris, & liquorem exudat, Oleum de Cade dictum.

Locvs.

Vulgatissima est in Galloprouincia, necnon in pluribus Italia locis.

QUALITATES
ET VIRES.

Pollet ijsdem quibus præcedens.

APPENDIX.

MATT. Pauci admodum sunt, qui non putent Oxycedrum esse Iuniperum maiorem, adeo vt plerique vulgarium illam ab hac nesciāt distinguere.*



SABINA.

NOMINA.

SABINA, Græcis, *Σάβινα*] Arabibus, *Abel, Abebel, siue Alhorar.*] Italis, *Sabina, & Savi-
na.*] Germanis, *Sebenbaum.*] Hispanis, *Sabina.*] Gallis, *Savinier.*] Boëmis,
Klafterka chnuogka.] Polonis, *Szauuina.*

SABINA.

GENERA.

Genera duo: Alterum fru- DIOSC.
giferum, alterum sterile. MATT.

FORMA.

Fructifera folijs exit Myri- DIOSC.
ca crassioribus, minimè acu- MATT.
leatis. Differètia in baccis. In
altera enim caruleæ, in alte-
ra rubentes spectantur.

LOCVS.

Seritur in apricis, & colli- MATT.
bus, in hortis, & viridarijs, ac
etiam sponte per se proue-
nit.

QUALITATES.

Tenuium maximè est par- Gale. li. 6.
tium: Excalfacit, & siccit or- fin. med.
dine tertio: gustu acri & ama-
ro, & adstringente. Digerit, MATT.
resoluit, aperit, prouocat,
abstergit, penetrat, sitim ac-
cendit.

VIRES.

Vrinam sanguinolentam ducit, menses elicit: særum interficit, ac etiam ex- DIOSC.
pellit, cum pota, tum suffita. Vtriusque folia nomas cohibent, vlcera in capiti- Gal. libid.
bus puerorum manantia sanât, foliorum puluere, & butyro bubulo illito: Suf- MATT.
fita gallinarum piritum, & grauedinem excutit. Ex butyro & melle delineta,
asthmaticis medetur. Nigra & fordida vlcera cum melle purgat. Additur quo-
que multis in antidotis.

CENSURA.

Qui Sabinam bacciferam non concedunt, apertè delirant.

D 4

SABINA



SABINA Sterilis, Græcis, *ῥεγάδης σαρπηλίδης*.] Italis, *Sauina sterile*.

SABINA STERILIS.

FORMA.

MATT. Vulgaris est notitiæ, folijs cupressi ferè similibus, sed acuto pungentiq̃ue cacumine, grauitè olentibus, amariusculis, feruentibusq̃ue.

LOCVS.

Idem. Nascitur in apricis, & feritur quoque in hortis & viridarijs.

QUALITATES
ET VIRES.

Idem. Non adeò multum differt à baccifera, verùm tum acrior est, tum quoque graueolentior: Excalfacit, & siccat tamen valentius. Digerit, resoluit, aperit, abstergit, prouocat, & parumper adstringit.



CEDRVS,

CEDRVS, Græcis, Κέδρος. Arabibus, Serbin. Italis, Cedro. Resina autem eius Latinis, Cedria, Græcis, Κεδρία. Arabibus, Kitran, Sur, Alkitran. Italis, Cedria.

CEDRVS.



GENERA.

Duum generum est: Maius MATT. videlicet & minus. Maioris generis duo, quemadmodum & minoris.

FORMA.

Procera arbor est, Abieti Idem, perquam similis. Quæ in maioris genere floret, fructum non fert. Altera verò contra, nunquam floret, sed conos tamen profert cupressi longè maiores. Resinam fundit laudatissimam. Ligni materies æterna.

LOCVS.

Maior in Syria, Iudæaque MATT. provenit, & præsertim in Libano monte.

QUALITATES.

Vtraque est calida, sicca. Galen. 7. que temperatura, tertio quodammodo ordine secundum utranque: At Cedria quantum ferè gradum attingere videtur, abundè calida simul, & tenuium partium. Eadem at- MATT.

tenuat, digerit, resoluit, expellit, putrefacit.

VIRES.

Cedria infusa defuncta corpora conservat, & viua putrefacit: additur oculis medicamentis, magno iuuamentò. Vermes aurium necat: cauis dentium indita eos frangit, & dolores leuat. Conceptum impedit inuncto ex ea genitali ante coitum: pediculos illitu enecat: pulmonum vlcera purgat, & obesos extenuat.

CEDRVS PHOENICIA, Græcis, *ᾠξέδρος*.] Italis, *Cedro minore*.

CEDRVS PHOENICIA.

FORMA.

Gal. li. 7. Arbor est Iunipero per omnia similis. Sed maioribus folijs aculeatisq; baccis quadriplo maioribus, colore aureo rufescente, sapore dulci, esui haud ingrato.

LOCVS.

MATT. Nascitur in Iapidæ montibus, non longè à Pefino oppido.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. Excalfacit, & siccac ordine simp. mc. ferè tertio. Aperit, prouocat, resoluit, digerit.

VIRES.

DIOSC. Baccæ stomacho aduersantur: auxiliantur tamen tussientibus, conuulsis, & urinæ stillicidio laborantibus. Eadem cum pipere potæ menses ducunt. Sumuntur quoque contra leporem marinum, ex vino. Inunctæ toti corpori ex ceruina medulla, aut adipe: à serpentibus hominem tutum reddunt. Ideoque bellè adduntur in Antidota.



LYCIA

N O M I N A.

LYCIA Cedrus, Græcis, Κέδρος λυκία.] Italis, Cedro Lycio.

39

LYCIA CEDRVS.



FORMA.

Folijis cōstat Phœnicia: Ion MATT.
gè minoribus, frequentiori-
busque longè minus aculea-
tis, ita vt Iuniperum parum
quadantenus referat. Eadē, si
digitis atterantur non insua-
nem spirant odorem, talis e-
nim habetur, qualis ferè in pi-
neorum strobilis percipitur.
Cortice caudex obducitur
subrufo: ramos emittit len-
tos, vitilium instar: baccas ge-
rit alterius, minores, ruben-
tesque, amaro sapore: odore
non ingrato.

Locvs.

Nascitur in quibusdā Mo- Idem,
rauiæ montibus.

QUALITATES.

Excalfacit & siccatur, minus Idem,
tamen quàm Oxycedrus.

VIREs.

Eadem ferè omnia præstat quæ Oxycedrus, sed non adeo valentèr.

Idem.

LAVRVS,

LAVRVS, Græcis, *Δάφνη*.] Arabibus, *Gaur*, *sive Gar*.] Italis, *Lauvo*.] Germanis, *Esterbaum*.] Hispanis, *Lauret*, *sive Laurerio*.] Gallis, *Laurier*.] Boëmis, *Bobeck*.

LAVRVS.

GENERA.

DIOSC. Laurus quædam tenui folio constat, altera latiore.

FORMA.

MATT. Vtraque folia habet oblonga, lata, in acutum desinētia, solida & odorata: flores utriusque tenues, muscosi que: Baccas oliuis haud dissimiles: è quibus Laurinum fit oleum.

LOCVS.

Idem. Nasceitur in apricis non longe à mari, & circa amœnos lacus, quod frigoris & algoris sit impatiens. In Italia copiosè in hortis, viridarijs, & collibus feritur, ac etiam per se nascitur.

Gale, li. 6.
simp. mc.

QUALITATES.

Folia & bacca exsiccant, & siccant vehementer, atque hæc quoque magis quam illa. Radicis autem cortex non nihil adstringit, & minus a-

MATT. cris est, & minus calida. Laurus attenuat, aperit, prouocat, incidit, emollit, digerit, flatus pellit.



VIRES.

DIOSC. Opitulatur foris omnes lauri partes vuluæ, & vesicæ vitijs. Bacca trita, & melle, aut passo excepta, delinctæque, auxiliatur omnibus thoracis rheumatismis. Dantur contra Scorpionum ictus: Illita vitilignes emaculat. Earundem succus vtilissimè aurium dolori, & grauitati instillatur, cum vino vetere, & rosaceo. Radicis cortex pora, calculos rumpit, & partus necat. Septem lauri bac-

MATT. ca à prægnantibus propediem parituris, cum se dormitum recipiunt deuorata, facilem, felicemque partum præstant.

*LINVS

NOMINA.

61

* TINVS. Laurus Sylvestris, Catoni Laurus Syluatica. Græcè *Δάφνη ἀγρία*.] Italis, *Lauro saluatico*, *Lauro regia*, *Lentagine*.] Brutijs, *Moleſſo*.] Hispanis, *Vua de perro*, *Follado*, *Durillo*.

TINVS.



FORMA.

Est cærulea bacca. Vuarū granulis simili in Corymbacea umbella copiosè disposita, sapore acerbo, tenui pericarpio, tenui quoque crusta seminis, quam præcedit flos ex albo purpurascēs, ramulorum summitates obtinens. Ipsa stirps lauro humilior est, in alas diuisis ramis longiusculis articulatis, quibus adnascuntur folia ordine distincta eo, ut semper gemina sibi inuicem opponantur, Laurina fere, nitētia, inodora tamen & lata, lanugine tenuissima pubescentia.

Plin.

LOCVS.

Peregrina nobis hæc stirps est, in paucorum hortis conspicua. Italiæ ac Hispaniæ agri & alię forte regiones huius feraces sunt, in primis verò ea syluæ Hetruriæ abundant.

VIRES.

Nemo veterum harum meminit, nec recentiorum quispiam.*

PLATA.

PLATANVS, Græcis, *πλατάνος*.] Arabibus, *Dulb.*] Italis, *Platano*.] Gallis, *Plan*, si-
ue *Plane*.

FORMA.

MATT. Procera, ramosa que arbor
Platanus est, folio vitigineo,
crassiore, inferna parte albi-
cante: Cortice vestitur crasso,
subcandicante. Flosculos edit
tenuis, pallidosq; baccis ro-
tundis, scabris: longo à pedi-
culo dependentibus.

Locvs.

Plin. Amat flumina & fontes, et-
si vini irrigatione plurimum
gaudeat.

QUALITATES.

Gale. li. 8. Platanus humidioris, frigi-
simp. mc. diorisque essentia est, non ita
multo quam symmetra: At-
qui cortex, & pilule magis ex-
iccant.

VIRES.

Tenera folia prohibet, re-
soluunt, reprimunt, & phleg-
monas nascentes adiuuant: in
vino autem decocta & illita, oculorum fluxiones sistunt: corticis decocto exa-
ceto parato vtiliter colluuntur in dolore dentes: Virides pilule in vino potæ
serpentium moribus auxiliantur. Exceptæ autem adipe igni ambusta sanant.

*ACER



NOMINA.

63

* ACER maior, nonnullis Platanus Germanica, alijs Carpinus Plinij. Græcis, *αφελδαμνος*.] Germanis, *Ahorn*/ *Waldschern*.] Gallis, *Plasne*.

ACER MAIOR.

GENERA.

Tria sunt Aceris genera: ma Theop.
ior Sphendamnus dicitur, mi-
nor Glinos, & tertium genus
est *αφελδαμνος*.

FORMA.

Maiores pulchra arbor est &
procera, cortice mediocriter
leui, materia interiore tenera
& tractabili, ramos expandit
plures, quibus folia lata, viti-
ginosa, pediculo rubete anne-
ctuntur, flores confertim de-
pendent ex viridi flauescetes,
quibus succedunt fructus alati
gemelli vni pediculo exaduer-
so adhaerentes.

LOCVS.

Montibus gaudet, sed & pla-
nis & campestribus assuescit.

FACULTATES & VIRES.

Aceris radix contusa ioci Plin.

Sere, Sam,

moris doloribus efficacissime imponitur.

Si latus immeritum morbo tentatur acuto,

Aceris radicem tundis & vna

Cum vino capis, hoc praesens medicamen habetur.*

FRAXI-



FRAXINVS, Græcis, *μελίζα*.] Italis, *Frasino*.] Germanis, *Eſchenbaum*.] Hiſpanis, *Fraſno*.] Gallis, *Frefne*.] Boëmis, *Gelin*.] Polonis, *Zefion*.

GENERA.

Theophr. Genera eius duo: Excelsum
lib. 3. c. 11. alterum, ac procerum. Alte-
de hiſt. ru humilius, & minus auctile.
plant.

FORMA.

Idem. Excelsum lignū habet can-
didum, crassiuenum, nerua-
tum, mollius, enodius, ac cri-
spius. Humile verò scabius,
durius, & flauius. Vtraque fo-
lijs est laurinis haud abſimilis,
angustioribus tamen, & sen-
sim per ambitum ferratis, for-

MATT. bimodo prodeuntibus. Fru-
ctum fert in ſilijs linguis a-
uicularum ſimilem, ſubru-
brum, & gultu amariuſculo,
ac medicato.*Præter fructum
alia quædam fert, vt muſcos in
globum coactos ſpecie pillu-
larum.*

LOCVS.

MATT. Nascitur in môtibus & cli-
uoſis ſyluis.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit & ſiccit, adſtrin-
git, reſoluit, abſtergit, atte-
nuat.

FRAXINVS.



VIREs.

Diosco. Folia, aut earum succus ex vino pota, viperarum morſibus medentur. Spu-
MATT. ma è viridi ligno manans dum incenditur, addito cyclamini, & rutæ ſucco: o-
mnibus ſimul parumper calefactis ſurditati auxiliantur, ſi in aurem ſanam in-
fundantur, dum ſe cubitum recipit æger. Corticis recentis decoctum potum
lienem abſumit. Fructus datur vtiliter potandus in lateris dolore, & ad vri-
nam ciendam. Idem venerem excitat, & in furno ſiccatus, potuſque calculoſis
auxiliatur.

POPVLVS

POPVLVS alba, Græcis, *Alvum*. Arabibus, *Haur*. Italis, *Populo bianco*. Germanis, *Bessen Poppelbaum*. Hispanis, *alamo blanco*. Gallis, *Peuplier*.

POPVLVS ALBA.



GENERA.

Tria populi sunt genera: MATT.
Alba de qua nunc sermo est,
Nigra, & Lybica, siue Alpina.

FORMA.

Alba arbor est procera, cras Idem.
so cortice, sed læui. Folia sunt
illi viridinea, inferna parte
maximè albicantia, ac lanugi-
nosa. Infrugifera arbor est.

LOCVS.

Nascitur circa flumina, & Idem.
vliginoso tractu.

QUALITATES.

Mistæ quodammodo tem- Gale. li. 7.
peraturæ est, ex aqua tepida, & simp. me.
terrena extenuante essentia,
quin etiam abstergentis facul-
tatis est particeps.

VIREs.

Cortex vnciæ pondere potus subuenit Ischiadicis, & vrinæ stillicidio: cum DIOSC.
mulino irene haustus, sterilitatem inducit. Idem præstant etiam folia à purga-
tione ex vino pota: Instillatur vtiliter foliorum succus in aurium doloribus.
Gemmae quæ primo foliorum partu extuberant, ex melle illitæ hebetes ocu-
los iuuant. Tam albæ quàm nigrae cortex particulatim incisus, & sulcis sterco-
ratis obrutus, quocunque anni tempore edules fungos profert. Idem præstat MATT.
alba populus humotenus secta, & aqua calida, quæ fermentum exceperit, per-
fusa: infra quatrimum enim fungos dabit, esui quàm gratissimos.

E POPVLVS

POPVLVS Nigra, Græcis, *αἰγες*. Arabibus, *fluiri omi*. Italis, *Poplo negro* Germanis, *Aspen* / *huc Popel Weiden*. Hispanis, *alano*, *Nigroglia*. Gallis, *Tremble*.

POPVLVS NIGRA.

FORMA.

MATT. Nigra albâ proceritate superat: folio est hederaceo, nō tamen vt in alba dissecto, sensim per ambitum serrato, apice in acutum desinente. Fructum fert racemosum, baccis Erui magnitudine, in quibus copiosa, albaque lanugo concluditur. Cortex est illi cinereus, crassusque: Materie alba ac contumaci, ad ædium & ventisilium fabricas idonea.

Locvs.

MATT. Nascitur in fluuiorum ripis, & scrobium aggeribus.

QUALITATES.

Gale. li. 6. Flores exalfaciunt ordine
sim, med. primo, in desiccando verò & humectando, parum temperatis, & medijs ad ficius deflexerunt. Verum subtiliū potius quàm crassarum sunt partium. Folia autem quodammodo floribus similia sunt, verum imbecilliora. Flores & folia digerunt, resoluunt, & attenuant: quæ omnia efficacius præstat resina.

VIRES.

DIOSC. Folia recentia ex aceto illita podagricos iuuant. Baccæ ex aceto potæ comitialibus auxiliantur. Prima erumpentia germina odorata sunt, & glutinosa: conciliant eadem capillorum nitorem, ijs contusis cum recenti butyro, insolatis, & illitis.

POPVLVS



POPVLVS Lybica, siue Alpina, Græcis, *νεγκις*. Italis, *Popolo montana*.

POPVLVS LYBICA.

FORMA.



Folio est cæteris tenuiore, MATT.
rotundiore, angulosoq; pun-
ctim albis notis consperso, te-
nuiq; pediculo appenso, con-
tinuò ferè se mouente, etiam
si nullus in aëre spiritus sen-
tiatur. Caudice est cæteris bre-
uiore, nigrioreq; cortice ve-
stito, & materie imbecilliore,
alba tamen & tenaci: Fructum
nullum fert nec flores.

LOCVS.

Nascitur in montium syl. Idem,
uis, & syluestribus locis.

QUALITATES.

Qualitates illi sunt quales MATT.
& cæteris generibus.

VIRES.

Folia eadem præstant, quæ Idem,
Nigræ, non tamen adeò sunt
efficacia.

E 2 ALNVS.

ALNVS, Græcis, *αλνυζα*. Italis, *Alno*, *Onio*, *Onizo*, & *Auno*. Germanis, *Erlenbaum*. Gallis, *Auno*. Boemis, *Vuolfa*. Polonis, *Olsa*.

ALNVS.

FORMA.

MATT. Folio est coryli, crassiore cortice scabro, materie molli, rubente. Fructum fert viridem, oblongum, moris forma similem, squamosumq; maturescit autumnno, minuto intus semine, fuluo colore.

LOCVS.

Theophr. Nascitur secus flumina, & vliginoso tractu.

QUALITATES

MATT. Exiccat manifestè, sed in frigiditate & caliditate, parum à medijs abest.

VIRE.

MATT. Folia resoluunt, restringunt, delassatosque recreât. Cortex verò præter hæc corroborat. Folia recentia illita tumores absumunt. Eadem pedum plantis supposita fatigatos viatores iuuant. Pulices necant rore matutino aspersa, & in cubiculis sparsa. Cortex, quodd magis astringat, vsurpatur gallæ vice ad coria inficienda. Sunt etiam qui eo vnà cum fructu vtantur pro galla ad scriptorium atramentum parandum. Expetuntur pali ex alno parati ad ædificiorum fundamenta, quæ in fluminibus & aquosis locis struuntur, quodd in aqua nunquam putrescant.

BETVLA



BETULA, Græcis, *Ξυλόδα*, Italis, *Bettola*, *Betula*, & *Bidollo*. Germanis, *Bircken*.
Boëmis, *Brikg*.

BETULA.



FORMA.

Folijs exit, nigra populi MATT.
haud absimilibus, per ambi-
tum serratis. lulos edit, ut Co-
rylus: sed fructū nullum. cor-
tex illi albus, membranofus-
que, bituminofus, & pinguis.
Materies candida, flexilis, ac
tenax, caudice terebro perfo-
rato, aqua clarissima, copiosa-
que distillat, & potu non in-
grato.

LOCVS.

Nascitur in sylvis Septen- Idem.
trionalibus, præsertim locis
frigidis, ac niuosis.

QUALITATES.

Folia excalfaciunt, & sic Idem.
cant, resoluunt, attenuant,
abstergunt, aperiunt, & ama-
ra sunt. Cortex verò, quod bi-
tuminofus sit, excalfacit, & e-
molliat.

VIRES.

Aqua quæ è perforato caudice distillat, cum renum, tum vesicæ calculos eij- Idem.
cit. Illita faciei nitorem conciliat, & maculas delet. Eadem oris vlcera sanat. Fo-
liorum succus coagulo admixtus, caecum à teredine & vermibus præseruat. Li-
gni materies ad cingenda vinaria vasa peridonea est. Alpini è corticibus con-
uolutis nocturnas faces parant: Bituminosi enim cum sint, nō minus quàm tæ-
da flagrant, & incenduntur: optimi quoq; è Betula parantur carbonēs ad fun-
denda metalla peridonei.

VLMVS, Græcis, *ῥαλέα*. Arabibus, *Didar*, *sue Lu Zach*. Italis, *Olmo*. Germanis, *Bîmen Rûstenholts*. Hispanis, *vlme*. Gallis, *Orme*.

V L M V S.

G E N E R A.

Theoph. Campestris, & Montana, quam Græci, *ῥεραπεύειαν* vocant.

F O R M A.

Theoph. Montana rectior, auctior, ac procerior. Campestris fruticosior. Vtraque folium habet crispum, asperum, leniter circum ferratum oblongumq;

MATT. Folliculos profert magnos, numerosos, crispas, humani scroti ferè effigie, lento, clarioq; liquore refertos, culicibus quoq; numerosis conclusis. Ligni materies nervosa, tenax, robusta, non tamen speciosa. Montana siliquas & semen profert. Cortex exterior illis est asper crassusq;, interior verò qui lignum ambit, lori modò lentus.

L O C V S.

Theoph. Montana in montibus; Plin. campestris, in campestribus locis habetur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. Folia, & cortex adstringunt,

MATT. inspissant, abstergunt, resoluunt, emolliunt, glutinant.

V I R E S.

DIOSC. Crassior cortex ex vino vnciatim potus pituitas, & aquas trahit. Fountur vitiliter fracta ossa, foliorum, & radicum corticis decocto. Humor è medulla ca-

MATT. strata arboris, defluentem capillum reddit, & continet ne fluat illitus. Liquor in folliculis contentus vitreo vase exceptus sepelitur in fimo equino calido, sale vasi substrato, viginti quinq; diebus, quo postea vulnera celeriter sanantur, si cum splenijs illinantur. Quin etiam puerorum, adolescentiumque enterocel-

C A R P I.



NOMINA.

CARPINVS, Græcis, *Καρπίνος*. Italis, *Carpino*.

71

CARPINVS.

FORMA.



Arbor est folijsvlmo proxi- MATT.
mis; tenuioribus tamen; caudi-
ce procero, cortice subalbi-
cante, scabro: ramis copiosis,
robustis, foliosis parulisq;. Ex
his per Æstatē petioli quidam
pendent, è quibus triquetra
quædam folia subpallida cir-
cumquaq; racematim exeunt,
quorum medius apex, cæteros
longitudine superat, & inter
hos parua quædam capitula
spectantur, ciceris magnitudi-
ne, aut paulo maiora, in quibus
femen. Radicibus nititur fir-
mis, crassisque. Ligni materies
alba, solida, tenaxq;, è quibus
iuga bouum villici parant.

LOCVS.

Crescit passim in omnibus Idem.
fere syluis.

QUALITATES, ET VIRES.

Qualitates, atq; vires, nemo est (quod sciuerim viderimq;) qui describat. Idem.

E 4 ARYM-

ARVND, Græcis, Κάλαμος. Arabibus, *Casab.* Italis, *Canna.* Germanis, *Rhor.* Hispanis, *Canas.* Gallis, *Cannes* siue *Roseaux.*

ARVND.

GENERA.

MATT. Domestica, quæ seritur, & Aquatica spontè proueniens, quanquam Plinio Arundinū 29. describantur genera.

FORMA.

Idem.

Satiua, quæ à radicem geniculis seritur, ad vitiū palos, ad decem cubitorum altitudinē adolefcit, robusta, ac firma, intus tamen inanis, compactis per interualla geniculis: cortice squamoso, aspero, subalbicantē. Folia habet longa milij Indici similia, aspera vbiq; superficie: & acuta circumferentia. Radix illi est albicans, dura, tuberosa, contorta, informis, geniculataq;. Secantur quotannis humotenus: sectæque illico regerminant.

Locvs.

Idem.

Domestica in imis vinearum locis seritur. Vliginoso præsertim solo: Aquatica autem sponte prouenit, cum stagnantibus aquis, tum quoque in fluminibus, & mari.

QUALITATES.

Gale. li. 7. Cortex adustus excalfacit ordine tertio, ac etiam plus siccat. Viridia folia resimp. mc. frigerant. Folia & cortex adstringunt, absterunt, & corroborant: radix verò attrahit.

VIREs.

DIOSC. Folia tusa & imposita, ignibus sacris medentur. Corticis cinere sanatur alopecie. Radix pota menses & vrinas ciet. Eadē recens tusa, & illita scorpionum ictibus auxiliatur, quin etiam aculeos, & alia corporibus infixæ extrahit.

ARVND



NOMINA.

73

ARVNDOPALUSTRIS, Græcis, κάλαμος ἐλεῖος. Italis, Cannella, & cannuccia aquatica. MATT.

ARVNDOPALUSTRIS.

FORMA.

Calamo est tenui, geniculis Idem. lato, læuibus internodijs, inani ac fragili, folijs longis, asperis, & per ambitum acutis: paniculis in summitate comosis tactu mollibus, læuibusque.

LOCVS.

Prouenit sponte in paludibus, lacubus, & cæteris stagnantibus aquis.

FACULTATES,
ET VIRE.

Vires sunt illi eadem, quæ Idem. & cæteris generibus.



E 5 MYRICA

MYRICA siue Tamarix, Græcis, *Μοΐρα*. Arabibus, *Tarfa*, seu *Carfa*. Italis, *Tamarigio*. Germanis, *Tamaristen*. Hispanis, *Tamargueira*, siue *Tamaru*. Gallis, *Tamarisc*.

MYRICA.

GENERA.

DIOSC. Duum est generum. Urbatum & sylvestre.

FORMA.

DIOSC. Urbana, folijs est cupressi
MATT. viridioribus: Fructumq; gerit
gallæ similem, & in altum ar-
borescit. Sylvestris folia ha-
bet Sabinæ bacciferæ similia,
tenuiora tamen, ac magis vi-
rentia, fructum quasi florem
ferens compage muscosum.

LOCVS.

DIOSC. Urbana, in Ægypto & Syria
prouenit: Sylvestris in fluui-
orum alucis fruticat.

QUALITATES.

Gal. lib. 6. Abstergetis est, ac inciden-
simp. me. tis facultatis, absq; perspicua
deficcatione: & adstrictionem
nonnullam habet.

VIRES.

DIOSC. Domestica fructus datur vtiliter cruenta expuentibus, celiacis, & contra
fæminarum profluuia, regium morbum, & phalangiorum morsus. Illitus tu-
mores inhihet, Vtriusq; cortex in eisdem vsus adhibetur. Foliorum decoctum
potum ex vino lienem absumit, dentiumq; dolorem collutione sedat, & in de-
fessionibus muliebria cohibet. Sarmætorum cinis aspersus ambusta sanat. Ra-
mi concisi, & ex aceto illiti lienem attenuant. Cortex potus alui fluxiones si-
stet: Radicum decoctum diutius cum passis viuis potum, lienosam elephantia-
sim curat.

ERICA



NOMINA.

75

ERICA, Græcis, *ἐρίκη*. Italis, *Erica*. Germanis, *Heiden*. Hispanis, *Queiro*. Gal-
lis, *Bruyere*.

ERICA.



FORMA.

Frutex est non multū à My- Pli. lib. 24.
rica differens, colore rorisma- cap. 9.
rini, & penè folio, floret bis in
anno, Vere scilicet, & Autum-
no, floribus parvis, copiosis,
subrubentibus.

LOCVS.

Nascitur in aridis, in cam- MATT.
pestribus, collibus, & syluis.

QUALITATES.

Digerendi per halitum fa- Gale. li. 6.
cultatem habet. sinap. mc.

VIRES.

Folia & flores. serpentium DIOSC.
ictibus illitu medentur. FO. MATT.
liorum & florum decoctum
quinq; vnciarum pōdere die-
bus triginta potum, vesicę cal-
culos frangit, idque feliciter
succedit, si à trigesimo die in
balneo eiusdem decocti sederint affecti aliquot diebus continuis, & super ipsa
Erica decocta sederint: Florum decoctum potum lumbricorum, & ventris do-
loribus medetur: foliorum succus impositus oculorum imbecillitati succurrit.

ERICA.

ERICA altera, Italis, Erica secunda.

ERICA ALTERA.

FORMA.

MATT. Ramos edit tenues, folijs alterius longioribus, acutioribusque, angustis, ac numerosioribus, quibus circumquaque ramuli stipantur. Flores edit paruos rubentesque.

LOCVS.

Idem. Nasceitur arido solo, & in collibus apricis, & montibus non valde excelsis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Si hæc planta Erica est: Ericæ facultatibus proculdubio insignitur.

CENSURA.

Idem. An hæc planta Erica legitima sit, aliorum indicio relinquo.



ERICA

ERICA BACCIFERA, Matthiolo.

ERICA BACCIFERA.

FORMA.

Procumbit hæc planta humi, & latas MATT.
occupat areas, folijs penè vulgaris Ericæ:
Baccas edit in purpura nigricantes, iuni-
perinis non absimiles, sed molliore pul-
pa, lenta, vt in prunis, quæ mense Augu-
sto maturescunt. Ramis est lignosis obse-
quiosisque.

LOCVS.

Prouenit in montibus, qui Boemiam Idem,
à Silesia disternant, & à quorum fon-
tibus Albis fluuius originem ducit.

FACULTATES,
ET VIRES.

De qualitatibus & viribus, quid certi Idem.
dicam, non habeo.



RHAMNVS

RHAMNVS, Græcis, *Páuvos*. Arabibus, *Naufig*, *sive Nufegi*. Ital. *Ramno*, *sive Mar-ruca*. Hispanis, *Scambrones*. Gallis, *Burguespin*, *sive Neprun*.

RHAMNVS.

GENERA.

DIOSC. Trium est generum: Can-
didum, Candidius, Nigrum.

FORMA PRIMÆ.

DIOSC. Candidum ramos fert re-
MATT. ctos in acutæ spinæ modum,
folijs parvis, oblongis, sub-
pinguibus, tenuibus. Baccis
rubentibus, pisi magnitudi-
ne, cortice albo, & tenui.

Locvs.

DIOSC. Fruticat in sepibus, & fru-
tetis.

QUALITATES.

Gal. lib. 8. Desiccat, & digerit excessu
simp. mc. secundo, & refrigerat primo
completo, aut secundo inci-
piente.

VIRES.

DIOSC. Folia ignibus sacris, & serpentibus vlceribus efficaciter illinuntur.

RHAMNVS



NOMINA.

79

RHAMNVS secundus, Italis, Marrucabianca.

RHAMNVS SECVNDVS.



FORMA.

Primo candidior est, folijs MATT.
falicis, auersa parte candidis,
virgis aculeatis albicantibus:
rubentibus inter folia baccis.

Locvs.

Nascitur in fruticetis, & se- Idem,
pibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Viribus & qualitatibus ni- DIOSC.
hil prorsus à priori genere ab-
esse videtur.

RHAMNVS

RHAMNVS Tertius. Italis, *Marruca nera*.

FORMA.

DIOSC. Nigrioribus est folijs quodantenus ad ruborem vergentibus: Ramos mittit quinum fere cubitorum, cæteris spinosiores, læui cortice obductos, fuluo colore. Fructum edit latum candidum folliculari specie, verticillo similem, in cuius medium ossiculum concluditur, in quo parvus inest nucleus. Aculei aliqui illi longi, rectique, nonnulli verò, ut rubi incurui.

LOCVS.

MATT. Nascitur in maritimis, in campestribus, & locis incultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

DIOSC. Folia ignibus sacris, ac serpentibus vlceribus vtiliter illinuntur. Fama est ramo huius, valvis fenestrisve imposito veneficia depelli. Eadem omnia potest, quæ Rhamnus primus.

CENSURA.

Falluntur qui putant Rhamnum tertium, esse Dioscoridis Paliurum, sed adhuc magis cæcutiunt, qui idem esse Dioscoridi adulterinum contendunt.

* RHAMNI

RHAMNVS TERTIVS.




NOMINA.

81

*RHAMNI SPECIES. Oleaster Germanicus. Germ. Weibendorn, Rheindorn/
oder Sanddorn. Batauis, Schyt bestien.

RHAMNI SPECIES.



FORMA.

Multis cinericeis furculis
assurgit hæc arbuscula, sex cu-
bitorū aut paulo procerior,
frequentius humilior, in qui-
bus folia oblonga angusta o-
leæ similia, minora tamen,
candidioraq; tenuissima la-
nugine subtus pubescentia,
superius vero in viri cineri-
cia. Flores herbacei totis ra-
mulis adnascuntur, quibus sin-
gulis deinde succedunt bac-
cæ rotundæ, Myrti aut Aspa-
ragi baccis similes, sed mino-
res, pulpa molli lutea, tenui
glabra & rufescente obdu-
cta cute. intus parua semina
insunt, oblonga, pallenti tu-
nicæ inuoluta. Tota stirps a-
culeis albicantibus longisq;
vndiq; vallatur, Et multifida
diffusaq; radice nititur. Ma-
teria eius à spino sola molli-
tie differt.

LOCVS.

Nascitur in Hollandiæ ac
potissimum Flandriæ mariti-
mis littoribus, & alibi in cõ-

uallibus ac iuxta profluentes amnes solo lapidoso arenosoq;. Nec deest Ger-
maniæ copiosa ad Lycum Vindeliciæ amnem & ad Danubium ab eiusdem Ly-
ci ostio vsq; ad Petras fauces per quas Danubius fluit, tribus millibus passu-
um supra Keilheimium oppidum sitas.

FACULTATES.

Acinos purgatricem habere facultatem affirmant, vnde Bataui quoq; ipsos
agnominarunt. Paratur & Rob de baccis illis, quod vehementer acidum est &
attenuans & incidens, vt berberis ferè, commendaturq; ad dyfenteriam.*

F

SPINA

SPINA infectoria. Italis *Spino merlo*, *Spino Ceruino*, *sive Spino guercio*. Germanis, *Wegdorn*.

SPINA INFECTORIA.

F O R M A.

MATT. Arbuscula est non magna, folijs pyri breuioribus, & angustioribus: Ramos fundit numerosos, quorum fastigium in aculeum definit. Baccas edit copiosas ligustrinis aequales, quæ primum virides, & per maturitatem nigrae spectantur. Ligni materies exterius albicat, medullitus verò rufescit.

L O C U S.

MATT. Prouenit in sepibus, & feniculis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Exoluit alium baccarum succus, aperit, & expellit, & caloris & siccitatis haud est expers.

V I R E S.

Idem. Fit è baccarum succo medicamentum alium exoluens, hoc modo. Sumuntur succi earundem libræ duæ, & sacchari sesquilibra, & coquantur ad Iulapij spissitudinem: demum linteolo percolantur additis Zingiberis, cinnamomi, & Caryophyllorum nonnihil, omnibus in puluerem contritis. Huius liquoris vncia epota crassam, lentamque pituitam ducit: Ideoque podagricis, Ischiadicis, paralyticisque belle confert. Baccarum succo vtuntur pittores: viridem colorem inde parantes.



HALF

NOMINA.

83

HALIMVS, Græcis ἅλιμος. Arabibus, *Molochia*. Italis, *Halimo*, Venetis *Bidone*,

HALIMVS.

FORMA.

Ramos plures à radice fundit, lentos, DIOSC.
& obsequiosos, folijs Oliuæ pinguiori- MATT.
bus, albicantibusq;, salso sapore. Semen
profert racemosum in caulium summi-
tatibus.

LOCVS.

Nascitur maritimis locis, & circa sali- DIOSC.
nas.

QUALITATES.

Excalfacit temperatè, & exiccat, & vt Gal. 6.
cætera salia corroborat, adstringit, & ab- simp. me.
stergit. MATT.

VIREs.

Cocta ex iure, aut aqua addito oleo, MATT.
aut butyro alium subducit: Radix cocta, DIOSC.
deuorataq; lactis vbertatem facit, & cõ-
uulsa, rupta, torminaq; mulcet. Idonea
planta est Halimus ad sepiendos horto-
rum toros, quippe obsequiosa cum sit,
facile quocunque distrahitur.

CENSURA.

An hæc planta legitima sit Dioscoridis Halimus non desunt rationes, quæ
rem dubiam reddunt.

F 2

AQVI-



AQUIFOLIUM, Italis, *Agri folio*. Germanis, *Walddisteln oder Strehpalmen*.

AQUIFOLIUM.

F O R M A.

MATT. Planta est arborecens, ad acutæ spinæ magnitudinem, folijs Laurinis, perpetuis, & in toto ambitu per interval- la sinuatis, aculeatisq; car- nosis, ac læuibus, Virgas edit lentas, & obsequiosas, viridi libro vestitas: baccas rotun- das, rubentesq; rusci modo.

L O C V S.

Idem. Arborefcit in syluis, & syl- uestribus locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Radices emolliunt, discu- tiunt, & resoluunt.

V I R E S.

Idem. Fouentur radicum deco- cto vtiliter articuli, qui pri- us luxati duritiem contraxe- runt. Idem ossa fracta ferru- minat. Id quod valérius præ- stat radicum ipsarum cortex excoctus, & illitus. Folia suspenduntur circa funes: è quibus salfæ carnes sub tecto pendent, ad arcendos mures. Sunt qui è tuso ra- dicum cortice arte quadam viscum parant ad aucupia.

C E N S U R A.

Hallucinantur qui hanc arborem Theophrasto Agriam, siue Ariam faciunt: atq; in eodem errore versantur, qui eandem existimant eiusdem esse Cratæo- gonon.

ACVTA



NOMINA.

85

ACVTA Spina, Græcis, *ἄκνυα* & *ἄκνυα*. Arabibus, *Ambiberberis*, siue *Berberis*. Italis, *Hetruscis*, *Bagaia*: *Ananiensibus* *Amperlo*. Germanis, *Hagborn*.

ACVTA SPINA.

FORMA.



Arbor est Sylvestri pyro si- DIOSC.
milis, minor tamen, & valde MATT.
spinosa. Baccas profert myrti,
plenas, rubentes, fragiles, &
intus nucleos, radicem multi-
fidam altè descendentem. Fo-
lia Apij hortensis modo diui-
sa, sed longiora: floribus race-
mosis, ac cædidis, cortice sca-
bro, & materie pyracea.

LOCVS.

Prouenit in Syluis, sepibus, MATT.
& fruticetis.

QUALITATES.

Fructus est tenuium parti- Gal. s.
um, & paulum quiddam inci- simp. me.
suum obtinet. Adstringit, ro-
borat, & prohibet.

VIRES.

Baccæ deuorata alui, & scæ- DIOSC.
minarum profluvia sistunt. Radix illita aculeos, & spicula extrahit: Nuclei in
puluerem triti, ac poti calculos tum frangunt, tum eiiciunt.

CENSURA.

Deluduntur qui Berberum communis vsus oxyacantham faciunt.

F 3

BERBE-

BERBERVS Vulgaris, siue Crespinus. Italis *Crespino*. Germanis, *Bersich*.
Gallis, *Espine*, siue *Vinette*.

BERBERVS VVLGARIS SI-
VE CRESPINVS.

F O R M A.

MATT. Complurib⁹ ab radice fructicat ramis, siue aculeatis stolonibus. Cortice vestitur candidanti, laui, tenuiq; Ligni materies flaua sed fragilis. Tota planta acutissimis aculeis scatet, ternis simul prodeuntibus, albis, planis, fragilibus. Folia habet punicea tenuissimis circumdata spinis, flores aureos, odoratos, racematim dependentes. Fructus rubentes, baccis oblongis, racemosis, vinosisq; adstringenti, & acido gustu. Radicibus haud altis, fuluo colore.



L O C V S.

Idem. Nascitur in sepibus, frutetis, ac fenticosis locis.

Q V A L I T A T E S.

Idem. Baccæ refrigerant, & siccant, cohibent, roborant, & adstringunt.

V I R E S.

Idem. Vinum quodè baccis exprimitur, datur vtiliter potandum cum sirupo violaceo, & oxalidis aqua, in ardentibus, ac perniciosis febribus: cum myrrino autem, & aqua plantaginis, cæliacis, & dysentericis, & in fæminarum profluuijs. Idem sitim sedat ex prislana haustum. Columellam procidentem gargarizatu reprimat. Auxiliatur quoq; sanguinem reiicientibus. Vlcera serpentia cohibet, & humida exiecat, faucium, & gutturis inflationes reprimat. Intestinorum animalia necat, ac pellit.

C E N S V R A.

Decipiuntur, qui vulgarè Berberim oxyacantham legitimā esse contendunt.

VVA

NOMINA.

87

VVA SPINA, sine Crispa, Italis, *Vua spina, sine vua marina*, Germanis, *Creusbeer*,
Gallis, *Groislier*.

VVA SPINA.



GENERA.

Altera Satiua, altera agre- MATT.
stis, ac sponte proueniens.

FORMA.

Vtraq; arbuscula est parua, MATT.
fruticosa, folio Apij, siue O-
xyacanthæ ramulis, ac virgis
albicantibus, vbiq; aculeatis.
Baccas profert rotundas, suc-
cosas, & hirsutas: & præsertim
sylvestris, acido, ac austero sa-
pore. At vbi maturitatem sen-
sere, flauescunt, & subdulces
euadunt.

LOCVS.

Satiua in hortis, pomarijs, Idem.
& vineis feritur, Sylvestris in
sepibus, & senticosis locis
sponte prouenit.

QUALITATES.

Baccæ frige faciunt: exiecant, Idem.
roborant, & adstringunt.

VIRES.

Baccæ veniunt in ciborum vsum vua acerbæ modò: nam iusculis incoctæ Idem.
appetitum excitant. Sitim sedant, & grauidarum malaciâ succurrunt. Dantur
deuorandæ celiacis, dysentericis, & cruenta expuentibus.

F 4

RIBES

RIBES vulgaris, Italis, *Ribes*. Germanis, *S. Johannis Treublein*. Gallis, *Ribetes* seu *Raisins de outremer*.

RIBES VVLGARIS.

GENERA.

MATT. Duum est generum, Domesticum, & Sylvestre.

FORMA.

MATT. Paruula vtraque; est arbor, folio paruo, vitigineo: Ramulos habet lentos, & quibus fructus rubefcentes, & vuae modo racemosi dependent, baccis copiosis, rotundis, vinosis, piperis magnitudine, gustu acido, & adstringenti, cum aliqua dulcedinis specie.

LOCVS.

Idem. Domestica feritur ad sepandos hortorum puluinos. Sylvestris, nascitur sponte in Boemia, in siluosis collibus, & in alijs Germaniae locis.

QUALITATES.

Idem. Vuae refrigerant, exiccant, adstringunt, & roborant.

VIREs.

Idem. Datur vtiliter in acutis febribus: Venter æstuantem refrigerat, sitim restinguit, nauseam, & vomitiones sistit, cibi appetentiam incitat, cæliacos & dysentericos iuuat, & biliosis fluxionibus obnoxios, sanguinis feruorem demulcet, bilis acrimoniam retundit, & impetum domat.

CENSURA.

Cæcutiunt, qui hanc plantam Mauritanorum Ribem faciunt, ac pariter qui Vrsi vnam esse contendunt apud Galenum.



LIGV-

LIGVSTRVM, Græcis, Κύπρος. Arabibus, Kenne, & Henne. Officinis, *Alcanna*.
Italis, *Guisfrico*, *Olivella*: *Oliuetra*, & *Cambrossene*. Germanis, *Deinholz*, oder
Mundholz, oder *Reinweiden*. Hispanis, *Alfena*, *sive Hallena*. Gallis, *Troesne*, *sive*
Trezillon.

LIGVSTRVM.



FORMA.

Arbor est oleæ folijs latioribus tamen, mollioribus ac viridioribus: flore candido racemoso, sed qui decerptus statim flaccescat: Baccas profert in cacumine racematim coherentes, hæderæ minores, læuiore, ac nigriore, sapore amaro, ac iniucundo, purpureo intus succo: materie robusta, ac dura.

LOCVS.

Prouenit in sepibus ac ne moribus.

QUALITATES.

Folia mista sunt temperatæ, quin etiam & summa germina: Digerunt enim leuiter accedente aquea substantia modicè calida, quin etiam aliquid astrictioræ possident facultatis: ex terrena frigida, & siccitatis non sunt expertes.

VIRE.

Folia commanducata oris

ulceribus medentur: & illita feruidis inflammationibus, & carbunculis. Decocto eorundem igni ambusta fouentur. Eadem trita, & illita capillum rufant: flores ex aceto fronti illiti, capitis dolores mulcent. Oleum in quo ligustri flores insolati fuerint, præstat illitum ad vulnere inflammationes. Item ad capitis dolorem à bile prouenientem. Aqua à floribus distillata præscripta omnia potest.

CENSURA.

Non minus hallucinantur, qui Cyprum, & ligustrum duas faciunt plantas, quàm qui ligustrum nostrum phillyream esse contendunt.

F 5

PHIL-

PHILLYREA, Græcis, *φιλύρεα*. Italis, *Phillyrea*. Arabibus, *Mahaleb*.

PHILLYREA.

FORMA.

DIOSC. Arbor est Ligustri magnitudine folijs oleæ nigrioribus, & latioribus: fructu lentis, nigro, subdulci, racematim coherente.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur in asperis.

QUALITATES.

DIOSC. Folia adstringunt.

VIRES.

DIOSC. Ad ea omnia præstât Phillyreæ folia, ad quæ Oleaster, cum adstrictione est opus, maximè ad oris vlcera commanducata, aut si eorum decocto os colluatur. Vrinam quoque ac menses cient, Epoto decocto.

CENSURA.

Aberrant qui *φιλύρεαν* Tiliam faciunt.

* APPENDIX.

Habetur foliorum differentia triplex, vt lata quædam, quædam angusta esse obseruentur, quædam etiam medio modo se habentia, vt nihil obstat Dioscoridis descriptioni, folia oleæ latiora Phillyreæ tribuentis.*

MAHALEB.



N O M I N A.

91

MAHALEB. Mauritanis sic dicta vnguentarijs. Italis, *Machalep*.

MAHALEB.



F O R M A.

Arbor est non admodum MATT.
procera; folijs Tilia: haud lon-
ge abfimilibus: Flores edit al-
bos, è quib. baccae subnascun-
tur nigrae, ossiculo intus cera-
forum paulo minore, in quo
nucleus reconditur, quo ad o-
doramenta, & smegmata vtun-
tur vnguentarij.

L O C V S.

Nascitur in montibus. Idem.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, emollit, abster- Serap.
git, attenuat, resoluit, & dolo- Auicenn.
res sedat.

V I R E S.

Nuclei contusi iliorum, & MATT,
dorsi doloribus vtiliter illinun-
tur. Id quod magis praestat o-
leum exijs expressum. Ex mel-
licrato hauſti, animi deliquijs

ſubueniunt: dantur quoque ad coli cruciatus, & renum calculos: ventris quo-
que tineaſ necant, & vrinam cient.

TILIA

ſta eſſe
dioſco-

ALEB.

TILIA MAS, Græcis, *φιλύρα ἐνδόχυν*. Italis, *Tilia maschio*, & *Carpino nero*. Germanis, *Steinsinden*.

TILIA MAS.

FORMA.

MATT. Arbor est magna, patentibus ramis, materie robusta spissaq; ac etiam sterilis: folia fert lata. oblonga tamen, in quibus ferè omnibus numerosæ extuberant bullæ, in quibus muscæ gignuntur, quæ tandem arefcentibus receptaculis, inde gregatim euolant.

LOCVS.

Idem. Prouenit in syluis, & montibus, saxosis locis.

QUALITATES.
ET VIRES.

Idem. Quid de huiusce arboris facultatibus scribam, hæcenus non habeo.



TILIA,

TILIA, Græcis, *φίλιρα*. Italis, *Tilia sine Teio*. Germanis, *Einderr*. Gallis, *Til, sine Tiler*.

TILIA FŒMINA.



GENERA.

Quædam mas est, quædam fœmina. Theoph. lib. 3. c. de hist. plant.

FORMA.

Fœmina folia fert hederacea, nisi quod in angulum acutorem rotundantur, & quam iuxta pediculum curviora, de mediotamen in acutius coacta preterduntur: Flos calycula intectus præter folij pediculum, amentumq; futurum, pediculo alteri adnexus, viridis dum in calycula est, de rectus autem leuiter flauus. Baccas fert orbiculatas, oblongas, magnitudine fabæ, quinis eminentibus angulis: Cortex fœminæ flexilis, & materies alba, tenaxq;: cui exigua est medulla.

LOCVS.

Non solum in montibus: MATT. sed in planitie quoq; prouenit, ac in cameterijs, & ædium arcis.

QUALITATES.

Adstringit: glutinat, discutit: inspissat, abstergit.

VIREs.

Cortex commansus, ac deinde illitus, vulnera recentia glutinat. Folia trita, & aqua conspersa pedum tumores discutunt. Humor è medulla castratæ arboris defluens, capite illitus non solum capillos replicat, sed fluentes continet. Aqua è floribus distillata sua peculiari dote datur vtiliter Epilepticis. Ligni carbones in puluerem tusi, auxiliantur his qui ab alto deuoluuntur fractis, ac cõtus.

CISTVS,

CISTVS, Græcis Κίσκος ἢ κίσθαρος, καὶ κίσσαρος. Arabibus, *Romiet*, *Alibei*, *sue Ibaie*, *Alibu*. Italis, *Cisto*. Hispanis, *Cerguacos*.

CISTVS.

G E N E R A.

DIOSC. Mas vnum. Alteram verò
fœmina.

F O R M A.

DIOSC. Mas ramosus frutex est, sed
improcerus, & folijs rotundis,
acerbis, hirsutis. Flosilli mali
puniceæ haud ab similis.

L O C V S.

MATT. Nascitur in Apennino Ita-
DIOSC. liæ saxosis locis, & asperis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 7. Folia, & parua germina ad-
simp. mc. stringunt, & exiccant non in-
strenuè: Frutex aded frigidus
est vt tepidi calidi sit particeps:
Flores præter prædicta non in-
strenuè desiccant.

V I R E S.

DIOSC. Flores in vino austero bis in
die poti, Dysentericis, ventris
imbecillitatibus, defluxioni-
busq; & humiditatibus opem ferunt, & nomas per se illiti cohibent. Meden-

MATT. tur quoq; vetustis vlceribus, & igni ambustis cum cerato. Folia, & flores in de-
fessionibus cohibent fœminarum fluxiones. In summa non parum præstant, v-
bi adstringere, & roborare sit opus.

CISTVS



CISTVS. fœmina: Græcis, Κίσθηλος. Italis, Cisto fœmina. Patauinis, Salvia Saluega.

CISTVS FOEMINA.

FORMA.

Folia gerit oblonga Salvia DIOSC.
æmula, albicantia, ac hirsuta. MATT.
Floribus albis cisti maris longè minoribus.

LOCVS.

Prouenit in collibus aridis, & saxosis, copiosa in agro Patauino.

QUALITATES.
ET VIRES.

Eadem illi sunt quæ mari qualitates & vires. Adstringit enim: & desiccant.



HYPO-

HYPOCISTIS, Græcis, ῥανκίστη. Italis, *Hipocisto*. Offic. *Hipoquistidos*.

HYPOCISTIS.

FORMA.

DIOSC. Forma est mali punicæ cy-
MATT. tino similis, aut orobanches
fastigijs colore vario. Nā quæ-
dam rufa: quædam herbacea:
& quædam candida visitur. Li-
quatur Acaciæ modo. Cæter-
um tunditur recens, & elici-
tur succus, qui insolatus asser-
uatur ad vsum.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur iuxta cisti vtriusq;
radices.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. Magis adstringit quam cisti
simp. mc. folia. Vires habet Acaciæ pa-

DIOSC. res: verum aliquanto magis
siccat.

VIRES.

DIOSC. Efficax est auxilium ad om-
nium fluxionū affectus, nem-
pe sanguinis reiectiones, profluvia muliebria, Celiacos, dysentericosq; affe-
ctus. Quin si quam partem roborare consilium sit, quæ videlicet plusculo hu-
more exoluta fuerit, robur, & firmitatem illi non imbecilliter addit. Sic sanè
Stomachicis, epithematis, hepaticisque commiscetur, & ex viperis confecto
antidoto inditur.

LEDVM,



NOMINA.

97

LEDVM, Græcis, Ἀνδύ. Arabibus, *Casus*: Pingue autem quod ex eo colligitur, Latinis, *Ladanum*. Græcis, Ἀδδανός. Arabibus, *Laden*, *sive Laden*, Italis, *Ladano*, *sive Odano*. Hispanis, *Xara*.

LEDVM.



GENERA.

Inter Cisti genera, & Lada- Diosc.
num est. Duum est generum. Matt.
Alterum folijs grandioribus,
alterum verò minoribus.

FORMA.

Frutex est Cisti modo na- Diosc.
scens, longioribus tamen fo-
lijs, & nigrioribus, quæ Verno
tempore quiddam cōtrahunt
pingue. * Nascitur etiam sub
hachypocistis quædam. *

LOCVS.

Prouenit in saxosis, & apri- Matt.
cis collibus in calidioribus re-
gionibus.

QUALITATES.

Ladanum exalfacit exces- Gal. 7.
su primo completè, vel in prin simp. me.
cipio secundi. habet etiam ad- Matt.
strictionis paululum. Emollit,
digerit, concoquit, venatum
ora patefacit, & spissat.

VIRES.

Capillum fluentem continet addito vino, myrrha, & myrteo oleo. Cicatri- Diosc.
cibus decorem reddit ex vino illitum. Medetur aurium doloribus cum hydro-
melite, aut rosaceo infusum: suffitu secundas eijcit. Pessis immistum vuluæ du-
ritiem sanat. Inseritur in medicamenta, quæ aurium dolorem, tussimq; finiunt:
ex vino vetere potum aluum sistit, & vrinam ciet. Fiunt ex eo orbiculati globi:
odorandi pestilentia tempore additis cinnamomo, Caryophyllis, Santalis,
Agallocho, Mosco, & Ambaro.

G Rosa,

ROSA, Græcis, Ροσῆ. Arabibus, *Nard, Vard, seu Naron.* Italis, *Rosa.* Germanis, *Rosen.* Hispanis, *Rosas.* Gallis, *Roses.*

ROSA.

G E N E R A.

Matt. Domestica & Sylvestris. Domestica & si plura Plinio sint genera, nostro tamen quo tria tantum in usum venerunt, videlicet puniceum, album, & quod carnis colorem refert. In albo genere ea est admodum odorata, quam Moscheram, & Damascenam Itali vocant.

F O R M A.

Matt. Rosarum, & rosacearum plantarum forma cum omnibus notissima, explorataque sit, superfluum est hic eam describere.

L O C U S.

Urbana in hortis, Viridarijs, pomarijs, & vineis floret. Sylvestris in sepibus, fenticosis, memoribus, & campestribus provenit.

Q U A L I T A T E S.

Mesue. Constant Rose diuersis sanè partibus, nempe terrestribus, & aqueis, quibus substantiam, & adstrictoriam facultatem acceptam referunt. Aëreis à quibus cum subdulcem, tum odoratū saporem accipiunt. Igneis à quibus amorem sibi vendicant. In vniuersum autem refrigerant, & adstringunt.

V I R E S.

Diosc. Folia, cor, ventriculum, iecur, & retentricem insuper facultatem, corroborant, dolores calidos, & inflammationes auferunt. Aridis in vino decoctis expressus liquor facit ad dolores capitis, oculorum, gingivarum, sedis, recti intestini, ac vulvæ penna illitus, & infusus. Eadem sine expressione tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi vitijs, igni sacro illini prodest. Flosculi medij cum suis capillis gingivarum defluxiones cohibent, & feminarum profluvia. capirula pota etiam aluum, & cruentas reiectiones sistunt. Succus & corroborat, & aluum exoluit. Verum id longè magis præstat dilutum pluribus repetitis macerationibus.

* Rosa



* Rosa sylvestris, Canina Rosa, Græcis *ῥόδον ἄγριον, κυνόρῥόδον*. Germanis, Wilde rosen, Heerrosen.

ROSÆ SYLVESTRES.

GENERA.

Sylvestrium Rosarum plures observantur varietates, ut sequitur.

FORMA.

Alia vulgo provenit, aculeatis virgis, prælongis rubo similibus, rosa pusilla, ut plurimum quinque foliolis constat, alba subrubensve, quarum hæc altior spinosiorque, illa humilior est. harum ramis spongiolæ villosæ vermiculis prægnantes adnascuntur. Alia odoratior sed minor etiam flores pallide rubentes fert, cuius virgæ rubente quoque cortice vestiuntur. Est & parva fruticosa spinosissima Rosæ exiguis candidis odoratis. Minima omnium saxatilis colore floribus ruberrimo. Maxima sylvestrium est quæ tota olet, & frequenter albicantes, raro purpurascens flores profert & spongiolis hirsutis non caret.



LOCVS.

Omnes sponte exeunt, prima quidem & quinta in aggeribus, & pratorum marginibus, altera in calidioribus regionibus, nam apud nos colitur, tertia in maritimis & arenosis locis, quarta in petrosis.

VIRE.

Radix sylvestris rosæ valet ad morsum canis rabidi, Spongiolæ cinere cum Plin. melle Alopecie capitis expleantur. Spongiolarum quoque in puluerem tritarum magna vis contra calculum & dysuriam, & capillum nutriendum inunctione. Sed & fructus cum semine pulveratus idem præstat quotidiana apud nos experientia.*

LYCIUM Italicum. Italis, *Licio nostrano*.

LYCIUM ITALICUM.

F O R M A.


Matt. Planta est aculeata pruni sylvestris faciem referens, minoribus tamen folijs. Flores mittit candidos, è quibus baccae gignuntur, ligustri ferè similes, sapore acerbo, atq; adstringenti, è quibus succus exprimitur.

L O C U S.

Matt. Nascitur copiosum in agro Tridentino circa Arcem de Gresta, saxosis locis.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Matt. Adstringit, cohibet, roborat, siccatur, & reprimunt: & ubi legitimum lycium non sit ad manus, nihil prohibet, quin hoc eius vice succedere valeat. Succus è baccis à me extractus, hæc omnia belle præstat.



BACCÆ,

NOMINA

Buxus, Græcis, Πύξος. Italis, Bosso.

101

Buxus.

FORMA.

Buxus provenit folio myrti minore, densiore, carnosiore, viridioreque. Fronde est perpetua, ob idque topiario operi peridonea, flore herbaceo, fructu rutæ simili: Materie spississima, flava, densissima, atque ponderosissima, adeo, ut nec cariem sentiat, nec in aquis fluitet. *Matth.*

LOCVS.

Locis gaudet cum frigidis, *Idem.* tum apricis. In Corsica frequens, crassissima, provenit.

QUALITATES.

Exiccat manifestè, sed in calore non longè à medijs abest, adstringit quoque & roborat.

VIRES.

Capillum rufant tum folia tum rami in lixiuio decocti.

Non desunt quoque qui asserant sanari alui defluvia ligni scobe deuorata, aut pota: Sunt & qui asserant buxi decoctum idem præstare, quod Guaiaci ad Venericum morbum.

CENSURA.

Delirant, qui Buxum & Guaiacum Indicum ynam, & eandem faciunt arborem.

G 3

Evo-

EVONYMVS, Græcis, *εὐώνυμος*. *Hetruscis, Silio. Italis cateris, Fusano, siue Fusaro,*
quod ex eo fusi à tornitoribus fiant.

EVONYMVS.

FORMA.

Theoph. Arbor est mali punicæ ma-
lib. 3. c. vi. gnitudine, atque etiam folio
tmo de eiusdem, maiori quàm chamæ-
plāt. hist. daphne, molli, vt punica. Ger-
minare incipit mense septem-
bri, & florere deinde vere. Flos
illi albæ violæ simili odore in-
festus, veluti cruorem infe-
rens. Fructus cum putamine
filiquæ Sefamæ proximus, præ-
ter quàm quod in versum diui-
ditur quaternos. Materie est
Matth. buxi modo pallida, ac solida,
verum non aded grauis.

LOCVS.

Matth. Nasitur frequens in Italia
in sepibus, dumetis, & syluis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Theoph. Fructus deuoratus pecus
ibidem. enecat, quin etiam folium
idem facit, & potissimum ca-
Matth. pras nisi purgentur Anochō. Lixinium in quo bacca decocta fuerint (vt no-
stræ affirmant mulieres) capillos splendidos facit, furfures extergit, & pedicu-
los necat. Ligni materies expetitur à tornitoribus ad fusos parandos.



ACA-

NOMINA.

103

ACACIA, Græcè *ἀκανθία*. Arabibus, *Achachie*. Italis, *Acacia*.

ACACIA.

GENERA.

Duum est generum: maius & minus.

FORMA.

Nascitur Spinæ instar fru- **Diosc.**
ticolæ, non se in rectum attol-
lens. Florem habet cæcidum,
& semen Lupino similem in
folliculis, è quo exprimitur
succus & siccat in ymbra.

LOCVS.

Primum in Ægypto nasci- **Diosc.**
tur.

QUALITATES.

Succus maioris condensa- **Gal. l. 6.**
tus medicamentum est frigi- **simp. me.**
dum, & terrosum, immista et-
iam quadam essentia aquea;
& sanè coniectura est non ef-
se simile, verùm quædam
habere in se dispersas partes
tenues, & calidas, quæ in ipsa
ablutione segregantur. Estq;
etiam hoc tertij ordinis exic-
cantium, & secundi refrige-
rantium, vbi quidem elotum
fuerit, illorum verò primi.

VIREs.

Succus utilis oculorum medicamentis, valet ad ignem sacrum, & vlcera, quæ **Diosc.**
serpunt. Perniones, pterygia, & oris vlcera: mensium abundantiam sistit: pro-
ciduam vuluâ cohibet, citam aluum supprimit, aut porus, aut suppositus, ca-
pillis denigrat. Spinæ decoctum solutos artus fori committit. Gummi cutis
spiracula obstruit, ambustis ex ovo illitum pustulas erumpere non patitur.

APPENDIX.

Vbi Acacia defuerit, licet eius vice, tum Rhois arbusculæ folia, tum lentisci **Diosc.**
foliorum succum, tum etiam hypocistidem medicamentis immiscere.

G 4

ACA-

ACACIA altera, Græcis, *Ἀκακία ἐρέβα*. Italis, *Acacia secunda*.

ACACIA ALTERA.

FORMA.

DIOSC. Prouenit ad Ægyptiæ spinę similitudinem. longę tamen minor, tenerior, humiliorq; munitur etiam aculeorũ vallo, folium habens rutar. Fert Autumno semen, lenticula minus in siliquis cõnexis ternum, quaternũve, gustu etiam adstringente. Color siliquis inest aureus, & fulgore quodam resperfus, aded vt in sole auri modo splendeat.

Matth.

LOCVS.

DIOSC. Prouenit in Cappadocia, & Ponto, quinetiam & in Italia.

Matth.

QUALITATES, ET
VIRE.

DIOSC. Adstringit, cohibet, roborat, & replet, atqui viribus alteri inferior est, & ocularibus medicamentis inutilis.



VITEX,

VITEX, siue Salix Amerina, Græcis, ἄγνος καὶ λόγος. Arabibus, Famincest, Samancheß, siue Benge best. Italis, Virice, siue Agno casto. Germanis, Ehasenmuller siue Reuschlamb. Hispanis, Gattiglio casto. Gallis, Casto. Officinis, Agnus castus.

VITEX.



GENERA.

Duo habetur genera: maior, & minus. *Plin. lib. 24. ca. 9.*

FORMA.

Maior in arborem salicis modo assurgit. Florem mittit album cum pupureo: quæ & candida vocatur. Minor quam nigram appellant, ramosa assurgit, folijs cædidiorib⁹, & lanuginosis, flore est tantum purpureo: Nō multū à salice vitilium vsu distat, & foliorum quoq; aspectu, nisi odore gratior esset. Ramos gerit lōgos, fractu pericaces, & semen racemosum vt piper. *Plin. lib. 24. ca. 9.*

LOCVS.

Nascitur in fluminum ripis, maritimisq; locis, asperis, & torrentium ripis. *Diosc.*

QUALITATES.

Excalfacit, & siccatur ordine tertio, tenuisq; substantia habetur, tum gustu acris simul & adstringens, aperit, resoluit, saporem inducit, atque emolliat. *Gal. l. 6. simp. me. Diosc.*

VIRE.

Semen potū venenatis ictibus, hydropicis, lienosisq; auxiliatur, lac euocat, mentes ciet, drachmæ pondere in vino potum. Genituram exoluit, caput tenat, & soporem affert. Foliorum decoctum, & seminis, mulieribus vuluæ malo opportunis opitulatur. Semen cum Pulegio potum purgationes mouet. Instillatur capiti cum aceto, & oleo in lethargo, & phrenitide. Folia suffita, aut substrata venenata fugant: Illita quoq; serpentium moribus auxiliantur, testium duricias cum butyro, & folijs vitium emolliunt: Semen cum aqua illitum facit ad sedis rimas, & cum folijs, medetur luxatis, vulneribusq;.

G 5 ELÆ-

ELÆAGNOS, Græcis, ἐλαῖαγνος.

ELÆAGNOS.

FORMA.

Theoph. Elæagnos natura fruticosa, lib. 4. cap. cæteris amerinis non absi-
ii. de pla. milis, figura quidem cæteris
hist. proxima. sed molli, lanugi-
 nosoque folio. flore populi
 albæ, sed minore, fructu
 nullo.

LOCVS.

Matth. Nascitur in insulis fluitan-
 tibus.

FACULTATES, ET
VIRE.

Matth. Cùm sit hæc planta vitici
 admodum similis, credide-
 rim ego similes quoq; habe-
 re facultates.

APPENDIX.

Nascitur in Boemia plan-
 ta, cuius hic imago spectatur,
 quæ quidem notis omnibus
 Elæagno atipulari videtur.
 verùm cùm baccas oliuæ similes proferat, non ausim ego affirmare stirpem
 hanc legitimam esse Theophrasti Elæagnum, cùm illi sterilis habeatur. nisi for-
 tasse idem deceptus sit, vel eius codex deprauatus, ut multis alijs in locis obser-
 uauimus.

* Doctissimis viris alijs & imprimis Carolo Clusio est Ziziphus alba, Bello-
 nio Cappadocica. *

SALIX,



SALIX, Græcis, *ἡ ῥέα*. Arabibus, *Buluf, Bhulles, Saffaf, sine Calif.* Italis, *Salice, si-
ue Salcio*. Germanis, *Weiden / sine Gelbinger*. Hispanis, *Salce, sine Salgueiro*.
Gallis, *Saulx*.

SALIX.



GENERA.

Plura traduntur genera. *Theoph.*
lib. 3. c. 13.
FORMA. *Plin. lib.*

Quædam in tantam proce-
ritatē assurgunt, ut ex eis fiant
perticæ, & pali ad vitium peda-
menta, aliæ non tam proceræ
crescunt, colore rufescentes,
sequacis admodum lentitiæ,
quæ ligandis cadorum vina-
riorum circulis commodè fin-
duntur. Has salices Græcas vo-
cât. Rursus aliæ firmiores cor-
bibus, & rusticanae supelle-
ctili expetita, aliæ namq; sunt
minuscule spectabili tenuita-
te texendis canistris, cistellis,
ac calathis aptissimæ. Omnium
folia oleagina, oblongaque
sunt. Supernè virentia, & in-
fernè candicantia.

LOCVS.

Nascuntur humecto solo, *Idem.*
in fluuiorum & in fossarum
aggeribus.

QUALITATES.

Flores exiccant absque morfu: Folia vim spillandi habent. Item Salix quan-
dam habet adstrictionem. *Gal. l. 6.*
simp. me.

VIRES.

Trita folia cum exiguo pipere, & vino pota ileosis subueniunt, sumpta per se, *Diosc.*
& cum aqua conceptum impediunt. Semen vtiliter cruenta expuentibus da-
tur. Cortex eosdem præstat effectus. Eiusdem cinis aceto subactus, & illitus
callos, & clauos tollit. Succus foliorum, & corticis in malicorio cum rosaceo
calefactus aurium doloribus auxiliatur. Eorum decocto fouentur vtiliter po-
dagrici. Recentia folia adduntur in soporiferis lotionibus. Sparguntur eadem *Matth.*
vtiliter circa febricitantium lectulos.

* SALIX

* *SALIX pusilla*, humilis, Salicula repens. Græcis χαμαίρτα. Germanis, Erdenweiden/Steinweidlin/Kriechweidlin/Bergweidlin.

SALIX PUSILLA.

FORMA.

Humi repit tota nec in-
ctum attollitur, sed vndique
adnatis caudici radiculis sese
propagat. Folia non oblonga
nec tam acuminata sunt vt
vulgarium Salicum & modice
splendent. Lignosis, tenaci-
bus, nodosisque ramulis co-
lor subruffus est, nouellis ta-
men furculis subuiridis. Flo-
rem & fructum nullum in ea
obseruare potui.

Locvs.

Nascitur in alpihus circa
lapides copiose repens.*



OLEA-

OLEASTER, aut Sylvestris Olea, Græcis, *ἀγριέλαια*. Italis, *Oliuo Saluatico*. Germanis, *Wilder Ölbaum*. Hispanis, *Zebucho*. Gallis, *Chiuer Sauvage*.

OLEA SYLVESTRIS.



FORMA.

Domestica, longè minor *Matt.* provenit: Folijs breviorib. & aculeatis ramis. Bacca & si numerosa fecunditate vincant, magnitudine tamen satius cedunt, quin & gustatu adstringentiore sentiuntur.

LOCVS.

Nascuntur in Herruria *Matt.* piose. Quin etiam in Dalmatia, & ferè in omnibus Adriatici, & Aegi maris Insulis.

QUALITATES.

Adstringunt magis, *Matt.* gisq; refrigerant rami, ac fo- *Diosc.* lia, quàm domestica. Oleum vehementer adstringit.

VIREs.

Folia trita, & imposita igne *Diosc.* sacrum, vlceraq; serpentia, Epynictidas, carbunculos, & nomas cohibent: quin etiam fordida vlcera repurgât, cutem à capite vullam conglutinant, oris vlceribus commanducata medentur. Succus & decoctum eorundem, eundem præstat effectum:

Succus peculiariter facit ad sanguinis eruptiones, muliebreq; profluviû, prodest vix, & pustulis oculorum: Vlcerâ, & veteres defluxiones sistit, quapropter in collyria additur, & ad palpebrarum erosiones per quam utilis est. auribus subuenit, cum exulceratis, tum purulêtis. folia illinuntur cœliaci vtiliter cum hordeacea farina. Sudor emanans ex cõflagrantibus lignis, scabiem, lichenas & furfures, sanat. Bacca trita, & illita medentur furfuribus, & depascentibus vlceribus. Ossium verò nuclei, ex adipe, & farina scabros vngues eximût. Oleum sylvestris oliuæ inungitur, colluiturq; vtiliter gingiuis putrilagine laborantibus, dentes mobiles firmat, & gingivarum fluxiones sistit. Idem in doloribus capitis, vtiliter pro rosaceo substituitur, defluentes capillos retinet, tardius canitiem sentiunt, qui eo quotidie pèrunguntur.

OLEA

OLEA sativa, Græcis, *Ελαια ἡμερος*. Arabibus, *Zaiton*, siue *Caiton*. Italis, *Oliua domestica*. Germanis, *Ölbaum*. Hispanis, *Oliuo*, siue *Azeymo*. Gallis, *Olivier*.

OLEA DOMESTICA.

GENERA.

Matt.

Antiqui genera decem fecere, nostro autem ævo tria tantum habentur.

FORMA.

Idem.

Folia habent oblonga in acutum desinentia, crassa, pinguiâq; supernè virentia, & infernè albicantia, sapore amaro, & acriusculo; flores mittunt albos, racematim dependentes, è quibus bacca prodeunt primùm virides, deinde pallescentes, & postremò purpureæ prius factæ, saturatè nigrescunt.

LOCVS.

Idem.

Seritur in collibus & in campis.

QUALITATES.

Gal. 6.

simp. me.

Oliuæ rami quantum habet adstrictionis, tantum & frigiditatis participes sunt: fructus verò, vbi rectè maturuerit, moderatè calidus est: immaturus autè magis tum restringit, tum refrigerat.

VIRES.

DIOSC.

Colymbades trita, & am-
bustis illita pustulas gigni prohibent, & sordida vlcera purgant. Oliua flaua, & recēs stomacho vtilior est, & ventri difficilis: nigra autem & matura stomacho auersatur, & oculis, & dolorem capitis mouet. Arefactæ autem illitu depascuntia vlcera sistit, & carbūculos emarginat. Amurca in cupreo vase ad mellis crassitudinē decocta adstringit, & cæteros præbet Lycij affectus. Illinitur dentium dolorib⁹, & vulneribus cū aceto, vino, aut mulso. Additur in medicamēta ocularia: infunditur vtiliter, sedis, vuluæ, & genitalium exulcerationibus. Iumētorum scabiem sanat, cum lupinorum, & Chamæleontis herbæ decocto. Cruda, recensq; podagricis, & articulorum doloribus auxiliatur, peruncta in villosa pelle, & imposita hydropicorum tumores reprimat.

QVER-



NOMINA.

III

QUERCVS, Græcis, Δρῦς. Arabibus, Chullor, Hullet, siue Belut. Italis, Quercia. Germanis, Eychbaum. Hispanis, Robre. Gallis, Chesne.

QUERCVS.

FORMA.

Folij est oblongis, firmis, *Matth.* robustis, per ambitum vtrinque sinuatis, caudice crasso, cortice rudi, scabroq; in ramis vero læuiori. Materie robusta, dura, graui, compacta, firmaq;. Glādifera est arbor, & præter glādes gallas quoq; producit cum maiores, tum etiam minores, quas omphacitides vocant. Alios quoque fert fructus, de quibus Theophrasto lib. 3. capit. 8. & 9. de plantarum historia abundè scriptum est.

LOCVS.

Nascitur vbiq; ferè in syluis. *Idem.*

QUALITATES.

Quæcunq; sunt in hac arboris partes adstringētis quasimodum. *Gal. 6. sim. me.* litatis sunt participes. Sed ceteris adstringentior est, quæ in trunci cortice membrana subest, tum quæ sub glandis ipsius calyce, ea videlicet, quæ fructus carnem conuertit: folia etiam non instrenuè desiccant.

VIRES.

Corticis decoctum, qui libro crassiori subest; quin etiam illius, qui glandium *Diosc.* putamini succedit, datur vtiliter potandum dysentericis, cæliacis, & sanguinem reiicientibus. Eadem in pello supposita vteri fluxiones cohibet. Aqua à tenerimis folijs distillata, sifit pota Iecorarias fluxiones, renū calculos comminuit: & alba mulierum profluuiā cohibet. Datur quoq; dysentericis, & sanguinem reiicientibus. Datur & in pestilentialibus febribus, quodd aduersus venena non parum valeat. Recentia folia ventriculi ardorem tollunt, si super lin- *Matth.* gua teneantur. Aqua, quæ in marcescentium quercuum cavitatibus reperitur scabiem omnem vlcerosam sanat: Glandes vrinam cient, & resistunt deuorata venenatorum moribus. Intritæ crudæ inflammationes leniunt.

FAGVS,



FAGVS, Græcis, Φηγύς. Arabibus, *Chinars*, *sive Chiacas*. Italis, *Faggio*. Germanis, *Buchbaum*. Hispanis, *Haia*. Gallis, *Fau*.

FAGVS.

FORMA.

Matt.

Folij est Carpinij vulgaris non absimilibus, grandioribus tamen, læuoribus, minusque rugosis: Fructus calyculo includitur rotundo, quadantenus echinato, hispido, ac scabro, nucleo intus triangulari, tunica castaneæ simili circumtecto: Nucleus albicat, Sapore castaneorum subdulci, & adstringente: Materies dura, sed non admodum firma: Arbor in magnam assurgit proceritatem, ramis grandioribus ac patulis.

Locvs.

Matt.

Prouenit in syluis, tam in planitie quàm in montibus, & collibus.

QUALITATES.

Gale .6.

Valentius adstringit, quàm *simp. me.* quercus, folia autem tenella non instrenuè desiccant.



VIRES.

DIOSC.

Matt.

Folia trita, & illita tumoribus profunt & imbecillas membrorum partes corroborant. Folia esicata labiorum, gingiuarumque vitijs mirificè auxiliantur. Glandis fagineæ cinis renum calculis vtiliter illinitur. Harum pabulo maxime delectantur glires, & aues quæ rostro sunt validiore.

ILEX.

NOMINA.

113

ILEX, Græcis, *Ἰλὴξ*. Arabibus, *Carbas*, *sive Barbes*. Hispanis, *Anzina*, *sive Azinbeira*. Italis, *Elice*, *sive Leccio*. Germanis, *Steineichen*. Gallis, *Tenfe*.

ILEX.



GENERA.

Duum est generum, *Alte-Columel-*
rum folio spinoso: Alterum *la.*
sine spinis.

* Differt etiam latitudine
& angustia foliorum.*

FORMA.

Arbor est spectata proce- *Matth.*
ritatis, cortice in rufum ni-
gricantē, materia admodum
densa, graui, ac robusta, sub-
rufescentiq;. Folijs est lauri-
nis, perpetuò virefcentibus,
sensimq; in toto ambitu, ser-
ratis, aut spinosis, & auersa
parte albicantibus, robustis,
ac duris. Glandes fert quernis
longè minores.

LOCVS.

Spinosa in Hispania fre- *Matth.*
quentissima: Quæ verò spi-
nis caret, in quàm plurimis
Hetruriæ syluis habetur.

QUALITATES.

Non differt qualitatibus, *Gal. 6.*
à quercu, nisi quòd valentius *simp. me.*
adstringit.

VIRES.

Glandes, quernas viribus antecellunt. Radicis cortex cum aqua coctus do- *Diosc.*
nec mollitus intabescat, & tota nocte illitus capillos denigrat, prius Cimolia
terra purgatos. Cetera, cum quercu, & fago communia sunt. Rubentes pi- *Matth.*
lulæ, quas præter glandes fert, trita, cum aceto vulneribus recentibus, & cru-
entis oculis vtiliter imponuntur.

GENSVRA.

Non rectè sentiunt, Columellæ testimonio, qui Plinij, & Theophrasti au-
toritate freti putant, haud legitimam esse Ilicem, quæ folijs spinosis non pro-
uenit.

H ILEX

* ILEX latifolia, Græcis, περίσπονδα πλάτφυλλον.

ILEX LATIFOLIA.

F O R M A.

Conuenit cum priore magnitudine, altitudine, materia ligni firma ac solida. Folio differt latiore ambitu sinuoso & aculeato. Glans interdum maior, interdum minor quam sit quercus, locorum ratione varians spinoso innititur calyculo, per maturitatē alicubi nigricans, nucleum habēs intus album, grati saporis; flosculi pusilli flauescētes racemulum cōficiunt oblongum, qui Maio mense inuenitur.

L O C V S.

Copiosa est in quibusdam nemoribus, collibus, campis aut conuallibus, & nō infrequens in Hispania, In Narbonensi Gallia ac Prouincia quoq; reperitur, nec non in Italia.

Q U A L I T A T E S.

Folia ipsius refrigerant & reprimūt vt reliquarum glandiferarum.



V I R E S.

Tam huius quam præcedentis folia tusa oedematosis tumoribus imponuntur, & imbecillis partibus roborandis vtiliter adhibentur.

A P P E N D I X.

Obseruantur nonnunquam in eadem Ilice diuersa folia, vt humilis ac tennellæ per margines spinosa horreant, adultæ verd aculeis careant.*

SYBER.

SVBER, Græcis φελλός. Italis, *Sugaro*. Germanis, *Pantoffelholz*.

S V B



GENERA.

Alterū folijs est prolixioribus, acuminatioribusque, alterum verò latioribus, brevioribus, & per ambitum serratis. *Matth.*

FORMA.

Arbor est perpetuæ viriditatis, fructu, & folio Ilicis, sed crassissimo cortice vestitur, atque Ilici magnitudine cedit. Glandes quoque profert iligneis pares, paulo tamen minores, deterioresq;.

LOCVS.

Latifolium in Romano agro frequentissima nascitur. Quod verò prolixioribus folijs est, in agro Pisano prouenit in Italia.

QUALITATES.

Idem præstat quod Ilex, & eodem ferè modo adstringit. *Idem.*

VIRES.

Suberis cortex tritus, ex aqua calida potus sanguinem ex vtralibet parte fluentem sistit. Eiusdem cinis ex vino calido haustus sanguinem excreantibus mirificè medetur. Eius glandes quemadmodum cæterarum glandiferarum arbores, in puluerem tritæ, potæq; drachmæ vnius pondere ex succo plantaginis auxiliantur omnibus alui, & vteri fluxionibus. Decoctum earundem haustum datur aduersus venena. Illinuntur eadem cum axungia maleficis vlceribus. Calyx quo glandes in arbore sustinentur, easdem possident facultates, sed magis adstringunt.

SVBER Angustifolium, Græcis, φελλὸς στενόφυλλον.

SVBER ALIVD.

FORMA.

Matth. Folij est angustioribus,
longioribus, acutioribusque.
Cetera verò cum priori com-
munia sunt.

LOCVS.

Idem. Nascitur plurimum in Ro-
mano agro.

QUALITATES.

Idem. Qualitatibus, ac tempera-
mento nihil ab altero distat.

VIRE.

Idem. Iisdem quoque viribus
pollet, quibus & alterum ge-
nus.



PHELLO-

NOMINA.

117

PHELLODRYS, Græcis pariter *φελλόδρυς*. Arcadibus, *Φήλυσ πρίνος*, Theophrasto recte. Italis, præsertimq; *Herruscu*, *Cerrosugaro*.

PHELLODRYS.

FORMA.

Caudicem habet suberi nō *Mart.* abfimilem, & folia & glandes quercui siue cerro similia.

LOCVS.

Nascitur in agro Senensi *idem.* in montanis syluis.

QUALITATES. ET VIRES.

Non differt suis in facultatibus ab alijs glandiferis. *idem.*



H 3 CASTA-

CASTANÆ, Græcis Κάσταναι ἢ σαρδάναι κάλανοι ἢ διδοι κάλανοι ἢ λήπια. Arabibus, *Sadianalach Castal, & Stebulor*. Italis, *Castagne*. Germanis, *Kesten*. Hisp. *Marones*. Gallis, *Caistaignes*. Boemis, *Kaistany*.

GENERA.

Matth. Domesticæ, & sylvestres. In domesticarū genere habentur maiores, quæ marones vocantur, & minores, quæ peculiariter Castanæ vocantur.

FORMA.

Matth. Arbor est procera, amplaq; folijs oblongis, iuglâdis similibus, venosioribus tamen, & per ambitum fimbriatis, fructu echinato: nuce intus solida, altera parte plana, altera gibbosa, triplici tegminis ambitu septa, membrana primū tenui, crispâq; & amara, mox lento ac coriaceo cortice, demum echinato calyce, alba intus pulpa, ac dulci. Ligni materies solida, ac diuturna.

LOCVS.

Idem. Montibus, & opacis gaudet magis, quam apricis, & campestribus.

QUALITATES.

Diosc. Adstringunt, cum ipsæ nuces, tum quoq; membrana subrufescens quæ carnem ambit.

VIREs.

Diosc. Dantur contra venena, & *Auic.* præsertim contra Ephemerum. Item ad tussim antiquam: prunis inassatæ, & cum saccharo deuorata. Flatus gignunt, & concoctu difficiles sunt, sed ubi rectè concoquuntur, memorabile alimentum præbent, crudæ tamen magis nocent. Siftunt tum alui, tum ventriculi fluxiones. Dantur cruenta expuentibus. Tritæ cum sale, melleq; subactæ, imponunt vtiliter rabidorum canum morfib; & cum polenta, & aceto illitæ mammarum duritias excutunt. Venærem excitant, & caput grauant. Tenuis earum membrana ex vino austero pota duarum drach. pondere, sistit valenter immodicos alui fluores, & sanguinis reiectiones, quin etiam cum pari ramentorum eboris pondere, alba vteri profusua, ex Nimpheæ aqua potæ.

CASTA-



Arabi-
n. Hisp.

NOMINA.

119

CASTANÆ EQVINÆ.

FORMA.



Arbor est spectatæ proce- Matth.
ritatis, folio pentaphylli, senis
tamen diuisuris: & ricini fo-
lio lōgè grandiore, longo, te-
nuiq; pediculo nirente. Echi-
nos fert in cacumine magni-
tudine nostratibus æquales,
subrufo colore, verum durio-
re ac crassiore, aculeis raris
sed robustis, ac firmis. Singuli
singulā includunt castaneam,
nostratibus haud dissimilem,
crassio rem tamen, rotundio-
remq;: Cortice subnigrican-
te, præterquam anteriori par-
te, ea enim albicat, macula
cordis figuram præferente.
totus idem robustus est, nulla
alia intus tunica, quæ carnem
ambiat: Sapor pulpæ nostra-
tibus ferè similis habetur, sed
dulci or paulò, nec adeo man-
dentibus gratus.

LOCVS.

Constantinopoli primum Idem.
ad me allatæ sunt.

QUALITATES.

Adstringunt: & flatus deuorata pariunt.

Idem.

VIRES.

Equinæ vocatæ sunt, quod anhelosis, & rufficantibus equis deuorata sint sa- Idem.
lutares. Dantur quoque sanguinem reijcientibus.

H 4 GALLA,

stata, &
dv bire-
agis no-
pienti-
canum
t. Vene-
eropota
inis re-
iproflu-
ASTA:

GALLA, Græcis *κνυδς*. Arabibus, *Hafes*, *sive Hafus*. Italis, *Galla*. Germanis, *Gallöpfel* / *sive Eychöpfel*. Hispanis, *Galla & Bughala*. Gallis, *Noix de galle*. Boemis, *Galles aneb bublinkj*.

GALLA.

G E N E R A.

DIOSC. Altera omphacitis, altera plana.

F O R M A.

DIOSC. Omphacitis, parua est, rugosa, solida, nullo foramine peruia, vnaq; acino magnitudine æqualis. Plana nucis inglandis magnitudinem explet, cortice leui fungosa medulla, perforataque, & anteriore parte coronata.

L O C V S.

Plin. Nascuntur Gallæ, in omnibus glandiferis arboribus. Verum in quercu copiosiores habentur, ac vtiliores.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 7. *simp. me.* Omphacitis exiccat ordine tertio, & refrigerat secundo, acerbum admodum est medicamentum, frigidum, terrenumq;: repercutit fluxiones, & partes laxas contrahit, ac constringit. Altera, quæ maior est & flaua, desiccatur ipsa quidem, sed tãdò minus, quantò minus acerbæ qualitatibus est particeps.

V I R E S.

DIOSC. Gallæ omphacitides tritæ excrescentias in carne, fluxionesq; gingivarum atque oris vlcerationem cohibent. Nucleus dentium cauernis inditus dolorem sedat. Crematæ vino, aut aceto extinctæ, sanguinem supprimunt. Decoctum eorum ad vulnæ procidentia, fluxionesq; in delessionibus vtile, capillos denigrant aceto, aut aqua maceratæ. Illinuntur vtiliter dysentericis, cæliacisque cum vino, aut aqua, ac etiam potui dantur. Integrarum decoctum, potum iisdem auxiliatur affectibus. In summa, vbi adstringere, siccare, ac sistere sit opus, præstantissima sunt auxilia, sedis inflammationes sanant, & procidentia cohibent.

R H V S.



NOMINA.

121

RHVS, Græcis *ρόδον*. Arabibus, *Sumach*, *Rosbar Sardifcos*, seu *Rosaidicos*. Italis
Rhu siue *Somacho*. Germanis, *Gerberbaum*. Hispanis, *Sumach*, & *Sumagre*.
 Gallis, & Officinis, *Sumac*.

RHVS.



FORMA.

Arbuseula est binum fere DIOSC.
 cubitorum altitudine, folijs
 oblongis, subrubentibus in
 ambitu serratis ilicis modo.
 Botros profert acino quadā-
 tenus lato vuarum gracilium,
 densos, magnitudine tere-
 binthi.

LOCVS.

Nascitur in montibus in- DIOSC.
 ter laxa.

QUALITATES.

Adstringit, & desiccatur or- Gal. 8.
 dine tertio, & refrigerat se- simp. me.
 cundo.

VIRE S.

Foliorum decoctum capil- DIOSC.
 los denigrat, atq; etiam vtili-
 ter dysentericis infunditur, &
 potandum propinatur. Instil-

latur auribus purulentis, folia ex aceto, aut melle illita gangrenas, & pterygia
 cohibent. Semen eisdem præbet effectus: caeliacorum dysentericorumq; ci-
 bis inspergitur. Fracta, desquamataq; ac sugillata, illitum ex aqua ab inflam-
 matione ruetur. Linguae asperitates cum melle abstergit, candida foeminarum
 profluvia sistit, hæmorrhoidas sanat addito querno carbone. Gummi quod è
 trunco profilit, cauis dentium inditum dolores finit. Recentium vuarum suc-
 cus, & seminis cortex, eadem omnia possunt.

H S

VIBR-

RHVS,

VIBURNUM, Italis, quibusdam Viburno, quibusdam verdè Lantanna. Gallis, Viorne & Mauissane.

VIBURNUM.

FORMA.

Math.

Ramis exit digitali crassitudine, bicubitalibus, folijs ferè vimeis, crassioribus & incanis, sensim per ambitum ferratis. Flores edit albos, umbellatim coherentes, à quibus acini prodeunt, lentium modo pressi, qui primò rubescentes, ultimò nigricantes fiunt: Virgæ adeo lentæ flexilésq; sunt, vt ad fascies colligandos, peridoneæ habeantur.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in sepibus, frutetis, & incultis collibus.

QUALITATES.

Idem.

Folia aspera sunt, & gustu adstringentia, fructus, vbi ad ultimam peruenit maturitatem, aluum exoluit.

VIRES.

Idem.

Foliorum decoctum, ex vino austero paratum, vacillantes dentes confirmat, & gingivarum rheumatismos cohibet, atqui longè magis valebit, si cum oliuæ folijs decoquantur in posca: Gargarissatur idem ad Columellæ procidentiam, & ad faucium fluxiones. Acini immaturi in puluerem triti dantur ad alui fluxiones. Paratur è radicibus corticibus sub terra maceratis, & diu tulsis viscum ad aucupia haud inutile.

CENSURA.

Non desunt, qui plantam hanc Viburnum minimè esse contendunt, sed decipiuntur,

COTINVS.



COTINVS, Italis, *Scotano*, & *Rosa*. Germanis, *Welsch Preßilgholtz*.

C O T I N V S.



F O R M A.

Planta est fruticosa, folio *Matth.* saq; ramis tenuibus, numerosq; cortice rufescente: folijs densis, Terebinthi rotundioribus, ac latioribus, graueolentibusque, materie adeo flaua, vt ad lanificia coloranda maximè insectoribus expetatur. Gerit in ramusculorum cacumine papposam quandam congeriem, colore ex candido rufescente, in qua siliquæ oblongæ hyperici ferè modo proueniunt.

L O C V S.

Prouenit copiosa in Tri- *Matth.* dentino agro, Veronensi, & in alijs non paucis Italiae locis. & præsertim in Apennino monte.

Q U A L I T A T E S.

Vis illi adstringentia inf- *Matth.* gnis, exiccans, cohibensque.

V I R E S.

Foliorum decoctum in collutionibus adhibitum auxiliatur, oris, & linguae *Matth.* vlceribus, quineriam columnella, & faucium fluxionibus. Valet idem ad genitalium quoq; vlcera, si eo saepe abluantur. Adduntur folia in deflacionibus, quæ ad menses cohibendos parantur. Siccorum foliorum ac ramusculorum puluis, ventri prius aceto rosaceo illito admotus, alui fluxiones quasunque compescit. Expetitur tota planta coriarijs admodum ad suas spissandas pelles.

PALMA.

PALMA Græcis, φοινίξ. Arabibus, *Machla*, siue *Nachal*. Italis, *Palma*. Germanis, *Dattelbaum*. Hispanis, *Palmera*. Gallis, *Palmiers*, siue *Dattiers*.

PALMA.

GENERA.

Theoph.

Mas est & Foemina: Vtraq; fructifera: quin etiam, & humilis palma habetur.

FORMA.

Matth.

Arbor Palma est procera, caudice squamoso ramos in cacumine tantum fundit in orbem actos cacuminibus ad terram pectantibus: folijs longissimis, duplicatis gladij figura: Flores profert numerosos, tenuibus quibusdam villis appensos, in magni racemi modum, Crocinis facie similes, sed multo minoribus. Si antequam emergant magno quodam cœluduntur involucre, quod palmam elatam vocant, quo tandem dehiscente emergunt, & panduntur. Hinc subinde Dactyli prodeunt, qui per Autumnum vnâ cum ficibus maturefcunt, rufo colore, nucleo intus durissimo, oblongo, canaliculatoq;.

LOCVS.

Matth.

Nascuntur præstantiores in Iudæa, & Aegypto: Cypri, Lybiaq; & in alijs quoq; Europæ regionibus. Sed ibi raro fructus ad maturitatem perducunt.



QUALITATES.

Gal. 8.

Est adstrictoria facultatis omnibus suis partibus, at fructus eius, & maxime dulcis, non simp. me. paucam obtinet caliditatem.

VIREs.

Diosc.

Contra alui scæminarumq; profluuia in vino austero bibitur. Hæmorrhoidas sistit, vulnera illitu glutinat. Dactyli dolorem capitis inferunt, copiosiores in cibo inebriant. Sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis, & dysentericis vtilis in esbo: Medentur esu faucium asperitati. Nuclei in crudo fistili ad albedinem vsq; cremati, Spodij vicem supplent. Vim adstringendi habent: Valentq; contra oculorum vnam, & pustulas: corporis excrefcencias cum vino reprimunt, & vlcera ad cicatrices perducunt. Auxiliantur deuorati scæminis albo vteri profluuiio laborantibus, & præsertim si exempto osse infarciantur Eboris Scobe, Margaritis, carollio rubeo, & deinde sumantur à ieiuniis quotidie tres aut quatuor.

Matth.

PALMA

PALMA Humilis, Græcis, χαμαιπῖπῆς. Italis, *Palmaminore*. Siculis, & Neapolitanis, *Cefaglioni*.

PALMA MINOR.



F O R M A.

Crescit sesquicubitali longitudine, folijs cæteris ab-
milibus, sed brevioribus longè, & angustioribus. Flores
edit ex obliquo capillacea
quadam coma emergentes,
è quibus baccae racematim
prodeunt. Pars radici pro-
pinquior in globum extuberans
internū, germen quod-
dam quod cerebrum vocant
numerosis inuolucris circū-
septum habet, tenerimum,
sapidum, & origratissimum.

L O C V S.

Nascitur in Sicilia, & Cre-
ta, & alijs quoq; regionibus.

Q U A L I T A T E S.

Adstringendi pollent fa-
cultate. Itaque roborant, &
cohibent.

V I R E S.

Germen quod cerebrum
vocat estur secundis men-

sis pro bellarijs cum pipere, & salis modico, perinde, ac carduus, & cinara:
Est enim sapidum, & origratissimum. Id (vt aliqui aiunt) ad venerem excitandam
præstare haud parum creditur: folia præstant, ad sportulas, tegeres, &
capitis umbracula: Rami verò vna cum folijs ad scopas parandas, pro verrendis
domibus, sunt enim non solum ad hoc peridoneæ, sed etiam vtilis, quod non
conterantur nisi tempore longo. Cætera cum maiori palma communia ha-
bet. Baccae sua adstringenti vi, dantur contra omnes corporis fluxiones.

* T H A M A -

*THAMARINDI, vulgo, Indis Puli & Ambili. Græcis ἐλαιοεινός.

T H A M A R I N D I.

F O R M A.

Fructus est pulpa nigra cum ossibus durissimis in massas coacta, sapore acido non ingrato. Eius arbor à varijs autoribus varie describitur. Nempe folio salicis à Serapione, qui fructum rubrum copiosiore carne, quam siliquæ & firmiore, coloreq; ex luteo in nigrum languescente & pingui succo scatente ipsi tribuit. Garzias inquit arborem esse magnitudine Fraxini aut Nucis, aut Castaneæ, ligno denso non fungoso: ramosam & multis folijs ornatam tenuiter incisissimis folijs inuolutum, interdum panis ostendi arcuatum, digito inflexo similem, cute viridi, ante maturitatem, postea cinereo, ubi siccat, qui facile auelli possit, pulpa viscida & lenta, cuius est usus abiectionis nucleis, qui intus continentur satiuorum lupinorum magnitudine, quodammodo rotundi, sed plani, colore furui, sed leues, Fructus viridis acidus est non sine suauitate. Mihi planta è semine nata est folio coluteæ fere, sed longiore, cuius imaginem hic exhibemus.



L O C V S.

Nascuntur multis Indiæ locis, sed qui locis montosis & ad septentrionem obuersis proueniunt, præferuntur & diutius incorrupti manent.

Q U A L I T A T E S.

Refrigerant & exiccant tertio ordine, aut saltem ipsius initio.

V I R E S.

Thamarindi infundi solent pondere §. 4. in aqua frigida aut stillatio in thybi liquore per tres horas, vt facta expressione exempti inspersiq; modico Saccharo propinentur ad purgandos biliosos humores & pituitosos incidendos & attenuandos. Indi sine molestia se purgant Thamarindis cum oleo nucis Indicæ sumptis. Folia vero Thamarindorum trita partibus corporis erysipelate infectis imponunt.*

Arabibus,

Arabibus, Italis, Siculis, Ciprijs, Musæ.

M V S A.

F O R M A.



Planta est vnicaulis quinū *Mattk.* senūve cubitorum longitudine, folio arundineo, quod tamen per quam longo latōque ambitu se diffundit, adeo ut tricubitali longitudine: latitudine verò sesquicubitali ac etiam quandoq; grandiore, * per medium folium costā perpetua & crassa discurret, aliquando aculeis quibusdam à tergo armata *, caulis squamoso vestitur cortice arundinum ferè modo. Evertice germen emergit molle cubitali longitudine à quo alia ab origine ad summum prodeunt germina, è quibus fructus quidam oriuntur, cucumeris mediocris magnitudine, cortice fici: Substantia pulpæ consistit Melopeponum modo, nullo intus nucleo, aut semine, sapore cum quadam insipiditate dulci.

L O C V S.

Nascitur in Syria, Ægypto, Idem. Cypro, & Sicilia.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit in medioprimi, & in fine eius humectat.

Serap.

V I R E S.

Fructus estur in cibis, sed parum alit. Priuatim prodest thoracis, pulmō-*Serap.* nis, & vesicæ ardoribus, aluum emollit, verum liberior eius vsus stomacho aduersatur, quin etiam lecur obstruit: Factum in vtero alit, affectis renibus opitulatur, yrinam ciet, & Venerem stimulat.

Musæ.

Musa imaginem cum fructu iam maturo, hic etiam excudi curauimus, ut rei plantariae studiosis cumulatissime satisfiat.



CvciO-

NOMINA.

129

CUCIOPHERA, Græcis, Κουκίοφερον. Italis, Cuciofera.

CUCIOPHERA.

FORMA.



Palmam tum caudice, tum *Theoph.*
folijs, hæc planta refert: ve- *lib. 4. cap.*
rùm à Palma differt, quod *4. de pla.*
hæc simplex indiuiduâq, al- *hijß.*
furgat, illa verò cùm aliqua-
tenus adoleuit, scindatur, &
bifida fiat: iterumque horum
vtrinq; pari modo diuidatur,
& subinde virgas breues &
multas proferat. Nos tan- *Matth.*
tum fructum vidimus. quo fit
vt plâte imaginem hic osten-
dere nequeamus. Fructum *Theoph.*
itaq; profert, magnitudine,
figura, & succo singularem.
Quippe magnitudine, ferè
qua manum impleat, figura
rotundum, colore flauican-
rem, succo dulcem, & orî gra-
tissimû, non racematim con-
gestum, vt in Palma, sed per
singula discretum: nucleo ma-
gno vehemèter duro, ex quo
anulos detornant, quibus in
versicolorib⁹ fragularijs vin-
culis vtuntur. Materies à Pal-

ma plurimum distat. Altera enim rara corpore, neruosa, & viridis, altera spissa,
grauis, carnosaq; & cæsa crispa admodum atq; dura.

LOCVS.

Prouenit copiosa apud Persas, & Indos.

Plin.

QUALITATES, ET VIRES.

Fructus non differt admodum à dactylorum facultatibus.

Idem.

I

MALVS

MALVS Punica, Græcè *πῦρεν*. Arabicè, *Cuman*, *Ruman*, *sive Roman*. Italicè, *Melagrano*: *sive Pomo granato*. Germanicè, *Granatöpfelbaum*. Hispanis, *Granadas*. *sive Romanas*. Gallis, *Pomes de Grenades*, aut *Mygrames*.

G E N E R A.

MALVS PVNICA.

Matib.

Domesticū alterum, alterū Sylvestre: Domesticorum tria genera, alia. n. dulcia sunt, alia acida: vinosa verò nonnulla.

F O R M A.

Idem.

Arbor quæ Punica poma profert minimè procera est, folijs ferè myrti, sed maioribus, tubo inharere pediculo. Rami illi sunt flexiles, aculeatiq;. Flores punicei, calathi modo patuli, ore stellatim circumsepto, è quo folia prominent tenuia coccineo colore: agrestis papaveris æmula, granulis quibusdam capillamentis appensis, ut in Rotula: Poma cariaeo vestiuntur calyce, exteriùs rufo, interiùs flauo: innumeris granis repleta, succosis vinosisq;, ossiculo intus latente, quæ intercurrentibus flauis, tenuibusque membranis, miro quodā naturæ ordine distinguuntur. Ligni materies flaua, cinereo libro vestita.

L O C V S.

Idem.

Seruntur in hortis, Vincis, & viri Jarijs. Sylvestres sponte nascuntur in collibus, & maritimis locis & aridis.

Q U A L I T A T E S.

Diosc.

Malum Granatum omne adstringentem facultatem obtinet. Acida tamen plus adstringunt, quam vinosa. Et hæc magis quam dulcia. Acini longè magis adstringunt, ac exiccant, quam vitum. Et his valentius quoq; putamen, & cytini. Vinum autè præter adstrictionem refrigerat, & exiecat.

V I R E S.

Gal. lib. 8.

simp. me.

Dulcia stomacho utiliora, sed febrientibus obsunt. Acida æstuantem stomachum iuuant, & urinam cient. Vinosa mediā fortius naturā. Acinorum nucleis acidi punici, insolati, & obsonijs in puluerem sparsi fluentem aluum & stomachū sistunt. Dantur vtiliter sanguinem ex-puentibus ex cælesti aqua. Acidorum succus coquitur cum melle, ad oris, & pudendorū vlcera, Cytini & Balaufti sanguinolenta glutinant: & humida gingiuarū vitia curant, & eorum decocto dentes cūmoti firmanur. Enterocellis quoq; vtiliter illinuntur. Malicorium hæc omnia præstare potest. Radicis decoctum potu latus ventris tineas pellit. Exprimitur è sylvestribus cytiniis succus, qui insolatus, hypocistidis vicem explet, Malicorium ex vino decoctum, ac illitum perniciōes sanat.

*MALA.



NOMINA.


131

*MALA Punica, vulgo Mala Granata. Germanis Granatöpfel / vel Marze
Magdalenen öpfel.

MALA PVNICA.

FORMA.

Exhibemus hic differenti-
am Malorum Punicorum tri-
plicem, non tamen negamus
inueniri plures posse. Dulces
continebat acinos & corticis
colorem magis fuscum quam
cetera habebat, quod superio-
rem locum hic obtinet, & quo
grana possint aspici, dissectum
quoque pingitur. Postea ma-
lum Punicum minus adieci-
mus quod flauo & eleganti ru-
bore distincto cortice grana
intus acida tegit. Vltimum lo-
cum tenet, quod vulgo Mu-
zum vocatur, & medium quasi
consistit inter acida & dulcia,
quantum interdum utraq;
magnitudine superat. Corti-
cis flauedo minus hilaris est,
saturatius tamen rubet.*



II 2

MYR-

MYRTVS Græcis, *μύρτιν*. Arabibus, *Aes*, *Alas* sive *As*. Germ. *Welschheidelbeer* baum. Italis, *Myrto Mortina* & *Mortella*. Hispanis, *Murta*, sive *Raiam*. Gallis, *Meurte*.

G E N E R A.

Matth.

Duo Satiuum, & Sylvestre: Satiui duplex est genus, candidum, & nigrum: Extant quoq; alia duo genera nempe Exoticum, & Tarentinum.

F O R M A.

Idem.

Satiua facile in arborē adolefcit, at sylvestris magis fruticat. Folijs utræq; sunt oblōgis, crassiusculis, firmis, odoratis, in acutum desinentibus: ramis obsequiosis, floribus candidis, numerosis, intus capillamentis, eximio odore. Satiuarū utrūq; genus baccas fert oblongas, aggregatas oleas quadantenus referentes: & multo sylvestribus maiores, parvis numerosisque intus nucleis.

L O C V S.

Idem.

Satiua in hortis, viridarijs, Vineis, & aucupijs seritur, sponte vero nascens Maritimis plurimum prouenit locis, & circa amœnorum lacuum ripas: sed in Hetruria in syluosis quoque collibus virefcit.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 7.

Constat ex contrarijs substantijs, virefcit tamen in ea frigidum terreum, habet verò & tenue quiddam calidum, vnde valenter desiccatur.

V I R E S.

Diosc.

Semen datur sanguinem expuentibus: & in vesicę erosionibus. Baccarum vinum Stomacho vtile vrinam cit, & prodest potū ad phalangiorum, & scorpiionum ictus ex mero. Idem præsumptum crapulam arcet. Præstat idem etiam semen, quo illito fluentes capilli continentur. Foliorum decoctum ad infestationes ubi adstrictione opus sit, plurimum præstat. Foliorum farina ex vino illita luxatos artus iuuat, inflammatos ictus, quin & testium inflammationes. Myrteum condimentum languidos ventriculos roborat, idcirco & cæliacis, & dysentericis vtile. Frondes, itemq; baccarum semen tritum contra fungorum stragulationē mirificę præstant. Baccæ quoquo modo haustæ, aut deuoratæ corroborant, & eius tremori mirificę conferunt.

Matth.

MYR-

M Y R T V S.



MYRTVS Tarentina. Italis. *Mortina Tarentina.*

MYRTVS TARENTINA.



FORMA.

Folio est nostrate longè mi *Matth.*
nore robustioreq; fructu co-
piofiore, sed minuscule & in
summitate pluribus apicibus
coronato. colore ex nigro
purpurafcente, minutis, cre-
bris, albicantibusq; intus of-
ficulis: floribus nostratis limi-
libus.

LOCVS.

Prouenit copiofa in Apu. *Idem.*
lia circa Tarentum. vnde illi
nomen.

QUALITATES ET
VIRE.

Non differt viribus, quali- *Matth.*
tatibusq; à nostrate.

F O R M A.

Matth.

Folio est nostrati haud ab-
mili, dilutiore tamen, acumi-
natiore copiosioreque. & adeo
denso, ut eo rami ubiq; stipen-
tur. Fructum fert oblongum, è
longoq; pediculo dependen-
tem, seminibus refertum, flo-
res albicant, ut in cæteris gene-
ribus.

L O C V S.

Matth.

Seritur in Italia in hortis, &
viridarijs, tanquam peregrina
ad topiaria opera contexenda.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.*Matth.*

Nò differunt viribus, & qua-
litatibus à cæteris generibus.
Folijs siccis utuntur Coriarij
non solum huius sed omnium
Myrti generum ad spissanda,
crispandaq; coria.



MYR-

NOMINA.

135

MYRTILLVS, Vitis Idæa, Græcis *χαμαίφυλλον*. Italis, *Myrtillo*. Ananienſibus,
Calauæ *Χα*. Germanis, *Heidelbeer*.

MYRTILLVS.

FORMA.

Frutex eſt cubitalis, caudi- *Matth.*
ce duro, ramis tenuibus, vi-
reſcentibusq; folijs myrti mi-
noribus, robuſtis, lenſimque
perambitū ferratis: flores edit
tintinnabuli effigie, inter fo-
lia ē petiolis dependentes, co-
lore ſub puniceo, ruſo intus
ſtamine: ē quibus bacca ſub-
naſcuntur, Myrti non abſimi-
les, ſed paulō minores, vinoſa
& auſteriuſcula: & ſumma par-
te vmbilicate, cæruleo colo-
re ad nigrum inclinante.

LOCVS.

Prouenit in montibus, & *Matth.*
ſyluis.

QUALITATES.

Fructus refrigerat, exſiccāt, *Idem.*
roborat, reprimīt, & cohibet.

VIREs.

Dantur bacca cūm recen- *Idem.*
tes, tum quoq; ſicca deuoranda dyſentericis, & cæliacis. Eduntur quoq; æſta-
te fragorum vice à paſtoribus. Nam auſteriuſcula cūm ſint, & vinoſa, ſitim ex-
tinguunt, & non ingratus ſunt cibus. Vſurpantur ab infectoribus ad coloranda
ſtamina, cæruleo colore; ac etiam à pictoribus: Germani autem Pharmacopæi
ijs paſſim vtuntur Myrti baccarum vice, cūm ijs deſtituantur.

I 4

*VITIS



MYR-

*VITIS IDÆA rubra. nonnullis Rhus minimus Plinij. Germ. Rot-Heidelbeer.
Steinbeerlin/Kronsbeer. Gallis Aurelles rouges.

VITIS IDÆA RVERA.

FORMA.

Suffrutex est exiguus, folijs
buxi, interdum leuissime ceu
ferratis marginibus, flosculis
arbuti candidis, confertis, ex
quibus bacce rubetes in sum-
mitate ceu corona quadam
denticulata nascuntur, sapo-
re acida & astringentes, radix
tenuis serpit.

LOCVS.

Amat loca syluosa saxosaq;
& copiose crescit circa abie-
tes atq; piceas.

QUALITATES.

Frigidam & siccam habent
facultatem & simul adstrin-
gendi vim maiorem quam ni-
grimyrtilli.

VIRES.

Pulueres efficiuntur ex aci-
nis aridis, & exhibentur calculosis. Horum quoque in dysenteria vsus est non
contemnendus.*

CERA-



CERASA, siue Cerasia, Græcis, κεράσια. Arabibus, *Sarasse*. Italis, *Cirege*. Germanis, *Kirschen*. Hispanis, *Cerejas*. Gallis, *Cerises*.

CERASIA.



CENSURA.

Diuerſa ceraſorū ſunt genera: nā alia dulcia, alia ſubamara, alia auſtera, alia acida, alia inſipida habentur: quin etiam alia domeſtica, alia ſylueſtria.

FORMA.

Arbor folia fert, meſpilo *Idem*. latiora, per ambitum ferrata: flores albos, racematim prodeuntes, è quibus rubentes oriuntur bacca, è longis pediculis dependentes, & pro na parte diuiſæ, duro intus officulo. piſi magnitudine, in quo nucleus includitur. Ligni materies fibroſa, compactaque, cortice læui, & inuolucris pluribus reſerto.

LOCVS.

Domeſtica Ceraſus in hor-
tis, vineis, & viridarijs ſerit-
tis. Sylueſtris in ſyluis proue-
nit, ac etiam in vallibus.

QUALITATES.

Quæ dulcia ſunt, magis *Gal. lib. 7.*
quæ in inteſtinis ſunt, ſubdu-
cunt, ſed ſtomacho minus vi-

tilia habentur. Contra verò auſtera: Quæcunq; verò acida ſunt, pituitosis ex-
crementosisque ſtomachis conueniunt: ſiquidem auſteris magis deſiccant, &
nonnihil etiam incidunt. Sylueſtria autem cæteris adſtringentiora ſunt.

VIRES.

Viridia aluum leniunt, ſicca verò cohibent. Gummi quod è trunco emanat, *DIOſC.*
communem cum omnibus viſcoſis, & mordicitate carentibus medicamentis *Gal. loco*
facultatem obtinet, quæ ad arterias exaſperatas accommoda eſt. Propriè autem *citato.*
calculis vexatos ex vino potum adiuvat. Idem cum vino potum veteri tuiſſi me- *DIOſC.*
detur, colorem commendat, viſum exacuit, & appetentiam incitat.

CHAMÆCERASVS, Græcis, χαμαίκερας. Italis, Ciregionano.

CHAMÆCERASVS.

F O R M A.

Matth. Arbuscula est Spirama paulo maior. Baccæ, quæ cum austeris magnitudine certant, breui petiolo innituntur, sapore austero, ac adstringenti.

L O C V S.

Matth. Prouenit spontè cum in valle Anania in agro Tridentino, tum in Boëmia, & Austria secus itinera, & prope sepes.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Matth. Baccæ cum cæteris austeriora habeantur, etiam cæteris sicciora iure fuerint, magisque adstringentia.



SILIQVÆ,

NOMINA.

139

SILIQVÆ, Græcis, Κεράρια. Arabibus, Charumb. Italis, Carole, & Carobole. Germanis, S. Johannis Brodt. Hispanis, Alfarbas Carrouges. Officinis, Carobe. Gallis, Caronge.

SILIQVÆ.

FORMA.

Arbor, quæ Siliquas pro-
fert, folio viret fraxino latio-
re, duriore, ac magis circinna-
to. Floret discedente hyeme,
aut vere iam appetente, fru-
ctificat verò Æstate & Autu-
mno, dependentibus siliquis,
primum viridibus, & deinde
cum siccantur, ex rufo nigri-
cantibus, mansu lignosis, sed
dulci pulpa, succoque prædi-
tis: Semine Ægyptiæ Siliquæ
haud dissimili.

LOCVS.

Nascuntur copiosæ in Apu-
lia, Campania, Creta, Syria,
Cypro, ac alijs calidioribus
regionibus.

QUALITATES.

Adstringunt, & exiccant. Gal. li. 7.
simp. me.

VIRE S.

Recentes stomacho aduersantur, & aluum soluunt. Eadem siccata sistunt, DIOSC.
stomachoque vtiliores fiunt. Vrinam quoq; ciunt. Eadem etsi omnium con-
sensu adstringunt: compertum est tamen earum decoctum potum mirificè iu-
uare tussientes, ob dulcem melleamque substantiam, quæ ijs inest.

*SILIQVÆ



IQVÆ,

*SILIQVÆ SYLVESTRES, vel Arbor Iudæ, alijs Cercis, nonnullis Fabago vel Siliquastrum, item, Cucuaia. Germanis, Wild Johannes brodt / Judas Baum. Gallis, Gaynera. Italis, Carobaria. Hispanis, algarouo loco, vel Arbor d' amor.

FORMA.

Speciosa admodum est arbor, & interdum satis magna fit, nullo germinandi ordine: caudex plerunq; non recta attollitur, sed incuruatur & declinat. Folia representant alari figuram, sed multo ampliora sunt, & singula longis petiolis dependent. Flores promit primo vere purpurascens, ex quibus Siliquæ gignuntur latæ, rubræ, siue potius purpureæ, in quibus semen, ut in Cerasiis, sed longè minus.

LOCVS.

Amat loca umbrosa & aspera. Circa Bononiam copiosè nascitur. In Germania ex semine provenit, & in hortis colitur.*

SILIQVÆ SYLVESTRES.



MALA.

MALA, Græcis, *Māla*. Arabibus, *Tufa*, seu *Tufalta*. Italis, *Mele*, seu *Pomi*. Germanis, *Deppfel*. Hispanis, *Mansanas*. Gallis, *Pomes*.

MALA.



GENERA.

Numerosum sanè est malorum genus, ac magis quam explicari possit sapore, forma ac mole diuersum. Alia enim austerū, alia acidū, alia dulcē simul, & austerū, quædam dulcē, & manifestē acidum, & nonnulla cum acore acerbum saporem habent.

FORMA.

Malorum arbor vnico tantum exit caudice, ramos inde statim in longū, latumq; mittens, crasso satis libro, colore exterius cinereo, & intus flavo: folijs virescit oblongis & tenuiter per ambitum serratis. Flores mittit albos, foliatos, aut ex cādido senim purascentes, è quibus poma oriuntur, forma, colore, magnitudine, & sapore varia.

LOCVS.

Domestica in hortis, vineis, & pomarijs habetur. Syluestria verò locis campestribus, tum etiā in syluis, & collibus spontè nascuntur.

QUALITATES.

Adstringētia mala, succum frigidum, terreumq; habent. Acida autem frigidum quidem, sed tenuium partium. Mediæ autē temperaturæ sunt dulcia, quæ ad calidius vergunt, quemadmodum omnis qualitatē expertia, insipidave, ad frigidius inclinant. Syluestria cæteris adstringentiora habentur.

VIREs.

Cruda in cibis omnia ferè refrigerant ventriculum: quamuis dulcia quæ Acidioscia vocantur minus lædant, & quæ in hyemem & ver asservantur: vbi prius maturuerint. Præstant dulcia ad Melancholicos affectus: quin etiam, ad pleuriticos. Ea enim si cineribus incocta, & Glycyrrhizæ succo, amylo, & Saccharo albissimo conspersa propinentur, tam mane, quam vesperi, illos quidem mirificè iuuant.

COTONEA

Fabago
Judas
vel arbor

MALA

COTONEA Mala, Græcè, *Κυδώνια, μῦθα*. Arabicè, *Saffargell*. Italicè, *Mele Cotonè*. Germanicè, *Rüthen*/sive *Quitten*. Hispan. *Membrillos*. Gall. *Pomes de Coing*.

GENERA.

DIOSC. Tria Cotoneorum numerantur genera. Palma illis quæ propriè Mala Cotonea nominantur. Secundo loco Struthia vocata, & tertio quæ media inter hæc habentur, Miluiana seu notha appellata.

FORMA.

Matth. Præstantiora, & quæ primas tenent, pressa sunt, & in toros ferè diuisa. Melopeponum modo colore ad aurum inclinato. Lanuginosa, & cæteris odore præstantiora. Struthia maiore admodum corporis mole spectantur, & forma magis pyra, quam mala referunt. Miluiana autem inter hæc media, cum facie, tum sapore, odoreque esse videntur. Arbor cõmuni malo ferè similis est: atqui folia angustiora sunt, læuiora, carnosiora, robustioraque, & à tergo albicantia, florem fert album syluestris rosæ figura.

LOCVS.

Matth. Prouenit satis in hortis, vineis, & viridarijs.

QUALITATES.

Idem. Valenter adstringunt, cohibent, roborantque: quin etiam refrigerant ordine primo, & siccant secundo.

VIRE.

DIOSC. Cocta, tostave Stomachum iuuant, & vrinam cient. Præsumpta aluum cohibent, contra verò citant. Profunt celiacis, dysentericis, & purulenta excreantibus, præsertim cruda. Succus crudorum datur vtiliter orthopnoicis. Decocto fouentur vtiliter sedis, & valvæ procidentia: Illinuntur cruda ad cohibendam aluum, & vomitiones. Vinum ex his expressum hæc omnia quoque præstare potest, quin etiam oleum quod ex ipsis conficitur, inunctum. Seminum mucago illinitur vtiliter omnibus inflammationibus, & linguae scabritiem lauigat.

*COTO-



* **COTONEA** Maiora, siue Struthia. Græce *στροθια*, vel *σθθια* Galeno. Germanice, *Grosse Quitten*.

Huc refer quæ de alijs sunt dicta.*



PERST.

PERSICA, Græcis, *περσινὰ μῆλα, καὶ ῥοδάκνα*. Arab. *Sauchfeu, Chauch*. Ital. *Pesche, & Persiche*. Germ. *Persich*. Hispan. *Pexegos*. Gallis, *Pesches*. Polon. *Broskyni*.

G E N E R A.

Matth.

Persicorum perplura reperiuntur genera: Quædã enim rubent, alia aureo colore fulgent, alia virescunt, alia albicant, alia sanguineo succo madent, alia duracina vocantur, quod duriores sint pulpa: & quod ab osse non diducantur. Et alia Coto-neæ, alia nucipersica, quod nucum Juglandium faciem representent, appellatur. Sunt etiam quæ pro nucleo amygdalâ dulcẽ habeant Persica amygdalâ appellata.

F O R M A.

Idem.

Persica malus arbor est folijs Amygdalæ per omnia similibus, quemadmodum & floribus, quamvis in persica magis purpurascens spectetur. Ligni materies fragilis, radicesque imbecilles, nec altè descendentes, unde fit, quod hæc arbor cito cõsenescat, & cadat.

L O C V S.

Idem.

Habetur ubique copiosa in Italia, sed in Apulia copiosissima provenit.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7.
simp. me.

Germina, & folia vincetem habent amaram qualitatem. Alioqui sanè etiã digerens medicamentum est. Fructus verò eius, nempe esculentum hoc persicum, humidior est, & frigidior temperie.

V I R E S.

Diosc.

Gal. li. de

alim. fac.

Matth.

Acerba Persica aluum cohibent, sed sicca vehementius. Decoctum è siccis alui stomachi machinæ fluxiones sistit. Pravi succi sunt, & quæ faciliè corrumpuntur. Flores recentes deuorati non solum aluum deiciunt, sed vomitiones quoque faciunt. Hydropticorum aquam pellunt: sed non absque egrotantium incommodo. Lachryma arboris datur ex plantaginis aut portulacæ succo ad sanguinis reiectiones: tussientibus verò & anhelosis ex Tussilaginis aqua, & Croci momento: facit quoque ad raucedinem & arteriæ impedimenta. Datur calculosis cum succo raphani, aut limonum, duarum drachmarum potere. Recetia folia illinuntur vtiliter ventri ad interaneorum vermes, ex aceto. Eorundem succus vermiculosus, ac purulentis auribus vtiliter infunditur.

*PERSICA



NOMINA.

148

*PERSICA rubra siue sanguinea. Germ. *Notz Pfirsich*.

PERSICA RUBRA.

FORMA.

A reliquis parum discrepant nisi maiora essent & intus saturate rubente & quasi sanguineo succo turgent. Caro etiam à nucleo non facile abscedit sed firmitus adherescit.*



K MALA

st. Fructus
temperie.

icis alui sto

Flores re-

nt. Hydro-

yma arbo-

tulentib.

ad raucem-

monū, dua-

aneorū ver-

er infundit.

PERSICA

MALA Armeniaca, sive Præcocia. Græcis, Μῆλα ἀρμενιανὰ ἢ πρæκοκία, & ἑστὶν ἡ ἀρμενία. Arabibus, Mermex mex, Mesmes, sive Misnis. Italis, Armeniache, Bacoche, Moniache, & Grisomele. Germanis, S. Johannis Pfirsich. Hispanis, Alvincosques, Albarchigas, Aluaricoques. Gallis, Abrico & Carmagnoles, & Chicandela.

ARMENIACA. MALA MAIORA.

GENERA.

Matth. Plures eorum visuntur species, magnitudine, & sapore quoq; differentes.

FORMA.

Idem. Arbor rarò procera admodum visitur. Folia fert Piri haud absimilia, subrotunda, & per ambitum ferrata. Flores albos, cerasi modò, è quibus fructus prodeunt perficorum forma ac ferè magnitudine, aureo colore, sæpe cum purpura misto, os omnia infra se concludunt, vtraque parte turgens, in quo nucleus concluditur, in quibusdam amarus, in quibusdam verò dulcis.

LOCVS.

Idem. Habentur in hortis, vineis, & Viridarijs.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. Fructus humidior, frigidiorque est, vtrunque secundo quodammodo excessu.

VIRE.

Matth. Oleum è nucleis expressum, mirifice valet ad inflammatas hæmorrhoidas inunctum. Valet quoq; ad vlcera tumores, & ad linguæ impedimenta: & pariter ad aurium dolores. Idem potus vnciarum quinq; pondere, cum vini Crofici vncia, calculos pellit, & colicos iuuat.

ARME-



ARMENIACA MINORA, Græcis, Μῆλα ἀρμενιακά μικρά. Italis, præsertimq; He-
truscis Armoniache, Bacoche, & Moniache minori: Insubribus autem, & Venetis
Armellini.

ARMENIACA MINORA.

FORMA.

Arbor est, mali proceritate, *Matth.*
folijs albae populi, floribus ce-
rali admodum similibus, ac pa-
riter racematim prodeunti-
bus. Fructus edit mali Persici
effigie, minores tamen, colo-
re aureo subrutillante, & odo-
re iucundo.

LOCVS.

Habentur passim in hortis, *Idem.*
viridarijs, & vineis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Non differunt suis in facul- *Idem.*
tatibus à maioribus. verùm ta-
men austeriori sunt sapore.



CITRIA MALA, siue medica mala, Græcis, Μῆδινὰ καὶ ῥιτὰ, ἢ καὶ δερμῆλα. Italis, Cedri, & Citroni. Germ. Citron Deyffel/ siue Züden Deyffel. Hilp. Cidras. Gal. Citron.

CITRIA MALA, SIVE MALA MEDICA.

GENERA.

Matth. Maiora, & minora.

FORMA.

Idem. Proueniunt maiora melopeponū magnitudine. Minora verò paulo limonibus grandiora: & gustu suauiora. Planta quæ perpetuo pomifera est, aurantiorum ac limonum arbores magnitudine æquat. Folijs virescit perpetuis, aurantiorum similibus, vbiq; veluti acu tenuissima perforatis, foraminibus, visum effugientibus. Flores edit ex albo purpurascens: solidos, calathi figura è quibus poma proueniunt, oblonga, rugoso cortice, flauo, ac luauē odorem spirante. Acidam includunt medullam, succo plenam, in qua semen reconditur hordei figura, sed quadantenus crassius: duro obductum cortice, amaro sapore. Arbor nunquam sine fructu visitur.

LOCVS.

Idem. Natale solum ijs est calidis in Regionibus, maritimo præsertim tractu, & circa amœnos lacus, & si etiam serantur in hortis, & viridarijs.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. Succus vincentem habet qualitatem acidam, & siccam, ut ipse, tertij sit ordinis exiccantium, refrigerantiumq;. Cortex autem exiccat, & non parum habet acrimonie, & proinde desiccatur secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut paulo infra. Porro caro pariter crassi fœci est, & puitosa frigidaq;. Semen amarum est, & digerendi videlicet, siccandi; facultatem obtinet secundo quodammodo ordine à temperatis recedens. Folia verò & digerunt & exiccant.

VIREs.

Matth. Semen in vino potum venenis resistit, peculiariter autem Scorpionum ictibus aduersatur, alium monet: oris suauitatem commendat. Succus grauidarum malaciæ succurrit. Pomum vestij impositum, tinea abigit. Idem totum venenis aduersatur, & succurrit pestilentialibus febribus affectis. Cortex saccharo, aut melle conditus, ventriculū, & cor corroborat. Succus flauam reprimat bilem, & pestis contagia arceat, & sitim sedat.

MALA



MALA Limonia, Italis, *Limoni*. Gallis, *Lemons*. Germ. *Limonen*.

LIMONIA MALA.



GENERAL.

Maiora: & minora: quæ et. *Matth.*
iam succi bonitate differunt,
& corticis crassitudine. Nam
quæ grandiora sunt, & succo,
& cortice, carneq; longè sunt
præstantiora.

FORMA.

Planta perpetua frondevi- *Idem.*
ret, quemadmodum & Citrus,
folijs etiam similibus, sed pau-
lò angustioribus. Flores fert
albos, & odoratos, à quibus
poma oriuntur oblòga, citri
faciem referentia, atq; etiam
colore magis diluto. Eadè o-
mnib; ferè gètib; nota sunt,
magis quàm describi debeant.

LOCVS.

Seruntur tanquam peregrini- *Idem.*
na in hortis, & viridarijs, &
quanquam mangonio cultor-
um in frigidis regionibus vi-
uant, quod hyeme in conca-
meratis cellarijs recòdantur,
earum tamè prouentus non
est nisi in locis calidis, & præ-
sertim maritimis, & circa la-

cus amænissimos. Ideoq; in Apulia, Calabria, & alijs Regni Neapolitani regio-
nibus copiosa limonia proueniunt.

QUALITATES.

Idem qualitatibus prædita sunt, quibus & Citria mala.

Idem.

VIRES.

Sirupus qui è limonũ succo paratur, extinguit non solùm bilis feruorem; sed *Idem.*
quoq; ad sitim extinguendam, & ad pestilentes febres conducit. Aqua distilla-
ta è limonum acida pulpa: expetitur mulieribus ad faciei nitore conciliandum,
quin etiam ad vitiligines, & corporis, cutisq; infectiones delendas, nam & va-
ros delet, & acaros quoq; interimit. Sirupis admista, datur vtiliter acutè, aut cò-
tagiosè febrientibus. Eadem lumbicos necat. Immaturi limonis succus, sescun-
cià pondere cum vino potus calculos renum pellit.

K 3

AVRAN-

AVRANTIA mala. Italis, *Aranci*. Germ. *Pomeranz*. Gallis, *Pomme d' Orenge*.

AVRANTIA MALA.

G E N E R A.

Matth. Sunt quæ dulcia: quæ acida: & quæ inter hæc media habentur, ut de punicis quoque diximus.

F O R M A.

Idem. Arbor est citro similis, & perinde ac illa perpetua comaviret, folijs lauro latifoliae proximis ac suaviter odoratis, crassis, lævibusq; , & in acutum desinentibus. Ramos habet flexiles, ac obsequiosos; topiarijs operibus haud inidoneos, aculeis firmis, acutisq; refertos. Cortice ex viridi subalbicante: flores albos odore per quam præstanti, è quibus suavis admodum distillatur aqua. Poma fert rotunda, aureo colore, odorataq; . Cortice crassiore, pulpa, & succo referta, in qua semen citri simile.

L O C V S.

Idem. Seritur in viridarijs, & hortis: Maritimis præsertim tractibus: Abundant ijs Campania, Apulia, Calabria, & aliæ Regni Neapolitani regiones, quin etiam Liguria & Benaci Lacus viridaria.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Refrigerant & exsiccant, quæ scilicet acida, & vinosa sunt: dulcia verò caloris non sunt expertia. Cortex omnium calidus est.

V I R E S.

Idem. Aqua è floribus distillata, præterquam quod præstâtissima habetur ad odoramenta: præstat quoq; pota sexvnciarum pondere ad sudorem ciendum: quare datur utiliter cõtra febres pestilenciales, in quibus exanthemata spectantur in cute. Cor corroborat, & spiritus vivificat. Cortex saccharo conditus ventriculorum roborat, & flatum pellit. Omnium succus sitim extinguit & febrientes iuvat, præter dulcium aurantium. Nam is febrientibus non adeò salubris est, nec sitim sedat.

P O M A



POMA ADAMI. Italis, *Lomie & Pomi d' Adamo*. Germ. *Adams Deyffel*.

POMA ADAMI.

FORMA.



Arbor quæ hæc edit poma, *Matth.* folio est Limoniæ Arboris maiore, patentioreq; ramis etiam similibus: floribus Citrei mali æmulis, fructu Aurantijs duplo, triplove maiore rotundo: Cortice haud crasso, pallido, crispo, & inæquali fixuris quibusdam apparentibus, perinde ac dētibus demorso, succosa, acidaq; mader pulpa, sapore limonum haud lōgè abfimili, insipidiore tamen, in qua semina latitant. citrei mali, aut limonij æmula. Hæc poma, quidam putant limonia esse fœmini generis.

LOCVS.

Seruntur cum Citrijs, li- *Idem.* monijs, aurantijsq; malis, & ijsdem, vt illa proueniunt locis.

QUALITATES.

Idem.

Refrigerant, exiccant, & adstringunt.

VIRE S.

Præstat eorum succus ad ea omnia ad quæ limonia præstare diximus: minore *Idem.* tamen efficacia: Peculiariter autem valent poma ad scabiem, si per medium secta: & tenuissimo sulfuris puluere aspersa, & deinde feruentibus cineribus calefacta, scabiosis corporis partibus infricentur.

K 4

PYRA,

PYRA, Græcis, *ῥαια*, Arabibus, *Humechte Cirmette*, *siue Kemetry*. Italis, *Pere*. Germanis, *Byren*. Hispanis, *Peras*. Gallis, *Poyres*.

PYRA.

G E N E R A.

Matth. Multa ac varia pyrorū numerantur genera, odore, sapore, colore, forma: ac proventu differentia. Quin etiam & Syluestria quoq; copiosa visuntur.

F O R M A.

Matth. Varia est quoq; pyrorum facies: quodd cū omnibus notum sit quemadmodum & plāta: nec huius nec illorum formam describere libuit.

L O C V S.

Proueniunt vbiq; in collibus, agris, Vineis, hortis, & viridarijs. Syluestria verò locis incultis, & in syluis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 5. Vim habent exiccandi: ac
simp. me. etiam adstringendi: Atqui
& 2. de a- Syluestria longè magis ad-
lim. fac. stringunt. Huc quoq; referri possunt quæ de malis & punicis dicta sunt: namq; sapor vires palam facit.

V I R E S.

Diosc. Pyra adduntur vtiliter in repellentibus cataplasmatibus. Decoctum siccorum, & cruda ipsa aluum adstringunt, ieiunos esitata lædunt. Recentia cocta esu stomacho grata sunt: Syluestria præstant dysentericis, cæliacis, & sanguinem excreantibus. Ligni arboris cinis datur vtiliter potandus. contra fungorum strangulationem: ad quod etiam valet pyrorum syluestrium succus potui datus: Quin etiam si ipsa cum fungis coquantur, eos innoxios reddunt.



MESPI-

MESPILVS prima, Græcis, μέσπιλον, ή μεσπίλη, Αβωία. Arabibus, Zarat, ZARUR, & Alzarur. Italis, Azarolo. Hispanis, pariter Azarolo.

MESPILVS PRIMA.



GENERA.

Duum Mespilus est generū DIOSC. folijs, & fructu diuersum.

FORMA.

Primum genus arbor est *Matth.* spinosa, mediocris proceritatis, & materia Pyro haud absimili, folijs laciniatis Apij æmulis, aut Oxianthæ, floribus albicantibus, racematim coharētibus. Fructus illi sunt Sorborū crassitudine, rubentes, vulgaribus mespilis equales, sed arctiore vmbilico, tribus intus ossiculis.

LOCVS.

Copiosa Neapoli, vbiq; in *Idem.* viridarijs, & vineis.

QUALITATES.

Fructus acerbus est ante- *Gal. li. 7.* quam matureseat, refrigerat, *simp. me.* exiccat, & adstringit, quæ etiam qualitas in germinibus & folijs viget.

VIRE S.

Ventris fluxiones cohibent fructus, & multò fortius quàm sorba. Siftūt fau- *Gal.* cium gutturis quæ fluxiones, vbi eorum decocto os collatur. Dantur vtiliter in DIOSC. mulierum granidarum malaciâ. Condiuntur cum zaccharo, & asseruantur ad *Matth.* omnia supradicta.

MESPILVS vulgaris, Græcis, μέσπιλον, ή μερμερίλη. Arabibus, Zaror zarur, & Alzarur. Italis, Nespulo. Germanis, Nespel. Hispanis, Nesper. Gallis, Nespier.

F O R M A.

Matth. Folijs est mali, sed minoribus: flores fert albicantes, Cotonæ mali æmulos: fructū rotundū latiore umbilico, quinque acutis processibus coronato.

L O C V S.

Habetur in vineis, hortis, & sepibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7. Fruct⁹ acerbi admodū sunt, simp. me. & strenuè coercentes, multo & 2. de 4. fortius quàm sorba. lim. fac.

V I R E S.

Diosc. Adstringunt vehementer, aluum fluentem cohibent.

Matth. Sicca folia in pulverem aspersa, recentia vulnera glutinant, & sanguinis profluvium sistunt. Dantur vtiliter sanguinem reijicientibus. Mespilorum ossicula in pulverem contrita, renum calculos valenter pellunt, vbi cochlearis mensura ex vino, in quo vulgaris Petrosilini radices decoctæ fuerint, ebibantur.

MESPILVS VVLGARIS.



L O T V S.

NOMINA.

155

Lotus, Græcis, *λωτός*. Arabibus, *Sedar*, siue *Alfadar*. Italis, *Bagolaro* siue *Perlaro*. Germanis, *Zurgelbaum*. Hispanis, *Almez*. Gallis, *Alyfier*.

LOTUS, SIVE CELTIS.

FORMA.



Lotus arbor est vasta magnitudinis, incisuras foliorum habet, perinde ac Ilicis. Baccas fert Cerasi minores, p maturitatem nigrescentes, & longo pediculo nirentes cerasorum modo: nulli cortex iucundior, aut oculos excipies blandius: nulli rami longiores, validioresque, aut plures, ut dixisse totidem arbores liceat.

LOCVS.

Montes & valles amat, & expetitur domibus, ramorum petulantia.

QUALITATES.

Non ita multo adstrictioris facultatis est particeps, sed & tenuium est partium, & exicatoria.

VIRES.

Baccæ aluum sistunt, ramentorum ligni decoctum, siue potum, siue Clysmate infusum dysentericis, ac foeminis vterinis fluxibus laborantibus auxiliatur. Rufat capillos, & defluentes cohibet, & citam aluum cohibet.

CENSURA.

Sunt qui contendunt Athenæo Zyzophum nostratē lotum designare, sed decipiuntur, & hallucinantur.

PSEUDO-

PSEVDOLOTVS, Italis, *Loto bastardo*.

PSEVDOLOTVS.

FORMA.

Matib. Arbor est procera, folijs latis, oblongisque, firmis, ac nervosis, fructu Sebestenorum effigie, sed longè minore, colore per maturitatē cæruleo, pluribus intus ossiculis, sapore non ingrato.

LOCVS.

Idem. Italiæ peregrina hæc arbor est, & raris in viridarijs habetur.

QUALITATES.

Idem. Eadem ferè illi qualitates sunt, quæ legitimæ loto tribuntur.

VIRES.

Idem. Vires quoque eadem illi sunt, si rerum experimentatoribus credimus.



CENSURA.

Non rectè sentiunt, qui Pseudolotum hanc Guaiaci plantam esse putant.

LOTVS

NOMINA.

357

Lotvs Africana altera, Italis, *Legno santo, sed falso.*

LOTVS AFRICANA ALTERA, SIVE
LOTI AFRICANÆ SPECIES.



FORMA.

Arbor est procera, folijs al- *Matth.*
terius loti latioribus, baccis ro-
tundis, acuminato tamen ca-
cumine, colore caruleo subni-
gricante. Hæ pediculis carent,
calyculis tamen ima parte ob-
ductis, perinde ac glandes, &
Mixa, arboris ramis, & surcu-
lis seriatim coherent.

LOCVS.

Habentur arbores multis in *Idem.*
locis in Italia, è longinquis ta-
men regionibus allata.

QUALITATES, ET VIRES.

Sunt qui velint arborem *Idem.*
hanc eisdem cum loto pollere
viribus. Id quod nos quoque
putamus.

CENSURA.

Aberrant, qui hanc loti spe- *Idem.*
ciem, Guaiaci esse Plantam
contendunt.

CORNVS,

CORNVS, Græcis, *Κεραία*. Italis, *Corniole*; Fructus *Cornole*, & *Cornie*. Germanis, *Arbor, Cornelbaum, Surberbaum*, siue *Diersen*; Fructus, *Welsch Kirschen*. Hispanis, *fructus Cornizelos*. Gallis, *Cornier*; Fructus verò *Cornoille*.

GENERA.

Theoph. Duum est generum. Quædam enim mascula est, quædam verò fœmina.

FORMA.

Theoph. Masculâ folia habet Amygdalæ (re autem vera virgæ sanguineæ vocatæ, haud dissimilia) Corticem heruosum, & tenuem, caudicem nō nimis crassum. Cæterū fœmina virgas paruas amerinæ salicis modo è latere profert, & fruticosior est. Nodos ambe perinde ac Amerina, tum geminatos, tum inuicem cōgruos habet. Mari materies excors, tota quæ solida. Fœmina verò medullam continet, & mollior est. Flos oleæ, baccæ oliui similes, oblongæ, rufi colore, & singulari pediculo, plures, ossiculū intus habet oblongū oliui modo, in quo nucle⁹ sapore dulci, odoratuq; grat⁹. Ambe fructū ferūt, sed fœminæ vix gustabilē esse dicūt.

LOCVS.

Matth. Nasçitur in syluis, in collibus, & dumetis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Fructus admodum acerbus est, ideo valenter adstringit, folia quoque & germenina acerba sunt, valenter quæ desiccant.

VIRES.

DIOSC. Baccæ in cibo adstringunt, ideoq; albo profluuiio fœminarum atque dysentericæ salutes, sanies quæ virentia folia torrendo resudarunt, impetigini conuenienter illiniuntur: folia maxima vulnera glutinant in duris hominum corporibus. Ligni materies, quod durissima sit, & admodum robusta, expetitur, pistonarijs fabris, ad parandum rotarum dentes: aduersatur lignum à cane rabido demorsis, nam huius tantum contactu in rabiem aguntur.


VIRGA



VIRGA sanguinea, Italis, Sanguineo, & Sanguinello. Germanis, Hartriegel.

VIRGA SANGVINEA.

FORMA.



Arbor est fruticosa, virgis *Matth.* corno tenuioribus, robustis, ac geniculatis, cortice sanguinis modo rufescente, folijs firmis, nervosis, cornoque proximis, brevioribus tamen, ac latioribus: Floret vere, umbellis subalbicantibus, è quibus bacce oriuntur orobi magnitudine, primū virides, & per maturitatem nigricantes, racemosaque, è quibus oleum exprimitur rusticis, ad lucernarum usum.

LOCVS.

Nascitur in sepibus & frutetis. *Idem.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Baccæ, amaro, acerbo, adstringenti que gustu sunt, itaque abstergunt, roborant, cohibent, ac repellunt. Idem quoque præstat oleum, quod ex eis elicitur.

SORBA,

SORBA, Græcis *σῶρα*. Italis, *Sorba*. Germanis, *Speyerling* / *Sporöpfel* / *huc Speyerbiern*. Hispanis, *Sorbas*. Gallis, *Sorbes*, & *Cormes*. Boëmis, *Kzerbiny*.

SORBA.

G E N E R A.

Matth. Duo Sorbi domesticæ arboris genera, alterū quidem mas, alterū fœmina: quæ pomorum diuersitate noscuntur. Duo item quoque syluestrium, quorum alterum Torminale vocatur.

F O R M A D O M E S T I C Æ.

Matth. Vtraque caudice exit recto ac longo, ramis in altum assurgentibus: folijs fraxini, sed angustioribus, auersa parte albicantibus, & per ambitum serratis: flores profert albos racematim prodeuntes, è quibus fructus pariter racemosi, in altera quidem orbiculati, & succo odoratiore, ac mitiore, in altera verò ouati pyri faciem referētes, & gustui asperiores, insuauioresq; & minus olentes, colore pallido, in latere rufescente. Hic mas, ille fœminæ esse creditur. Ligni materies durissima & compacta. Fructus straminibus impositi aut suspensi, maturantur.



L O C V S.

Idem. Habentur ferè vbique locorum in Campis, Vineis, & Viridarijs.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 3. Adstringunt vt Mespila, sed imbecilliore effectu.

V I R E S.

simp. me. Sorba deuorata aluum sistunt, & præsertim sicca anteaquam maturescant. Id quod præstat earum farina, si polentæ loco sumatur. Quod & decoctum eorum in potu præstat. Datur vtiliter farina delingenda dysentericis, cæliacis, & sanguinem reiicientibus, ac etiam fœminis vterinis fluxibus opportunis.

SORBUS

SORBUS Sylvestris, vel Aucupalis, Italis, *Sorbo saluatico*. Ananiensibus, *Temelo*. Germanis *Eberaschen*/Vogelbeer.

SORBUS SYLVESTRIS.

FORMA.



Folia, & ferè vniuersa plan- *Matth.*
ta huiusce facies, à domesti-
ca parum differunt. Fructus
verò aliter se habet. Ex mu-
scarijs enim, sambuci modo
dependet, sed baccis quadru-
plo maioribus, colore aureo
subrufescente, sapore acerbo
adstringentiq;.

LOCVS.

Prouenit syluosis, ac frigi- *Idem.*
dis locis inter ceteras agre-
stes plantas.

QUALITATES
ET VIRES.

Baccæ adstringunt, siccant, *Idem.*
& repellunt. Asseruantur
hyeme ad aucupia, quòd tur-
dis gratissimæ sint. Arboris
virgæ quod solida, robusta-
que sint materie, expetuntur
à rusticis pro stimulis boum
parandis.

L

SORBUS

SORBUS Torminalis, Italis, *Sorbo Torminale*, & *Sorbo Saluatico*. Germanis, *Wilder Sperwerbaum*. Boemis, *Vuofkerusse*. Fructus, *Elsbeer*.

SORBUS TORMINALIS.

FORMA.

Plin.

Matth.

Folio exir vitigineo, Platani modo, læui, haud infirmo, baccis racematim coherentibus, asperiusculis, & oblongis, coronato umbilico, colore ferrugineo: Sapore ante maturitatē perfectam acido, & austero, postea non iniucundo.

LOCVS.

Matth.

Nascitur in syluis, cum cæteris syluestribus.

QUALITATES.

Matth.

Baccæ adstringunt, non tamen adeo valenter, vt domesticæ.

VIREs.

Matth.

Plin.

Possunt eadem omnia quæ domestica: sed inefficaciora habentur: Adstringunt enim aluum, & dysentericorū torminibus vtilia sunt, vnde illi nomen.

CENSURA.

Matth.

Decipiuntur profectò, qui hanc Torminalis Sorbi plantam Crateogonum esse censent, seipsosq; accusant, negligenter legisse Plinium.

PRVNVs



PRUNVS, Græcè, Κοκκύμυλα, & Κοκκυμυλέα, Pruna verò Κοκκύμυλα. Arabi-
bus Anas, Anas, siue Agias. Italis, Pruno susino, Fructus Sueine, & Susine. Ger-
manis Pfaffen / & Kriechen. Hispanis, Prunas, Andrinās, Ciruelas, Ame-
xeas. Gallis, Arbor Prunier, fructus Prunes.

PRUNVS.



GENERA.

Prunorum genera, varia, Matth.
& multiplicia sunt facie, ma-
gnitudine, colore, & sapore
differentia.

FORMA.

Arbor est procera, radici. *Idem.*
bus haud altè descendentibus,
paucisq; , caudice sub-
recto, cortice scabro, multis
ramis brachiato, folijs latis
oblongisq; per ambitum ser-
ratis: floribus candidis, folia-
tis, racematim prodeuntib⁹.
Fructu carnosio, tenui vesti-
tus cuticula, osliculo intus
oblongo, in quo nucleolus.

LOCVS.

In vineis, hortis, & virida- *Idem.*
rijs habetur.

QUALITATES.

Folia refrigerant, exiccant, *DIOSC.*
adstringunt, prohibent. Fru- *Gal.*

ctus verò aluum subducunt, idq; recentes magisque sicci.

VIRE S.

Folia Pruni in vino decocta, collutione, & gargarizatu, Columellam, gin- *DIOSC.*
guas, tonsillâsq; fluxione laborantes reprimunt. Arboris gummi aggluti-
nat, & ex vino potum, calculos rumpit. *Idem* ex aceto illitum infantium li-
chenas sanat. Recentia pruna deuorata stomacho inutilia sunt.

L 2

*Pruna

* Pruna cerea præcocia, Germanis, *Spilling* / & Serotina, *Zipparten*.

PRUNA CEREÆ.

FORMA.

Præcocia parum differunt à reliquis prunis sed tamen toto habitu inelegantiora videntur, cortex stipitis scabrius, folijs acuminatioribus vestiti rami, oblongioribusque, Fructus verò cerei plerumque; copiosiore sætu arbores onerāt, præcociores sunt reliquis prunis & pulpa minus lapida constant. Serotina minora sunt, colore quoque cereola, sub finem octobris colliguntur, subdulcia, modice astringunt, plura, quinq; ferè, ceu à botro dependent.

LOCVS.

Hortis vinerisq; hæ quoq; arbores familiarissime sunt.

FACULTATES.

Præcocia aluum subducunt vt alia pruna dulcia, sed cauendum à nimio ipforum esu, nam ventriculum grauant & putredini obnoxia sibi similes humores gignunt, ideoq; multis alui profluuium nec non dysenteriam conciliant.

Serotina vero saluberrima vulgo putantur & visceribus, imprimis pulmonibus, utilia. Siccata & cocta addito saccharo placent.*



PRUNVS

PRUNVS Sylvestris, Græcis, Κονκύνη & ἀγία. Fructus, Italis, Prugnole Sal-
uatiche. Germanis, Schlehdorn / arbor, Fructus, Schleen. Boemis, Trnfi.

PRUNVS SYLVESTRIS.



FORMA.

Humilis est arbuscula, fru. Matth.
tiosa, & ubiq; aculeata, folio
fatiua Pruni longè angustio-
re, duriore, asperioréque, flo-
ribus albis, ac numerosis. Bac-
cis vix Acinis æqualibus co-
lore in purpura nigricante.
Viridi intus pulpa, austero,
adstringente admodum gu-
stu. In quibus os includitur
ceraforum simile.

LOCVS.

Nascitur in dumeris, sepi. Idem.
bus, & Syluis.

QUALITATES.

Tota planta exiccantis, ad Idem.
stringentisq; est facultatis,
quemadmodum & bacca.

VIRE.

Bacca Cæliacis, & dysen- Idem.
tericis vtiliter deuorantur.
Eadem cum arbusculæ radi-

cibus, ex aqua vel austero vino decocta, sanant oris, linguæ, gingiuarum, Co-
lumellæ, & faucium vlcera, & fluxiones tum collutione, tum gargarizatu,
quare non parum recreantur hoc medicamento, qui hydrargyro perunchi
oris vlceribus, & fluxione laborant, & præsertim addito Lycio, alumine, &
Rhodomelle. Idem decoctum in defensionibus auxiliatur feminis vteri pro-
fluuiio obnoxijis. Aqua è floribus distillata, interficit hausta intestinorum ver-
mes, oculorumq; fluxiones cohibet.

L 3

SEBE-

SEBESTENA, Græcis, Μύξα, μύξα, & μυξάγια. Arabibus, *Sebesten Motheica*, *Makeita*, & *Mokaita*. Italis, *Sebesteni*. Gallis, *Sebeste*.

SEBESTENA.

F O R M A.

Matth.

Arbor est Sebestenus Pruno non admodum dissimilis, folijs comatur pruni rotundioribus, ac firmiter. Floribus albicantibus, racematis prodeuntibus, & quibus Bacca oriuntur, prunis parvis similes, calyculo quodam ut glandes ima parte colligatae, osse intus triquetro, in quo nucleus. Ii maturitatem adepti in atrum virescunt, gustu prædulci, ac lenta, tenaciq; pulpa, ex qua Syri, & Aegyptij viscum ad aucupia parant.

L O C V S.

Idem.

Proveniunt in Syria, & Aegypto, unde ad nos conferuntur.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Emolliunt, sitim sedant, & aluum citant.

V I R E S.

Idem.

Bacca à cortice purgata, linguae asperitatem mirificè leniunt, & dantur utiliter ex flava bile febricitantibus. Pectori opitulatur, quo fit ut tussientibus, & lateris dolore affectis opem ferant. Ventris tineas pellunt, urinae ardoribus succurrunt. Bacca triginta, aut quadraginta ex iure carnum macerata, deuorataq; aluum commodissimè citant, sed pinguiore, crassioresque eligendæ sunt.

ZIZYPHA,



NOMINA.

167

ZIZYPHA, Græcis Ζίζυφα. Arabibus, *Hunen Zufalzes, siue Hanab.* Officinis *Iuinba.* Italis, *Giuggiole.* Germanis, *Rot Brustbeere.* Hispanis, *Azufecifa.* Gal-
lis, *Iuinbes.* Boemis, *Iuinba.*

ZIZYPHA.



FORMA.

Arbor est Zizyphus Pru- Matth.
no humilior, caudice con-
torto, cortice scabro, viti vi-
niferæ haud absimili, mate-
rie Oxiacanthæ proxima, ra-
dicibus firmis, ramis vbiq-
ue spinosis, è quibus quidâ pro-
cessus exeunt iunci modo
lenti, tenuesq; sparti modo,
spithama longiores, è qui-
bus vtrinque per intervalla
folia exeunt, impari tamen
exortu, oblonga, nō magna,
firma, vt in Clematide pri-
ma, & sensim per ambitum
ferrata. Flores edit pallidos,
& baccas Oliuarū instar pri-
mum virides, subinde palle-
scentes, & per maturitatem
rubentes, in quibus os con-
cluditur oliuæ simili pulpa
dulci, & gustui non ingrata.

LOCVS.

Seruntur in hortis, & viri Idem.
darijs.

QUALITATES.

In humiditate, & caliditate temperata sunt.

Matth.

VIRES.

Exiguum præbent alimentum, difficile concoquantur, & stomacho inuti- Gal. 2.
lia sunt. Conferunt pectoris, pulmonis, & lateris morbis, à caliditate genitis. de alim.
Medentur quoq; cum maxime renum, tum etiam vesicæ affectibus. facul.

L 4

ARBVTVS,

ARBUTVS, siue Vnedo, Græcis κόμας. Arabibus, *Hariladib*. Italis, *Albatro*. Hispanis, *Madronho*, & *Madromethro*. Gallis, *Arbousier*.

FORMA.

ARBUTVS.

Matth. Folia profert laurinis similia, breuiora tamen paulò, crassioraq; colore ex viridi pallescente, & in ambitu serrata, rubra per medium excurrente costa. Caudex cortice vestitur subrubro, haud crasso, aspero tamen, & squamoso, à quo rami prodeunt rubentiores. floret mensibus, Iulio, & Augusto, Floribus cædids, paruis, Lilij conuallij haud longè dissimilibus, racematim dependentibus, è quibus fructus gignuntur rotundi, Sorborum ferè magnitudine, qui primo exortu virent, deinde flauescunt, & per maturitatem rubent, aspero tactu, nullo intus ossiculo, fragorum modo, quorum etiam effigiem referunt. sapor his insipidus, simul & austerus, & vbi eduntur, linguam, & palatum stimulant, acetosa quadam substantia, quæ exterius conteguntur, integro anno maturescunt.



LOCVS.

Matth. Nasctur in collibus, & syluosis vallibus.

QUALITATES.

Gal. 7. simp. me. Arbor acerba vnà cum fructu est, qualitate: at fructus stomacho infensus est, & capiti dolorem infert. Adstringit, roborat, & inspissat.

DIOSC.

VIRE.

Matth. Arboris folia expetuntur Coriarijs ad spissanda coria: Non desunt, qui foliorum stillatitia aqua vtantur aduersus pestem, eam in principio dantes cum puluere ossis ceruini cordis, magno (vt ipsi dicunt) auxilio. In summa vbi adstringere, & roborare opus est, Arbutus eximiè præstat.

AMYGDA-

AMYGDALA, vel Amygdalus arbor, Fructus, Amygdala vel Amygdalum.
Græcis, Ἀμυγδαλή & Ἀμυγδαλός. Ἰδὲ δένδρον, ἀμυγδαλή, vel ἀμυγδαλή, vel ἀμυγδα-
λον, ὁ γαρσός. Arabibus, lauz. kauz. siue Lauzi. Italis, Mandorle. Germanis, ar-
bor, Mandelbaum, Fructus, Mandelkern. Hispanis, Almendras. Gallis, A-
mandes.

AMYGDALAE.



V I R E S.

Amaræ illæ vitia cutis in facie corrigunt. Eædem fronti admotæ, aut temporibus cum DIOSC.
aceto, aut rosaceo, capitis dolorem mulcent. Siliuntur ad vlcera putrescentia, serpentiaque,
& cum melle ad canum etiam motus. Deuoratæ ventriculi dolores sanant, aluum emol-
liunt, somnum faciunt, & urinam cient: dantur ad renum morbos, & ad pulmonum affectus,
cum resina terebinthina. Præstant ad coli inflationes, & præcipue oleum ex ijs expressum.
Quinis septenisve præsumptis, ebrietatem non sentiunt potatores. A vulpibus deuoratæ eas
interficiunt, quin etiam & gallinæ. Gummi datur vtiliter sanguinem reiicientibus. Impeti-
gines ex aceto illitum tollit, tussi vetustæ cum diluto vino potum medetur, calculosis verò
cum passo. Dulces impingunt, lateris dolores, ac tussim sedant, & præsertim earum cremor, Matth.
Oleum ab ijs expressum mulcet intrinsecos dolores omnes intestinorum præsertim, vteri, ac
renum, si calidum sex unciarum pondere bibatur, est enim certum auxilium.

L 3

PISTA-

GENERA.

Aliæ dulces, aliæ amaræ, a- Matth.
liæ maiores, aliæ minores.

FORMA.

Arbor est vtrique spectata Matth.
percitatis, caudice crasso, cor-
tice aspero, radicem habet vt
plurimum vnicam robustam,
grandem, altè descendentem.
Folia Persico per omnia simi-
lia, ac etiâ flores, nisi dilutiori
esset colore. Nuces edit cordis
figura, quæ antea quam obdu-
rescant, integræ cum putami-
ne comeduntur: duplici con-
teguntur putamine, quemad-
modum iuglandes.

LOCVS.

Tractu gaudent calidiore, Idem.
quo fit, vt in Apulia, & Sicilia
copiosissimè proueniant.

QUALITATES.

Dulces nihil prorsus adstri- Gal. li. 6.
ctoriæ facultatis habent, sola simp. me.
enim extenuandi, atq; abster- 2. de
gendi facultate pollent, & mo- ali. fac.
deratè calidæ sunt. Amaræ o-
mninò extenuandi, & calefa-
ciendi, & abstergerendi faculta-
tem possident. Gummi excal-
facit, & adstringit.

PISTACIA, siue Pistacea. Græcis *πιστία*. Arabibus, *Pustech*, siue *Festuch*. Officinis, & Barbaris *Fistici*. Italis, *Pistacchi*. Germanis, *Welsch Pimpernistlein*. Hispanis, *Allocigo*. Gallis, *Pistaches*.

PISTACEA.

FORMA.

Matth.

Tota arbor Terebintho similis est, folijs colore ex viridi in luteum inclinante: nuces racematim prodeunt in ramorum extremitatibus, rubra exterius tunica, & odorata, nuce intus alba, vnguentariae glandifacæ simili. Internus nucleus cuticula contegitur rufa, atqui medulla virescit, sapore pineæ nuci proximo, sed odoratiore ac gratiore.

LOCVS.

Idem.

In Persia, Arabia, & Syria vnde in Italiam quoq; aduecta sunt, copiosa proueniunt.

QUALITATES.

Gal. & Auic.

Excalfaciunt, & humectant, impinguant, roborant, aperiant, non tamen valde nutriunt.



VIRES.

Matth. Idem.

Stomacho amica sunt deuorata, aut ex vino pota. Profunt contra serpentium morsus. Venerem excitant, tabidos, & suppuratos iuuant. Iocinoris obstructions aperiant.

STAPHILO-

STAPHILODENDRON. Italis, *Pistaci Saluatici*. Gallis, *Pistaches sauvages*. Germanis, *Wild Pimpernusslein*.

STAPHILODENDRON, SIVE
PISTACIA AGRESTIA.

FORMA.



Humilis Staphilodendron *Matth.*
est planta, folio Sambuci, materie admodū imbecilli. Floribus albicantibus, racematim dependentibus, quemadmodum & fructus, qui quibusdam in folliculis prouenit, colore subrufo, Ciceris ferè effigie, sed maior, in quo subuirens nucleus concluditur, sapore dulci, sed nauseam commouens.

LOCVS.

Prouenit in Syluis, & fructus *Idem.* teris.

QUALITATES,
ET VIRES.

Neminem habeo, qui de *Idem.* horum viribus, & facultatibus scripserit: verū cum nauseam moueant, si copiosè edantur, vomitiones eadem mouere posse non dubitamus.

Nvx

Nvx Juglans, Græcis *χάρα βασιλινγ*. Arabibus, *tebuz leuz*, *sue Gianezi*. Italis, *Noci*. Germ. *Nuß* & *Welschnuß*. Hisp. *Noeses*. Gallis, *Noix*.

F O R M A.

NVX IVGLANS

Matth.

Caudice assurgit procero, ac crasso, ramis multis, ingentibus, & longè, lateq; diffusis, libro vestitur cinereo, crasso, ac rimoso. Radicibus nititur prælongis robustisq; frondibus pluribus vtrinque ab vno pediculo exeuntibus, ut in fraxino oblongis, & graviter olentibus. Primo germinatu paniculas quasdam edit, quæ breui flavescentes decidunt, quas nuces sequuntur, duplici obductæ monumento, nempe calloso primum calyce, mox ligneo putamine, crispo intus nucleo, quadripartitoq; callosa intercedente membrana. Leguntur nuces inchoante Autumno, perticis excussæ, & siccantur in umbra.

L O C V S.

Idem.

Proueniunt ubiq; in campis, & collibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7.

Folia, & germina adstrictio simp. me. nem quandam possident, cæ-

Item 2. de terum euidentem, multamq;

alim. fac. in nucis putamine recenti pariter, ac sicco. Recentes nuces neq; adstringentis qualitatibus, neque oleosæ conspicuè sunt participes. Nuclei inueterati verò oleosi sunt, & tenues.

V I R E S.

Diosc.

Deuoratæ ægrè concoquuntur, ideoq; stomacho inutiles sunt, biliosæ, & capitis dolores inferentes, & tussientibus inimicæ. Cum ruta verò, & caricis præsumptæ à ieiunis, venenis resistunt, nec minus si à veneni haustu comedantur largius deuoratæ tineas latas pellunt. Illinuntur vtiliter mammarum inflammationibus, cum mellis exiguo, & ruta, cum calyce suo perustæ, tum deuoratæ, tum umbilico admotæ, tormina sedant. Nuclei vsti alopecij impositi præferti sunt remedio, recentes stomacho innocentiores sunt, & illitæ liuores auferunt. Panniculæ siccæ, & in puluerem contritæ ex vino albo potæ vteri præfocationibus auxiliantur.

Matth.

Nvx



Nux Indica. Italis, Noce d'India. Mauritanis, Neregin, Dabig, seu Giaux. Ialend.
Italis, Noce de India. Germanis, Indianisch Nuß. Hispanis, Noiez de las India.

NUX INDICA.

FORMA.



Arbor Palmæ faciem ex-
plicat. Fructus tamē edit præ-
grandes, magnorum Melo-
peponum instat. Nang; ma-
gna inuolucrorū mole obte-
guntur, colore subrufescēte,
tenax, callosusque, ex villosa
tamen materie constans: quæ
manibus extrita, in capilla-
menta fatiscit. Hoc sub inuo-
lucro nux occultatur. puta-
mine plerunq; triquetro, vil-
loso atq; barbato. Cornu in-
stat præduro, anteriori parte
humanam fere faciem refe-
rente, nucleo intus oui anse-
rini magnitudine, inani, sub-
stantia pingui, duriuscula ta-
men, alba, callosaque, sapore
butyroso, tenui subasperaq;
cuticula obrecto.

LOCVS.

Prouenit hæc arbor copio-
sa in India Orientali, vnde ad
nos affertur. Idem.

QUALITATES.

Nuces exsiccant, & hy-
meant ordine primo: emolliunt, læuigant, & dolores sedant. Idem.

VIRE S.

Additur nucleus à tenui cuticula repurgatus, in medicamentis, quibus ex-
renuata corpora refocillantur. Idem genituram auget, & venerem allicit. O-
leum, quod ex ijs exprimitur, vtiliter inungitur ad hæmorrhoidarum dolores,
quin etiam lumborum, genuumq; cruciatus mulcet. Præstat idem, ad neruo-
rum dolores, & ad pectoris asperitates, non modo illitum, sed etiam delinctū.
Raucedini opitulatur, macie affectos impingat, & induratos articulos emol-
lit. Quodd autem latiore lagina corpora reficiat: Idcirco maximè expetitur à
strigolis mulieribus. Idem.

Nux

Nux Myristica, Græcis, *Μοσχάριον, μοσχασίδιον, νύξιον μυριστινόν, ἢ νύξιον ἀρωμα-
πικόν*. Arabibus, *Ienzbaue Iusbague, siue Glauziban*. Italis, *Noci Moscade*. Ger-
manis, *Muscatenuss*. Hispanis, *Nuez de especie*. Gallis, *Nois Muscades*.

FORMA.

MYRISTICÆ NUCES.

Matth. Arbor, quæ Myristicas pro-
fert nuces, nostratib⁹ Persicis
haud absimilis est, angustiori-
bus tñ folijs, ac brevioribus.
Fructu nostratibus nucib⁹ in
arbore existentib⁹ persimiles
sunt. Primò .n. crasso ac viridi
cortice cōteguntur: cui dein-
de subest nux ipsa duro satis
putamine oclusa, nostrate ta-
men tenuiore, quam macis
(quem vocant) reticuli instar
ambit: putamine autē fracto,
nux myristica inuenitur, quā
vulgus medicorū Muscatam
vocant. Id quod palam faciūt
nuces integræ, quæ ex India
melle asseruatæ ad nos cōue-
hūtur. Ceterū arbores absq;
omni cultu fructus edūt sup-
peditante tantum natura.

LOCVS.

Matth. Afferuntur ex India, ex insu-
la præsertim nomine Badam.

QUALITATES.

Auicenn. Exalfaciunt, & siccant or-
Serapio. dine secundo completo, quin
etiam adstringunt.

VIREs.

Matth. Commansæ oris suauitatem commendant, & fœtentis animæ viri abolent.
Lentigines in facie emendant. Visum acuunt, ventriculum corroborant. Lie-
nem absumunt, vrinam cient, fluētē aluum sistunt, flatu discutiunt, & frigi-
dis quibuscunq; vteri affectibus mirificè profunt. E recentibus prius cōtulis,
& in cacabo calefactis, prelo exprimitur liquor, qui refrigeratus, ceræ instar cō-
crescit, fragrantissimum spirans odorem, & nervorum, & articulorum diutur-
nis doloribus, à frigore excitatis vtilissimus. Idem expetitur Veneris vnctio-
nibus. Mulcet mirificè nux ventriculi dolores, à flatu genitos, & contra vene-
nolorum animalium ictum ex vino pota maximè præstat.

Latinis,



Latinis, Nux Metella; Recentioribus Stramonium. Græcis nostris, *παρονόκη-
λος*, aut *εαυονέκηλος*. Arabibus, *Leuzalrachaba*. Italis, *Noce Metella*, *Para-
coculi*. Germ. *Stechpffel*, *Derrenpffel*. Gallis, *Pomme de Peru*.

NVX METELLA.



FORMA.

Solanis eius planta adeò si. *Serap.*
milis est, ut aliud nihil quàm *Auicenn.*
ipsum representet: verum *Matth.*
eius folia opiū redolent. Flo-
res gerit albos, conuoluti
maioris, siue leuis similis æ-
mulos. Fructus Mespilorum
magnitudine, circumquaq;
aculeatus umbilicatusq; vi-
ridi colore, in quo semen,
Mandragoræ simile.

LOCVS.

Seritur nūc passim in hor- *Matth.*
tis, ut alia peregrina.

QUALITATES.

Frigida est excessu quarto, *Serap.*
obstruit, mulcet, vomitio-
nes ciet.

VIRES.

Pota quatuor granorum *Serap.*
pōdere cum vino fortē fa- *Auicenn.*
cit ebrietatem, duorum verò drachmarum pondere hausta, statim interimit,
nisi succurratur epoto butyro calido, vomitu, & aquæ calidæ balneis cum
brachijs, tum cruribus adhibitis.

*NVCII

* Nyci Metellæ congener planta, Tatulæ, vel Datura, Germanis, *Yggelöl* ben/*Stachelnuss*. Hispanis, *Burladora*. In Malabar, *Vumata Caya*. In Canara, *Datiro*. Arab. *Marana*. Persis & Turcis, *Datula*.

FORMA.

TATVLA.

Caule assurgit crasso ramo-
so ultra humanâ altitudinem,
quam tamē excedit ramorum
ambit^o, folijs amplis Stramo-
niæ similibus maioribus ta-
men, & in longiores acutio-
resq; angulos desinente am-
bitu, odore opio aliquantum
similia, admodum abominan-
do. Flos in extremis ramis
prouenit vt in Stramonio, cui
subnascitur fructus oblon-
gus aculeis horridus, in quo
semina ante maturitatem cā-
didissima, postea penitus atra
efficiuntur.

LOCVS.

Nascitur in Malauar, sed
apud nos in hortis colitur.

QUALITATES.

Frigida est excessu tertio &
sicca secundi fine, & pernicio-
sa qualitate non caret.

VIREs.

Semen dimidiæ drachmæ pondere qui hauserit, diu mente alienatus rema-
net. Si quantitas fuerit nimia, interimit. Gentiles ad prouocandas vrinas cum
pipere & folijs Betele id exhibent & perutile esse dicunt. Sed nolim experiri
cum alia medicamenta ad eam rem vtilia non desint. Semine per noctem in
aceto macerato, deinde exacte trito, vtiliter illinuntur herpes miliares &
erysipelata serpentina, nam breui sanantur. Radix verò drachmæ vnus ponde-
re ex vino pota somnum profundum inducit, in quo varia insomnia & miræ
rerum facies obuerfantur.*

NYCES



Nuces Auellana, seu Pontica, seu Prænestina. Græcis, Κάρα, ποντική, λεπτο-
χέια. Italis, Nocciuole, auellane, & nocelle. Germanis, Haselnuß. Hispanis,
Auellanas. Gallis, Noifilles, Noilertes, Auellaines.

NUCES AVELLANÆ.

GENERA.

Domestica, & Sylvestria. *Matth.*

Caterum ex domesticis, alie oblongæ, alie rotundæ sunt, veruntamen oblongas præstātiores, & gustui gratiores esse cōstat, & illas præsertim, quæ rufæ sunt putamine, & fractu minime contumaces.

FORMA.

Arbor est, quæ rarò proce-
ra spectatur, sed quæ ab ipsis
statim radicibus fruticosa sit.
Arborefcit tamen ramis in
summitate frōdosis, folijs alni
latioribus, crispiorib. tenuio-
ribusque, & ambitu ferratis.
Cortice vestit tenui, & enodi
materie: floret hæc arbor nū-
quam, sed iulos emittit autu-
mno longi piperis figura, quo
tēpore folia decidunt. Nuces
eduntur æstate, quorum puta-
men viridi callosaq; vestitur
membrana, molli, & quæ in
barbæ modū simbriata prætra-
hitur. Quanquam id nō in o-
mnib. fiat. Nuci nucleus, quā-
doq; albus, quandoq; purpu-
reo vestitus membrana, dulcis, ferè Amygdalarum modo, sed duriore pulpa.

LOCVS.

Domestica habentur in hortis, vineis, & viridarijs. Sylvestres verò ubiq; p-*Idem.*
ueniunt in syluis, & secus itinera.

QUALITATES.

Plus habent essentiaë terrestris, ac frigidæ quā iuglandes, quin & plus alunt, *Gal. 2.*
siquidem densiores sunt, & minus pingues. *alim. fac.*

VIRES.

Stomacho infestæ sunt, medentur tussis veteri, si trita in aqua mulsa sumantur. Tosta & *Galen.*
cum exiguo piperis potæ, destillationes concoquunt. Crematarum cinis cum axungia, aut
visi adipe illitus alopecij capillum reddit. Deuorata minus Amygdalis alunt, cibis in ven-
triculo superatant, & caput tentant, sed virides innocentiores sunt. *DIOSC.*

M

AVELLA-



MORVS, Arbor, Græcis, *Μορῆα*, ἢ *συρῆα*. Arabibus, *Tut*, *sive Thut*. Italis, *Moro*. Germ. *Maulbeerbaum*. Hisp. *Moras*, *del Moral*. Gallis, *Maurier*.

MORVS.

GENERA.

Duum est generum, album *Matth.* videlicet, & nigrum, à fructu appellationem sortitum.

FORMA.

Nigra Morus caudice plurimū est cōtorto, gibberoq; ac nodoso. Ramos edit crassos, in latum spatiantes, libro vestitur crasso, lento ac flexili, cui materies subest robusta, & medullitus flava. Radicibus nititur numerosis, magnis, ac robustis, non tamē altē descendētib; Nigræ folia latiora, crassioraq; sunt, & ambabus in acutum desinentia, & circumquaq; serrata. Nigra fructum fert Rubi, grandiorē tamē, oblongioremq; Sanguineo succo per maturitatem madentem. In alba: utem, bacca minores habetur, quæ vbi ultimā sensere maturitatis coctionē, melleā prorsus dulcedinem recipiunt.

LOCVS.

Alba vbiq; scatur Italia, ac *Idem.* ē in Hispania ad alēdos sericeos

Bombyces, tantum sata, Nigra verò etiam vbiq; habetur, aut in hortis aut in viridarijs.

QUALITATES.

Immatura Mora vbi auerint admodum ventrem restringunt. Maturorum succus adstringit modico: immatura verò, & tota arbor admixtam qualitatem habent, ex restringente, *Gal. li. 8.* & purgante compositam, in radicis autem cortice purgatoria cum quadam amantudine exuperat qualitas. *simp. me. & 2. de ali. fac.*

VIRES.

Mori succus decoctus in aereo vase atque insolatus adstringentior redditur. Idem facit ad fluxiones, & tonsillarum, vnaq; inflammationes, addito mellis exiguo, immatura, siccaque coeliacos iuvant, & dysentericos. Radicis cortex decoctus in aqua, & potus aluum resoluit, latus ventris tinea excutit, & his quoq; auxiliatur, qui aconitum biberunt. Succus foliorum potus valet contra Phalangiorum ictus, feruefacti corticis, & foliorum iure dentes apertissime in dolore colluntur. Succus ex incisa radice emanans, vbi concreuerit, in dolore denium efficax est, tubercula discutit, & aluum purgat. *Diosc.*

M 2

SYCOMO-



SYCOMORVS, Celso Morolycos. Aegyptijs, Ficus Pharaonis. Græcis, Συκό-
μορος, & Συκόμορος, vel Μορόσυκος. Arabibus, Mumeiz, & Iumeiz, Aliumeiz,
& Giumeizi. Italis, Sicomoro, & Fico d' Egitto.

SYCOMORVS.

FORMA.

Diosc. Arbor est magna Fico simi-
Theoph. lis, frondosa, multo lacte abun-
dans, folijs mori. Fructū ter,
aut quater anno fert, non ra-
mis, vt ficus, sed caudice ipso
caprifico nō dissimili, dulcio-
rem grossis, sine granis inte-
rioribus, qui non maturescit,
nisi prius vngue, aut ferro scal-
patur. Decerptis fructibus, a-
lij ac alij ex eodem loco sub-
nascuntur, terno ita, & qua-
terno partu copiosa.

LOCVS.

Diosc. Nascitur plurimum in Ca-
ria, Rhodo, Syria, & Aegypto. 3

QUALITATES.

Galen. Succus è vulnerato cortice
manans, conglutinat, discut-
tit, emollit.

VIRE.

Diosc. Fructus aluo utilis, sed perexiguū præbet alimentum, & stomacho ad-
uersatur.

PSEUDO-



PSEVDOSYCOMORVS. Italis, *Sicomoro falso*. Mauritanis, *Azadaracht*.

PSEVDOSYCOMORVS.

FORMA.

Arbor est procera. Folijs *Matth.* vulgaris lorilongioribus, & in acutum definitibus. Bac- cas edit virides, è quorum of- sibus Monachi verticillos pa- rant, quibus funiculo traie- ctis, suas numerant preces.

LOCVS.

Nusquam in Italia (quod *Matth.* sciuerim nouerimque) hac planta sponte nascitur. Ha- betur tamen aliunde allata, in Cœnobiorum claustris, remplorum arcis, & alijs in locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Deleteria facultatis parti- *Anicen.* ceps est, sed quid præter id præstare valeat ignoratur.

CENSURA.

Ridiculum est credere vnà cum vulgo, hanc plantam esse sycomorum.

M 3

FIGVS,



FICVS, Græcis, *ῥιγ.* Arabibus, *Sin Fin, seu Tin.* Italis, *Fichi.* Germanis, *Feygen.* Hispanis, *Igos.* Gallis, *Figues.*

GENERA.

Matth. Varia sunt genera sunt, cum facie tum colore diuersa.

FORMA.

Idem. Arbor caudice plurimum est breui, contortoque, subalbicate libro, lacteoque succo madente, gustu ad stringenti, acamaro, adeo vt exulcerare possit, materies illi alba, & fungosa, tenaxq; Radicibus nititur multis, sed summa tellure vagantibus. Folia illi sunt aspera, ampla, firma, viridinea, rotundis ac robustis pediculis nitentia. Fructus edit nullis apparentibus floribus, à foliorum exortu, extremis tantum ramis, turbinatos, & varios, siquidem alij pyri facie repræsentant, alij sessiles sunt inter hos medij. Differunt et colore, quippe quoddam alia albe, alia nigrae, alia purpureae, alia virides, alia subruffae, alia pallide, & alia variegato colore spectentur. Molli præterea sunt pulpa, granis minutis referta, & esui gratissima.

LOCVS.

Idem. Habentur in hortis, vineis & viridarijs, in Italia, & Hispania copiose.

QUALITATES.

Gal. 2. de alim. fac. Commeabiles sunt, & facile in totum corpus penetrant, nam abstergerendi vi pollent haud obscura, flatuosa tamen sunt aliquatenus.

Diosc. Arida verò vim habent excoalsciendi ordine primo completo, aut secundo incipiente. Habent & partium tenuitatem quandam. Pinguiores magis concoquantur, gustu verò aciores, magis extergunt ac discutiunt. Arbor tenuium est partium. Lac & foliorum succus valenter calidus est, coagulat, exulcerat, aperit, soluit.

VIRE.

Diosc. Maturi Fici aluum solvunt, sed facile sistitur fluxio, cæterisq; autumnalibus fructibus, sunt innocentiores, situm sedant, caloremq; restringunt. Sicciores vires alunt. Gutturis, renibus, vesicæ, Suspiriosis, Hydropicis, & comitialibus aptissimi sunt. Thoracem purgant. Earundè decoctum cum Hyssopo tussis veteri, diurnisq; pulmonum vitij conuenit. Cum Cnici pulpa tusa, & deuorata alui emolli. Idem arteriæ, & tonsillarum inflammationibus, vtiliter gargarizatur. Costæ, illitæq; duritias discutiunt. Crematæ, & cerato addito perniones sanant. Lacteus fici succus, lac in ventriculo concretum dissoluit, exulceratq; Potus menstrua ciet, & infusus vermiculosos aures sanat. Percussis à Scorpione, venenatorum ictibus, & rabiosi canis moribus auxiliatur. Causis dentium inditus dolorem tollit. Verrucas aufert circumlitus. Lac dum coquitur, si fuligineo ramo assidue moueatur, aluum soluit.

FICVS



Ficus Indica, Opuntia. Italicè, Fico d'India. Germ. Indianische Feigen.

INDICA FICVS.

FORMA.



Arboris faciem repræsen-
tat, quamquam sine caudice,
sine ramis, germinibusq; cõ-
ster, vt ex appicta hic imagine
quispiam cernere potest. Si
quidem hæc absciso vno tan-
tum folio, humiq; ad mediũ
vsque sepulto, prognatis ex se
radicibus, paulò post folia su-
perne ex ipso prodeunt, adeò
vt hac serie folijs è folijs pro-
deuntibus in arboris speciem
assurgat. Folia ei crassissima
sunt, ita vt quandoque polli-
cis crassitudinem æquent, è
quibus tenues, longæ, acutæ-
que prominent spinæ, etsi si-
ne spinis etiam habeantur. Pa-
rit hæc in foliorum summita-
tibus, fructus pulpa, & sapore
ficubus nostratibus similes,
sed crassiores, & qui superio-
re parte in coronæ speciem
desinant. Colore ex viridi
purpurascente.

LOCVS.

Peregrina in Europa est arbor, & in Italia à multis, in hortis colitur.

Idem.

QUALITATES, ET VIRES.

De viribus, & qualitatibus, quid veri, certi q; afferam, sanè non habeo: refe-
runt tamen, qui Orientales Indias sunt peruagati, eorum esu cruentam reddi
urinam, non sine sumentium terrore, qui horum vires ignorant.

M 4

IBERIS,

IBERIS, Græcis, Ἰβέρη, ῥαβδα, μαλὰν, & ἀγριοῦ ῥαβδίου. Arabibus, Seit aragi, Aseit aragi, Scitharegi, siue Hausab. Italis, Iberide, seu Lepidio. Germanis, Wilder Kress. Hispanis, Nasturtio montefino. Gallis, Chasserage, & Passerage sauvage, siue Nasturti sauvage.

IBERIS.

F O R M A.

DIOSC. Folia habet Nasturtij, Caulis cubitalem, ramosum, florem lacteum, semen Thlaspi simile, sapore acri, grauique odore.

L O C U S.

Damocr. Nasctur secus itinera, in ruderibus, templorum arcibus, & in agrorum incultis extremitatibus.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit ordine quarto, nasturtij modo, minus tamen eo desiccatur.

V I R E S.

Galen. Radix contusa, cum salsa axungia, horis quaternis ad-
Diosc. alligata, Ischiadicis mirum in modum medetur.

C E N S V R A.

Hallucinantur qui Iberidem & Lepidium duas contendunt esse plantas.



Libri primi Finis.

TRIT-

TRITICVM, Græcis *τροῖς*. Aphris, *Henta*, *Henea*, siue *Hantha*. Italis, *Grano*, siue *Fornento*. Germanis, *Weissen*. Hispanis, *Trigo*. Gallis, *Fourment*.

TRITICVM.

GENERA.

Plura notantur genera, cum *Matth.* à locis, tum à colore, viribus, maturitate, prouentu, & spicarum numero, forma ac magnitudine denominata.

FORMA.

Triticum omne radicibus *Theoph.* numerosis, ac pretenuibus *li. 8. ca. 4.* titur: folio singulari, germinibus omnino multis, sed quæ in ramos brachiarum non possint. Tota hyeme herbaceum est: remollito autem cælo, cauliculis de medio assurgit, cuius tertio, aut quarto geniculo spica geritur, non prius euidens, quam folliculo inclusa. consumato eo, flos erumpit quarto, aut quinto post die, ac totidè ferè diebus perdurat, & post florè granum crassescit, quod ubi maturuerit, demetitur.

LOCVS.

Seritur ubiq; locorum. Locis *Matth.* autè maritimis, & tractu am-

niore, calidioreque frugalius, ac copiosius prouenit.

QUALITATES.

Excalfacit foris impositum, non tamen refrigerat, nec desiccatur, manifestè. *Gal. li. 8.* habet etiam quiddam glutinosum, & obstruens. Fermentum autem excalfacit, & trahit. *simp. me.*

VIRES.

Tritici farina illinitur ex hyoscyami succo ad neruorum fluxiones, & contra *Diosc.* interaneorum inflationes. Furfures ex aceto decocti turgentes mammas resoluunt: viperarum moribus, & torminosis auxiliantur. Tritici pollen, si ex hydrelæ decoquatur, omnem discutit inflammationem. Glutinum ex similagine, & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinè excreantibus prodest, si frequenter delingatur. Panis è similagine confectus plus alit, quàm cibarius. Comendatur *Matth.* tritici oleum ad vlcera sinus, ad manuum, pedumq; rimas, atq; ad cutim læuigandam: Paratur compressis granis inter calefactas igni ferri laminas.

M s

FRVMEN-

FRUMENTVM Indicum. Indis *Maitz*. Italis, *Grano*, *sive formento Indiano*. Germanis, *Türckisch Korn*. Boemis, *Turecken Zizto*.

FRUMENTVM INDICVM.

G E N E R A.

Matth. Quatuor est generum, quę tantum granorū colore differunt. Est enim q̃ nigrū, quod rufum, quod album, quodq; fulvum semen proferat.

F O R M A.

Matth. Caule exit arundinaceo, quemadmodū & folio, crasso, rotundo, procero, geniculato, alba intus medulla, in cui⁹ cacumine paniculę funduntur diuulsę, superuacue, nullis intus granis. Fructum edit folliculo membranaceo inclusum ē medio calamo ex latere prodeuntē, cuius spica piceę arboris conum cum crassitudine, tum lōgitudine æquat, circa quam omnino nuda coaceruantur grana penitissime sese stipantia, læuia, & subrotunda, pisi magnitudine, alba intus substantia. Radicibus nititur numerosis, durisque.

L O C V S.

Idem. Seritur in campis, & agris, stercoreato solo.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Nostrate tritico paulō calidius est, ac glutinosius.

V I R E S.

Matth. Farina vtiliter miscetur cataplasmati, quę pus mouent. Id quod etiam valentius præstat fermentum ex eadem farina paratum. Ex ea quoq; rura alpinis tractibus pultem, quam suo idiomate vocant Polenta, conficiunt, & addito butyro, & caseo avidissime vorant. Est enim cibus non insuavis, sed crassum præbet alimentum.

FRUMEN-



FRUMENTVM Saracenicum. Italis, *Formentone*, & *Saracino*. Germanis, *Heidenform*. Boemis, *Pohanka*.

FRUMENTVM SARACENICVM.



FORMA.

Folijs provenit primo statim exortu subrotundis, quæ paulò post hederaceâ formam concipiunt: acutiora tamen sunt, & molliora. caulem edit rubentē, inanem, fragilem, bicubitalē, & sæpe maiorem, foliosumq; flores candidos, paruos, racemosos, è quibus semē oritur triquetrum, pullo colore, sed alba intus medulla.

LOCVS.

Seritur passim in aruis, perinde ac alia frumentacca, bisq; in anno feri potest: nempe vere, & post messem. Itaq; bifenum est.

QUALITATES.

Calfacit, & humectat, verum non multum à temperatis distat.

VIRES.

Farina ex lacte decocta præstat illita ad biliosas inflammationes. Rura, non solùm ex ea panes pinunt, sed pulcem quoq; conficiunt, quam polentam vocant, quæ non ingratus est cibus, vbi recte fiat, & caseo & butyro aspergatur. Præstans quoq; exutis granorum putaminibus, è granis parant, & ex carniū iure decoquunt ad esum.

CENSURA.

Proculdubio falluntur, qui Saracenicum frumentum, ocymum, quod pauli genus est, esse statuunt.

HORDEVM,

HORDEVUM, Græcis *ἄριθος*, & *ἄρις*. Arabibus, *Xabaen*, *sive shaix*. Italis, *Orzo*. Germanis, *Gersten*. Hispanis, *Cenada*. Gallis, *Orge*.

H O R D E V M.

G E N E R A.

Theoph. Varia sunt hordei genera:
lib. 8. cap. aliud enim binis versibus, ali-
4. de his. ud ternis, quaternisve, cumq;
plant. plurimum senis: est enim vel
eiusmodi quoddam genus.

F O R M A.

Matth. Folio exit tritici latiore, a-
superiorq; quin etiam culmo
fragiliore, sed octonis articu-
lis geniculato, simplici stipu-
la, folioque, & eo quidem sca-
bro, ac tritici latiore. Grana
simplici amiciuntur tunica,
quæ tamen solidè inhæreat.
è cuius cacumine aristæ pro-
deunt firmiores, longiores,
mordaciorésq; quàm in triti-
co. Nititur fibrata radice.

L O C V S.

Idem. Seritur in agris, perinde ac
trititum.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 7. Exiccat, & refrigerat ordi-
simp. me. ne primo, pauxillumq; abster-
git, & paulò plus deficcet, quã
farina fabacea, cui non insint cortices, cætera verò similia sunt, foris vrentibus.

V I R E S.

Diosc. Minus quàm trititum alit. Præstana verò præstat contra acrimonias, & gut-
turis scabritias, & exulcerationes. Eadem cum fœniculi semine cocta lactis v-
bertatem facit: & tumores concoquit. Farina cum ficu, ex mulsâ decocta col-
lectiones, & duritias discutit: cum meliloro autem, & papaveris calyce, lateris
dolores finit. Hordeaceus panis ventriculum grauat, & frigidos, lentosq; suc-
Matth. cos gignit. Præstana febricitantibus, & pleureticis commodissimè datur: quin
etiam tabidis, & hæctica, aut marasmo laborantibus, & præsertim addito semi-
nis melopeponis, cucurbitæ, cucumeris & papaveris cremore, Hordeū, quod
non diu fuerit elixum, inflat, & ventriculo nocet.

Z E A,



ZEA, Græcis *Zea*, ἡ *Zea*. Arabibus, *Hais*. Italis, *Spelta*, *Biada*, & *Pirra*. Germanis, *Spelsh* / *S. Peterstorn* / *Kintorn* / *sive Dincelstorn*. Hispa. *Spelta*. Gallis, *Espeautre*.

Z E A.

G E N E R A.

Duum est generum, vna *Diosc.* simplex, altera in geminis putaminibus grana bina iuncta gerit. & ob id dicoccos appellata.

F O R M A.

Folio provenit tritico haud *Matth.* ab simile, tenuiore tamē culmo firmioreq; verum spica à tritico differt, quod plana sit, granis tantum vtrinq; è lateribus simplicibus versibus, prodeuntibus: aristis longis, ac tenuibus. Dicoccos grandiore firmioreque culmo, & spica maiore provenit.

L O C U S.

Seritur vbique locorum in *Idem.* agris, cæterorum frumentaceorum modo.

Q U A L I T A T E S.

Vniuersa sua facultate quo- *Gal. l. 6.* dammodo in medio est tritici- *simp. me.* ci, & hordei, itaq; ex illis cognoscatur.

V I R E S.

Valentius alit quàm hordeum. Digeritur in panificia, sed minus quam triticum nutrit. Leues efficit panes, concoctu faciles, haud ingrati gustus. Ex Dicocco paratur Halica, quæ plus alit, quàm *Oryza*: aluumq; magis cohibet: stomacho longè vtilior. Decocta in aceto, ac illita lepras tollit, vnguium scabrities extricat: incipientibus agilopijs medetur. Infunditur vtiliter decoctum dysentericis, quos excruciat dolor.

C E N S V R A.

Non recte sentiunt qui Halicam, & Far adorem vnam, & eandem esse rem existimant.

S E G A L E,



SECALE, siue Farrago. Italis, *segala*. Germanis, *Rott*. Hispanis, *Centeno blanco*. Gallis, *Seigle blanche*. Boemis, *Zito*.

SECALE.

FORMA.

Matth. Folio prouenit tritici angustiore: stipula tenuiore, sed firmiore, ac proceriore, spica pendente, aristis infirmioribus, sed fecundis granis. diu floret, adeo, ut quadragesimo tantum die à flore mature-scat.

LOCVS.

Seritur alpinis tractibus.

QUALITATES.

Matth. Refrigerat & humectat ordine primo: emollit, abstersione non vacans, & pus mouet.

VIRES.

Plin. li. 18. cap. 16. Sordidos efficit panes, agrestibus hominibus idoneos, amarulentos, ac lentos, atq; facile permeabiles: minus alit quam triticum, & hordeum.

Matth. Decocta integra ab equis deuorata, tineas eorum pellit. Fatina additur in cataplasmatibus, quæ puri mouendo parantur. Idonea eadem est ad glutinum librarium parandum. est enim cæteris tenacius: cul-torum cinis aqua subactus, & illitus, pedum, manuumq; rimas sanat.

CENSURA.

Cæcutiunt qui Secalem olyram esse putant, & pariter hallucinantur, qui Secalem cum Siligine confundunt.

AVENA.



NOMINA.

191

AVENA, Græcis, *Ἀvena*. Arabibus, *Cartamum*, *sive Churtal*. Italis, *Vena*, *sive Gena*. Germanis, *Habern*. Hispanis, *Auena*, *sive Auca*. Gallis, *Avoine*.

AVENA.



FORMA.

Folio, & stipula non admo- *Diosc.*
dum à tritico diffat: Spica illi
denuisa, folliculis veluti par-
vis locustis bipedibus depen-
dentibus, in quibus granum
includitur oblongum atque
subalbicans.

LOCVS.

Seritur in campis. gaudet- *Mattb.*
que frigido tractui.

QUALITATES.

Similem hordeo vim ha- *Gal. li. 6.*
bet. Illa enim desiccatur, & *simp. me.*
digerit mediocriter, & sine
morsu. temperiem autem ha-
bet paulò frigidiorē, & non
nihil quoque adstringit.

VIREs.

Avena in cibis aluum sistit, *Diosc.*
& eius pulve rufientes iuuan-
tur. Eadem cum putamine *Mattb.*

caesata, & in sacculis adhibita flatuosos dolores tollit. utilis quoque ad alen-
dos equos, ac etiam homines. Nam putamine exuta, vescitur à Germanis, ex
iure carniū decocta. Sic enim parata cibus fit haud ingratus, & præsertim
ubi estur antequam dissiliat.

ORYZA.

ORYZA, Græcis, ὄρυζα, & Theop. ὄρυζον. Arabibus, *Arz*, seu *Arzi*. Italis, *Riso*. Germanis, *Weiß*. Hispanis, *Arroz*. Gallis, *Riz*.

FORMA.

Matth. Folio prouenit arundinaceo, carnosio, porraceo haud absimili: culmo cubito maiori, geniculato, triticeo crassiore, ac robustiore, in cuius cacumine spica geritur in ramulos diuisa, in qua semen vtrinq; impari exortu conspicitur: putamine subflauo, aspero, striatoque. quo exuto candidum remanet granum.

LOCVS.

Idem. Gaudet locis vliginosis, ac palustribus. verum copiosissima prouenit in Asia, Syria, & Ægypto. Seritur & in Italia.

QUALITATES.

Gal. li. 3. Habet adstrictorium quippiam, ac etiam siccandi, resoluentiq; potestatem.

VIRES.

Diosc. Oriza in cibis mediocriter alit, sed aluum cohibet. *Matth.* Ex lacte decocta, aut amygdalarum dulcium cremore, aut ex pinguium carniū iure, cibus fit haud ingratus.

Quin etiam concoctu faciliior, & ori gravior. Datur in cibis vtiliter dysentericis, cœliacis, & diarrhæa laborantibus: præsertim vbi prius torrefacta, in lacte, in quo igniti calculi extincti fuerint, decoquatur. farina bellè quidem admiscetur cataplasmatibus repellentibus. Eadem mammarum incipientes inflammationes arcer: cum rosæ & anthemide decocta & illita.

MILIVM,



MILIVM, Græcis, Κέϋρος. Arabibus, Ieuers, Geguers, siue Giaures. Italis, Miglio, siue Meglio. Germanis, Hirß. Hispanis, Millo, & Miyo. Gallis, Mil, siue Miller.

MILIVM.

FORMA.



Milium folia profert arum *Matth.* dinacea, panico haud longè dissimilia, calamus bicubitalem, crassum, geniculatum, lanuginosumque. radicem multiplicem, ac duram, paniculis diuulsis, & cacumine dependentibus, in quibus numerosa habentur grana, parua, subrotunda, solida, laeuiuscula, ac tenui putamine obducta.

Locys.

Scitur in agris, pingui, & *Matth.* stercoreto solo.

QUALITATES.

Refrigerat ordine primo, *Gal. 7.* & siccatur tertio exoluto, aut *simp. me.* certe secundo intenso: paululum etiam habet tenuitatis. comestum minimum confert nutrimenti, & ventrem desiccatur.

VIRES.

Milium & eius panis minus cæteris frugibus alit. Eius pulve sistitur aluus si *Diosc.* deuoretur, & promouetur vrina. fit ex eo fomentum optimum ad siccandum citra morsum, ubi prius calefactum cum sacculis adhibeatur. Fitq; magis efficax auxilium admixtis sale, & anthemidis floribus: Siquidem rectè ad tormina adhibetur, quæ à flatu excitantur, & ad lateris dolores. Quæ in milij aceruo conduntur, diutius à carie, & putredine tuentur. imò & ipsæ carnes recentes in milio æstate reconditæ, à putredine vindicantur.

N MILIVM

MILIVM Indicum. *Hetruscis, Sagina. Longobardis, Melega. Venetis, Sorgo.*
Germanis, Weissher Hirs/ Sorgsame.

MILIVM INDICVM.

FORMA.

Marth.

Frugis est genus tam forma, quam proceritate arundinem referens. eius tamen calamus inanis non est, sed alba farctum medulla, sambuci modo: Paniculas in cacumine gerit magnas, crassasq; numerofo semine refertas, colore plurimum rubro: et si nigro quoq; & subalbicante.

LOCVS.

Idem.

Seritur in campis aratro cultis, ac stercoreatis.

QUALITATES.

Idem.

Refrigerat, siccatur, cohibet, & resoluit.

VIRES.

Marth.

Facultas ei haud milio dissimilis. Rura ex eius farina panes conficiunt, sed concoctu contumaces, & qui parum alant. Alium adstringit. Seritur in Hetruria solum ad alendas columbas, & gallinas. calamorum medullae cinis cum pipere, & spongiae vstae puluere, vitello oui assati excepta, propinatur vtiliter a coena septem diebus decrefcente Luna, ad gutturis strumas. Florum pulvisculus a paniculis excussus, ex vino rubro drachmae pondere potus, rubra foeminarum profluuia sistit, si è rubris paniculis deligatur. namque quod ex albis excutitur, alba profluuia cohibet. Datur pari iuuamento etiam dysentericis.



PANI-

NOMINA.

195

PANICVM, Græcis, *ταυρος*. Arabibus, *Dochon*. Italis, *Panico*. Germanis, *Se-
nich*/sue *Heydelsfenich*. Hispanis, *Panico*, sive *Paniso*. Gallis, *Pani*z.

PANICVM.

FORMA.

Folio, radice, culmoque *Matth.*
milio est per omnia simile:
Paniculis autē differt: Nam
in panico panicula prouenit
pedali longitudine, non ut in
milio diuisa, sed prædensis
compacta racemis, granis
numerosis, & hirsutis.

LOCVS.

Seritur in campis mense *Idem*.
maio, & quandoque statim
post messem.

QUALITATES.

Exiguum dat alimentum, *Gal. l. 6.*
exiccat, & adstringit, ut mili- *simp. me.*
um, ac etiam refrigerat.

VIRE.

Datur edendum dysente- *Matth.*
ricis & alijs alui fluxionibus *DIOSC.*
laborantibus. illinitur co-
limum.

Etum ubi siccare, & refrigerare sit opus. sed minus alit, & stringit, quam mi-
lium.

N 2 PANI-

PANICVM Sylvestre, Græcis, *ἐλνυμος ἀγριος*. Italis, *Panico saluatico*, sive *Panicastrella*.

PANICVM SYLVESTRE.

FORMA.

Matth. Sponte per se prouenit, gracili admodum culmo, geniculato tamen, cubitali longitudine. folijs longis, angustis, asperisque: paniculis paruis, longis, subrubentibus, ac adeo hirsutis, & asperis, ut vestibus pertinaciter inhæreant.

LOCVS.


Idem. Nascitur in hortis, & viridarijs: quin etiam in campis, & vineis.

QUALITATES.

Idem. Exiccatur, refrigeratur, adstringitur, magis quàm satium.

VIRE.

Idem. In ciborum usum non venit, eo tamen delectantur auiculae, quibus paniculae offeruntur. cætera cum panico satiuo communia habet.



SESA-

NOMINA.

197

SESAMVM, Græcis, *σισαμνον*. Arabibus, *Semsem*, *siue* *senferra*. Italica, *Sesamo*. In officinis vulgo, *Gingolena*.

SESAMVM.

FORMA.

Caule prouenit milio simili- *Theoph.*
le, crassiore tamen, ac proce- *lib. 8. cap.*
riore, folijs tubentibus, flore quod *pla.*
viridi, aut herbaceo, semine *hist.*
vasculis incluso papaueris
modo.

LOCVS.

Seritur in campis, quos ste-
riles reddit.

QUALITATES.

Non parum glutinosum *Gal. lib. 8.*
est, & pingue, quare emplasti- *sim. me.*
cum est, & emolliens, modi-
cè calidum. Eiusdem faculta-
tis est, quod ex eo conficitur
oleum.

VIRE.

Cibus inutile sesamum est, *dioco.*
& halitus grauitatem facit,
neruorum crassitiem illitu
discutit. medetur auribus fra-
dis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastæ moribus. facit &
ad capitis dolores æstu concitatos, ex rosaceo illitum. Eadem facit herba ex vi-
no decocta, quæ peculiariter oculorum inflammationibus, ac doloribus au-
xiliatur.

N 3

LOLI-



LOLIVM, Græcis, *ἀλκα*. Arabibus, *Seilen*, *sive Zened*. Italis, *Gioglio*, *sive Loglio*. Germanis, *Ewalch*, *Rüweissen*, *sive Eulch*. Hispanis, *Toio*. Gallis, *Turaye*.

LOLIVM.

FORMA.

Matth. Cum hyeme nascitur, folio est longo, pingui, hirsuto, adultum deinde culmum edit tritici graciliorem, in cuius cacumine spica exit longa, aculeatis siliquis, impari exortu vtrinque referta, è quibus grana terna quaternave cumulatum aperte prodeunt, contumaci obducta putamine. maturefcit vna cum tritico.

LOCVS.

Idem. Nascitur in arvis è tritico, hordeoq; corruptis vlgine seminibus, aut per hyemem imbre nimio madidis. Corripitur contra & ipsum, & in triticum conuertitur.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Excalfacit in principio tertij
simp. me. ordinis, & exiccat in fine secundij.
Matth. Item attenuat, resoluit, abstergit, inebriat, somnum mouet, & mentem tentat.




VIRES.

Diosc. Farina nomas, putrescentia vlcera, gangrenas compescit, cum raphanis, & sale illita. Ex aceto vero & sulphure viuo feros lichenes, & lepras sanat. Strumas quoq; discutit, cum fimo columbino, & Lini semine decoctum in vino. rumpitur, quæ agre ad coctionem perducuntur. Illinitur vtiliter Ischiadicis ex aqua mulsa decoctum. Si cum polenta, myrrha, & thure sufficitur, conceptionem adiuuat.

FOENVM

FOENVM GRÆCVM, Græcis, Τύλιν, & Βούκαρος. Arabib. Olba, Helbe, seu Hebbe. Italis, Fieno Greco. Germanis, Senigree, sine Bockshorn. Hispanis, Alformas, vel Alloluas. Gallis, Fenigree, seu Senegre.

FOENVM GRÆCVM.



FORMA.

Planta est trifolio similis, fo- *Matth.*
lijs per ambitū serratis, cauli-
bus exilibus, compluribusq;
Flores edit albicantes, è quib;
cornicula prodeunt incurua,
longa, acuminataq;, in quib;
semen gignitur subfuluum,
pingue, & graueolens. Ra-
dice nititur tenui, sed fibrosa.

LOCVS.

Seritur pingui solo Februa- *Idem.*
rio, & Martio calidiori tractu.

QUALITATES.

Excalfacit ordine secūdo, & *Gall. 8.*
siccatur primo. Digerit, resoluit, *simp. me.*
emollit, pellit, & abstergit. *Matth.*

VIRE.

Farina ex multa aqua deco- *DIOSC.*
ctā duos tumores digerit im-
posita, sed feruentibus inflam-
mationibus obest. Lienes ex-
tenuat cum aceto, & nitro il-
lita. Mucoso seminis decocto
iuuantur vteri præclusiones,
ac tumores, si in eo infideant
femina. Seminis mucago ca-
pillis, furfures, & manantia
capitis vlcera purgat, & mulie-

bres locos dilatat, & emollit, cum anserino adipe supposita. Decoctū eius pro-
dest ad tenasmos, & fetidam dysentericorum prolunem. Oleum, quod ex eo
exprimitur, & Myrto, capillos, & genitalium cicatrices absterget. Medetur vl- *Matth.*
cerose scabiei, si cum quarta parte seminis natureij excipiat aceto, & subin-
de illinatur. Farina ex multa vsurpatur vtiliter ad genitalium tumores. Eadem
cum sulphure, & nitro lentigines delet, quin etiam parotidas sanat. Podagram,
chiragram, & articulorū luxationes. Ex vino subacta, carcinomata purgat. Da-
tur vtiliter potandum fœnogræci decoctum ad diutinam tussim, & vbi pectus
fuerit exulceratum. Seminis mucago fronti ex lintheolis adhibitum, oculorum
fluxiones auertit. Decoctum verò eius ex aqua oculorum inflammationes ar- *Matth.*
cet instillatum.

LINVM, Græcis, *Alvor*. Arabibus, *BaZarichichen*, seu *BeZerchetan*. Italis, *Lino*. German. *Lein*/sive *Flachs*. Hispanis, *Lino*. Gallis, *Lin*.

FORMA.

Matth. Caulē edit sesquicubitalem, teretē, rectū, obsequiosum: folia oblōga, angusta, molliaq; ramulos promit in summitate ternos, quaternosve, in quib⁹ carulei emicant flores. semen edit in orbiculatis folliculis in acutū desinentibus, planum, lēue, cordis figura. Radice niti tur vnica, nō tamē sine fibris.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in campis, atrito, ac stercoreato solo.

QUALITATES.

Gal. 6. Excalfacit semē ordine primo, mediumq; est inter siccitatem & humiditatem. *Quin* etiam emollit, resoluit, concoquit, & abstergit.

VIREs.

Diosc. Seminis farina cū melle, oleo, & exigua aqua decocta, discutit, atq; emollit tam internas, quā externas inflammationes. Eadem cruda vitia cutis in facie, & varos tollit. Illita cum nitro, & siculneo cinere, parotidas, & duritias discutit. Ex vino decocta fauos,

& vlcera, quę serpunt expurgat. Scabros quoq; vngues eximit. cum pari nasturtio, & melle illita. Delineta cum melle pectoris vitia extrahit, & tussim lenit. Estur decoctum semen, melle, & pipere additis, ad excitandam venerem. Eiusdem decoctum infunditur ad interaneorum, & vteri erosiones: alui excrementa euocat, & est vtile admodum in deflectionibus quę ad vuluę inflammationes perantur. Oleum quod ē semine exprimitur valet ad neruorū conuulsiones: perutile quoq; est omnibus sedis affectibus, & ad emolliendos induratos feminarum locos. infunditur vtiliter coli dolore vexatis, daturq; magno auxilio, potandū pleuriticis, & nephriticis. Medetur ambustis, ex aqua rosarum potum, & illitum. Præstat quoq; ad Lucernarum vsum, quod diutius igni resistat: Expeditur pictoribus, lapicidis, lignarijs, camentarijs, & ferrarijs fabris.

Matth.

LINVM.



LINVM.

Lino.

LINUM Sylvestre, Græcis, Λινον ἄγριον. Italis, Lino saluatico.

LINUM SYLVESTRE.

FORMA.



Complures ab vna radice emittit *Matth.*
caules, graciles, teretes, rectos, ac fle-
xiles, folijs in caule vniuerso lini æmu-
lis, sed breuioribus, ac firmioribus.
Flores in cacumine exeunt pufillis è
ramulis, aurei, lini floribus facie haud
abfimiles.

LOCVS.

Nafeitur sponte in conuallibus in- *Idem.*
culto solo.

QUALITATES, ET
VIRE.

Herba ipsa vna cum floribus deco- *Matth.*
cta, & cum recenti butyro illita tumo-
res resoluit, & inflammationes lenit.
quin etiam induratos articulos emol-
lit, addita althææ radice, & gallinacæ
adipe.

CENSURA.

Linum sylvestre hanc plantam à no- *Matth.*
bis inuentam vocare libuit, non so-
lum, quòd linum facie referat, sed quod lini modo in stamina trahi possit.

N ,

* LINUM

stir-
enit.
Eius-
mèta
spa-
per-
ina-
po-
um,
Ex-

NVM

* LINYM Sylvestre caruleo flore.

LINYM SYLVESTRE.

F O R M A.

Linorum sylvestrium varietas ex alijs autoribus peti potest, est enim infinita fere. Nobis elegantiusculam hanc speciem addere libuit, caruleo flosculo Satiui æmulam, vti etiam folijs in tenuissimis virgulis sine ordine digestis, semen minus est, radix perennat.

L O C V S.

Oritur sponte circa Vienne, præsertim gramineis decliuis & iuxta vias.*



Gos

GOSSIPIVM, Græcis, *Εύλιν, λάρβαξ*, siue *παμπάξ*, siue *ἰεροπέρον*. Officinis, & Barbaris, *Cotum, Bambax*, seu *Bambasum*. Italis, *Bambagia*, siue *Cotone*. Germanis, *Baumwoll*. Gallis, *Coron*.

GOSSIPIVM.

F O R M A.

Planta est quæ Gossipium *Matth.* profert folijs vitigineis, floribus luteis, vmbilicotenus purpurascens: fructu exigui mali magnitudine, barbato, nucis ponticæ fere modo. is lanugine per quam alba refertus est, seminibus pipere maioribus, in quibus medulla est alba, ac pinguis. Planta seritur, adolescitque tribus, aut quatuor mensibus, ad arbusculæ proceritatem.

L O C V S.

Seritur in Creta, Cypro, & *Idem*. Sicilia insulis, quin etiam in Apulia, & alijs in Regionibus calidioribus.

Q U A L I T A T E S.

Lanugo exalfacit, & exic- *Idem*. cat, seminis verò medulla exalfacit, & humectat.

V I R E S.

Lanugo combusta mirum in modum sanguinem è vulneribus manantem *Idem*. sistit. eadem accensa, & naribus suffita, vteri strangulatus auertit. Seminis medulla ruffientibus, & ægrè spirantibus auxiliatur: genitale semen auget, & venere stimulat. Oleum è semine expressum lentigines, alphas, & carteras cutis infectiones in facie perunctum delet, & palpebrarum asperitates lenit.

C I C E R,



CICER. Græcis, *ἑρβιδος*. Arab. *Chemps*, *Hamos*, seu *Halhamos*. Italis, *Ceci*. Germ. *Richern*, *Richererbis*, *sive* *Zifererbis*. Hispanis, *Grauancos*. Gallis, *Cices*, *sive* *Chiches*.

GENERA.

CICER.

Matth. Satiuū est & Syluestre. Satiuū
Diosc. triū est generū, candidū co-
lumbinum vocatū. Rubeū
venereum dictū, & nigrū a-
rietinum appellatū.

FORMA.

Idem. Adolefcit cubitali altitudine, fo-
lijs oblongis, dēticulatis, subalbi-
cantibus, pilosis: caule lignofo, ra-
mis multis brachiato, florib⁹ sub-
purpureis ē quibus siliquę prode-
unt breues, turgentes, hirsutę, in
acutum tenuemq; mucronē desi-
nentes, in quibus ad summū
grana duo concluduntur.

LOCVS.

Idem. Seritur pingui solo vere appe-
tente, & maturefcit æstate.

TEMPVS.

Idem. Demetitū arefcētib⁹ sili-
quis, nam si citius extirpetur, se-
men rugosū euadit.

QUALITATES.

Gal. 6. Cicera calida sunt, & modicē hu-
simp. me. mida, atq; amaritudinis nō omni-

Matth. no expertia. Prouocant, abster-
gunt, aperiunt, attrahunt, discu-
tiunt, incidunt & flatūs excitant.

VIREs.

Diosc. Satiūm Cicer vrinā ciet, colorem commendat, menses, & partus pellit.
Lac auger cum eruo decoctū. illinitur vtiliter ad testium tumores, verrucosās
formicas, scabiem, vlcera capitis manantia, & impetigines. Item cum melle ad
carcinomata, & contumacia vlcera, addita hordeacea farina. Arietinum autem
præter hæc præstat peculiariter cū rore marino ad hydropem, & regium mor-
bum, epoto eius decocto. Lēdunt Cicera exulceratā vesicam, & renes, attamen
Matth. calculū frāgunt. Venerē stimulant & geniturā augēt. Farina ex Intubi stillaticia
aqua decocta, & illita locinoris tumores resoluit, & serpētū morib⁹ medetur.

CENSURA.

Errant maximē Germani, qui pisorum ius potandum exhibēt ad abstergen-
dum ventriculum, sibi persuadentes pisum columbinum esse cicer.

CICER



CICER Sylvestre, Græcis, *ῥεβιδος ἄγρος*. Italis, *Ceci saluaticchi*.

CICER SYLVESTRE.

FORMA.

Satio ciceri simillimum *Matth.* habetur, sed folia denticulata non sunt, & siliquæ minores rotundioresque spectantur. Est planta in vniuersum hirsutior, atque asperior.

LOCVS.

Nascitur sponte in agris, *Matth.* & locis incultis.

QUALITATES.

Excalfacit & siccatur, & cum *Matth.* plus amaritudinis habeat, magis quàm satium abstergit, & aperit.

VIRE.

Ventrem subducit, sed flatulentus, & intestinorum dolores gignit. *Plin.*

FABA,



FABA, Græcis, *Κάβος*. Arabibus, *Hachille*, *Haballe*, *sive Bachale*. Italis, *Fava*. Germanis, *Bonen*. Hispanis, *Hauas*. Gallis, *Fave*.

GENERA.

Matth. Plura fabarum exstant genera, forma, colore, & magnitudine differētia. Alię enim magnę sunt, alię parvę, alię subrotundę, alię compressę, & alię quidē colore albicante, alię subrutilo, & alię subnigro.

FORMA.

Idem. Fabarum planta caule exit quadrangulo, obliquo, inani fragiliq; geniculis intersecto. alis etiam multis, ē quibus flores complures ex vno pediculo racematim prodeunt. non vtrinq; quidem, sed vno tantum latere seriatim appensi, versicolores, hirti, ac cristati. Exeunt ē cauli rami, in quibus folia habētur pingua, vtrinq; quaterna. E ramulculorum cuminumibus claviculę prodeunt prætenues, ac singulares, quę facillē perduntur. Siliquas edit ceteris leguminibus maiores, carnosioresq; , in quib; fabę cōcluduntur. Vnica nitit radice paucis adnatis fibris.

LOCVS.

Matth. Seruntur in agris cæterorum leguminum modo.

QUALITATES.

Gal. l. 7. In exiccando, & refrigerando secundum vtrunq; ad medium temperamentum propinquissimē accedunt adstringunt, discutunt, desiccant, abstergunt, impingunt, sed flatus gignunt.

VIREs.

Diosc. Ex posca decocta datur vtiliter deuoranda dysentericis, & cæliaciis. Lomentū eius tum per se, tum cum farina hordeacea illitum, vulnerum inflammationes mitigat, cicatrices concolorēs facit, turgentes lacte mammas iuuat, & ab inflammatione vindicat: Lac extinguit, furunculos, sugillata, parotidasq; cum sœnogræci farina, & melle discutit: cum rosīs autem, thure, & oui candido, procidentes oculos, tumores, vuasq; reprimat. Subactum verò cum vino oculorum suffusiones, & ictus recreat. Manducata faba, & fronti illita fluxiones auerit. Fabarum putamine illiti, capillis, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, & minus nutrimenti capeffunt. Fabalium caulium & siliquarum cinis cum vetere axungia illitus, præstat ad coxendices, & veterem nervorum dolorem.

FABA



FABA Sylvestris. Græcis, *κύβητος ἀγρικός*. Italis, *faba saluatica*.

FABA SYLVESTRIS.

FORMA.

Caules edit quadrangulos *Matth.*
humi repentes, ac sese inui-
cem implicant: folijs dome-
sticæ fabæ similibus: floribus-
que in purpura albicantibus,
e quibus filiquæ prodeunt,
lupinorum modo pressæ, sed
fabarum longè minores. In
quibus semen continetur ro-
tundum, fabaceo sapore.

Locys:

Prouenit sponte in Apulia, *Idem.*
campestribus locis.

FACULTATES, ET
VIRES.

Sunt qui dicant hanc eas. *Idem.*
dem cum domestica habere
vires.

CENSURA.

Etsi non desint qui hanc
plantam Aracum domesticum faciant, nos tamen sylvestrem fabam eandem
esse censemus.

ARA-



inquit.
gnunt.

um per
ncolo-
furun-
thure,
no ocu-
barum
iment
ad co-

FABA

ARACVS, Græcis, ἀρακος. Italis, Araco.

ARACVS.

FORMA.

Matth. Aracus humi repit, caule anguloso, flexili, lubaspero, cicercula haud absumile. folia illi sunt oblonga, caulem inferne ambientia, quæ summo cacumine clauiculas tenues fundunt: flores edit non magnos erui fere modo, è quibus filiquæ oriuntur pisi minores, in quibus semen est asperum, rotundum, pullo colore.

LOCVS.

Idem. Nascitur inter segetes, campetribus locis.

FACULTATES, ET
VIRES.

Idem. Abstergit, resoluit, desiccatur, & expurgat.



FABA

FABA Ægyptia, siue Colocasia, Græcis, Κλάμα ἀγυῖας. Italis, Fava d' Egitto.
Hispanis, Hana de Egipto. Gallis, Fave d' Egipte.

FABA ÆGYPTIA.

F O R M A.

Folia edit ampla instarga Diosc.
leri: caulem cubito longio-
rem digiti crassitudine: florem
roseum, dupla papaveris am-
plitudine, è quo folliculus pro-
dit oblongus, vesparum fauis
similis, in quo faba supra oper-
culum bullantis ampullæ mo-
do prominent. Radice nititur
arundinacea, grandi, Coloca-
sia peculiariter appellata.

L O C U S.

Prouenit in Ægypto, Asia, Diosc.
& Cilicia, in Lacubus, & palu-
dibus, seritur humenti glebæ
mandata, & ita in aquam de-
missa.

Q U A L I T A T E S.

Sicuti nostratem fabam ma- Gal. lib. 1.
gnitudine præcellit, ita & na- de alim.
turam humidior, magisq; facul.
excrementitiam sortita est.

V I R E S.

Manditur virens cruda, pariter & cocta: adstringendi facultatem obtinet, Diosc.
itaq; dysentericis, & celiacis prodest, insparso polentæ vice Lomento. Corti-
ces in mulso vino decocti, si terni inde multi cyathi bibantur, magis proficient.
Quod in fabarum medio viride spectatur gustu amarum, facit ad aurium dolo-
res, si tritum cum rosaceo instilletur.

* Pinimus, hodierno die Ægyptijs dictam Colocasiam, quam peritissimi
quiq; negant ferre eiusmodi flores, quales Autor suæ tribuit, & nos parua ima-
gine representatos adieccimus.*

O

L E N S,

ABA

LENS, Græcis, *Φακός*. Arabibus, *Hades*. Italis, *Lente*, & *Lenticobia*. Germanis, *Ensien*. Hispanis, *Lenteyas*. Gallis, *Lentille*.

LENS.

G E N E R A.

Math. Duum est generū. Album, quod altero minus est, & in cibis gratius. Cinereo colore alterum, orbe paulo maiore.

F O R M A.

Idem. Maior folio exit vicia, minore, flore haud longè absimili, in purpura candicante. Siliqua parua compressa, molliorq; in latitudinem fusa in qua semina terna, aut quaterna concluduntur, rotunda pressa, tenui putamine connecta.

L O C V S.

Idem. Seritur vbique in campis, cum cæteris leguminibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 8. In caliditate, & humiditate medium tenet, desiccatur tamen ordine secundo, valenter quoque adstringit. Ipsum itaq; eius corpus desiccatur, & sistit ventrem, decoctum vero prouocat. Inflat, lenit, glutinat, extinguit, purgat, discutit.

V I R E S.

Diosc. Cum cortice cocta, & deuorata aluum sistit: contraverò ius primum prouocat. Dantur vtiliter triginta grana delibrata ad ventriculi subuersiones: cum farina hordeacea decocta, & illita, podagras lenit. Sinus cum melle glutinat, erustas rumpit, vlcera purgat. Decocta in aceto duritias, & strumas discutit: Cum cotoneo malo, aut meliloto medetur oculorum inflammationibus. & addita maris aqua, valet ad nomas, quæ in gangrenas euaserunt. Cocta in aqua maris, & illita, lac in mammis concretum dissoluit. Frequenter in cibo sumpta oculorum aciem obtundit, ægrè concoquitur. Stomachum lædit, eumq; & intestina inflat. Somnia tumultuosa excitat, estq; capiti, neruis, & pulmōni inutilis.

* L E N S



NOMINA.

211

*LENS Minor. Græcis φακὸς ἡ φακὶς ἡ ἀρτίου. Germ. Klein Linsen.

LENS MINOR.



FORMA.

Strigosior est in totum quam maior, & tenuioribus exit cauliculis, durioribus & obliquis foliolis, angustioribusque & minoribus. flores exigui simpliciter albi, siliquæ minores minora semina habentes.

LOCVS.

Seritur & hæc in campis, utraq; solum amat tenue, cæliq; temperiem siccam.

QUALITATES.

Huc refer quæ de priore scribunt autores.

VIRES.

Equipollent & hæ præcedentis facultatibus.*

O 2

PHA-

PHASIOLI, Græcis, Φασόλοι. Italis, Fagioli. Hispanis, Fafelos. Gallis, Fafolis.
PHASIOLI.

GENERA.

Matth. Diuersa, variaq; sunt Phasiorum genera, varijs colorib; distincta. Nam candidi, rubescentes, melini, nigri, ac diuersi resperfi maculis reperiuntur.

FORMA ALBORVM.

Matth. Albi, & magis vulgares, qui in campis feruntur, sine pedamento per se reguntur, in latum sese pandentes, folijs hederaceis, latioribus tamen, & mollioribus, ternis ex uno pediculo prodeuntib; flore candido, pisi minore. & quibus cornicula prodeunt incurua, spithamę longitudine, in acutum desinentia, quę per maturitatem albescunt. In his femina plura cōcluduntur quadrupe dum renibus similia, alba, vmbilico excepto, qui tantum in ijs nigricat.

LOCVS.

Matth. Seruntur in agris, mēse Maio, & quandoq; post mellesem.

QUALITATES.

Simeon Sethi. Excalfaciunt, & humectant ordine primo. Atqui fului, flauī & rubri, albis calidiores sunt.

Gal. 4.

simp. me.

cap. 23.

Matth.

VIREs. In cibis sumpti inflant, & ventriculo laborem faciunt, semen tamen generant, & venerem sollicitant, & præsertim si cum longo pipere, galanga, & saccharo aspergantur. Id autem valentius præstant, si ex lacte bubulo coquantur, quousq; rumpantur. Redduntur in cibo innocentiores, si cum sinapi, aut cari semine edantur. Tumultuosa præterea, ac terrifica somnia representant, cornicula dum viridia sunt & tenera, elixantur, & cum pipere in acetijs, eduntur. Phasioli masticati, & illiti sanant equorum morsus. Adduntur etiam in fucis, quibus mulieres faciem concinnant.

PISVM,



NOMINA.

213

PISVM, Græcis, Πισυόν. Italis, Pisello, & Biso. Germanis. Erbisz.

PISVM.

GENERA.

Duum est generum, Alte- Matth.
rum maius, alterū minus; Ma-
ius pedamento gaudet, minus
humi accumbit.

FORMA MAIORIS.

Maius caulibus exit fistulo- Idem.
sis, ramosisq; clauiculis mul-
tis ē ramorum summitatibus
prodeuntibus, folijs nume-
rosis, longiusculis, subpingui-
busq; Siliquis cylindraceis,
rotundo, & candido semine
se se intus stipante albi cice-
ris maiore. Flores edit papi-
lionis animalis figura, umbi-
licotenus purpureos, & quā-
doq; in vniuersum candidos.
Radice est imbecilli.

LOCVS.

Facilem & solutam terram Columel.
desiderat, & in apricis seri. lib. 2.

QUALITATES.

Exiccant, & refrigerant fa- Gal. 1. de
tergendi facultatem non habent. fac. alim.

VIRES.

Vbi faba nō sit ad manus, pisum eius poterit esse succedaneum, praterquam
ijs in morbis, qui absterfione opus habent.

CENSURA.

Qui scribunt Pisorum iure hausto purgari puerperas, auriginosos sanari, &
aqua intereunte laborantes iuuari, proculdubio decipiuntur, quod hanc haud-
quaquam prastare possit medicamentū, quod refrigeret & siccet. cicera enim,
quæ pisa ij esse credunt, non ipsa pisa, id prastare possunt.

O 3

PISVM



asfolia.



E

is, albis

gene-
& fac-
antur,
ut cari-
, cor-
antur.
fucis,

svm,

Pisvminus, Græcis, Πισδν μινερ. Italis, Pisello minore. Gallis, Poix.

PISVM MINVS.

GENERA.

Matth. Dum est generū, album,
& subnigrum, quod Eruli-
am vocant.

FORMA.

Idem. Maiori per omnia simile,
sed minora & graciliora illi
sunt omnia, humiq; accum-
bit.

LOCVS.


Idem. Seritur, vt maius, aprico
loco, solo probe culto, ac so-
luto.

QUALITATES.

Idem. In qualitatibus omnibus
nihil prorsus a maiori differt.

VIRES.

Idem. Vires eadem minori in-
sunt, quæ maiori inesse dixi-
mus.



ERVVM.

ERVVM, Græcis, *Ορβαν*. Arabibus, *Herbum, Keisene, sive Kersene*. Officinis, *Orobis*. Italis, *Eruo, sive Mocha*.

ERVVM.



GENERA.

Duum est generū, Candidū, *Diosc.* & Rufum: *Gal.* quoq; tertium addidit nempe pallidum, inter prædicta medium.

FORMA.

Planta est sarmētoſa, folio- *Matth.* ſaq; humi procūbens, ramis ſeſe implicantibus, folijs parvis, longiuſculis, lente minoribus. flores edit paruos, ſubpurpureos, & quandoq; candidos, ſiliquam piſi breuiorem, gracilioremq; in qua rotundum concluditur ſemen, conclaſa inter granum & granum ſiliqua.

LOCVS.

Nāſcitur ſponte in aruiſ, & ſeritur quoq;.

QUALITATES.

Calſcit ordine primo, & *Gal. 3.* ſiccāt ſecundo intenſo: quate *ſimp. me.* nus autem amaritudinis eſt particeps, eatenus incidit, extergit, atq; obſtructiones aperit. Itē impinguat, vrinam ciēt, adēd vt quandoq; ſanguinem cum vrina trahat, quin

VIREs.

etiam emolliendi vim habet. Farina vlcera cum melle purgat, Lentigines, & vitia cutis in facie, & maculas *Diosc.* in toto corpore affricta delet. Nomas, & gangrenas diutius ſerpere nō patitur. Mammariū durities emollit, carbunculos rumpit, atra vlcera emarginat, cum vino ſubaſta, & ſilita, viperarum, & canum morſibus medetur. vrinæ difficultates, atq; etiā tenaſmos ex aceto mitigat. Melle excepta, ac delincta, craſſa pul- *Matth.* monum excrementa eiicit. Eruum a ieiuniis deuoratorum lienem minuit, inguinum bubones reſoluit ex melle illitum. Virentes ſiliq; cum ſuo caule, folijsq; contrita, illitaq; capillos denigrant. Farina vipereis paſtillis additur. Damnat autem Eruum in cibis ſumptum.

CENSURA.

Aſtipulandum haud ijs eſt, qui Eruiliam Piſi genū, Eruum eſſe contendunt.

LUPINVS, Græcis, *ῥαῖς*. Arabibus, *Tarinus*, *Arinus*, seu *Tormus*. Italis, *Lupino*. Germanis, *Wickbonen* / *Seigbonen*. Hispanis, *Entramuces*, sue *Entramucos*. Gal-
lis, *Lupins*.

FORMA.

Matth. Vnico exit caule, haud in-
firmo, folio septifariam dissec-
to, piloso, molli, subalbican-
te, flore candido, siliquis faba-
ceis, compressis; albicantibus,
per ambitum crenatis, in qui-
bus quina, senave continen-
tur grana membranis distin-
cta, orbiculata, alba, pressa,
umbilicata, & insigniter ama-
ra. Radice nititur subflauo-
scente, ac diuaticata.

LOCVS.

Idem. Seritur in agris, sterili solo:
nā ipse solum sibi impinguat.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, & siccit mani-
festè, abstergit, aperit, dige-
rit, resoluit, & attenuat.

VIRE.

Diosc. Farina ex melle sumpta, ven-
Matth. tris animalia pellit. Idem præ-
stat ventri illita. Præstat hoc

idem eorundem decoctum cum ruta, & melle potum. Idem Lienosos iuuat,
quin etiam vlcera tetra, gangrenas, pustularū eruptiones, vlcera in capite ma-
nantia, vitiligines, maculasque fotu sanat: menses, & partus extrahit in vellere
subditum cum myrrha, & melle. Eorum farina cutem, & liuores abstergit: in-
flammationes quoq; cum hordeacea farina, & aqua mitigat: coxendicum cru-
ciatus ex aceto lenit. Cocta in aceto, & illita strumas dissipat, & catunculos
rumpit. Lupini in caelesti aqua decocti, quousq; lentescant in pultem, faciem
abstergunt. Radicis decoctum ex aqua, vrinam eiet. Ij vbi macerati dulcescere
cœperint, cum aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi auaritatem faciunt.

*LUPIN-



*LUPINVS sylvestris, Græcis, *ἄγριος ἕρως*. Germanis, *Wildt Fenchbonen*/Türk-
elischer *Beetel*. Posteriore tamen vocabulo eum dignantur qui florem luteum
profert.

LUPINVS SYLVESTRIS.

GENERA.

Lupini sylvestres aliquot à
se inuicem differentias habe-
re obseruatur, inter quæ præ-
cipuæ duæ.

FORMA.

Prior luteo flore copioso,
pulchro, suaueolente spicato
insignis est, violam luteam o-
dore & colore prope æmulas.
folia & caulis domestico simi-
lia sunt, siliquæ minores, du-
riores, hirsutiores, semina in-
cludentes minora, sapore a-
maris. multis maculis varie-
gata. Alter altius excrescit, &
ramosior fit, folijs tamen an-
gustioribus, & minorib. flos-
culis è caruleo purpurascen-
tibus aut subrubentib. prædi-
tus est: fructus minuti, colore
sordido, vario, & nonnihil li-
uente aspersi sunt.

LOCVS.

Oriuntur plerisque locis sponte, sed nobis non nisi sati proueniunt.

FACULTATES.

Amaritudine superant satiuos, vt Galenus inquit, ideoque præpollent in e-
iusdem cum ipsis generis facultatibus.*

O 5 RAPVM,



RAPVVM, Græcis, ραπβαν. Arabibus, Selien, Selgem, Selgrem, siue Alsegrem. Italis, Rapo, & Raio, Germanis, Rüben. Hispanis, Nabo. Gallis, Raue.

G E N E R A.

Matth. Trium est generum, sessile, longum, rotundum.

F O R M A.

Idem. Rapum aded omnibus vulgare habetur, vt superuacaneū sit eius formam describere.

L O C V S.

Idem. Seritur in campis, citoque prouenit, nam post messem factum, vbi seges prius fuerat, alpinis tractibus tribus mēsis perficitur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. Radix exalfacit & humectat. Semen verò calidum est, & siccum: cum autem sit etiam amarum, abstergit, aperit, digerit, prouocat, flatu gignit, & venerem excitat.

V I R E S.

Diosc. Radix elixa ex iure carniū alit, sed flatu gignit, humentem ac mollem carnem creat. Venerem stimulat, & præsertim cum longo pipere deuorata: forum rapi decoctum podagricos, & perniones iuuat. Si excauatæ radici cera vna cum rosaceo adigatur, & feruenti sub cinere coquatur, auxilium non infimum erit ad exulceratos perniones. Cymæ prius elixæ, deuorata, urinā cient. Semen potum venenis aduersatur: quare in antidotis additur. Constat experimento, valere ad variolas & morbillos, nam potum semidrachmæ pondere morbillos latentes ad cutim expellit.

RAPVVM



calis.

N O M I N A.

219

R A P V M L O N G V M.



Forma tantum ab altero
differt. Cætera verò nihil dif-
fident.

R A P V M

car-
otum
cum
erit
apo-
o, va-
os la-
pvm

RAPVM sylvestre, Græcis, γογγύλη ἀγρία. Italis, Rapo saluatico.

RAPVM SYLVESTRE.

F O R M A.

Matth.

Prouenit sylvestre rapum folijs, caule, floribus, siliculis, & semine domestico non ab similibus, sed omnia agrestiora, asperiora, hirsutioraque spectantur. Radicem habet raphani modo longam, crassamq; sed sapore domestici rapi, præditam, acriore tamen & amariore.

L O C V S.

Idem.

Nascitur in agrorum marginibus, & iuxta semitas.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Radix, quòd acrior, amariorque sit, excalfacit ordine secundo, & siccatur in principio primi. Atqui semē id longē valentius præstat: præterea abstergit, incidit, aperit, attenuat, & prouocat, magis quàm domestici.

V I R E S.

Idem.

Semen in farinam tritum, lentigines, & alphas exterit: potum ventris animalia pellit, & vrinam ciet.

A P P E N D I X.

Tametsi scimus hanc plantam non esse Dioscoridis sylvestre rapum, cū tamē notis omnib; rapum referat, nobis sylvestre rapum ipsam appellare libuit.

RAPVNCV-



RAPUNCVLVS, Italis, *Raponzolo*. Germanis, *Rapungel*.

RAPUNCVLVS.

FORMA.



Planta est cubitalis, caulibus pluribus ab vna radice prodeuntibus, in cacumine ramosis. Folia profert anteaquam caulem edat, oblonga, humi accubantia, sed quæ in caule sunt, angustiora & longiora habentur. Flores fert in ramusculorum cacuminibus ceruleos. Semen concluditur simplici calyculo nigrum, ac minutum. Radice nititur longiuscula, crassiuscula, & media sui parte extuberante, alba, fragili, terrena, & subdulci sapore prædita. *Matth.*

LOCVS.

Nascitur in aruis non cultis, in collibus aruænis, & in pratis. *Idem.*

QUALITATES.

In caliditate & frigiditate radix non longè abest à temperatis, imo nec in alijs qualitibus. *Matth.*

VIREs.

Estur cruda radix, ac pariter cocta in acetarijs, quod maximè gustui placeat, & appetentiam exciter. Creditur quod radix elixa, & cum longo pipere deuorata, lactis vbertatem in nutricibus faciat.

CENSURA.

Non rectè sentiunt, qui putant Rapunculum, Rapum esse sylvestre Dioscoridis: Horum enim sententiæ repugnat Theophrastus lib. 7. c. 6. de plantarum hist. quippe qui sylvestre rapum radice constare longa raphani modo, breuiq; caule consistere scribit.

RAPVS,

NAPVS, Græcis, *Bouvidas*. Italis, *Nauone*, & *Nagone*. Germanis, *Eretreiben*. Hispanis, *Nabicas*. Gallis, *Nauet*.

GENERA.

Matth. Plura Theophrasto & Plinio habentur genera. Verum nobis duo tantum feruntur, nempe album, & subflauum.

FORMA.

Idem. Folijs atq; radice, raphano similis est, caule verò, florib⁹, & semine rapum æmulatur.

LOCVS.

Idem. Seruntur napi in campis, raporum modo, & in hortis.

QUALITATES.

Idem. Radix excalfacit ordine secundo, & humectat primo incipiente: atqui semē excalfacit & siccac, abstergit, aperit, digerit, prouocat, & incidit.

VIRE.

Diosc. Cocta radix inflat, modicum alit. Semen potum venenorum vires hebetat, quare antidotis miscetur. Necat idem interaneorum vermes ex limonum, aut Citriorum succo potum: ex adianti autem decocto sumptum morbillos, & exanthemata ad cutim propellit, & morbi malignitatem superat. Datur vtiliter cochlearis mensura; addita Lini feminis drachma ad ciendam vrinam. Ventriculi cruditates vomitione extrahit ex oxymelite, & repēti aqua sumptum. Datur quoque diebus pluribus quotidie drachmæ pondere ex marrubij stillatitia aqua, aut decocto, vtiliter potandum regio morbo laborantibus. Semen, tusum pressumq; copiosum remittit oleum, ad omnia vtile, ad quæ semen.

RAPHA-



NOMINA.

223

RAPHANVS, Græcis, Ραφάνιον, & Ράφανος. Lat. Raphanus, & Radix. Arab. Fugel, siue Fegiel. Italis, Rafano, & radice. Germanis, Rettiſch. Hispanis, Rauano, & Rauanillo. Gallis, Ressort.

RAPHANVS.



GENERA.

Duum est generum. Sati-
um & syluestre, quod Ar-
moraciam Latini vocauerunt.

FORMA.

Folia fert napo similia, aspera, atq; hirsuta: caulis illi-
teres, flos alb^{us}, silique tumē-
tes, ac mucronata, semine
int^{us} rotundo, rufo, acuto sapo-
re. Radice nititur varia: non-
nullis. n. inest longa, alba, te-
res, tenera, fragilis, nec ad-
modū acris. Aliquibus crassa
napi figura, altera longē du-
rior & acrior. Differt quoq;
colore: namq; alba & nigra
vbique; fere habetur, non solū
satiua, sed agrestis quoque.

LOCVS.

Satius feritur in hortis,
& agris. Agrestis sponte pro-
uenit in campetribus in a-
gro Romano.

QUALITATES.

Radix excalfacit excessu tertio,
& exiccat secundo, sed in vtroque
agrestis efficacior. Semen autem
longē efficacius est. Quin etiam
digerit, aperit, prouocat, incidit,
extenuat, rarefacit.

VIREs.

Radix vrinam ciet. Decocta contra veterem tussim, & pituitę crassitiem in pectore efficac-
est, lieno sis vtilis, fuggillata cum melle delet: auxiliatur cōtra viperarū ictus. Alopecias ad pi-
lum reducit. Lentigines cum loliacea farina emendat: valet aduersus fungorum venenū quo-
quo modo sumpta: menses ciet. Recens minutim incisa, & ex albo meraco, & butyro in sarta-
gine calefacta, pubique admota, remoratam vrinam pellit. Idem præstat eius succus duarum
vnciarum pondere ex vino Cretico haustus. Corticis vncia cum mercurialis tantundem croci
granis quatuor. Casia odorata drachma. Et duabus succi fabinae: omnibus rarissimo linteolo
exceptis, & subpositis, subuenit præsentanco auxilio egrę parturientibus. Radicis succus cum
oleo amarum amygdalarum & vini albi nonnihil feruefactus, addito colocynthidis momen-
to, aurium sonitus curat.

CENSURA.

Errant profectō qui raphanum rusticum, de quo statim dicitur, Armoraciam faciunt.

RAPHANVS.

RAPHANVS longus. Italis, Radice longa.

FORMA.

Radicis forma tantum ab altero raphano differt, quæ in hac longa, tenera spectatur, in altera dura solidaque habetur, ac magis quoque acris.

QUALITATES,
ET VIRES.

Cum sit altera mitior: mitiores quoque vires possidet.

RAPHANVS LONGVS.



RAPHA-

RAPHANVS Rusticanus montanus, Græcis, ἀργυράκη. Italis, Rafano, & Ra-
uano. Germanis, Rren. Gallis, Rafan, siue Ressorf sauuage.

RAPHANVS RVSTICANVS.

FORMA.

Folijsprouenit Hippolapa- Matth.
thi proximis, radice longa, pol-
licis crassitudine, ac etiam cras-
siore, acerrimo gustu, sinapi
haud absimili: floribus in cau-
lium summitatibus albis, & pu-
sillis.

LOCVS.

Nascitur sponte in pratis, vi Idem.
ridarijs, & secus itinera.

QUALITATES.

Radix excalfacit, & siccatur
ordine tertio complero. Ape-
rit, pellit, incidit, prouocat, at-
tenuat, & abstergit.

VIRES.


Ea omnia potest, quæ dome- Idem.
stica, & agrestis radix, sed va-
lentius operatur. Quinetiam
sinapivires obtinet, vrinam, &
arenam valentius pellit. Illini-
tur contrita radix ex vino al-
bo, & recenti butyro calefacta, vtiliter pubi ad ciendam vrinam, siue sit dolor
ex renum calculis, siue ex crassa, lentaq; pituita vesicæ ceruicem obstruente. In
quo casu datur quoq; non paruo auxilio, potandum vinum, in quo incisa radix
fuerit macerata. Germani, Vngari, atq; Poloni hac radice suos condiunt cibos,
in quibus quanquam appetentiam facit, reuera tamen, & caput lædit, & nido-
rosas eructationes mouet.

CENSURA.

Rectius fortasse saperent, qui hanc plantam perperam Armoraciam faci-
unt, si Crateuæ Thlaspin, de quo in Thlaspi meminit Dioscandem esse scribe-
rent.

P

SISER,



APHA-

SISER, Græcis, *Σίσυρος*. Arabibus, *Culcas*, *Eifarum*, siue *Seifarum*. Italis, *Sisaro*. Germ. *Grüselndren*.

SISER.

FORMA.

Matth.

Folia promithortensi pastinacæ similia, breuiora tamen, atq; minora, caules etiam similes habet, striatos. Semen in umbella pronenit, petroselinimodo: Radicibus nititur numerosis, asphodeli modo, teneris, fragilibus, dulci sapore, & amariustulo, origratis, tenui intus matrice.

LOCVS.

In Germania vbi passim habetur, scriitur in hortis.

QUALITATES.

Gal. 8.

Radix excalfacit ordine simplic. me. cundo, aperit, digerit, vrinam ciet, adiunctamq; habet amaritudinem, cum leuicula adstrictione.

VIRES.

Diosc.

Stomacho haud inutilis est, appetentiam iuuat. Venerem stimulat.



SISER

NOMINA.

227

SISER alterum, Italis, *Carota bianca*. Germanis, *Sierstin*/sive *Sirgellin*. Hispanis, *Chiriuias*. Gallis, *Cherij*, sive *Givoles*, aut *carottes blanches*.

SISER ALTERVM.

FORMA.

Folia caules, umbellas, flo *idem*. res, & semen habet sylvestris pastinacæ. Radix, napi effigiem representat, colore albicante, aut subflauescente, sapore subdulci, ac simul amarulculo.

LOCVS.

Seritur in hortis, ac etiam *idem*. in agris, in vniuersa Germania, & Boemia.

QUALITATES.

Excalfacit, & humectat, *idem*. inflat, aperit, vrinas mouet.

VIREs.

Valet radix ad ea omnia, *idem*. ad quæ Siser primum valere diximus.

APPENDIX.

Tametsi sub Siseris alterius nomine hæc planta posita sit, nihil tamen cum legitimo sifere habet cognationis.

P 2

LAPA-



LAPATHVM, siue Rumex, Græcis, Ῥάπαρον ἢ ὀξύραρον. Officinis, *Lapathum acutum*. Arabibus, *Humad*, siue *Humad*. Ital. *Lapathio*, siue *Rombice*. Ger. *Amysfer* / *Wengelwurk* / *Streiffwurk* / *Zitterwurk*. Hisp. *Labara*. Gallis, *Lapais*, *Pareile*.

GENERA.

Matth.

Quina habentur genera: Oxylapathum, Satiuum, q̄ & Rumex, Sylvestre. Quartū quod quidā Oxalida, alij anaxirida vocant. Et Hippolapathum.

FORMA RVMICIS, ET OXYLAPATHI.

Idem.

Exit Rumex folijs betæ nigre proximis, sed minoribus, plantagini ferè equalib⁹, humi accubantibus. Caulis illi inest cubitalis, striatus, flore rubescente, semine minuto, pellucido, nigricante. Radicibus nititur longis, flauo colore. Oxylapathum autem folijs prouenit longioribus, in cacumine acutis. cetera Rumici similia sunt.

LOCVS.

Prouenit Rumex sponte in hortis, secus itinera, & incultis locis: Oxylapathum verò, in aquosis, & palustribus.

QUALITATES.

Gal. lib. 7. Lapathum moderate digestum, rentē sortitusest facultatem,

at oxylapathum mistam: nam cum eo, quod digerit, non nihil quoq; repercutit. Semen autem eorum, manifestam quandam adstrictionem obtinet.

VIREs.

Gal. lib.

Aetius.

Matth.

Vtriusq; semē, & præsertim oxylapathi dysenterias, diarrhas, ac cetera alui profluvia cohibet potum. Præstat ad canum rabidorū morsus, fori vulneri applicatū, & herba ipsa illita, atq; vna cū radicibus potui data. Vinum in quo oxylapathum decoctum sit, diebus aliquot potum, auriginē pellit. Aqua tota plantilla distillata, vna cum caphuræ momento, pustulas in facie delet. Herba pubi illita, vrinam ciet. Quin etiā radicem ex vino decoctum potum, calculos renum adhibitur scabiem sanat: Idemq; præstat succus cum sulphure illitus.

*LAPA-



*LAPATHVM rubrum, Cretense, vulgo sanguis Draconis. Græcis Ερυθρολά-
τος. Germ. Rot Ampffer/Drachenblut.

LAPATHVM RUBRUM.

F O R M A.

Folia & caulis cruento suc-
co turgent, vt manus infici-
ant si premantur, radix lutea
est vt vulgaris lapathi, cui fe-
rè per omnia respondet, ex-
cepta magnitudine.

L O C V S.

Frequētius in hortis quam
alibi nascitur & seipsum serit.

F A C V L T A T E S.

Gustu nitrosiore quā oxy-
lapathum esse depræhendi-
tur. Reliqua huic sunt cū eo-
dem communia. Aluum ciet
iusculum aut expressus suc-
cus sanguineus totius plan-
tæ. Semen eius puluerisatum
& in aliquo decocto adstrin-
gente potum singularem ha-
bet efficacitatem in sistendis
nimis mensibus & similibus
fluxibus.*

P 3

O X A L I S



OXALIS, Græcis ὄξαλις. Officinis, & Italis, *Acetosella*. Germanis, *Sauer Ampffer*. Hispanis, *Azedrilla*, *Agrelles* & *Azedas*. Gallis, *Oseille*, *Vinette*, *sive Salicette*.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum. Maius & minus.

F O R M A M A I O R I S.

Maior folia promit Lapathæ adeo æmula, ut quandoq; oculos fallat: tamen minora sunt, læviora atq; paulò angustiora. Et ab ipsorum exortu sagittali ferè figura, acido omnino gustu. Radice nititur, ubiq; fibrata, sed non rumicis modo fulva, sapore perinde ac folia, & caules. Semen profert subrubrum, paruum, & acuminatum. caulem cubitalem, & striatum, & succosum.

L O C U S.

Idem. Nascitur spontè in pratis, & seritur etiam à nonnullis in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Refrigerat, & siccatur excessu secundo, digerit, aperit, & nonnihil incidit.

V I R E S.

Matth. Herba ipsa biliosis, ac pestilentibus febribus aduersatur. Præstat & ad cordis affectus. Sitim sedat, putredini resistit. *Diosc.* vermes necat, appetentiam excitat. Semen fluentem aluum cohibet, dysentericos, & cæliacos iuuat; stomachi fastidia tollit: Sanat scorpionum ictus; quod si quis in potu præsumat, nihil molesti patietur ex ictu. Hæc omnia præstat non solum semen, sed vniuersa quoq; planta.

OXALIS MAIOR.



OXALIS

NOMINA.

231

OXALIS minor, Acetosa ouillax. Græcis, *ἄκαλις μικρά*. Italis, *Acetosella*, *Saacciola*,
& *Sannicciola*. Germ. *Klein Saurampffer*/Schöpsampffer. Gallis, *petite oseille*.

OXALIS MINOR.



FORMA.

Folia promit alteri longè *Matth.*
minora, pinguiuscula, lanceæ
cuspidis figura; laevia, minu-
risque, ac rubentibus venulis
exarata acidioraque quàm in
maiori. cauliculos edit peda-
les, tenues, in quibus flosculi
numerosi spectantur ruben-
tes, ac foliacei, & semen vñ in
altera subrubens, sed longè
minus.

LOCVS.

Crescit exoluto solo, & in *Idem*.
culto.

QUALITATES.

Refrigerat, ac siccat perin- *Idem*.
de ac altera: digerit, & incidit.

VIRES.

Omnia belle potest, quæ *Idem*.
maior; nec infirmioribus pol-
let viribus.

P 4

HIPPO-

HIPPOLAPATHVM. Græcis, ἵππολαπάθος. Officinis, Rhabarbarū Monachorum. Italis, Rombice maggiore. Germ. Münch Rhabarbaren. Gallis, Reubarbe de Marais.

HIPPOLAPATHVM.

GENERA.

Matth. Duū est generum, alterum Hortense, alterum sylvestre.

FORMA.

Idem. Planta est grandis, ac formosa, folijs, semine, radicib⁹, ac cæteris in vniuersum notis, minori lapatho similibus; sed omnia longè maiora, nam folia grandia sunt, helenij ferè modo, radix pariter grandis, vegeta, fuluo colore.

LOCVS.

Idem. Alterum seritur à pluribus sicutaculi causa in hortis, & viridarijs, alterum sponte nascitur in palustribus.

QUALITATES.

Idem. Digerit, abstergit, mundat, aperit, prouocat.

VIREs.

Idem. Radicis succus cum sulphure illitus scabiem sanat, cum lupinorum verò facina lentigines, alphas, & alias cutis infectiones exterit. Radicis dilutum, ex vino paratum præstat, ad pellendos renum calculos. Idem facit sicca radicis puluis: drachmæ pondere ex meraco potus: quin etiam ex marrubij decocto haustus, auriginem curat.



LAM-

LAMPSANA, siue Brassica sylvestris. Germanis, Keintöl/Senffhoef. Græcis,
Λαψάνα. Italis, *Caualo saluatico, & rapo falso, & rapastrella.*

L A M P S A N A.



F O R M A.

Planta est pedalis altitudi- *Plin.*
 nis, hirsutis folijs, sinapi non
 ab similibus; flore melino sub-
 albicante, semine in cornicu-
 lis erucæ modo sursum spe-
 ctantibus.

L O C V S.

Nascitur sponte in campis *Matth.*
 cultis, & incultis.

Q U A L I T A T E S.

Semen exsiccatur, & siccat, *Gal. li. 6.*
 absterge di, digerendiq; non- *simp. me.*
 nullam facultatem possidet.

V I R E S.

In cibum sumpta; succos *Diosc.*
 prauos procreat, & plus alit,
 quam rumex.

P 5

BLITVM,

BLITVM, Græcis, Βαλνίλον Arabib. *Bachala*, *Tamenia*, siue *Bachale* *Alamanie*. Italis, *Blito*, *Biedone*, & *Bietolone*. Germa. *Mayer*. Hisp. *Bredos*. Gal. *Blette*.

GENERA.

Matth. Duum est generum, Rubrū & Album, & in rubri genere maius & minus.

FORMA MAIORIS.

Idem. Rubrum maius, crescit ad arbusculæ magnitudinem, folijs & caule alterius longè maioribus: flore grandi, numerosas veluti panniculas fundente, cacuminibus deorsum spectantibus, atque rubentibus amaranthi ferè modo, caule brachiali crassitudine, firmo, lignoso ac striato.

LOCVS.

Seritur in hortis & viridarijs, & habetur etiam fictilibus ad fenestras opacandas.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Refrigerat & humectat Blisimp. me. tum ordine secundo.

VIREs.

Gal. 2. de alim. fac. Sumitur in cibum, sed stomacho infestum est. Datur edendum aduersus Scorpionum ictus, quin etiam succus idem facit, cum vino potus. Illinitur ex oleo, ad lienis, & temporum dolores.

Plin. lib. 20. c. 22.

BLITVM



BLITYM rubrum minus, Græcis, Βλῆτον μικρόν. Italis, Blito, Biedone, aut Bietolone minore, & Gelofia.

BLITYM RUBRUM MINUS.



FORMA.

Folia promit purpurea, Mat. b. amaranthi proxima, minus tamen rubescentia. Caulem quoque habet purpurascen- tem, striatum, cubitale- que. Flores edit spicatos, siue in racemi modum, pariter purpureos: Radicem multi- fidam, purpureo succo præ- gnantem.

LOCVS.

Seritur in hortis, ac etiam *Idem.* in ijs spontè prouenit.

QUALITATES.

Refrigerat, humectat, & *Idem.* emollit.

VIREs.

Auxiliantur peculiariter *Idem.* ad menses remorantes pro- uocandos, molas, & secun- das educendas, si fœmina vapore decocti calidi suffiantur, adeò, vt vapor ad vterum ascendat.

BLITYM

BLITVM album, Græcis, Βλήτιον λευκόν. Italis, Blito, Biedone, & Bietolone bianco.

FORMA.

Matth. Folia profert Blito rubro minori similia, subalbido colore. Flores & semen racematim tenuibus insident ramusculis, ex alarum cauis prodeuntibus, panicularum effigie.

LOCVS.

Matth. Sponte nascitur in agris nō cultis, secus itinera, ac etiam in hortis, & areis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Iisdem qualitatibus & viribus pollet, quibus & cætera genera.

BLITVM ALBVM.



*BLITVM

*BLITVM sylvestre. Polyspermon Aloysij Anguillare. Græcis, Βαλζογ ἀγγιου, aut
 πολίσπερον. Germanis, Wildt Meier/ Wildt Traubenfraut. Italis, Biedoni, seu
 Blito saluatico. Hispanis, Bredos saluages. Gallis, Blere sauuage.

BLITVM SYLVESTRE.



FORMA.

Minus est reliquis generibus Bliti,
 folijsq; ocymi angustioribus, flosculis
 racemosis, & semine copiosissimo Bo-
 tryos instar, nigro splendente, radix al-
 bagracilis.

FACULTATES.

Hac mirè capiuntur pisces, vt expe-
 rientia confirmati tradunt.*

MALVA,

MALVA, Græcis, *Μαλίζη*. Arabibus, *Chubeze*, seu *Chabazi*. Ital. *Malva*, & *Malua*.
Germ. *Pappel*. Hispanis, *Maluas*. Gallis, *Malue*.

MALVA.

GENERA.

Matth. Vna hortensis, altera agrestis, & utraq; maior, & minor.

FORMA.

Idem. Vulgaris adeo notitiæ malua est, ut eâ calamo delineare opus non sit.

LOCVS.

Idem. Prouenit sponte, & sata quoq; in hortis & viridarijs, & vbique.

QUALITATES.

Gal. li. 7. Domestica quanto plus habet aquee humiditatis, quàm agrestis, tanto minus digerentis est facultatis.

VIRES.

Diosc. Illinitur vtiliter contra aculeatos apium, & vesparum ictus, nec ab his feriuntur, qui ea trita cum oleo fuerint peruncti. Sanat capitis vlcera, & furfures: medetur sacris ignibus, & ambustis decocta folia, & ex oleo illita. Eius decoctum in fessione vulvas emollit, quinetiam clysmate infusum, vesicæ, & intestinorum erosiones sanat. Ius decoctæ

vnâ cum radice, bibitur vtiliter contra omnia venena, si cōtinuò à bibentibus reuomatur. Contra phalangiorum ictus remedio est. Semen ex vino potum, lac euocat, vrinæ cruciatus tollit. Feruefacta folia in cibum apposita raucedines expediunt, ex sale autem, oleo, aut recenti butyro aluum citant. Folia cum porris, & capis illita, præstant ad serpentium venenosorum morsus. Succus auribus instillatus dolorem sedat. Foliorum, & radicum decoctum ad lentorem vsque feruefactum datur potandum agrè parturientibus magno iuuamento. Idem præstat succus selibræ pondere potus. Semen ex vino rubro potum, nauseam tollit. Cauliculi molles elixi, delibratique comeduntur asparagorum modo, ad citandam aluum. In summa, Malua ad multa vtilis est, ideoque non immeritò antiqui Maluam Omnimorbiam vocauerunt.

Matth.



MALVA

NOMINA.

239

MALVA Arborea, siue Malua maior, Moscentos Plinio. Græcis, Δένδρομαλάχη.
Italica, Malua, siue Malua maggiore. Germanis, Grosse Pappel/vel Pappel Rosen.
Gallis, Malues de lardin.

MALVA ARBOREA.

FORMA.



Folia gerit hortensis Mal. Matth.
ua grandiora subhirsuta, per
ambitū hortensis Maluæ mo-
do diuisa, longis que pediculis
appesa. Stolonibus interdum
singulis, interdum pluribus
ab vna radice prodeuntibus,
tricubitalibus, & quandoque
maioribus, subhirsutis, baculi
effigiem referentibus: floribus
in superiore parte caulium sese
pendentibus, rosarum modo
amplis, & quandoque foliorum
multitudine similibus: colore
in quibusdā purpureo, in non
nullis candido. Et in quibus-
dam subpurpurascens. Semē
edit cæteris maluis simile, sed
maius: Radicibus nititur vali-
dis, & multifidis.

LOCVS.

Seritur in hortis, & virida-
rijs, ac etiā in fictilibus, ad opa-
candas in æstate fenestras. Idem.

QUALITATES ET VIRES.

Ea omnia facile præstare potest, quæ & cætera maluarum genera.

Idem.

ATRIPLEX.

ATRIPLEX, Græcis, ἀράπαξις, ἢ χυροάρανον. Arabibus, Cataf, siue Caraf. Italis, Atriplice, Reppice, & Treppice. Germanis, Woltzen/ seu Wiltzen. Hisp. Armoles. Gallis, Choux, Arroches, Bonnes, Dames, Folles, seu Femés.

ATRIPLEX.

GENERA.

Matth. Trium est generum, Hortense, Sylvestre, Marinum.

FORMA.

Matth. Hortensis Atriplex folia mitit humotenus lata, in mucronem tamen desinentia, sagittarum instar, pingua, succosa, colore ex viridi in luteum langescente: caulem rubrum, multis vndiq; adnatis ramis, qui ad quatuor cubitorum mensuram adolescit, semine spicato, pressis, tenuibusq; folliculis occluso.

LOCVS.

Matth. Seritur à ruricolis in hortis, & in campis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Humida & frigida temperie est. Humida quidem secundum ordinem à medijs, frigida vero primi, quam utiq; tepidam esse caliditatem dicimus, cuiusmodi in rosis inest, non tamē adstrictionis est particeps, sed aquea est, & minimè terrena: Hortensis itaq; tum humidior est, tum frigidior sylvestri, & paululum omnino est, quod digerendi vim obrinet. Semen autem abstergendi vim habet.

VIREs.

Diosc. Panos discutit si cruda, siue cocta illinatur. Semen cum aqua mulsa potum, regium morbum sanat. Idem potum vomitiones ciet, & aluum exoluit: Estur herba ceterorum olerum modo.

ATRIPLEX



N O M I N A.

241

ATRIPLEX sylvestris, Græcis, ἀράβις ἀγρία. Italis, Reppice saluatico. Germanis, Wild Witten. Gallis, Arroches sauvages.

A T R I P L E X S Y L -
V E S T R I S I.



G E N E R A.

Trium est generum folio- Matth.
rum diuersitate dissimilium.

F O R M A.

Primum genus folia edit
hortensi haud dissimilia, mi-
nora tamen, & quæ ad terram
sunt per ambitum laciniata,
subalbicantiq;: caulem ses-
quicubitalem, ramosum, ac
etiam striatum: semen race-
mosum, & exile: Radicibus
nititur numerosis, ac tenui-
bus.

L O C V S.

Nascitur sponte cum in
hortis, & vineis, tum secus
itinera, & locis incultis, &
campestribus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Humida est, & frigida, sed Gal. 6.
minus quam hortensis. Itaque aliquantulo plus digerit. simp. me.

Q A T R I -

Ita-
voles.

osis in-
Hor-
mo est,

orum,
Estur

IPLEX

ATRIPLEX SYL-
VESTRIS II.

FORMA.

Folijs exit latioribus, quer-
cus modo per ambitum inci-
sis, subalbicantibus. cætera
cum altera paria sunt.

LOCVS.

Nascitur prope vrbium
mœnia, & locis quoque alijs
incultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Eædem illi sunt qualitates
& vires, quæ priori.



ATRIPLEX

NOMINA.
ATRIPLEX SYL-
VESTRIS III.

243



FORMA.

Folia habet oblonga, viridia, carnosâ, non, vt reliqua laciniata, in acutum desinentia: semen racemosum, cæteris minutius, caule ramoso, supino atq; striato.

LOCVS.

Nascitur intra, & extravibium, & oppidorum mœnia, & in arcis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Viribus præstat, quibus, & præcedentes.

Q 2 ATRIPLEX

ATRIPLEX Marina, Græcis, ἀτρίπλεξ θαλασσία. Italis, *Atriplice*, *sive Reppice marino*.

ATRIPLEX MARINA.

FORMA.

Matth. Caules humi repunt, in quibus folia exeunt albican-
tia, spanachij oleris figura,
minora tamen, falso sapore:
Semen profert in caulium
summitatibus racemosum,
radicem diuariatam, multi-
fidamque.

LOCVS.

Idem. Nasceitur sponte mariti-
mis locis, non procul à lito-
re.

QUALITATES.

Matth. Abstergit magis quàm ce-
tera genera, magisq; aluum
citât, & digerit. Incidit, at-
tenuat, liquat, à putredine
vindicat, aperit, & abraden-
do expurgat.

VIREs.

Idem. Humentem ventriculum
siccât, hydropicos iuuat, pingues extenuat.



SPANACHI-

NOMINA.

245

SPANACHIVM, Græcis, Σπανάκιον. Italis, Spinace. Germanis, Spinat. Arabibus, Spanach. Gallis, Espinoches, siue Espinars.

SPANACHIVM.



FORMA.

Nascitur septem diebus, à *Matth.* satione, folijs primū triquetris, quæ deinde in sagittæ formam exeunt, mox à pediculo intybi sylvestris modo lacinata euadunt. Exigua nititur radice, tenuibus capillamentis fibrata, caule cubitali, & quandoq; maiori, inani tamen. flores gerit in vertice rotundos, paruos, herbaceosque, racematim coherentes, semen aculeatum, angulosumque.

LOCVS.

Seritur passim in hortis *Idem.* cæterorum olerum modo.

QUALITATES.

Humidum est, & frigidum *Matth.* ordine primo, nec omnino vacat nitrosa qualitate.

VIRES.

Aluum emollit, sed flatus gignit. Succus foliorum potus, præstat ad scor- *Serap.* pionum, & phalangiorum ictus. In cibum deuoratum, lenit exasperatas arterias.

Q 3

KALY

KALI vel Viscnita Mauritanis vocata. Italis, *Soda*, *Salsola*. Gallis, *Soede*.

K A L I.

* G E N E R A.

Plurima eius habentur genera, e quibus quatuor exhibebimus.

F O R M A I.

E T I I I I.

I. Multis ramulis fruticat, è stipite lignoso, grandi perpetuo, & interdum ad duos cubitos attollitur, subrubente cortice obducto. Surculi ex folijs ceu granulis, hordei magnitudine, componuntur sapore saluginoso.

IIII. Vel idem genus habetur, vel parū differt à priori, granulis tantum in summitate rotundis ceu seminibus annatis, lenticulas referentibus, aut exiles squamas.

L O C V S.

In maritimis nascitur.


Q U A L I T A T E S.

Calida & sicca est herba, & calidior ex eo confectus cinis, qui ad quartum qualitatis vtriusq; gradum accedit, vrendiq; & causticam vim habet.

V I R E S.

Comburantur in cinerem hæ planta, quo liquefiunt contriti lapides ad parandum vitrum. Lixivium inde percolatum acerrimum & mordacissimum, addito oleo in saponem decoquitur ad abluendas vestes utilissimum. Herba exigua quantitas intro assumpta, urinas & menses potenter euocat, sortum eijcit, aquosos per aluum humores ducit, hydropicos purgat. Eius nidore fugantur serpentes. Miscetur etiam cinis, quæ scabiei & cutis fœditatibus illinuntur, medicamentis superfluum & excrecentem in malignis vlceribus carnem exest.*

Cali



* Cal. 11. & 111. Salicornia. Germanis, Salztraut.

CALI.



FORMA.

11. Frequentioribus ramulis prodit è stipite cinereo componiturque tota planta quasi granis in se inuicem confertis, superioribus semper inferiorum osculis ceu acetabulis insidentibus. 111. Tenerior est herbula, folijs crassis, pinguibus, carnosiss, teretibus constans, vt reliqua id genus plantæ præcedentes, quæ omnes, vt ex iconibus patet, differentias parui momenti fortitæ sunt, & autumnî tempore rubent.

LOCVS.

Ad maritimas oras crescit & minor illa species in Germania quibuldam in locis circa Salinas & falsos lacus prodire visitur.

QUALITATES,
ET VIRES.

Huc refer quæ paulo ante de reliquis dicta sunt.*

Q 4

BRASSI-

BRASSICA lævis, Plinio Cumana, Græcis, κραιβη λέια, Theop. λεϊφύλλοι-
Arabibus, Corumb, seu Karumb. Italis, Cauolo liscio, sine Verza liscia. Germa-
nis, Röl. Gallis, Choux Vers, aut Choils. Hispanis, Colthes, seu Couues.

BRASSICA LÆVIS.

FORMA.

Matth. Folio exit grandi, ima parte
vtrinq; dissecto, per ambitū
fimbriato, leui, pinguiq; cau-
le breui, firmo, subalbicante,
alba int^o medulla. Flores edit
melinos, & semē rapi simile,
ac similibus quoque siliquis
inclusum subrufo colore, &
subamarum.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in hortis.

FACULTATES.

Gal. 7. Desiccandi vim habet, non
simp. me. tamē admodum acrem, quin
etiam emolliendi, glutinan-
di, & abstergendi.

VIRE.

DIOSC. Cæcutientibus, & tremu-
lis deuorata prodest, Summo
cibo sumpta crapulā discutit,
& vini noxā restinguit. Cru-
dus succus cum nitro, & Iride
denoratus, aluū emollit, ex
vino verò potus, viperarum
morsib⁹ auxiliatur. Cum fæ-
nogræci farina, podagris, &
articularū vitijs cōmodē illinitur. Prodest sordidis, & vetustis vlceribus. Caput
purgat naribus infusus, Menfes trahit cū loliacea farina inditus. Illita folia per
se, aut cum polenta, conferunt inflammationibus, & tumoribus, & ignē sacrum,
leprāq; sanant, carbunculos ex sale rūpunt, fluentes capillos retinent. Ex mel-
le cocta valent ad depascentia vlcera, gangrenāq; Cruda ex aceto lienosis pro-
sunt. Mansa, & exucto succo retulam vocē instaurant. Decoctū eorum potum
aluū, & menfes ciet. Semen potū tineas ventris pellit, lentigines, alphōsq; illitū
in facie purgat, caulū cinis adipe suillo exceptus, illinitur vtiliter ad diuturnos
laterum dolores: Brassica leuiter feruefacta aluum citat deuorata, percocta ve-
rò sistit.

BRASSI-



NOMINA.

249

BRASSICA crispa, seu Sabellica Plinio. Græc. κράμνη θυλίσφυλλος. Italis, Canolo cresspo, seu Verzacresspa. German. Krautköhl.

BRASSICA CRISPA.

FORMA.

Caule exit firmo, nodoso, Matth.
è quo folia numerosa exeunt,
lata crispaq; , & quæ in me-
dio sunt, crispiora, albican-
tia, & in orbem conglome-
rata, tenera, & in cibis grata.

LOCVS.

Seritur in hortis, perinde Idem.
ac althera.

QUALITATES,
ET VIRES.

Præstat ad ea omnia, quo- Idem.
rum in læui Brassica memini-
mus.



Q. BRASSI-

BRASSICA capitata, siue Imperialis, Græcis, κεφαλή κεφαλάδης. Italis, *Caudo*
Cappuccio, Cappuzzino. Germanis, *Rapskraut.* Gallis, *Choux, Cabuz.* Hispanis,
Repolho, Colhes morcianos.

BRASSICA CAPITATA.

FORMA.

Matth.

Folia fert primùm ampla
 subrotunda, à pedamento in
 girum sese fundentia, quæ
 deinde in orbem capitatum,
 ac solidum cōglomerantur,
 qui in aliquibus rufescit, in
 quibusdam albicat, in non-
 nullis virefcit.

LOCVS.

Idem.

Seritur in Germania in
 campis. In Italia verò in hor-
 tis.

QUALITATES,
ET VIRES.*Matth.*

Viribus ab alijs brassicis
 non differt, nisi quod in ci-
 bis nocentior habeatur.



*CAVLO.

*CAVLORAPVM, Rapæcaulis. Græcis, κράμβη γερραδάδης. Germ. Rübenföhl.

CAVLORAPVM.

F O R M A.



Lævi brassicæ congruit fo-
liorum figura, quæ tamē non-
nunquam crispantur profun-
dis lacinijs, sed magnitudine
capitatum ferè adæquat, eius
caulis crassescit infra folia iux-
ta radices, extuberatq; in ra-
pi mediocris magnitudinem,
flores & semina veluti aliæ
profert.

L O C V S.

Hortensis est, & amat so-
lum mediocre, pingue, & be-
ne stercoreatum, probeq; sub-
actum. Semen aliunde infer-
tur.*

*BRASSI-

*BRASSICA cauliflora, siue Cypria, Plineo Pompeiana. Germanis, *Raps*
föl/Blumenfö. Italis, *Caulo flore*. Gallis, *Chous floriz*.

BRASSICA CAULIFLORA.

FORMA.

Caule folijsq; imitatur læ-
 uem brassicam sed albidior
 est, crassiorq; ac in totum ma-
 ior, in medio foliorum in ca-
 put conglomerantur ramuli
 pingues albidi molles, quasi
 asparagi, denso ordine com-
 pacti, Floret vt vulgaris bras-
 sica, cui semen etiam simile
 profert.

LOCVS.

Peregrina est, & instructio-
 ribus tantum hortis manci-
 pata. *



BRASSI-

BRASSICA marina, Græcis, Κράμβη θαλασσία. Italis, & Officinis, Soldanella.
Gallis, Chou de mer.

BRASSICA MARINA.



F O R M A.

Facie à fatiua prorsus ab- DIOSC.
horret: nanque folia fert Ari-
stolochia rotundę similia, sed
parua, singula à ramis ruben-
tib⁹ exeuntia singulari, vt hæ-
dera, pediculo, lacteo succo
prægnantia, salso iustu, & ali-
quantum amaro. Flores fert Matth.
læuis similacis vulgaris haud
ab similes, calathi effigiem re-
ferentes.

L O C V S.

Prouenit sponte locis ma- Matth.
ritimis, & præsertim in litori-
bus Venetis, & Aquileiensis-
bus.

Q U A L I T A T E S.

Cum subfalsa, & subamara Gal. li. 6.
fit, sanè etiā ad externos cor- simp. me.
poris vltus idonea fuerit, & ad
omnia, ad quæ tales qualita-
tes accommodantur.

V I R E S.

Herba in totum stomacho inimica, acris, ciet alium vehementissimè in ci- DIOSC.
bo cocta, & coquitur propter acrimoniam cum pingui carne. Præstat eius Matth.
decoctū potum, cum Rhabbaro, ad pellendas hydropicorum aquas. Idem
facit foliorum siccorum puluis, addito Rhabbaro, & cubebis, pluries ex vi-
no potus.

*SOLDA-

*SOLDANELLA alpina. Italis quibusdam *Lunaria di dinari*.

SOLDANELLA ALPINA.

F O R M A.

Herba elegans est ob flos-
culum caeruleo colore pulch-
rimo insignem, multipliciter
dissectū campanulæ formam
representantem. Folium est
ipfi crassiusculum vnum atq;
alterum & sæpius plura, Sol-
danellæ marinæ subastringen-
te & amaro nonnihil sapore,
vnde illi nomen.

L O C U S.

In Alpibus colligitur.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Vipollet glutinandivulne-
ra, atque ad cicatricem per-
ducenda.*



BETA.

BETA, Græcis, τεύλον. Arabibus, *Decka*, siue *celb*. Italis, *Bietola*. Germanis, *Mangold*, siue *Pieffen*. Hisp. *Aselgas*. Gal. *Porree*.

BETA ALBA.



est alba, quam nigra. Succus absterforius est.

VIRES.

Succus naribus inditus caput purgat: aurium doloribus auxiliatur radicis DIOSC. decoctum, & foliorum: furfures, lendesque detergit: perniones fotu mitigat. Crudis folijs vitilignes nitro antea perfrictas, alopeciarum inanitates, scalpello prius exasperatas, atque depascentia vlcera illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustis que cocta medetur. Huius ceu aliorum olerum Gal. 2. de ali. fac. exigua est alimonia, iecoris obstructionibus aptius, quam malua accommodatur: magis autem, vbi cum sinapi, aut aceto estur, lienosos item similiter manducata mirifice iuuat. Iure enim quis ipsam medicamentum potius, quam alimentum dixerit.

BETA

GENERA.

Trium est generum, alba, Matth. nigra, & rubra.

FORMA ALBÆ.

Alba folijs prouenit ceteris grandioribus atriplicis aut hortensis rumicis fere similibus, per ambitum leuiter sinuatis, caulem gerit bicubitalem, striatumque: flores exiguos, sublutei coloris: semine copiosum, inæqualiter rotundum, ac subasperum: radice alba, raphani modo longa, ac etiam tenera.

* Nigra paulo minor est, & colore differt.*

LOCVS.

Seritur passim in hortis. Idem.

QUALITATES.

Nitrosa facultatis particeps Galen. 8. est, quæ tum digerit, tum exsimp. me. tergit, & per nares purgat. Cocta nitrositatem omnem exuit, fitque facultatis leuiter digerentis. Porro ad detergendum, digerendumque validior

BETA rubra, Græcis, τεύτλαν ῥομβόν. Italis, *Bietola rossa*. Germanis, *Rot Mangolt*; *Rot Rüben*.

BETA RUBRA.

FORMA.

Matth. Folijs prouenit cæteris angustioribus, duriorib. rubentibusq; radice rapi longimodo crassa, sanguinolenta, adnatis circumquaq; prodeuntibus: caule verò, pariter rubente, semine cæteris simile.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in Germania in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Matth. Non aded multum differt suis in qualitatibus, ac viribus à cæteris generibus. Hæc Germani hyeme, aut elixant in aqua, aut cineribus calentibus coquunt, & exutis subinde corticibus, incidunt, & in acetarijs, asperso pipere, concinnant ad esum. Quin etiam semicoctas in aceto, & sale diu asseruant, & cum assis carnibus vorant.



PORTV-

PORTULACA, Græcis, ἀνδράκυν. Arabibus, Bakleancha, seu Bachele Albanica. Italis, Portulaca, Procaccia, siue Porcellana. Germanis, Burseltraut. Hispanis, Verdolagas, & Baldroegas. Gallis, Porcelaine, Pourpier, siue Pourchaille.

PORTULACA DOMESTICA.

GENERA.

Duum est generum, sativa, & sylvestris.

FORMA.

Sativa folia insunt latiora, Matth. pingua, crassa, splendētia, & a tergo candicātia, gustu acido, & austero: caulē edit crassum, glabrum, erectum, subpurpureū atq; pinguem: semine nigro, exiguo, in herbaceis calyculis incluso. Radice multifida.

LOCVS.

Seritur in hortis passim ab olitoribus.

QUALITATES.

Frigida, & aquea tempera. Galen. 6. mento est; refrigerat quidem simp. me. ordine tertio, humēdat verò secundo, viscosum etiā quiddam obtinet. Succus magis adstringit, quā herba, quæ succum gignit modicū, eumque frigidum, humidum, & glutinosum.



V I R E S.

Portulaca cum hordei farina capitis doloribus, & oculorum inflammatione. Diosc. nibus vtiliter imponitur: Quin etiā ventriculi ardoribus, igni sacro, vesicæ doloribus auxilio est, commanducata dentium stuporem sedat: stomachi, & intestinorum astuationē, fluxionēq; mulcet. Veneris impetus coerct. Succus epotus simili effectu prodest. Contra teretes ventris tineas, cruentam excretionem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficax est: ocularibus medicamentis vtilissimè commiscetur. Interaneis fluxione laborantibus, atq; vuluarum erosionibus, infunditur: contra dolores astu excitaros, caput ex rosaceo, & oleo fouetur, eruptiones papularum in capite, cum vino emendat: vulnerib. ad syderationē spectantibus vtiliter illinitur. Fluxiones calidas omnes repellit, & in febribus hæcicis totis hypocondrijs illinitur. Plin. libr. confert muliebri profluvio tum herba ipsa deuorata, tum eius succus potus. & capite præciduo umbilico etiam imponitur. sanat quoq; & mammarum, & podagræ inflammationes. 20.

R

PORTV-

PORTVLACA sylvestris. Græce, ἀσπράχυν ἀγρία. Italicè, Prochachia, & Portellana saluatica, & parimente grassola.

PORTVLACA SYLVESTRIS.

FORMA.

Matth. Portulaca, quæ sponte nascitur, caulibus exit rotundis, lentis, pinguibus, rufescentibus, humiliter diffundentibus, folia gerit alteri similia. sed minora, oblongiora, numerosioraq; cætera cõsimilia sunt.

80?

LOCVS.

Idem. Prouenit in hortis, vineis, campis, & agris incultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Non differt à domestica, nisi quod adstringenti vi, paulò sit potentior, atq; etiã non nihil minus humectat. Ruricolæ integras plantas elixant: & deinde in sole siccant. & ad hyemales cibos afferuant.



ASPARA-

NOMINA.

259

ASPARAGVS, Græcis, ἀσπάραγος. Mauritanijs, Halion, siue Helium. Italis, Aspara-
rago. Germanis, Spargen. Hispanis, Esparagos. Gallis, Esparge.

ASPARAGVS.

GENERA.

Duplex habetur, altilis, & sponte nascens. Huius tria vi-
suntur genera, nempe Palu-
stre, Græcis, ἐλαίον vocatum,
Montanum, & Petreum, cor-
ruda, propriè dictum.

FORMA.

Thyrsum is primum, siue Matth.
germen à radicibus mittit te-
nerum, cacumine crassiore in
acutum desinente, perinde ac
Orobanche, qui tandem, au-
ctus, in ramos sese explicat, in
quibus folia sunt capillacea,
fœniculo breuiora, tenuiora-
que. Florem edit exiguū, quo
flaccescente, bacce subsequū-
tur, primum virides, & dein-
de rufescentes. Radice niti-
tur circa caulem spongiosa, à
qua numerosæ oriūtur fibræ
ellebori modo, albicantes,
crassioresq; vt in rusco.

LOCVS.

Altilis passim in hortis co- Matth.
litur.

QUALITATES.

Abstergendi vim habet, idque citra manifestam, aut caliditatem, aut frigi- Gal. li. 6.
ditatem. simp. me.

VIRE S.

Huius teneri cauliculi triti in vino albo, renum dolores sedant. Asus autem, DIOSC.
siue coctus vrinae stillicidiū, difficultatemq; ac dysenterias mitigat. Radix cum
vino, aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cum ficis, aut ciceribus,
sumpta, regium morbum sanat, coxendicis cruciatus, stranguriamque leuat. Matth.
Seruntur ad esum, nam non ingratus sunt cibus, siue in acetarijs, siue dum ca-
lescunt, asperso modico sale, recentiq; butyro, cum pipere deuorentur.

R. 2

ASPARA-



ASPARAGVS sylvestris, Græcis, ἀσπαράγος ἀγρική. Italis, *Asparago saluatico*.

ASPARAGVS SYLVESTRIS.

•GENERA.

Tria (vt in altili diximus) huius habentur genera, Palustre, Montanum, & Petreum, Corrudavocatum.

FORMA.

Matth. Montanus, & Palustris, facie vix ab altili differunt. Corruda verò caule exit lignoso postquam adoleuit, flexiliq; folijs exiguis, præduris, & aculeatis. huius cauliculi prima germinatione etiam in cibis veniunt. sed ceteris tenuiores sunt, & amariuculi: quo fit, vt etiam ingratiore habean- tur in cibis.

LOCVS.

Idem. Montanus, in montib. Palustris, in paludibus, & Petreus, siue Corruda, saxosis locis, & in sepibus, prouenit.



QUALITATES, ET VIRES.

Idem. Palustris, & Montanus eadem omnia possunt, quæ altilis, nec imbecilliores, nec valentiores vires habent. Cæterum Corruda ob manifestam, quam possidet amaritudinem, longè magis aperit, prouocat, & abstergit, id quod manifestè patet ex fœtida quam ciet vrinam.

APPENDIX.

Idem. Nascentur tibi Asparagi altiles totius anni decursu, si, vbi fructum legeris, radices, quæ summo cespite vagantur, circumfoderis, ac aperueris.

PLANTA-

PLANTAGO, Græcis, ἀνθὺς λωσάν. Arabibus, *Lifen*, aut *Lefan alhamel*. Italis, *Piantagine*, seu *Centinerbia*. Germanis, *Wegrich*. Hispanis, *Lhantem*, siue *Tamebagem*. Gallis, *Plantain*.

PLANTAGO MAIOR.



GENERA.

Plantaginis tria obseruauimus genera, nempe maius, medium, & minus, quod quidam longam Plantaginem vocant. sunt etiam, qui aquaticam addant, de quibus omnibus speciatim dicemus.

FORMA.

Maior, latior, virentiorq; cæteris **DIOSC.** habetur, latis constans folijs, oleracei generis, neruis septem, & quandoque pluribus secundum longitudinem excurrentibus, quo fit, ut à nonnullis septineruia vocetur, Huius caulis cubiti altitudinem petiit, & à medio ad verticem, tenui semine circumdatur, & in quadam specie foliis quibusdā vestitur, quæ primo exortu, antequam penitus adoleſcant, rosæ effigiem præ se ferunt. Radicibus nititur teneris, hirsutis, candidis, digiti crassitudine.

LOCVS.

Nascitur plurimum in lacunosis, & humectis locis, in Plateis, in arvis, & secus itinera, & sepes.

FACULTATES.

Mistæ est temperaturæ: habet enim quiddam aqueum frigidum, quiddam verò, & austereum, id quod terreum est siccum, frigidum. Itaq; refrigerat simul, & desiccat ordine secundo. Semen eius, & radix similis sunt facultatis, nisi quod sicciolis sunt facultatis, nisi quod sicciolis sunt facultatis, nisi quod sicciolis sunt facultatis.

ris, & minus frigida. Sed semen subtilium etiam est partium: radices verò crassiorum, folia autem exiccata tenuioris, & minus frigida facultatis sunt.

VIRES.

Folia malignis omnibus vlceribus, & fluxioni opportunis, atq; elephanticis, fordibusq; illita profunt: profluvia sanguinis, serpentina vlcera, carbunculos, nomasq; cohibent: vetera vlcera, & inaequalia cicatrice obducunt: chironia sanant: sinus conglutinant: canum morſibus, ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidibus, strumis, ægilopijs illita cum sale profunt. Folia cocta cum aceto, & sale dysentericos, cæliacosq; iuuant: Estur in Betæ locū olus ipsum, cum lenticula coctum, ad aquam intercutem, quam leucophlegmariam vocant: foliorū succo vtiliter os colluitur ad sananda eius vlcera: gingiuis eruentis, & sanguinis reiectionibus in potu confert. Clyſtere dysentericis infunditur: valet ad vuluæ strangulationes, cum vellere suppositus: semen ex vino potum alui fluxiones, & sanguinis excretaiones sistit. manſa radix dentium dolores sedat: eadem cum folijs vtiliter in pallo datur ad vlcera, tum renum, tum etiam vesicæ.

R 3

PLANTA-

PLANTAGO media, siue minor, Græcis, ἀγρόγλασσον μικρόν, siue μέσον. Italis,
Piantagine minore.

PLANTAGO MEDIA.

F O R M A.

Matth. Folia habet angustiora, minora, molliora, lauiora, & tenuiora, cauliculo est anguloso, in terram inclinato, floribus spicatis, pallidis, pilosisq; femine summis caulibus emicāte: radicibus multifidis, tenuibus, albicantibusque.

L O C V S.

Idem. Nascitur, & hæc perinde, ac altera plurimū humectis, & vliginosis locis, in hortis, & secus vias.

FACULTATES,
ET VIRES.

Iisdem pollet facultatibus, & viribus, quibus & maior.



PLANTA-

PLANTAGO longa, Græcis, ἀνθήλαστον μακρόν. Italis, Piantagine longa, siue lanciola.

PLANTAGO LONGA.

FORMA.

Folia gerit longa, cuspidis Matth. lancea modo, vnde illi nomē, striata, neruosaq., humi accubantia: caules, flores, semina, ac etiam radices mediæ plantaginis, omnino similia.

LOCVS.

Nascitur locis incultis, ac ferè vbique.

QUALITATES,
ET VIRES.

Non differt facultatibus, & Idem, viribus ab alijs generibus, nisi quòd minus humidas qualitates habet.



R 4 PLANTA-

PLANTAGO aquatica ita recentioribus appellata, Græcis, incognita. Offi-
cinis, *Barbasyluana*. Italis, *Piantagine aquatica*.

PLANTAGO AQUATICA.

F O R M A.

Matth.

Folij est hæc Planta, cæte-
ris crassioribus, carnosiori-
bus, robustioribus, ac læuio-
ribus ex lata origine in acu-
tū desinentibus, lanceæ cuspi-
dis modo, caulem gerit cubi-
to longiorem, ramosum, vbi-
que flosculis candidis refer-
tum, radicibus nititur nume-
rosis, albicantibus, ellebori
modo.



L O C V S.

Idem.

Nascitur tantum in aque-
sis, & palustribus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.*Matth.*

Cum neminem antiquo-
rum habeam, neq; apud Græ-
cos, neque apud Mauritanos,
aut Latinos, qui huius Plan-
tæ meminerit, nec de eius vi-
ribus aliquid scriptum reli-
querit, nihil sanè habeo, quod de eius viribus tuto in medium afferre possim.

C E N S V R A.

Idem.

Non desunt, qui hanc Plantam Damosonium, siue Alysiam esse autument.
Atqui proculdubio falluntur.

SIVM

Sium Græcis, *Σίον*. Mauritanis, *Rocathalmi*, & *Inhamanella*, seu *Hamehanella*. Italis, *Sio*, & *Gorgolestro*. Germanis, *Wassermerck*. Hispanis, *Rabacas*. Gallis, *Berle*.

S I U M V E R V M.



F O R M A.

Sium, caule exit recto, ex- *Matth.* panis folijs, per ambitum ferratis, myrrio similibus, sed minoribus, & odoratis: umbellas profert in summis caulibus, floribus albis, semine odorato, aniso non dissimili.

L O C V S.

In scaturientium fontium *Gal. li. 6.* riis, quorum aqua hyeme *simp. me.* calent, æstate vero frigent, plurimum nascitur, fere semper una cum Sifymbrio aquatico.

Q U A L I T A T E S.

Quantum gustu Sium o- *Gal. li. 1.* doratum est, tantum etiam *simp. me.* excalfacientis facultatis est *Diosc.* particeps. Cruda folia co- *Matth.* ctave esu, calculos rumpunt, atque excernunt, urinas ci-

ent, menses, & partus extrahunt, dysentericis in cibo auxiliantur. Hepatis obstructions quoque expedit, universa planta decoctum potum, auriginem tollit, hydropicos iuvat. idem, aut ipsa herba deuorata, visum acuit.

C E N S V R A.

Errant, qui Plinium secuti, aquaticum Sifymbrium Sium esse censent.

R s S I U M

SIVM vulgare. Italis, *Sio falso*.

FORMA.

Matth. Caulem edit striatum, ramosum, inanem, tenerum, fragilemque: folia gerit apij, non insuavia, flosculos in summitate albos, semine corniculis incluso, paruo, minutoque: radice superuacua.

LOCVS.

Idem. Prouenit tantum in aquis decurrentibus, perinde ac Sium verum.

FACULTATES,
ET VIRES.

Idem. Excalfacientis est facultatis, quæ tamen imbecillior illi est, quàm legitimo Sio.

SIVM VVLGARE.



SISYMBRIVM

N O M I N A.

267

SISYMBRIUM sativum, siue hortense, Græcis, Σισυμβριον ἡνθες. Italis, Sismbro domestico, Balsamita, seu mentha cresta. Germanis, Ragenbalsam.

SISYMBRIUM HORTENSE.



G E N E R A.

Trium est generum. Hortense, Sylvestre, Aquaticum.

F O R M A H O R T E N S I S.

Folia profert circinnata, vulgaris menthae latiora, rotundioraq; crispa tamē: caulem edit quadrangulū, & flores spicatos: folia menthae acriora, odoratioraq;.

L O C U S.

Seritur in hortis ferē omni- bus.

Q U A L I T A T E S.

Tenuium est partium, calfaciens, & exiccans in fine secundi ordinis, aut in principio tertij: attenuat, digerit, resoluit, aperit, incidit, & provocat.

V I R E S.

Flatus, & lumbricos pellit, tum herba ipsa in puluerem trita, tum eius decoctum po-

tum: valet ad vteri inflationes, si vnā cum parthenio in calenti tegula calefactum, & odorato meraco aspersum, imo venter applicetur: valentius quoq; vterinis doloribus puerperarum subuenit, si cum parthenio, artemisia, & anthemidis floribus, tenuiter concisum: tribus aut quatuor ouis excipiat, & deinde in patella cum oleo lilino ad ignem fiat placenta, & calida venter medio applicetur. Illinitur tam recens, quā siccum calefactum, & Cretico vino aspersum, cœliacis, & ventriculi doloribus à flatu prouenientibus. Succus testibus illitus, nocturnas pollutiones cohibet.

S I S Y M -

SISYMBRIVM sylvestre, Græcis, Σισυμβριον ἄγριον. Italis, Sifembro salustico. Arabibus, Sifnabarion, seu Sifnabar.

SISYMBRIVM
SYLVESTRE.

FORMA.

DIOSC. Prouenit menthæ hortensis similitudine, odoratius tamen, & folio latiore: caule quadrāgulari, radicibus longè vagantibus, tenuibus, villosis.

Matth.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur inculto solo.

QUALITATES.

Gal.li.8. Tenuium est partium, digerentis, excalfacientis, exiccantis facultatis, & temperaturæ in tertio ordine. sed & semen eius tenuium partium est, & calidum.

fimp. me.

VIRES.

DIOSC. Bibitur semen eius contra stillicidia vrinæ, calculosque: idem tormina, & singultus sedat: folia in capitis dolore à pituita genito, fronti aut temporibus illinuntur. Item contra vesparum, apiumq; ictus, vomitiones potu quoq; cohibet.



SISYM-

SISYMBRIVM aquaticum, Græcis, Σισυμβριον ἑρῆρον. Officinis, & Barbaris, Senetion. Italis, Crescione. Germanis, Brunnfressen/ seu Wasserfressen. Hispanis, Berros, aut Agriris. Gallis, Creffon.

SISYMBRIVM AQUA-
TICVM.



FORMA.

Folia promit primum ro- DIOSC.
tunda, adulta erucæ modo
finduntur.

LOCVS.

Riguis gaudet, & ijsdem Idem.
locis, quibus Sium.

QUALITATES.

Nasturtio simile quiddam Gal.li. s.
gustu præfert: cum siccum est, simp.me.
tertij enim est ordinis excal-
facientium, & desiccantium:
cum verò humidum est, & vi-
ride, secundi.

VIREs.

Vrinas mouet: esturctu- DIOSC.
dum. purgat lentigines, cu-
tisque vitia in facie, noctibus
impositum, matutinisq; de-
tractum. Cum raphano om- Matth.
ni, & petroselini radicibus
sectum, & ex albo meraco,

& butyro calefactum, calidumq; pubi admodum vrinas educit, ac trahit. Sin-
cipiti illitus veterinosos iuuat, & præsertim foliorum succus.

SISYMBRIVM

SISYMBRIVM aquaticum minus, Italis, *Crescione minore.*

SISYMBRIVM AQUATICUM ALTERVM.

F O R M A.

Matth. Folia, & caules edit longè minores, ramulis numerosis: floribus pusillis, tenuibus albicantibus, in cacumine tantum cernantibus.

L O C V S.

Idem. Non solum in riguis, & aquosis provenit, sed etiam in hortis, & secus itinera.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Imbecillius est altero: namque minus excalfacit, & siccatur: ubi verò alterum non sit ad manus, hoc uti præstabit.



*COCHLE-

* COCHLEARIA. Germanis, *Esselkraut*.

COCHLEARIA.



FORMA.

Herbula est non alta, folijs prædita multis, splendentibus, latiusculis pinguibus, concavis, cochlearia parua referentibus, interdum nonnihil angulosis, in petiolis è radice simul enatis, ex horum medio surgunt caules dodrantes, quibus flosculi albi secundum longitudinem adnascuntur: semina subruffa Nasturtij valvulis clauduntur, radices pusillæ fibrosæ, gustu acri.

LOCVS.

Prouenit sponte in Frisia, Hollandia & in maritimis inferioris Germaniæ, Item circa Hamburgum & alibi locis palustribus & riguis. Ex semine Hortis quoque familiaris redditur.

QUALITATES.

Calida est & sicca vt virens Nasturtium.

VIRES.

Scorbuto medetur in acetarijs vsurpata, aut cum lacte vinoue cocta & sæpius continuèq; bibita.*

CRITHMVM.

CRITHMUM, Græcis, Κριθμὸν. Italis, Crithmo, Finocchio marino, & herba di San Piero. Germanis, Bacillen / & Meer Fenchel. Hispanis, Perexil de la mar, & Vnhas de agnula yerua. Gallis, Bafille, & Fenoil marin.

GENERA.

Matth. Quatuor habetur genera, quorum tria Marina sunt, & quartum terrestre.

FORMA PRIMI.

Diosc. Planta est fruticosa, & vndique foliosa, cubiti altitudinem ferè petens, folijs pinguibus, Portulacæ ferè modo, sed longioribus, latioribus, numerosis, albicantibus, ternis ex vno petiolo dependentibus, falso gustu, flores in umbellis quandoque candidi quandoq; lutei spectantur, è quibus semē oritur, ceu Rosmarini, odoratum, molle, rotundū, in quo nucleus tritici effigie, radices fundit tres, aut quatuor, digiti crassitudine, odoris grati, & iucundi.

LOCVS.

Diosc. Nascitur in maritimis, petrosi locis. Scopulis, & rupibus, in ipsis maris littoribus.

FACULTATES.

Gal. 6. Gustantibus salsum quodammodo est, cum paucula amaritate, quam obrem simp. me. facultas illi est, tum exiccandi, tum abstergeri: vtraque tamen in eo est imbecillior, quàm in amaris.


VIREs.

Diosc. Radix, semen, & folia in cocta vino, potu urinæ difficultati, & regio morbo auxiliantur, menses cient, & aluum citant, semen ex vino potum, status pellit.

CENSURA.

Qui credunt Crithamum marinum, esse Empetron, manifesto errore cecutiunt.

CRITHMUM I.




NOMINA.

CRITHMVM secundum. Italis, *Crithamo* secundo.

CRITHMVM II.

273

FORMA.



Non valde differt à primo, *Matth.*
nisi quod folijs est angustiori-
bus, mucronatis, atque pun-
gentibus, salso, amariuscule,
& acuto sapore: caulibus verò
pragnatiorib^{us}, succosioribus,
vegetioribusque, in quorum
caccumine ramuli exeunt bi-
ni, terni, quaternive, suas sin-
guli umbellas ferentes, albis
flosculis refertas, è quibus se-
men oritur sceniculo quadan-
tenus simile, cui radicem quo-
que non absimilem habet.

LOCVS.

Isdem prouenit locis in *Idem.*
maris littoribus.

FACULTATES
ET VIREs.

Ea omnia prestare potest, *Idem.*
quæ primum Crithmi ge-
nus, nisi quodd vim aliquam in-
cisuam habere videtur.

S CRITH-

CRITHMUM tertium, vitriaria, Italis, *Crithamoter* 70.

CRITHMUM III.

FORMA.

Matth.

Planta est fruticosa, plures ab vna radice emittens caules, rectos, circa quos totos folia habentur, per intervalla, plura ex vna origine gregatim prodeuntia, longiuscula, crassa, & salso etiam gustu: sub horum exortu peculiare quoddam erumpit foliū cæteris duplo longius, è quo propè caulis cauitatem petiolus exit, ex quo sex septemve folia breviora produntur. flores fert in cacumine orbiculatos, villosq; pallido colore, radice nititur longa, tereti, non sine adnatis.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in littore Maris, locis planis, non cliuosis.



FACULTATES ET VIRES.

Idem.

Ea omnia potest, quibus pollere cætera genera diximus.

CENSURA.

Matth.

Subscribam ego illis nunquam, qui hanc quoque plantam Empetron nominant.

CRITH-

CRITHMVM quartum. Italis, *Crithamo terrestre*. Germanis, *Sichelkraut*/Si-
cheldren.

CRITHMVM IIII.



FORMA.

Folijs prouenit longis, angustis, firmis, ternis ex vno petiolo, ipsoq; lōgo prodeuntibus, vtrinque denticulatis, falcis frumentariae modō. Cæterum quæ in caulium summis partibus habentur, minora, breuioraque sunt. caulem gerit ramosum, alis concauum, geniculatumq;: in cuius summitate ramuli exeunt diuulsi, in quibus floridæ, albican-tesque sunt umbellæ, quæ postremò semen oblongum, acre, & odoratum mittunt: tota planta gustu saluginoso percipitur, atque amariuscule, vt cætera Crithami genera, quanquam non adeo vehemēti. Radice cohaeret pastinacæ maiore gustanti dulce, atque subacri, odorata.

FORMA.

Nascitur copiosa in Boemia in agro Pragensi, non solum inter segetes, sed in agrorum marginibus, ac etiam alijs in regionibus.

QUALITATES ET VIRES.

Aperit, digerit, exalfacit, siccit, & mediocriter incidit.

CORONOPVS, Græcis, *Kogorbeous*. Italis, *Herba stella*. Germanis, *Kraenfuß*. Hispanis, *Gniabelba*. Gallis, *Corn de Cerf, sine Sanguinaire*.

CORONOPVS.

GENERA.

Matth. Duo cius habentur genera domesticum & sylvestre.

FORMA.

Matth. Domesticum folia fert longa, angusta, per interualla corniculata, crassiuscula, humi accubantia: & in stellæ modum radiantia, caulem, spicam, florem, & semengerit per omnia Plantagini similia, nulla intercedente differentia. Nititur vnica tantum radice, numerosis tamen adnatis capillamentis: foliorum sapor Plantaginis omnino est, quo fit, vt crediderim Coronopum eiusdem esse generis.

Locys.

Diosc. Seritur passim in hortis, nasciturque sponte in aggeribus, locis incultis, & secus vias.

FACULTATES, ET VIRES.

Diosc. Ipsdem pollet viribus, quibus Plantaginem pollere diximus, peculiariter tamen radix cœliacis auxiliatur.

CENSURA.

Qui Capriolam seu sanguinellam vulgo vocatam Coronopum esse censent, manifesto errore ducuntur, quemadmodum & ij qui ranunculum Coronopum faciunt.

CORO.



CORONOPVS sylvestris, Italis, *Herba stella saluatica*, at peculiariter Goritien-
bus, *Serpentina* vocatur.

CORONOPVS SYLVESTRIS.



FORMA.

Folia fert tenuioria, capil- *Matth.*
laceaque, rariusculè corni-
culata, humi accubantia: cau-
libus, spicis, floribus, semi-
ne, hortensi similibus, sed
longè tenuioribus.

LOCVS.

Prouenit in Goritienfi a-
gro diluto, extenuatoque so- *Idem.*
lo, non longè à Sontij flumi-
nis ripis, & alijs etiam in a-
gris.

FACULTATES, ET
VIRE.

Radix ex vino pota viperar-
um, aliorumque venenosor-
um animalium moribus, *Idem.*
mirificè auxiliatur, ita vt ipsa
sola liberet demorsos, præfe-
runt eam quoque ad hydro-
pem, quam Anasarcam vo-
cant, epoto apozemate plu-
ribus diebus, in quo radix
conferbuerit.

S 3

SON-

SONCHVS, Græcis, Σόνχος. Italis. Soncho, Cicerbita, seu Crespine. Germanis, Wilder Hasenföhl, siue Gänse distel. Hispanis, Serraya, & Serralba. Gallis, Laiteron, & Palais au lieure.

SONCHVS.

GENERA.

Matth. Duo sonchi habentur genera: sylvestris, siue aspera, & leuiss, cuius duæ etiam sunt species.

FORMA PRIMI.

Idem. Folia profert Cichorij modo per ambitum laciniata, crispas, aspera, aculeata, & subrubentia. Caulem gerit cubitalem, inanem, fragilem, lacte pregnantem, ac etiam quandoq; subruscenscentem: flores in summis caulibus melinos, Senecioni haud absimiles, qui deinde in pappos euanescent.

LOCVS.

Idem. Pronenit in agris incultis, in vineis, in hortis, & secus itinera.

QUALITATES.

Gal. lib. 8. Temperamentum eius quoddammodo mistum est: constat enim ex aqua, terreaq; essentia, vtraq; leuiter frigida, & est etiam adstrictionis cuiusdam particeps.



VIRES.

Diosc. Illinitur vtiliter aestuanti ventriculo, ac eius inflammationibus. Sorbetur quoque eius succus ad stomachi rosiones: lac elicit: in vellere suppositus, sedis, ac vuluæ collectionibus opitulatur. Tam herba, quam radix illita vibratis à scorpione ictibus subuenit. Soncho vtuntur Itali in acetarijs, & præsertim eius radicibus, quæ cum teneræ sint, & dulces, frequenter hyeme mensis expetuntur. In vino decoctus stomachi fluxionibus medetur, lacteus eius succus potus suspiriosos, & asthmaticos iuuat. idem auribus instillatus, earum dolores mulcet, & præsertim in malicorio cum oleo decoctus: stranguriam quoque sanat vnciarum pondere potus, commanducata folia, oris graueolentiam tollunt.

SON-

SONCHVS lævis, Italis, Cicerbita gentile.

SONCHVS LÆVIS.



GENERA.

Duo habentur genera, quæ Matth. tantum folijs aliquatenus differunt.

FORMA.

Alterum læuioribus habetur folijs, minus quoque lacinjatis, & magis extensis, cætera verò (demptis aculeis) sylvestri similia spectantur.

LOCVS.

Nascitur in hortis, invineis, Idem. & locis incultis.

QUALITATES ET VIRES.

Non differt à primo genere, siccis in facultatibus.

S 4

SON-

SONCHVS lævis altera. Italis, *Cicerbita gentile seconda*.

SONCHVS. LÆVIS. ALTERA.

FACULTATES
ET VIRES.

Huc referas quæ de alijs.
generibus dicta sunt.



*SON-

NOMINA.

281

*SONCHVS. Flore Caruleo. Sonchocichorium.

SONCHVS. CERVLEVS.

FORMA.



Amara est herba, bicubitali caule valde hirsuto pilis rigidis, non tamen pungentibus, rubicundis. Folia sonchi habet lactescencia, sed flores Cichorij à caruleo ad purpureum inclinantes, interdum etiam magis caruleos plures in caulis summitate confectos, Radix crassa & valde intricata est, ac multas veterum caulium reliquias ostendit, telluri tenacissime inhærens.

Locvs.

Amat loca opaca in Austria frequens & alibi circa alpes.*

S 5 INTV-

INTYBUS. Græcis, *Σέλις*. Mauritanis, *Dumbebe*, *Aundebe*, seu *Endeba*. Italis, *Endiua*. Germanis, *Endiuen*. Hispanis, *Endiua*. Gallis, *Endiue*.

G E N E R A.

INTYBUS MAIOR.

Diosc. Duo eius habentur genera, altera quidem hortensis, altera sylvestris. Hortensis itē duæ habentur species, altera maior, altera minor, quam seriolam maiorem, siue (ut officinæ) scariolam vocant. Quin etiam sylvestris duæ species, quarum alterā scariolā minorem, siue Cichoriū sativum, alterā quidē sylvestre Cichorium, & pocrin, ab amaritudine vocant.

Matth.

F O R M A.

Matth. Hortensis maior, folijs provenit latioribus, lactuce similib⁹, caule bicubitali brachiato: floribus caeruleis, Cichorij similib⁹, semine parvo, oblongoq³. Unica nititur radice, ipsaq³ villosa. * Minor foliagerit longiora & angustiora, caules quoque tenuiores, cætera maiori similis est. *

L O C U S.

Idem. Seritur passim in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 8. Domestica magis quam asimp. me. gressis refrigerat. Sed & humiditatis multæ admistio siccitatem extinguit, verum adstringentis qualitatis est particeps, subfrigida est, & subamara, ac moderatè adstringens, corroborat, abstergitque.

V I R E S.

Diosc. Stomacho utilissima est: cocta aluum sistit, si cum aceto edatur. Cardiacis ex hordei farina utiliter illinitur. Quin etiam podagris, & oculorum inflammationibus. Herba cum radice illita, ictis à scorpione subvenit: igni sacro cum farina hordeacea medetur. Succus cum cerusa, & aceto additur utiliter frigidis illitionibus. Verum enimvero vis eius magna quidem est ad calidos iocinoris morbos, oscula venarum eius extergit, & præsertim eius cum radice decoctum. Estur passim cruda, coctave in acetarijs.

Matth.

INTY-



NOMINA.

223

INTVBVS crispa, Italis, *Endivia crispa*.

INTVBVS CRISPA.



FORMA.

Recensetur, & hæc inter *Matth.* maiora intubi genera, siquidem amplo, foliosoque cespite provenit, folijs magnis, sed in ambitu ubique crispis, ac fimbriatis, caule cæteris maiore: reliqua cum alijs paria sunt.

LOCVS.

Seritur in hortis ab olitoribus, quod admodum in acetarijs in cœnis placeat. *Idem.*

QUALITATES ET VIRES.

Eadem omnia potest, quæ *Idem.* de hortensibus intubis superius dicta sunt.

INTV-

INTUBVS sylvestris, Græcis, *Σέβας ἀγρία ἡμερος*. Hetruscis, *Tornasole*. Italis cæteris, *Cichoria domestica*. Germanis, *Wegweisse/Wegwurz*. Hispanis, *Almerones*, & *Cichoria*. Gallis, *Cichorea*. Officinis, *Scariola minor*.

CICHORIVM.

GENERA.

Duum est generum, Picris sylvestrior, & Satiua, latioribus folijs, & origrator, minusque amara.

FORMA.

Satiua folijs exit minori satiuoque Intubo similibus, angustioribus tamen atque brevioribus: minusque per ambitum lacinitatis, sed caule, & flore similibus. Radicem habet pedali longitudine, alba intus pulpa, teneram, & subamaram.

LOCVS.

Scritur passim in hortis.

QUALITATES ET VIRES.

Eadem omnia potest, quæ domestica Intubus: Ea tamen siccior est, & magis ex-tergens.



SVL-

SYLVESTRIS Intubus, Græcis, Κρηόριον ἀγρίον. Italis, Cichoria saluatica. Germanis, Wilde Wegwurtz.

INTUBVS SYLVESTRIS.



FORMA.

Folia fert longa, sonchia-
speræ modo incisa & in sum-
mitate sagittæ instar acumi-
nata: rubea per mediũ excur-
rẽte costa, amaro sapore: cau-
lis est illi durus, atq; lignosus,
flores à ceteris generib. haud
ab similes, quemadmodum
& semen: Radice nititur do-
mesticæ duriore, amarioreq;.

LOCVS.

Nascitur in agris incultis, Idem.
in pratis, & secus itinera.

QUALITATES.

Olus est subamarũ, ob id- Gal. lib. 3.
que picrida ipsum quidã nun- sim. me.
cupant: est autem ea frigida,
siccaq; temperatura, vtraq;
secundo excessu, & adstrin-
gẽtis qualitatũ est particeps.

VIRES.

Isdem pollet viribus, quib. cætera genera pollere diximus: verũ cum plus
amaritudinis habeat, magis quoque abstergit.

CENSURA.

Tiresia caciore sunt, qui Hieracium, & sylvestrem lactucam Intubum syl-
vestrem faciunt.

DENS:

DENS leonis, Græcis, præsertimq; Theophrasto, *ἀπόργα*. Italis, Dente di cane, & *Piscia alletto*. Germanis, *Pfaffenblatt* & *Münichstoppf*. Officinis, *Taraxacon* & *caput monachi*, ac nonnullis *Rostrum porcinum*, & *Ambubeia*.

DENS LEONIS.

FORMA.

Matth.

E terra prodit ipso statim Veris initio, folijs cichoraceis, frequenter laciniatis in sagittæ modum desinentibus, humi accubantibus, caule spitamæ magnitudine, rotundo, glabro, subrubente, intus concauo, lacteo succo prægnante, flores gerit luteos, foliososque, quibus decidentibus, subcrefcit papposum caput. Radicem habet Cichorio proximam, lacteo succo plenam, sed longè amariorem.

LOCVS.

Idem.

Prouenit in hortis, in campis, prope sepes, & in ruinosis ædificiorum muris, quin etiam in vineis, pratis, & viridarijs.

FACULTATES.

Idem.

Adstringit, roborat, atque abstergit, magis quàm vtrunque Cichorium.

VIRES.

Idem.

Cocta, stomachum dissolutum adstringit, cruda verò aluum sistit. eadem dysentericis auxiliatur, sed magis cum lente decocta. Succus potus prodest, quibus genitura effluit. in aceto decocta, urinæ tormina discutit. Vniuersæ plantæ decoctum potum Ictericam tollit.

ZACIN-



NOMINA.

ZACINTHA, Italis, *Cichoria verrucaria*.
CICHORIUM VERRUCARIUM,
SIVE ZAZINTHA.



FORMA.

Folia profert Cichorij, a-*Matth.*
superiora tamen, ac minus la-
ciniata. Caules edit cubita-
les, & quandoq; maiores, te-
nues, asperiusculosque, in
quorum cacumine flores
spectantur aurei cichoracea
specie, quibus flaccescenti-
bus semen remanet subni-
grū, capituli instar, circum-
quaque secundum longitu-
dinem secti, striati, radice
niritur rapunculi æmula, te-
nuibus adnatis circumquaq;
fibris.

LOCVS.

Prouenit in campestribus, *Matth.*
& à nonnullis quoque seri-
tur in hortis, & fœtilibus in
medicum vsum.

QUALITATES ET VIRES.

Mira huius plantæ facul- *Idem.*
tas est ad tollendas verru-
cas, siquidem scimus nonnullos, quorum manus verrucis admodum nume-
rosis scatebant, sanatos esse, deuoratis in acetario semel tantum huiusce plan-
tæ folijs. Idem præstat eius semen tribus diebus drachmæ pondere à cœna po-
tum, dum se cubitum recipiunt verrucosi.

CYANVS

CYANVS maior, Græcis, *Klavyos*. Italis, *Fior Campefe*, *fior Aliso*, & *Battifucera*. Germanis, *Kornblum*. Officinis, *Batiscula*.

CYANVS MAIOR.

GENERA.

Matth. Duum est generum, maius, & minus.

FORMA MAIORIS.

Idem. Maius latioribus prouenit folijs, albicantibus, tomentosis, & nulla in parte diuisis. vegetiores quoq; habet caules, albicantiores, breuiiores tamen, & flores longè maiores, & patentiores quàm minor. Flos cyaneus, ceruleusve spectatur, foliosus, & in cristæ modum extremis oris laciniaius, calyculis, è quibus prodit, squamosis, ac subasperis.

LOCVS.

Idem. Prouenit in montibus frequentius, quàm in campestribus.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem. Huiusce plantæ vires nullus antiquorum, quod sciuerim, scriptis mandauit, non desunt tamen recentiores, qui putent Cyanum propria dore pestilentibus morbis aduersari: maioris puluis datur vtiliter ab alto deuolutis, & sanguinem reijcientibus, ex aqua Plantaginis, aut portulacæ, aut maioris Symphyti, aut equiseti. succus illitus recentia vulnera glutinat, & oris vlcera sanat.

CYANVS



CYANVS minor, perinde ac maior, tam Græcis, quàm Italis, & Germanis vocantur.

CYANVS MINOR.

F O R M A.

Folijs exit longis, pilosis, *Matth.* albicantibus, barbulis quibusdam dissectis, caules edit plures, bicubitales, lanuginososq; minoribus repletos folijs: flores in cacumine profert cæruleos, in ambitu crenatos, squaroso è calyce prodeuntes.

L O C V S.

Nascitur in campis inter *Idem.* segetes, & floret Maio, & Iunio mensibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Ea omnia præstare potest, *Idem.* etiam valentius, quæ de maiori dicta sunt, peculiariter tamen huiusce folia, ac pariter semen ex vino decocta, & hausta, auxiliantur à scorpione, phalangioque iētis, quin & pernecabiles febres.

T C O N -



CONDRILLA, Græcis, *γάρδιον*. Arabicis, *Candavel*, *Cadaron*, & *Amiron*. Italis, *Condrilla*, & *Terracrepolo*, Hispanis, *Lentugas*, & *Leichugas* dentre los planos. Gal-
lis, *Lehteren*.

CONDRILLA.

GENERA.

Matth. Duo eius habentur gene-
ra, foliorum diuersitate diffe-
rentia.

FORMA PRIMÆ.

Diosc. Prima, quæ quidem Cicho-
Matth. rij species est, caulem, florem,
& folia habet Cichorio simi-
lia: verum planta tenuior tota
est, in cuius ramulis gummi a-
liquando inueniri solet masti-
ches similitimum: radice nititur
Cichorio breuiore, & lacteo
succo pregnante.

LOCVS.

Matth. Nascitur in agris non cul-
tis, & secus itinera, atq; etiam
in pratis.

FACULTATES.

Gal. 8. Non differt ab alijs Cicho-
simp. me. raceis suis in facultatibus.

VIRE S.

Diosc. Tufacum radicibus herba, melleq; excepta, & admisto quoq; nitro, vitiligi-
nes illitu emaculant, gummi quod ab ea refudat subpositum fæminarum men-
ses trahit, pilos inordinatos replicat. Quod item tenera radix efficit, ubi acus
succo intincta pilis admoueat: ex vino pota, viperarum moribus auxiliatur:
succus decoctæ in vino, aut per sese potus aluum sistit.

CHON-



NOMINA.

291

CHONDRILLA altera, Græcis χονδρίλλη ἑτέρα. Italis, Chondrilla secunda.

CHONDRILLA ALTERA.

FORMA.

Folia fert oblonga, circum Dios-
rosa, humi sparsa: caulem la-
cto succo madentem: radice
tenui, rotunda, lævi, vegeta,
flavescente, succosa.

LOCVS.

Nascitur in latis, & cultis Idem,
locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Caules, & folia cōeoquen- Gal.
divim habent, succus incom- Diosc.
modos palpebrarum pilos re-
fleat.



T 2

CYCVA-

CUCURBITA, Græcis, Κολοκυνθα ἐδωδιμῶ. appellatur Arabibus, *Hraba*, *Ham*, seu *Carba*. Ital. *Zucca*. Ger. *Kürbis*. Hisp. *Calabassa*. Gall. *Courge*, *Courle*, sine *cause*.

G E N E R A.

Matth. Cucurbitę tria recensentur genera, nempe longa, rotunda, & sessilis.

F O R M A.

Idem. Hederaceis virefcit folijs, sed amplis & subcandicantibus: flagellis farmētosis, angulosisq; humi repentibus, verū ubi adminiculū nacla fuerit, illud facile clauiculis comprehendit, quibus arbores, & pergulas scandit, & ijs sese implicat. flores profert albos, grādioreq; & in stellæ ferē modū diuisos, verū nō omnes frugiferi sunt. Frugiferi. n. facile noscuntur ex conceptu sub ipsis extuberante, fructus edit magnos, q quidem in vno genere longi, in altero rotūdi, & in altero sessiles visuntur, verū omnes in magnam extuberant molem.

L O C V S.

Idem. Seruntur passim in hortis, & circa sepimenta.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 3. Cucurbita humidæ, frigidaq; temperaturæ est, vtraq; qualitate secundi ordinis.

V I R E S.

Diosc. Illita cruda, tumores, & abscessus mitigat. Ramenta eius illinuntur vtiliter sinepiti infantibus, contra capitis ardorem, quem syriacum vocant, oculorum inflammationes, podagrasq; refrigerant. succus è ramentis per se, aut cum rosaceo infusus, autium doloribus auxiliatur. adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuvat. Totius seruefactæ, & expressæ cremor, cum melle exiguo, & nitro potus, aluum leniter soluit. Vinum in cucurbitam recentem excauatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potum aluum læuigat. Folia recentia iumentis illita, affrictaq; muscas abigunt. eadem mammis puerperarum admota lac siccant. oleum, quod è cucurbitarum floribus paratur, ijs in eo diutius insolis, renum calores inunctum extinguit, & capitis dolores, præsertim in febribus mulcet: aridæ cinis ambusta, & pudendorum vlcera sanat. Estur passim çstate in cibis cum iusculis elixa, tum quoq; in oleo, aut butyro sfxa, farina prius circumlita, & acerbę vuæ succo aspersa.

CUCUR-



CUCURBITA Indica, Italis, Zucche Indiane, oltra marine.

CUCURBITA INDICA.

GENERA ET
FORMA.

Varia huiusce cucurbitæ *Matth.* habentur genera, magnitudine, facie, & colore differentia. Referunt tamen omnes melopeponum effigiem, sed alia magnæ, imo maximæ, ventricoseq; alia parvæ, alię mediocres, & alia oblongæ, alia rotundæ, alia vario colore spectantur: folijs nostratibus longè maioribus, firmioribusq; asperis vitigineis, & rigenti petiolo adnexis, samenta illi crassa, angulosa, aspera, hirsutaq;. Ea humi serpunt, longo admodum tractu, atque etiam scandunt, & pergulas, & attegias opacant, flores edit magnos, lilij ferè effigie, aureo colore. Semen in ventre gerunt magnum, album, in quo nucleus concluditur dulcis, & suavis, sapor fructibus subdulcis, non ut nostratibus vsq; adeo insipidus.

LOCVS.

Planta est peregrina ex Indijs, & alijs fortasse longinquis regionibus ad nos *Idem.* allata, sed iam diu Italico solo proueniunt.

QUALITATES, ET VIRES.

Cum subdulci sint sapore, crediderim has primo excessu refrigerare, & hu- *Idem.* medare secundo.

T,

CUCV-

CUCUMIS sativus, Græcis, *Σίκυς ἡμαρ*. Arabicis, *Chathe*, seu *Chethete*. Ital. *Cocomero*. Hetruscis, *Cedrulo*. Ger. *Cucumern*. Hisp. *Cogombro*. Gall. *Cocombre*.

GENERA.

CUCUMIS SATIVVS.

Matth. Duo habentur genera vnū Citrei mali figura, alterum lōgum anguium formam referens.

FORMA.

Idem. Planta est sarmentosa, humi repēs, folijs vitigineis, asperis, scabrisq; flagellis pariter scabris, atq; rigentib; flores edit melinos, fructu sub ipsis extuberāte, qui tandē in longū protensus citrei mali modo viridi primū fit colore, & dum maturefcit flauo cortice verrucis scatente.

LOCVS.

Idem. Seritur passim ab olitoribus in hortis.

QUALITATES.

Gal. lib. 8. Cucumis esculentus, maturus quidē tenuioris est essentię, qui verō immaturus est, crassioris: ambo tamen, abstergendi facultate participant, superat in eis humida, frigidaq; tēperies, non tamen magnopere, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis, aut semen, aut radicem arefaciat, haud etiā humidæ fuerint naturæ, sed iam deficcantis, idq; in primo quodammodo ordine, aut in secundo incipiente, est & in istis maior abstergendi facultas, quā in fructus ipsius carne.


VIREs.

Diosc. Prodest vesicæ morbis: olfactu deliquio animi affectos reuocat. semen vrinam mouet, & cum lacte, aut passlo, vesicæ exulcerationibus subuenit. illita cum vino folia morsus canum sanant, epinyctidas cum melle. Veniunt frequenter, in cibis crudi, sed prauos generant succos, nam etsi nonnulli cucumeres rectē concoquant in ventriculo, dum tamen in hoc fissi assiatim ijs se replent, temporis tractu gelidum, & vtcunque crassum humorem in venis acervant, qui non facile in probum sanguinem conueri potest: proinde abstinere ab illis consulerimus: etiam enim, sensimq; post longum tempus prauus in venis succus ex ipsis accumulatur, qui vel leuicula putredinis arrepta occasione, febres saeuissimas, & mire contumaces excitabit.

CENSURA.

Non est eorum admittenda opinio, qui vulgarem cucumin peponem esse contendunt.

CUCUMIS



CUCUMIS longus, Italis, Cocomero serpentino. Hetruscis, Cedruolo longo.

CUCUMIS LONGVS.

FORMA.

Non differt tota sua facie ab *Matth.* altero, nisi in fructu, qui longus est, & serpentis modo curuus, strijs per longitudinem protensis.

LOCVS.

Scratur in hortis, & præfer- *Idem.* tim in Apulia.

QUALITATES, ET
VIRE.

Eadem illi sunt facultates, *Idem.* quæ alteri.



PEPON, Græcis Πέπων. Mauritanis, Batecha, seu Bathiecha. Italis, Mellone. Herufcis, Popone. Germanis, Melon. Hispanis, Melon. Gallis, Melons.

FORMA.

PEPON.

Matth.

Serpit Peponum, & Melo-peponum planta lōgis, ac viticulosiſſis ſarmētis, cucumeris modo, folijs vitigineis, minoribus tamē incifuris, ſcabris, hirsutisq; floribus luteis, fructu grādi, humani capitis inſtar, & ſæpe maiori, cortice cartilagineo. Sed non omnibus idem eſt color. Namq; alij herbaceo ſunt colore, alij pallido, nonnulli flauo, quidā albo, pleriq; cinereo. Sunt etiam qui tota cute textura quadam reticulari magno naturæ artificio, pueniant. Striati ferè ſunt omnes, Toris ſecundum longitudinē circumqua; prominentib. Interna pulpa guſtatu ſuauiſ eſt, verſi color tamen, in altero. n. genere rubet, in altero albicat, aut in albo ruſceſcit. Qui præſtant (plurimi ſunt, qui nulla cōmendantur gratia) præter odoris incunditatē, dulces, & ſuaues ſunt: Semē intus ingerunt copioſum, oblongum, nucleo intus dulci, albo contectum putamine.

LOCVS.

Idem.

Gaudent læto, & aprico ſolo, ac etiam libertate, quā poſſint vltro vagari: ſeruntur in hortis, & agris.

Gal. 3.

QUALITATES.

ſimp. me.

Vniuerſa Peponum natura frigidior, cum largā humiditate exiſtit, ſed habent quoq; quantā abſtergendi vim: atqui melopepones minus humidi, quā pepones ſunt.

VIRE.

Diosc.

Peponis pulpa in cibis ſumpta, vrinam ciet, & inflammationes oculorū illita ſedat: ramenta eius ſincipiti admodum ſyriaſin infantium tollit, & oculorū fluxiones auertit. ſuccus cum ſemine, farina exceptus, & in ſole ſecatus, cogitur in ſinegmata, quæ faciem repurgant: radix ſicca ex hydromelite pota drachmæ pondere vomitiones mouet. Gignit pepo in corpore vitioſum humorem, poſſiſimè, quando non probe coctum fuerit, tum verò morbum etiam, qui chole-
CENS VRA.

Gal.

Errant toto cælo, qui pepones vulgares Cucumeres faciunt.

ANGV-



ANGVRIA, Arabibus, *Dullaba*. Italis, *Anguria*. Hetruscis, *Cocomero*. Germanis, *Erdöpfel*. Hispanis, *Cogombro*. Gallis, *Cocombres*.

ANGVRIA.

FORMA.



Folia promit Colocynthi- *Matth.*
dis medicamentosa maiora,
aspera, & per ambitum diuisa.
Caules sarmentosos humi re-
pentes, melopeponis modo.
Flores edit aureos: & fructus
mirum in modum extuberan-
tes, pöderosos, subrotundos-
que: Cortice læui, herbaceo
colore, maculoso tamen: car-
ne intus humida, aquosaq; in
quibusdam prædulci, in non-
nullis verò subacida, insipi-
dave, siliq; extinguendæ per
quam idonea. Semen conclu-
dit latû, cucurbitæ paulò mi-
nus, rufo, nigrove putamine.

LOCVS.

Seritur in hortis & virida- *Idem.*
rijs, ac etiam in agris.

QUALITATES.

Frigida est, & humida ordi- *Idem.*
ne secundo, siliq; arcendæ
idonea.

VIRE.

Succosa eius pulpa confert ardentibus febribus, & linguæ ariditati quam *Matth.*
maximè: acutos humores vincit, & ijs præsertim auxiliatur febrientibus: qui *Serap.*
humorum prauitate, magis, quàm abundantia scatent, illisq; præsertim con-
uenit, qui tenuis, & imbecillis, sunt temperamenti, macri, & exangues, cum ijs
alterantibus magis opus sit, quàm ducentibus humores.

T

LACTV-

LACTUCA, Græcis, Θηλαζ. Arabibus, Cherbas, seu Chas. Italis, Lattuca. Germanis, Lactuch / Lattich. Hispanis, Lechuga, seu Alfalfa. Gallis, Laitue.

GENERA.

Matth.

Plura ac diuersa sunt lactuce genera. Est etiam & syluestris. Inter satiuarum genera habetur, quæ à crispis folijs, Crispa appellatur: quæadmodum & altera à lato caule, Laticaulis dicitur: Est & quæ sessilis vocatur. Nos verò in capitatam, rotundam & crispam, genera diuisimus: Differunt etiam foliorum colore, alia enim saturatè viridis est, alia subviridis, & quæ cruentis maculis sit respersa.

FORMA.

Idem.

Crispa folijs exit crispis, maiori Intybo similibus: Rotunda in orbem spargitur, rotundioribus folijs, tenerioribus, & vnà sese stipantibus, capitata autem parum folijs à rotunda differt, sed in globum folia conglomerantur, brassicæ capitatæ modo, in quo genere & ea quoque recensetur, quæ vulgo Romana nuncupatur; ceteris in cibis gravior, quæ cadidior, teneriorque; habeatur: caule edunt omnes albicantes, brachiatum, flosculis melinis, & semine tum albo, tum etiam nigro.

LOCVS.

Idem.

Seritur passim ab olitoribus, & ab alijs quibuscunque in hortis.

QUALITATES.

Gal. li. 6.

Humidum, ac frigidum olus lactuca est, non tamen extremè, perinde ac aqua simp. me. fontana.

Diosc.

Stomacho in cibis gratè omnes habentur: somnū conciliant, aluū emolliunt, lac euocant, verum decoctæ magis alunt, stomachicis profunt, si illotæ edantur. Semè assiduus in somno imaginationes libidinosas cōpescit, & venerè repellit. Ipsæ verò frequentius in cibo sumptæ oculorū claritati officiant: inflammationibus & ignibus sacris opitulatur. Earundè succus fronti, & temporibus, illitus, febrientibus tum somnum cōciliat, tum capitis dolores mulcet: testiculis illitis nocturnas pollutiones cōpescit, & seminis profluvium, addito caphura momenro, sed venerè restinguit: Seminis cremor vrinæ ardoribus opitulatur; cauendus aut lactucarum vsus suspiriosis, sanguinè excreatibus, pituitosisque: sed ijs maxime, qui procreandis liberis dant operam.

Matth.

LACTUCA.



LACTV-

LACTUCA florescens. Italis, *Lactuca florita*. Germanis, *Lattich mit der Blüt*.

LACTUCA FLORESCENS.

FORMA.



Folia, quæ ad terram sunt *Matth.* exoleta paucioraque spectantur, caulis illi brachiatus parvis foliolis, ipsisque acuminatis refertus, floribus melius non magnis, qui in pappos evanescent.

LOCVS.

Scatent ea horti ferè uni- *Matth.* uersi in fine Æstatis.

QUALITATES.

Amaro percipitur gustu: *Matth.* quam ob causam abstergerendi facultate non vacat, & præsertim lacteus eius succus.

VIRES.

Lacteus caulium liquor o- *Matth.* culorum argemas, & maculas delet, & vitia cutis emendat.

LACTV-

LACTUCA sylvestris, Græcis, *Ἐπίδαξ ἀγρία*. Italis, *Lactuca saluatica*.

LACTUCA SYLVESTRIS.

FORMA.

Matth.

Sylvestris Lactuca folio exit oblongo, hyeracij maioris modo per ambitum laciniato, candidiore, graciliore, asperiore-que quàm domesticæ, quin etiam aculeato, post quam caulē ediderit, amaro gustu. Caulē mittit florescentis domesticæ quadantenus similem, & flores pariter similes.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in aruis & incultis locis.

QUALITATES.

Matth.

Abstergit eius lacteus succus, & somnum conciliat, soporiferus etiam est, prouocat, & deijcit.

VIREs.

Diosc.

Lacteus eius liquor aquam per aluum eijcit, si ex mullo bibatur duorum obolorum pondere: argemas, co-
liginesque repurgat, oculis instillatus: illinitur efficacius cum lacte muliebri
adustionibus: somnum allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit, &
contra scorpionum, & phalangiorum ictus bibitur: lemen satiuæ modo libidi-
num imaginationes in somno amolitur, ac Venerem arcet.

CENSURA.

Non desunt Pharmacopæi, qui è sylvestri lactuca aquas per alembicum pa-
rant, quam deinde pro Intybi aqua vendunt, decepti superiorum myropola-
rum inscitia.

GINGI-



GINGIDIVM, Græcis, Τριγίδιον. Italis, Gingidio.

GINGIDIVM.

FORMA.



Est gingidium pastinacæ syl ^{DIOSC.}
 uestri haud absimile, amarius ^{Matth.}
 tamen, caule ramoso, rotun-
 do, sesquipedali, striato, subni-
 gricante, geniculatoque, um-
 bella in cacumine alba, mino-
 ribus circumquaq; comanti-
 bus folijs, ipsisque laciniatis. E
 florib. semen prodit, quo ma-
 turescete, umbella in sese con-
 trahitur, vt in pastinacam, &
 tactu glutinosa percipitur, ra-
 dicem habet candidatē, spi-
 thamæ longitudine, subama-
 ro sapore.

LOCVS.

Copiosum in Syria nascitur, ^{Matth.}
 vnde in Italiam aduectum se-
 men, iam seritur in hortis.

QUALITATES.

Sicuti gustu amaritudinem ^{Gal. li. 6.}
 & adstrictionem præfert, sic ^{simp. me.}
 temperamento quoque ipso

caliditatem, & frigiditatem: secundum verò vtranque qualitatē desiccatorium
 est, sed stomacho amicum, vt pote non paruam obtinens adstrictionem, quam-
 obrem non admodum conspicuam caliditatem possidet: secundo autem reces-
 su desiccatur.

VIRES.

Olus hoc crudum, coctum, conditumque estur magna stomachi vtilitate, v ^{DIOSC.}
 rinam cit. Decoctum ex vino haustum vesicæ vtilis est. Perspicuum verò est, ^{Gal. 2. de}
 quod hæc herba medicamentum potius, quàm alimentum est, quippe quæ ad ^{alim. fac.}
 strictionis & amaritudinis non obseurè, nec exiguè particeps est.

CENSURA.

Eorum sententiæ minimè subscribendum est, qui volūt vulgare cerofolium
 legitimum esse gingidium.

CEROFO-

CEROFOLIUM, Græcis, *χαυρόφυλλον*. Italis, *Cerofoglio*. Germanis, *Körffel/suo*
Kerbelkraut. Gallis, *Cerfueil*.

F O R M A.

Matth.

Fragilis ac tenera est planta, senis ab vno pediculo emergentibus folijs, vulgaris petrosilini modo per ambitum incisis. Caulibus sesquipedalibus, pinguibus, subrufescentibus, geniculatis: Umbellam in summis caulibus gignit, flosculis albis stipatam, è quibus renna, rectaq; exeunt cornicula in racemi ferè modum, ex vno petiolo emergentia, in quibus semen longiusculum concluditur, pullo colore. Radix illi brevis in plures diuiscata fibras.

L O C V S.

Idem.

Seritur passim in hortis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Matth.

Tota planta dulcis est, & odorata acriusculo quodā accedente sapore, vix ferè sensibili: quo fit vt alijs oleribus addita, ea gustui gratiora reddat. Estur cruda in Acetarijs, vnà cum alijs plantis ad hoc idoneis, ac etiam cocta cum beta alijsque oleribus.

C E N S V R A.

Qui hanc Myrrhim esse autumant, non diligenter eius notas expenderunt.

VISNA-



VISNAGA, Italis. *Visnaga*.

VISNAGA.

FORMA.

Facie pastinacam agrestem *Matth.*
eo usque refert, ut rectè dici
possit. Pastinaca sylvestris ma-
ior. Nam caulium crassitudi-
ne, longitudineque: quin et-
iam umbellæ magnitudine, vul-
garem sylvestrem Pastinacam
superat.

LOCVS.

Nascitur copiosa in Syria: *Idem.*
etiam nunc feritur in hortis
in Italia.

QUALITATES,
ET VIRES.

Eadem omnia potest, quæ *Idem.*
sylvestris pastinaca.

CENSURA.

Non desunt, qui hanc plan-
tam Gingidium esse credunt:
Sed proculdubio falluntur.

PECTEN



PECTEN veneris, Italis, *Pettine di Venere*. Germanis, *Wilde Moren*.

F O R M A.

Matth.

Radice nititur candida: cauliculis pedalibus: folijs Anthemidis proximis, exilibus: floribus albis, emergentibus, turmatim ab eodē capitello compluribus acuminatis rostellis, inter se disjunctis, quæ pectines ferè referunt, quibus linum mulieres concinnant, siue pectunt.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Matth.

Huius radix cum malua tusa, corpori infixæ extrahit: Eadem cum herba, & floribus calesacta, cum albo meraco, & butyro, additis petrosilini folijs pubiq; adhibita, remorantem vrinam elicit.

PECTEN VENERIS.



CAYCA-

NOMINA.

305

CAVCALIS, Græcis, Καυκαλῖς. Italis, Petrosello saluatico. Gallis, Persil sauuage.

CAVCALIS.

FORMA.

Caulē exit dodrantali, & Diosc. saepe maiori, dauci, aut pastinacæ simili, subhirsuto, folijs apio similib^{us}. sed quæ in caule, ac ramis sunt, fœniculi modo per extrema multifidis, hispidisq^{ue}; candida in cacumine umbella. Semine odorato, Radice pastinacæ.

LOCVS.

Prouenit in campestribus, Idem. inculto præsertim solo.

QUALITATES.

Gustu ac viribus Dauco si- Gal. 7. milis est: nam excalfacit, vt il simp. me. le, & pariter deficcet. Ape- Matth. rit, prouocat, abstergit, attenuatq^{ue}.

VIRES.

Cruda, coctave oleris modo Diosc. do estur. Vrinam cit. Cor- Matth.

dis affectibus auxiliatur. Epotus succus calculos, & arenas pellit, & iocinoris, lienis, renumq^{ue} pituitas attenuat: Semen haustum oculorum aciem acuit, & mentes feminarum trahit. Datur viris contra seminis profluuium cum aspleno, & viticis semine. Steriles prolificas facit, assidue ex vino potum: præstat aduersus Trigonis, Draconis, & Scorpionis marini ictus, vulnere illitus. Herba rota ex aceto mansa, & vomitione reddita aluum purgat, appetitum languentem excitat, nausæ fastidia discutit. Melancholicos iuuat, tum herba ipsa in cibis sumpta, tum eius succus epotus, tum semen, tum totius plantæ decoctum: proinde datur vtiliter quartanarijs, scabiosis, & gallica lue affectis.

V ERVCA,

ERVCA. Græcis, ἐνζαπουρ. Mauritanis, *Lergir*, seu *Giargir*. Herruscis, *Ruchetta*.
Cæteris Italis, *Rucola*. Germanis, *Weiß Senff*. Hispanis, *Oruga*, & *Arugua*.
Gallis, *Roquette*.

ERVCA.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum, Satiua,
& sponte nascens.

F O R M A S A T I V Æ.

Satiua folijs exit oblongis,
profunde laciniatis, Sifymbrij
aquatici modo: sapore acri, &
amariusculo: caule sesquipe-
dali, floribus in cacumine al-
bicantibus: semine in tenui-
bus corniculis concluso. Ra-
dix illi alba, tenuis, & acri, vt
herbagustu.

L O C V S.

Idem. Seritur passim copiosa in
hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 2. de Excalfacit per quàm mani-
alim. fac. festè, adeò, vt nò facile, atque
adiunctis lactuca folijs eda-
tur, siccatur, attenuatur, aperit, in-
cidit, flatus pellit, & extergit.

V I R E S.

Diosc. Eruca in cibis sumpta, genitale semen auget, & venerem excitat: concoctio-
Gal. ibid. ni prodest, alio per quàm accommodata. Semen potum muris aranei morfi-
bus medetur, ventris tineas necat, lienemq; extenuat. Tritum, & ex melle illi-
Matth. tum, nigras vulnerum cicatrices ad candorem reducit. Cum melle verò vitia
cutis in facie emendat, & lentigines emaculat.

ERVCA



ERVCA sylvestris, Græcis, *ἐν ῥαυτῶν ἀγρίων*. Italis, *Ruchetta gentile*, & *Rucola salu-*
tica. Germanis, *Wild Weiß Senff*. Gallis, *petite Roquette*, & *Roquette sauvage*.

ERVCA SYLVESTRIS.

FORMA.

Folijs prouenit satiuæ an- *Idem*.
gustioribus, ac magis lacinia-
tis, gustu acriori lapidiorique:
caulibus numerosis: floribus
luteis: corniculis in vniuersa
ferè planta copiosis, sursum
spectantibus: semine sinapi si-
mili, acri, & amariusculo.

LOCVS.

Prouenit spontè locis ari- *Idem*.
dis, adeo, vt in muris quoque
nascatur.

QUALITATES.

Magis excalfacit, siccit, at- *Idem*.
tenuat, aperit, incidit, extra-
hit, extergit, prouocat, quàm
satiua.

VIRES.

Ea omnia præstare potest Diosc.
quæ satiuæ, valentius tamen, *Matth*.

Costa, & deuorata infantium tussi medetur, addito saccharo. Tradidere qui-
dam, tria sylvestris erucæ folia, sinistra manu decerpta, illicoq; deuorata, aurigi-
nosos sanare.

V 2

OCIMVM,



OCIMVM, Græcis *ἀνιθον*. Italis, *Basilico*. Mauritanis, *Berendaros*, & *Bedarog*. Germanis, *Basilien* & *Basilgram*. Hispanis, *Albahaca*. Gallis, *Basilic*.

OCIMVM.

G E N E R A.

Matth. Tria ocimi habentur genera omnibus cognita.

F O R M A.

Matth. Primū quod maius vocant, folia mittit Amarantho longè maiora, lata, oblonga, crassaq; Citrea mali quadantenus æmula; flores spicatos, albo colore, è quibus semen gignitur subnigricans. Tota planta suauiter spirat.

L O C V S.

Idem. Seritur in hortis, & fætilibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 8. Excalfacit secundo ordine, habet quoq; recrementum humiditatem, quare eius minime idoneum iudicatur: pellit, aperit, prouocat.

V I R E S.

Diosc. Copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, aluum emollit, flatus mouet, urinam pellit, lac euocat, ægre tamen conficitur. Illitum cum hordeaceæ farinæ polline, ex aceto, & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Dragonis marini, & scorpionum ictibus per sese prodest, & cum vino albo odorato oculorum doloribus. Succus instillatus, caliginem oculorum abstergit. Semen potum datur vtiliter infanientibus, ægre mingentibus, inflatisq; Naribus haustum sternutamenta mouet, sed oculos comprimere oportet cum sternutamentum vrget. Additur in Antidotis, quæ ad cordis affectus parantur.

Matth.

OCIMVM



Ocimum alterum siue medium, Græcis, *ὄνημον μέτερον*. Italis, *Basilico mezzano*.

O C I M V M S E C V N D V M.

G E N E R A.

Dum est generum, odore *Matth.* tantum differentium.

F O R M A.

Folij exeunt maioris similibus, sed duplo minoribus. odore in altero quidē plebei ocimi, in altero verò citrei mali, adeo simili, ut nulla sit odoris differentia. Proinde hoc citratum Arabes vocauere.

L O C V S.

Seritur, & hoc in hortis, & *Idem.* fictilibus.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Ea omnia præstare potest, *Idem.* quæ maior.



OCIMUM minus, siue tertium, Græcis, ὄκνον μικρότατον. Italis, Basilico gentile.

OCIMUM MINVS.

FORMA.

Serap.

Folij constat paruis, odore cæteris fragrantiore, quare Mauritanis ocimum Caryophyllatum nuncupatur.

LOCVS.

Matth.

Seritur, & hoc in hortis, & ficilibus.

QUALITATES,
ET VIRE S.

Idem.

Quanto cæteris est odoratius, tantò quoq; ad omnia efficacius.



ORO-

NOMINA.

311

OROBANCHE, Græcis, ὀροβάνχη. Italis, *Orobanche*. Officinis, *Canda leonis*.

OROBANCHE.

FORMA.

Cauliculum edit asparagi Diosc.
instar, sine folijs, in cacumine
hypocistis faciem referentem,
subrubeum, hirsutum, mol-
lem, pinguem, fistulosum, ses-
quipedalem. Flos illi subalbi-
cans, hirsutus, è calyculis pro-
diens: Radix fungosa, digitali Matth.
crassitudine, breuiq;

LOCVS.

Nascitur in segetibus, inter Idem.
legumina, in campestribus, in
pratib; fecus itinera, & prope
sepes.

QUALITATES.

Est frigida, siccaq; natura Gal. lib. 3.
In primo ordine. simp. me.

VIREs.

Estur ut olus asparagi mo. Diosc.
do, legumentis addita conco-
ctionem accelerare creditur.

Hæc planta à nonnullis herba tora vocatur, quod vaccæ ea deuorata illico tau- Matth.
rum admittere soleant.

V 4

BARBV-

BARBVLA hirci, Græcis, Τραγοπύλον. Italis, Barba di becco. Hetruscis, Saffestica. Germanis, Docksbart/Josephsblumen. Hispanis, Barba de Cabron. Gallis, Barbe de bouc.

BARBVLA HIRCI.

GENERA.

Matth. Duum est generum, alterum flore aureo, alterum purpurascente.

FORMA.

Primum genus folijs exit Croci latioribus, ac longioribus, floribus aureis, magnis, è calycibus prodeuntibus. Hi sereno cælo fatiscunt, nubiloso autem contrahuntur, occludunturq; concludo calycis vertice. barba dependet incana, prolixaq; inde illi nomē. E floribus papposum oritur caput, in quo semen continetur oblongum. Radice nititur longa, alba, dulci, iucundaq; qua utimur nos in acetarijs.

LOCVS.

Idem. Prouenit copiosa in pratis ac etiam saxosis locis.

QUALITATES.

Idem. Radix exalfacit, ac etiam primo ordine humectat.

VIRES.

Idem. Glutinat hæc recentia vulnera si foliorum succus vel etiam stillatitia aqua in splenijs admoueatur. Estur quoq; in cibis.

BARBV-



BARBVLA hirci altera, Græcis, Τραγοπανῶρος ἑρτεςον. Italis, Barba di Beccho por-
porca.

BARBVLA HIRCI ALTERA.

FORMA.

Prodit hæc folijs alteri si-
milibus, aut paulò latiorib⁹,
& numerosiorib. robustio-
ribusque: caule quoq; simi-
li, geniculato, cōspicuis pro-
pè genicula alis, è quibus ra-
mi prodeunt. Flores mittit
in cacumine purpurascētes,
minores tamen quàm in al-
tera, radiantib. circumqua;
calycis apicibus in stellæ fe-
rè modum. Radice quoque
firmatur grandiore, robu-
stiorēque, lacteo succo re-
ferta, non quidem vt in al-
tera dulci, sed adstringenti, &
amariufculo.

Matth.

QUALITATES,
ET VIRE.

Radice lacteus succus ad-
stringit, cohibet, firmat, &
modicè abstergit, cui tamē
inidonea est.

Idem.

V 5

SCORZO-



Sassefi-
Gallis,

aquain

AREV-

SCORZONERA, siue Scurzonera, seu Viperina. Italis, *Scorzonerà*.

SCORZONERA HISPANICA.

FORMA.

Matth.

Folia fundit hęc plāta Tragopogono (cuius procul dubio species est) longē latiora, & quę solo p̄pinquiora sunt per ambitum sinuata, longo, pressoque pediculo, à radice prodeuntia, humique accubantia. Caulem edit sesquidrantalem, & sæpe maiorem, teretem, geniculatum, in quo folia angustiora, minoraque spectantur. Flores profert aureos, Tragopogono aded æmulos, ut alterū ab altero vix cognosci possit. Hi flaccescentes in papposum mutantur orbem, in quo semen continetur Tragopogono simile. Radice nititur sesquidrantali pollicari crassitudine, raris adnatis fibris, vegeta, tenera, fractu facili, alba intus pulpa, lacteo succo pragnante, dulci, & gustatu iucunda. Floret æstate.



Locvs.

Idem.

Nascitur in sylvis, virginoso solo, ac etiam alibi.

QUALITATES ET VIRE.

Matth.

Foliorum, radicūve succus datur presentaneo remedio potandus adversus viperarum, cæterorumque venenosorum animalium ictus, quin etiam ad quoscunque pestiferos morbos. Radix recens, sicca, aut saccharo cōdita, quotidie deuorata, pestilentie contagia arcet, & venenis quibuscunq; resistit. Datur eadem, aut eius succus vtiliter quoque comitialibus, cardiacis, vertiginosis, animi deliquio, cordisq; tremore, aut pulsu laborantibus: commanducata per se radix, tristiciam discutit. Lacteus radicis succus, oculorum nubesulas delet. In summa tota planta, magni est ad omnia vsus.

ORNITHO-

ORNITHOGALVUM, Græcis, ὀρνιθόγαλον. Italis, *Ornithogalo*. Gallis, *Choufles*.

ORNITHOGALVUM.

*GENERA.

Habentur plures varietates Ornithogali, ex quibus duas hic depictas exhibem⁹.

FORMA.



Primū folia habet aliquot tenuia, angusta, longa, mollia, per medium eorū lactea discurrente linea, in terram strata, complectentia inum cauliculi sesquipedalis, & plerunq; breuioris, teneri, cui adnascuntur aliquot ramuli vel pedunculi sustinentes niueos intus flores, foris herbaceos, è quibus vascula fiunt sexangula, continentia femina compressa nigri coloris. Radix bulbosa, cādida, bulbos paruos adharētes habet. Alterum maius est, & folia longitudine cubiti, latitudine digiti infima parte cingunt caulem vnicum robustum, rotundum, cubitalem aut maiorem, pluribus ornatū florib⁹, qui mediam

ferè partem caulis occupant, & formam spicæ efficiunt, singulis similis iam dicto Ornithogalo, intus albis, foris herbaceis cum apicibus intus luteis. Radix bulbosa similis est Cypæ, magna, candida, vt prioris Ornithogali.

LOCVS.

Abundat his Italia, & prope Monspelium quoq; inter segetes proueniunt.

QUALITATES ET VIRES.

Coquitur cum pane vt Melanthium. Radix cruda coctāye mādatur, est enim DIOSC. dulcis & suavis.*

TRASI,

TRASI, ita Veronenſibus appellati. Venetis, *Dolzolini*, & *Traſi* dicuntur.

TRASI.

FORMA.

Matth. Folijs exeunt longis, in cacumine mucronatis, Cyperi modo, quem quidem planta tota plurimū emulatur. Caulenim edit cubitales & angulosos, in quorum cacumine folia exiliora, in ſtellę modum radiantur. Inter quę flores ſpectantur ſpicati, ſubfulueſcentesque. Radices habet numeroſas, è quibus globuli dependent bulbosi, oblongi, ſubrueſcentes, fabarum magnitudine, ac etiam grandiores, alba, dulciq; intus medulla caſtaneorum ſapore, ſcaborputamine.



LOCVS.

Idem. Nuſquam proueniūt ſponte in Italia, niſi in agro Veronenſi.

QUALITATES.

Idem. Excalfaciunt, & humectant ordine primo, leniunt, læuigant, emolliunt.

VIRES.

Idem. Radicum bulbosarum cremor lacteus, pectus, & pulmones expurgat hauſtus, quo fit, vt tuſſientibus opem non modicam præſter. Tunduntur ergo radices, maceranturque carniū iure, & deinde per linteolum exprimitur cremor, quem etiam recentiorum nonnulli venereis potionibus admiſcent. Præſtat idem hauſtus ad vrinę ardores, & præſertim ſi melopeponum, cucurbitarum, & cucumerum ſemen addatur. Veronenſes, pro bellarijs ijs radicibus veſcuntur, ſed ſtatus excitant.

TVBERA,

TUBERA, Græcis, *ῥιζα*. Mauritanis, *Ramech*, *Alchamech*, *Tamer*, & *Kema*. Italis, *Tartusi*, & *Tartusole*. Germanis, *Hirschbrunst*. Hispanis, *Turmas de tierra*. Gallis, *Truffes*, siue *Truffles*.

TUBERA.



GENERA.

Duo in agro Romano re- *Matth.*
periuntur genera: quorū al-
teri cādida pulpa, alteri pulla
subest. Habent & alia genera,
sed ignobilia & esui ingrata.

FORMA.

Rotūda: radices (si rectè ra *Idem.*
dices appellari debent) tube-
ra sunt, sed omnino inæqua-
les, nigro, ac scabro, putami-
ne, sine folijs, ac sine caule,
nullis quoque adnatis fibris,
insipida intus pulpa: cū alba
(vt prædiximus) tum etiā ni-
gra. * Ad Tuberā etiam sunt
picti isti fungi qui vocātur fa-
uaginosi, q in Germania Ver-
no tempore sunt in delitijs,
vulgo *Morchel* nominantur.*

LOCVS.

Abūdat Tuberib⁹ optimis *Idem.*
Hetruria. Atqui alijs in Italiæ
locis copiosa pueniūt sitien-
tibus locis, ac labulosis, fruti-
cosisque.

QUALITATES.

Nullam euidentem habent qualitatem, qui ergo ijs vtuntur ad excipienda *Gal. 2. de*
condimenta tanquam materiam habent, ceu alia qualitatis expertia. *alim. fac.*

VIRE.

Terrena magis, quam aquea sunt, omniq; prorsus sapore expertia: Atrabi- *Auic.*
liarios, & crassos gignunt humores, magis quā cætera ciborum genera, quo
fit, vt frequenter deuorata apoplexiam, aut paralysim excitent. Sunt & conco-
ctu contumacia, & ventriculum agrauant. Expetuntur magnatibus in cænis, *Matth.*
bellariorum vice: quin etiam ijs, qui putant venerem ijs deuoratis cum pipere
excitari.

APPENDIX.

Tuberā re vera, radices non sunt. Nullas enim fibras adnatas habent, nec fa-
ta vnquam proueniunt, nec etiam terræ coherent, itaque terræ callum potius
sunt appellanda, & in fungorum potius, quā radicum genere recensenda.

SMILAX

SMILAX hortensis, Græcis, Σμίλαξ κηπέου, ὁ καὶ πὸς, ἀβέλα. Mauritan. Lubia. Ital. Smilace delli horti, & fagiolo Turchesco. Germanis, Welsch Bonen/ Windbonen/ Sprenczel Bonen. Hispanis, Feyones. Gallis, Fajolz de Turquie, & Faves peintes.

SMILAX HORTENSIS.

G E N E R A.

Matth.

Varia Smilacis hortensis habentur genera (Phaseoli hortenses sunt seminum diuersitate differētes) quidam enim candidi, alij rubescētes, nonnulli melini, plerique diuersis, varijsque maculis infecti, reperiuntur.

F O R M A.

Matth.

Horū planta tota ferè facie vulgaribus fasiolis persimilis visitur, peculiariter autē differt in siliquarum & seminū magnitudine, quæ omnia in hortensibus maiora, latiora quæ spectantur, differunt etiam caule. Hortensum enim planta sarbores scandit, smilacis asperæ modo, itaq; sequaci sarmentorum, clauicularumq; reptatu, testudines, attegias, pergulas, & tabernacula conuestit.

L O C V S.

Idem.

Seritur passim in hortis, & viridarijs.

Q U A L I T A T E S.

Auicenn.


Excalfaciunt semina, & humectant ordine primo.

V I R E S.

Matth.

Semina in cibum sumpta magis inflāt, & ventriculo laborem faciunt, quàm vulgares fasioli, copiosiusque semen generant, & venerem stimulant, præsertimque cum longo pipere, galanga, & saccharo asperguntur, quod quidem longè valentius præstant, si ex lacte bubulo pingui elixentur: cornicula dum tenerima sunt, elixa perbelle in acetarijs veniunt, aluum emolliunt, & pectus dilatant.

Apha-



NOMINA.

319

APHACA, Græcis, ἀπάκη. Arabibus, Aphaki, Apaki, siue Albikia. Italis, Aphaca.
Germanis, Wilde Wicken/ & Vogels Wicken. Gallis, Vesse sauvage.

APHACA.

FORMA.

Folij est tenuibus, siliquis Diosc.
lenticulæ maioribus, in quib⁹
terna, quaternæve semina ni-
gra continentur.

LOCVS.

Nascitur non solum spon- Matib.
te inter segetes, sed etiā à qui-
busdam seritur ad columbarū
faginam.

QUALITATES.

Semen viciæ modo amarū Idem.
est, & terrenæ essentia, ideo-
que absterforia est facultatis,
adstringendi quoque vim ha-
ber.

VIRES.

Seminis farina vino suba- Diosc.
cta, illinatur vtiliter ad serpen-
tium, & quadrupedum quo-
rumcunq; morsum: melle ex-
cepta, & illita, lentigines, va-
riolos, & cetera cutis vitia delet: torrefactum semen, stomachi, aluique fluxiones
sistit, si frefum lentis more decoquatur, sed melancholicos humores gignit.

VICIA,



VICIA, Græcis, Βίχιος. Italis, Veccia. Germanis, Wicken. Gallis, Vesse.

FORMA.

Match. Folia mittit aphacæ angustiora, in acutum desinentia, corniculis oblongis, teretibus, nigro semine stipatis, Orobi magnitudine: caulem edit bicubitalem, qui clauiculis è ramusculorū summitatibus prodeuntibus, segetibus sese implicat.

LOCVS.

Idem. Oritur sponte in aruis inter segetes, & feritur quoq; ad columbarum, aliorumque volucrum sagineam.


QUALITATES.

Idem. Excalfacit, & siccit, mundat, abstergit, & adstringit.

VIRES.

Non differt ab Aphacæ, peculiariter autem vrinam ciet, & tabidos inuat, si ex prisana frequenter sumatur.

VICIA.



PORRVM

PORRVM, Græcis, Πρασον. Mauritanis, *Curat*, seu *Kurat*. Italis, *Porro*. Germanis, *lauch*. Hispanis, *Puerro*. Gallis, *Porreau*.

PORRVM.



GENERA.

Duum est generum: capitatum, *Matth.* Græcis, κεφαλωτόν dicitur, & scétile.

FORMA CAPITATI.

Capitatum folijs prouenit allio *Matth.* latioribus, longioribusque, carinatis, & in acumen desinentibus. Ceruix illi longa, bulbosaque, candicans, crassiori capite, numerosis radicibus, ipsisque tenuibus, & capillatis: tunicis quoque numerosis conglomerato. Bimum in caulem proflit capæ modo, longum, cauumque, floribus in cacumine in orbem congestis, semine nigro, capæco simili.

LOCVS.

Seritur in hortis,

Idem

QUALITATES.

Corpus exalfacit, crassos humores extenuat, glutinososque incidit. *Gal. 6. de alim. facul.* Inflat, noxium succum creat, tumultuosum somnium parit.

VIRE S.

Diosc.

Vrinam ciet, aluum mouet, oculorum aciem hebetat, menses pellit, sed lædit exulceratam vesicam, renisque, cum ptisana verò coctum, *Diosc.*

esu, pectoris vitia extrahit. Coma in thuris poline, lacte, aut rosaceo vtiliter aurium doloribus, & sonitui instillatur. Semen veteres sanguinis reiectiones cohibet, duarum drachmarum pondere cum æquali baccarum myrti quantitate potum. Illinuntur decocta folia ad tumentes, dolorificasque hæmorrhoidas. *Matth.* Eadem melle subacta illinuntur ad venenosorum omnium ictus. caput cum ceruice ex melle delinctum præstat ad omnia pectoris, & arteriæ vitia. sumitur sub cineribus tostum, ad fungorum venena, Idem crapulam, & ebrietatem discutit.

X

PORRVM

Matth. PORRVM sectile, Græcis, Πράσον τρυτὸν. Italis, Porro minore. Germanis, Schnittlauch/ sine Fleischlauch.

PORRVM SECTILE.

FORMA.

Idem. Non differt à Capitaro, nisi quod capite sit tenuiore, ac etiam ceruice.

LOCVS.

Idem. Seritur in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Ea omnia præstare valet, quibus capitatum pollere diximus.



AMPELO-

AMPELOPRASVM, Græcis, ἀμπελόπρασον. Mauritanis, Nabati. Italis, Porro saluatico, & Porandello. Germanis, Wilderlauch. Hispanis, Ayos, & Puerros de las vinhas. Gallis, Porree de Chians, siue Porreau sauvage.

AMPELOPRASVM.

FORMA.

Ampeloprasum porri facit. Matib. em representat, sed folijs, ceruice, capiteq; longè minoribus, & ad mandendum durius, acriusque.

LOCVS.

Oritur sponte in Vinetis, Idem. vnde illi nomen, secus sepes, & in agrorum marginibus.

QUALITATES.

Acrius, & siccius satiuo habetur, attenuat, & crassa incidit, & obstructions aperit, & prouocat vrinam.

VIRES.

Stomacho magis quàm doctissimo aduersatur, plus autem exalfacit, & vrinas, & menses vehementius ciet. Estur vtiliter, arque etiam illinitur ad serpentium morsus.

Lentos, crassosque humores potentius incidit, valentiusque infarcta organa Galibid. obstruione liberat.

CAEPA, Græcis Κεράμυον. Arabibus, Basil, seu Bassal. Italis, Cipolla. Germanis, Zwiebel. Hispanis, Cebolha. Gallis, Fiboule, & Oignons.

G E N E R A.

C A E P A

Theoph. Ceparum genera plura, diuersaq;
Matth. habentur (vt Theophrastus est au-
tor.) Atqui nos de quatuor tantum
generibus scribemus, nempe vulga-
ri, communique, Scetili, Fissili, &
Afcalonico.

F O R M A V V L G A R I S.

Matth. Cæpæ folijs proueniunt longis,
fistulatis, teretib⁹, & acuminatis: cau-
le vero cubitali, maioriq³, tubæ faciē
præferēte, inani ac fragili, in cuius
summitate, flores exeūt in globum
sele stipantes, & quibus semē oritur
nigrum, porraceo simile. Radice ni-
titur bulbosa, fessili, rapi rotūdi in-
star, & inferiori parte fibrata, sed et-
iam in his notantur differentiæ. For-
ma enim aliq³ maiores, aliq³ minores,
quædam longæ, quædam rotundæ,
quædā verò sessiles proueniunt. Sic-
ut colore rubentes, & subrubetes a-
liæ, quædam virides, & albæ nonnul-
læ. Quin etiam sapore, vel acerrime,
vel mediocriter acres, aut nihil fere
acredinis habentes.

L O C V S.

Idem. Serūtur, trāsplantāturq³, in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 7. Cæpa excalfacit ordine quarto: Ef-
fimp. me. fentia autem eius potius est crassarū
partium. Porro si succum eius expri-
mas, quod reliquū est, terree admo-
dum est substantiæ, eiusq³ calidæ, at
succus aquæ, æræq³ue caliditatis.

Diosc. Longa longè acrior est quàm rotunda, item flaua quàm candida, & sicca quàm viridis, & cruda
quàm cocta, omnes tamen mordent, flatus gignunt, appetentiam inuitant, sitim mouent, ex-
tenuant & expurgant.

V I R E S.

Diosc. Cæpa repurgatā putaminibus, & in oleo coniecta, & pro balano subdita, hæmorrhoidas,
reliquoq³ excretionum exitus reserat. Succus ex melle illitus, oculorum hebetudinibus, ar-
gemis, nube oculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur, menses suppressos pellit. Naribus
infusus caput purgat, vitiliginis sanat, in sole illitus. In auribus sonitum & grauitatem emen-
dat. In alopecij illitus, capillos reuocat. Largiore cibo deuorata cæpa, capitis dolores excitat,
cocta vehementius vrinam pellit. Elixæ cum viuis passis, & fico tubercula admota concoquit,
& celerrimè rumpit: sub cineribus tosta, belleq³ macerata, datur vt iliter ex melle aut saccharo
deuoranda anhelosis, asthmaticis, & tussientibus. Eiusdē squama sub feruenti cinere tosta diu-
turnum capitis dolorem sedat, vbi frustulum eius calidum in dolentis latevis aurē intro-
ducatur superasperso rosaceo & laurino oleo, succidatq³ addita lana, quæ totam operiat aurem:
Succus cum acerrimo aceto mistus, sanguinem è naribus manantem sistit, ijs immixtus.

CAEPA

NOMINA.

325

CÆPA sectilis, Græcis, Κρόμμυον τμητόν. Italis, Cipolla settiuole. Germanis, Matth.
Schnitzwibel.

CÆPA SECTILIS.



FORMA.

Folij exit, caule, floribus, *Idem.*
& semine, vulgaris cæpæ si-
milibus, sed longè minori-
bus, tenuioribûsque. Bul-
bis verd, ac cervice, oblon-
gis, tenuibus, & minimè ca-
pitatis, ob idque germinatio
tota in folijs, sæpiûsq; reton-
detur, vt porrum.

LOCVS.

Seritur in hortis ad obso- *Idem.*
nia, & condimenta paranda.

QUALITATES,
ET VIRES.

Iisdem pollet facultatibus, *Idem.*
quibus vulgaris cæpa dota-
tur.

X 3

CÆPA

CÆPA fissilis, Græcis, Κρόμμυον ζισδον. Hetruscis, Cipolle malige. Germanis, Schleißwibel.

CÆPA FISSILIS.

FORMA.

Math.

Facie tota Ascaloniam refert, nisi quod omnibus suis partibus maior spectatur. Bulbi plures ab una tantum radicum coma oriuntur, longa, tenuique ceruice nitentes, Ascalonia modo, sed a credine differentes.

LOCVS.

Idem.

Habentur passim in hortis, in Hetruria.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Ea omnia possunt, quæ & cætera genera.



CÆPA

NOMINA.

327

Cæpa Ascalonia, Græcis, Κεράμιον ἀσκαλόνιον. Italis, Scalogna. Germanis, Aschlauch.

CÆPA ASCALONIA.

FORMA.



Folijis prouenit tenuibus, *Matth.* longis, teretibus, fistulosis, in acutum desinentibus, ceruice pariter tenui, bulbis numerosis, ab imo radicum cespice prodeuntibus, paulò nucis auellanae maioribus, parui fici faciem representantibus, sapore admodum acri, haud tamen ingrato.

LOCVS.

Seruntur Ascaloniae Cæpæ *Idem.* in hortis ad ciborum condimenta.

QUALITATES.

Excalfaciunt, & siccant: in- *Idem.* cidunt, aperiunt, prouocant, deijciunt.

VIRES.

Non solum ea omnia præ- *Idem.* stare possunt, quæ cætera cæparum genera, sed cibi appetentiam faciunt, vermes intestinorum necant, & caput non adeo lædunt.

X 4

ALLIUM,

ALLIVM, Græcis, Σκόροδον, Pœnis, Chaum, & Cairin. Italis, Aglio, & Aio. Germanis, Knoblauch. Hispanis, Ajos. Gallis, Ail, & Aux.

ALLIVM.

GENERA.

Matth. Duum est generum, Satium, & Sylvestre. Huius plura sunt genera, nēpe Ophioscorodon, Elaphoscorodon: Vrsinum, & Anguinum alterum.

FORMA.

DIOSC. Satium folijs prouenit porro similibus, minoribus tamen, ceruice lōga, capite bulbofo, quod pluribus coagmentatur nucleis, siue spicis, sapore acri, sed ori non ingrato, quod autē in Aegypto prouenit singulari, vt porrum capite cōstat, candido, ac minus acre. Sylvestre σκίοσκορον, Græcis vocatum, singulari capite cōstat nullis diuisum nucleis, satiuoq; longē minus, sed odore, saporeq; non absimili. folijs angustioribus, gracili caule, in cuius cacumine flos emicat purpureus, & semen subsequitur nigrum. Huic simile ferē est, quod ἐλαφιοσκορον, Græci vocant, id est ceruinum Allium. De cæteris inferius dicitur.

Matth.

LOCVS.

Matth. Satium in hortis, & campis feritur. Sylvestre verò in collibus, & montibus sponte prouenit.

QUALITATES.

DIOSC. Vis illi acris est, mordet, excernit, digerit, pellit, aperit, incidit, prouocat, exalfacitq;, & siccatur ordine quarto.

Gal. 7.

simp. me.

facul.

VIREs.

Gal. li. 12.

Metb.

DIOSC.

Allium turbat, flatu discutit, coli dolores minuit, vbi à flatu prouenerint. Sitim gignit, oculorum aciem hebetat. Latas ventris tineas esu abigit, vrinam ciet. Prodest, contra viperæ, & peculiariter hæmorrhoidis ictum, ita vt non aliud magis, si cum vino assumatur: præstat quoq; contra rabioforum morsus, tam illitū, quam potum, vocem clarificat, veterem tussim coctum, crudūve lenit: Ex origani decocto potum, pediculos, & lendes necat, vitiligines, lichenas, lentigines, manantia capitis vlcera, lepras, & furfures, cum melle, & thure eximit, cum thure, tædaq; decoctum dentium dolorem mulcet in ore detentum. Coma feruefacta, & in defensionibus addita, menses, & secundas extrahit. Hydropicis quoque est vtile, & præfertim Timpanite laborantibus.

ALLIVM



ALLIVM anguinum, alpinum. Græcè, *ἀγριοσκόβορον*, vel *ἀγροσκόβορον*. Italis, *Aglia serpentina*, aliquib. *Victorialis longa*. Germ. *Neunhelm* / *Matterfuoblauch* / *Siegwurz Weib.*

ALLIVM ANGVINVM.

FORMA.



Folia profert lilio conual- *Matth.*
lio serè similia, angustiora ta-
men, & nigris maculis resper-
sa; quin etiam caulis iisdem
inficitur notis, Dracūculi ma-
ioris modo, quo factum est,
vt à nobis allium Anguinum
fuerit appellatum: Ceruice
nititur longa: radice bulbosa,
inuolucris, vt in croco circū-
tecta, numerosis inferna par-
te fibris, vulgaris allij odore,
saporeq; prædita.

LOCVS.

Nascitur in Montibus ex- *Idem.*
cellis.

QUALITATÈS,
ET VIRES.

Excalfacit, & siccit perin- *Idem.*
de ac allium agreste, & suis in
facultatibus illi per omnia si-
mile existit.

* Superstitiosi appendent radicem pecoribus quocunque casu excæcatis,
& visum hinc ipsis reddi sibi persuasum habent. *

X f

ALLIVM

Plin. libr. ALLIVM vrsinum, Italis, *Aglio degli Orsi*. Germanis, *Wär / & Hundes Knob*
 19. cap. 6.lauch / Rampen / Kempfen / & Ramseren.
 in fine.

ALLIVM VRSINVM.

FORMA.

Matth. Folijs exit latis, minoris
 plantaginis ferè æqualibus,
 frequenter striatis, caulibus
 angulosis, in quorum summi-
 tate flores sunt in umbellæ fe-
 rè modū se diffundentes: Ra-
 dice nititur bulbosa, spicata-
 que, lilij albi modo, depen-
 dentibus ima sede capilla-
 mentis.

LOCVS.

Idem. Nascitur in collibus, in syl-
 uis, & aliquando inter sege-
 tes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Ea omnia præstare posse
 creditur, quæ cæteris agre-
 stium alliorum generibus af-
 signantur.



SCORODO

NOMINA.

331

SCORODOPRASVM, Græcis, Σκοροδοπρασσον. Italis, Aglio porro. Germanis, Abergknoblauch. Gallis, Ail porreau.

SCORODOPRASVM.



FORMA.

Magnitudine porrum & diosc. quat, folijs, ceruice, & capite quoque similibus.

LOCVS.

Nascitur sponte in prato- Matth. rum, agrorumq; marginibus, & propter sepes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Scorodoprasum, sicut gu- Galen. 7. stu, & odore mediam allij, & simp. me. porri qualitatem possidet, ita & vires. Coctum porri mo- diosc. do, dulcescit, & in olerum vi- cem transit.

SINAPI.

SINAPI, Græcis, *Σινάπι*. Hetruscis, *Senape*. Italis quibusdam, *Senauro*. Mauritanis, *Cardel*, & *Chardel*. Germanis, *Senff*. Hispanis, *Mofaza*. Gallis, *Seneue*.

S I N A P I.

G E N E R A.

Matth. Trium est generum, quorum vnum rapaceam frödem exprimit: alterum gracili est folio: tertium verò Erucae folio laciniatur.

F O R M A P R I M I.

Plin. 19. cap. 8. Quod rapi folijs prouenit cæteris maius, domesticū est: caulem mittit vegetum, subhirsutum, à quo ramusculi superiore parte crescunt, in quibus semē subrufum in corniculis prouenit, acerrimo sapore, ac etiam olfactu infestū.

L O C V S.

Matth. Seritur in hortis passim ab olitoribus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 8. simp. me. Calefacit, & siccac ordine quarto.

V I R E S.

Diosc. Ad extenuandum, incidendum, detergendum, extrahendumq; efficax est. Manditur ad eliciendam capitis pituitā, contra veterem, callosamque arterie scabritiem. Succus ex aqua, & melle vtiliter gargarizatur: tritum, & naribus ad motum sternutamenta ciet: fœminas vuluæ strangulatū oppressas excitat; illinitur auxilio magno lethargicis, derafo capite, cum ficis admixtum, donec rubescat locus: quin etiam eodem modo ad ischiadicōs dolores. Additur in emplastris extrahentibus, scabiemq; extenuantibus, magno sanè vsu.

Matth. Seminis farina aceto subacta, illinitur ad serpentium, & scorpionum ictus, pota verò fungorum venenis auxiliatur, illinitur & hydropicis ex impubis pueri vrina, sordities omnes corporis abstergit, cuti natium conciliat nitorem. Datur quoque vtiliter suspiriosis, & asthmaticis.



S I N A P I

NOMINA.

333

SINAPI alterum, Græcis, Σίνωνι ἑρμεγ. Italis, Senape, sine Senauro saluatico.
German. Gelber Senff.

SINAPI ALTERVM.

FORMA.

Folia habet tenuiora, plura *Matth.*
ex vno ramusculo prodeun-
tia, caulem rectum, firmum,
asperum, scabrum, hirsutum-
que, à medio ramosum: cor-
niculis numerosis, atque hir-
sutis.

LOCVS.

Nascitur locis incultis, in *Idem.*
campestribus, & inter rude-
ra.

QUALITATES, ET VIRES.

Ea omnia præstare potest *Idem.*
semen, quæ latius sinapi alli-
gnantur.



SINAPI

SINAPI tertium. Italis, *Senape bianca, siue Rocchetta*. Gallis, *Monstarde blanche & douce*.

SINAPI TERTIVM.

F O R M A.


Matth.

Folij exit sylvestri erucæ
similibus, frequenter lacinia-
tis, ramis tenuibus, in caulis
summitate exētibus, in qui-
bus vtrinq; siliquulæ spectan-
tur, albo intus semine, non a-
deo, vt in alijs generibus acri.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem.

Cum non sit, vt in cæteris
generibus, eius semen acre,
non adeo, vt illa excalfacit, &
siccat. Itaque & si ad omnia
vtile habeatur, ad quæ cætera
genera, imbecillius tamē est.
Atqui semen peculiariter in
vinum mustum coniectum,
diutius eius dulcedinem tue-
tur, atque eam deficere pro-
hibet.



NASTVR-

NOMINA.

335

NASTURTIVM, Græcis, *Κάδευρον*. Mauritanis, *Narf*, *Alchif*, seu *Narf*. Italis, *Nasturtio*, & *Agretto*. Germanis, *Gartentress*. Hispanis, *Nasturtio*, & *Malpiga*. Gallis, *Cresson de Iardini*, & *Nasturt*.

NASTURTIVM.



FORMA.

Herba est tenuis, folijs par- *Matth.*
uis, laciniatis, caule tenui, sel-
quipedali, flore albo, semine
in rubeum nigricante, folli-
culis orbiculatis, squamosisq;
incluso Thlaspi modo, acri
sapore.

LOCVS.

Seritur passim in hortis, & *Idem.*
vsurpatur ad ciborum condi-
menta, & intinctus, & venit
quoque alijs cum herbis in a-
cetarijs.

QUALITATES.

Semen adurentis facultas *Galen. 7.*
tis particeps est, excofacit, & *simp. me.*
siccat ordine quarto, folia vi-
ridia multò inferiora semine
sunt, adeo ut mordacitas eorū
moderata sit. Attenuat, mū- *Matth.*
dat, aperit, promocat, incidit,
urit, & resoluit.

VIRE.

Stomacho aduersatur, al- *Diosc.*
uum turbat, ventris tinea ex-
cutit, lienem minuit, partus
exanimat. Illitum cum melle lienem extenuat, fauos expurgat: sorbitionibus
incoctum pulmonum vitia extrahit: serpentium venenis potum resistit, atque
eas suffitu fugat, capillorum defluuia cohibet, coxendicibus commodè ex ace-
to illinitur. Animum exacuit. Succus dentium dolores mulcet, si calidus in *Matth.*
aure dolentis lateris fuerit instillatus, semen denariorū decem pondo ex aqua
potum, bilem subducit, capitis vitia purgat, & visum acuit.

THLASPI.

THLASPI, Græcis, Θλάσι. Barbaris, Nasturtium teſtorum. Italis, Thlaſpi.
Germ. Weſentraut. Hiſp. Paniqueſo de flor blanco. Gallis, Seneue ſauuage.

THLASPI.

GENERA.

Matth. Quatuor Thlaſpi obſeruauimus genera, vt ex eorum imaginibus hic ſeriatim appictis parebit.

FORMA.

DIOSC. Primum folijs eſt anguſtis, digitali lōgitudine, in terram verſis, ſubpinguibus, in cacumine diuiſis, cauliculo tenui binum dodrantum, non ſine adnaſcentibus ramis, fructu circa ipſum totum, ab extremo in latius ſe pendente: ſemine Naſturtij vaſis incluſo, lenticulę effigie, niſi quod infringitur, vnde nomen accipit. ſos illi albicat.

LOCVS.

Matth. Naſcitur in ſemitis, ſepibus, & ſoſſis, quin etiam inter rudera, & in vetuſtis ædificiorum muris, & tectis.

QUALITATES.

Galen. Semen habet & ipſum facultatem acrem. Excalfacit, exiccat, attenuat, vrit.
Matth. extrahit, prouocat, expurgat, & incidit perinde ac Naſturtij ſemen.

VIREs.

DIOsc. Semen bilem vtrinque extrahit acetabuli meſura potum: prodeſt iſchiadicis inſuſum: potum ſanguinem educit: internas ſuppurationes rumpit,
Matth. meſes ciet, ſed fœtum enecat. Additur in antidotis, ideoque in theriacam ingreditur.

THLASPI



NOMINA.

THLASPI secundum, Scorodorthlaspi, Græcis, Θλάσσι ἑταῖον. Italis, *Thlaspi* maggiore.

337

THLASPI II. SIVE ALTERVM.

FORMA.

Folij exit alteri maioribus, *Matr.* latioribusque, prope caulem diuisis, & per ambitum serratis, caule firmo, ramosoque, filiquis latioribus in cacumine diuisis, pressisq; in quibus semen minutum continetur, aureo colore.

LOCVS.

Nascitur in agrorum marginibus, & inter segetes. *Idem.*

QUALITATES, ET VIRES.

Semen minus mordet, minusque longè calefacit, & siccat, atque etiam cetera minus præstat, quàm alterius. *Idem.*

Y

THLASPI



THLASPI tertium, Saxatile. Italis, *Tlasi della terza specie.*

THLASPI III.

F O R M A.

Folijsprouenit à radice numerosis, oblongis, subalbican-
tibusq; minime gustatu a-
cutis, caulibus, & ramis tenui-
bus, tenuibusque folliculis
circumquaq; stipatis, in qui-
bus semen Thlaspi simile a-
cerrimi gustus.

L O C V S.

Nascitur locis saxosis, &
asperis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Excalfacit, & siccit perin-
de ac alia genera, & cætera
quoque prestat, sed non adeo
vehementer.



THLASPI

THLASPI quartum, siue Creticum, Cappadociumue. Italis, *Thaspi della quarta specie.*

THLASPI IIIII.



FORMA.

Folia profert longa, angusta, raraque in caule ramoso, * nā inferiora latiora sunt & nonnihil crenata. Flosculi in fastigijs ramulorum dilute purpurascens vmbellas cōstituant, quibus succedunt folliculi parui vt primi thlaspios, in quibus semen. *

LOCVS.

In Pannonia superiore nascitur in incultis locis, & in collibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Semen cum acerrimo habeatur sapore pariter calefacit, & siccatur, & ea omnia praestare potest, quæ primi generis Thlaspi adscribuntur.

Y 2

BVRSA

ASPI

BVRSa pastoris, Italis, & Officinis eodem nomine appellatur, quin etiam sanguinaria aliquibus, non nullis herba cancri, & alijs crispula quoque vocatur. Germanis, *Seckelkraut* & *Deschelkraut*. Gallis, *Bourse à Pasteur*.

BVRSa PASTORIS.

FORMA.

Matth.

Caulis edit teretes, sesquidodrantales, ramis tenuibus in summitate emergentibus, folia eius prima verbenacæ proxima spectantur, sed quæ in caule sunt Thlaspi æmula sunt. radicem habet tenuem, candidamque: flores edit in summis ramulis albos, è quibus pressæ oriuntur siliquæ, cordis ferè imaginem referentes, semine intus paruo, ac minuto.



LOCVS.

Idem.

Nascitur ferè vbique, præsertimq; secus vias, in antiquis ædificiorum parietibus, in hortis, & vineis, & inter rudera.

QUALITATES.

Idem.

Est hæc planta ex refrigerantium, & adstringentium genere.

VIREs.

Idem.

Prodest attrita, & illita cum inflammationibus, tū etiam sacris ignibus, decoquitur pluuiali aqua cum plantagine, & Armenio luto, bibiturq; eius decoctum ad dysenteriam, & cruentas excreationes, herbæ succus recentia vulnera glutinat, & auribus purulentis infusus medetur, sistit mensium abundantiam, si in eius, & persicariæ decocto insideant mulieres. Esturq; ad idem, & contra denique omnes sanguinis fluxiones efficax est, tam deuorata, quàm admoda. additur in emplastris, quæ ad capitis vulnera parantur. in calceos coniecta, & nudis pedibus pressa auriginem tollit.

ARABIS,

NOMINA.

341

ARABIS, siue Draba, Græcis, *Αραβίς*, & *Δραβή*. Italis, *Draba*. Barbaris, *Nasturtium Orientale*. Germanis, *Türkisch Kress*.

ARABIS, SIVE DRABA.



FORMA.

Ad cubiti altitudinem ^{af-di}osc.
furgit, tenues spargēs ramos,
& ex utroque latere folia, le-
pidij æmula, sed molliora, &
candidiora, in cacumine verò
sambuci umbellam gerit, can-
didos flores habentem.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, *Matth.*
& agrorum marginibus.

QUALITATES.

Insignis est acrimonix, & *Serap.*
Nasturtio per omnia similis,
itaque valenter excalfacit, &
siccatur.

VIRE.

Herba cum ptisana coqui-
tur ad pituitosa pectoris vitia:
semen aridum pro pipere ob-
sonijs admiscetur.

Y 3

*ARABIS

F O R M A.

Er radice valida, & longissi-
ma, colore subalbida & sa-
po- re non minus acri quam Na-
sturtiū, caules promit com-
plures vltra humanam longi-
tudinem, graciles tamen &
circa summities in aliquor
ramulos diuicatos, qui non
vmbellam efformant, sed si-
ne ordine nascūtur sustinen-
tes flosculos copiosos luteo-
los, ex quaternis folijs com-
positos, ex quibus semen re-
linquitur oblongis strictisque
siliquis inclusum, tenue, ful-
uum, acre. Folia vestiunt to-
tam stirpem oblonga, acumi-
nata, crenata per oras, & circa
fastigia caulium quæ prode-
unt longe inæqualiore ambi-
tu laciniata spectantur.

L O C V S.

Habetur in hortis, & forte
alicubi sponte nascitur.



Q U A L I T A T E S, E T V I R E S.

Acredo ipsius manifesta qualitate & viribus cum Arabi convenire illam
cuius prodit.*

IR 10

IRIO Latinis, Græcis verò Ερίσιμον. Italis, *Erisimo*, & *Irione*. Germanis, *He-
derich* / & *Wilder Senff* / *Schnödsenff* / *Schlursenff* / & *Steinsenff*. Hispanis,
Rinchon. Gallis, *Velar*, sine *Torrelle*.

IRIO, SIVE ERISIMVM.

GENERA.

Duo eius habentur gene- *Matth.*
ra, foliorū magnitudine diffe-
rentia.

FORMA.

Folij exit *Eruca sylvestris*, *Diosc.*
cauliculis in lori modum len-
tis, & obsequiosis: floribus lu-
teis: filiquis in cacumine gra-
cilibus, acuminatisq; in qui-
bus semen reconditur exigu-
um vrentis gustus.

LOCVS.


Oritur iuxta vires, rudera, *Matth.*
arque hortos, quin etiam in
plateis, & ædificiorum arcis.

QUALITATES.

Acrimonia pollet, vt Na- *Galen. 6.*
sturtium, & Sinapi. *simp. me.*

VIREs.

Contra thoracis effluxiones efficax est, & purulenta extussientibus auxilia-
tur, regio morbo, & coxendicibus prodest, bibitur etiam vtiliter contra dele-
teria pharmaca: illinitur ex aqua, aut melle cæcis carcinomatibus, parotidibus,
mammarum duritijs, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & ex-
calfacit.



illam

IRIO

VULGARIS Irio, Italis, *Irio*, o vero *Erisimo* commune.

IRIO ALTER VULGARIS.

FORMA.

Matth. Folia mittit hortensis Eru-
cæ, caules lentos, flexilesque,
ramis in summitate tenuibus:
rotundis, acutis, tenuibusque
corniculis vndique stipatis,
sursum spectantibus, in qui-
bus semen cōcluditur minu-
tum, flauo colore.

LOCVS.

Idem. Prouenit, vt alter, iuxta vr-
bes, rudera, hortosque.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem præstat eius semen,
quod alteri quoque adscribi-
tur, peculiariter autē selsqui-
drachmæ pondere, ex ovo for-
bili, deuoratum tribus conti-
nuis diebus, seminis proflu-
uium cohibet, & ex vino renum calculos pellit.



PIPER,

PIPER, Græcis, Πίπερι. Mauritanis, Falsel, & Falsul. Italis, Pepe, & Peuero.
Germanis, Pfeffer. Hispanis, Pimienta. Gallis, Poivre.

PIPER.



GENERA.

Plura Piperis sunt genera, nem- *Matth.*
pe nigrum, albū, longum, Aethio-
picum, & quod vocant Itali Indi-
cum.

FORMA.

Scritur Piperis planta, quod re- *Idem.*
pat clematidis alterius modo, pro-
pe proceras plantas, super quas re-
pit ad fastigium vsque, folijs raris,
citrei mali effigie, sed minoribus,
gustu aliquantulum acribus. Fru-
ctum proferit racemosum, vuarum
modo, sed minorem, perpetuo vi-
rentem donec siccetur, & plenam
maturitatem consequatur, quæ
conficitur Ianuario mense, radice
nititur pusilla. Huic nigri piperis
plantæ, persimilis omnino est, quæ
Piper album gignit.

LOCVS.

Piperis prouentum maximum *Idem.*
habetur in Maluar locis mariti-
mis, quæ à Comorin ad Cananor
vsq; pertingunt: quin etiam in Ma-
lache maritimis, & in insulis, quæ
circa lauam sunt: vnde per mare
Erythronæum ad nos comporta-
tur.

QUALITATES,

ET VIRES.

Excalfacit, & siccit valenter, in- *Diosc.*
cidit, attenuat, concoquit, prouo- *Matth.*
cat, distrahit, discutit, & abstergit,

februm horroribus tam potum, quàm illitum subuenit: serpentium moribus auxiliatur,
partus extrahit: tussi, omnibusque pectoris vitijis à pituita exortis, tum in potu, tum in ecle-
mate succurrit: cum melle vtiliter anginis illinitur: tormina discutit, cum recentibus lauri
folijs haustum: cum yua passa manducatum pituitam à capite elicit: valetudinem tuetur,
dolores finit, appetentiam mouet, concoctionem adiuuat: strumas cum pice discutit, & vi-
riligines cum nitro emaculat. Integra grana quinque, numero quotidie deuorata, ijs auxili- *Matth.*
antur, qui ventriculi dolore, tum ex flatu, tum cruditatibus exorto, laborant.

CENSURA.

Delusi sunt antiqui omnes, quod crediderint ex eadem planta prouenire nigrum Piper, *Matth.*
& longum, siquidem alia valde diuersa planta piper longum mittit, quod in Begala nasci-
tur.

PIPER Æthiopicum. Italis, *Pepe d'Ethiopia*.

PIPER ÆTHIOPICVM.

FORMA.

Matth. Pronenit hoc Piperis genus in filiquis nigris racematim exeuntibus, pisorum, aut phaseolorum similibus, semine intus, nigri piperis baccis paulo minore, ac pertinaciter filiquis inhærente.

LOCVS.

Idem. Nascitur in Æthiopia, unde nomen inuenit apud Arabes.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, & siccit vehementer, attenuat, incidit, prouocat, aperit, digerit, resoluit.

VIRES.

Vtuntur eo Æthiopes ad dentium dolores.



CENSURA.

Manifestè cæcutiunt, qui Æthiopum Piper Carpesium esse contendunt.

INDICVM

N O M I N A.

347

INDICVM PIPER siue Siliquastrum. Italis, *Pepe cornuto*, aut *Pepe d' India*.
Germanis, *Indianisch Pfeffer* / & *Schottenpfeffer*. Gallis, *Poyure de Inde*.

PIPER INDICVM.

F O R M A.

Folij exit hortensis folani *Matth.*
maioribus, oblongioribuf-
que, caule sesquicubitali, vi-
ridi, ramis compluribus bra-
chiato, geniculatoque. Flo-
ribus candicantibus, è qui-
bus vaginæ oriuntur corni-
culorum speciem referentes,
viridi primum colore, & de-
inde coralliorum modo ru-
bescente, pellucido, gustu a-
cerrimo, aded vt piper omne
sua ingenti acredine superet.
In his semen concluditur mi-
nutum, colore subalbicante,
eiusdem protinus gustus.

L O C V S.

Seritur in hortis, & sicuti *Idem*.
libus.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, & siccat exces- *Idem*.
su quarto. Ideoque valenter
urit, & exulcerat corpus ad-
motum recens.

V I R E S.

Recentia cornicula tusa, & illita Ischiadicos iuuant, siquidem locum exu-
runt.

C E N S V R A.

Non desunt doctissimi viri, qui hoc piperis genus Cardamomum faciunt,
manifesto tamen errore.

* SILE-



* SILIQVASTRI varietas triplex. * Siliquastrum rotundum. † Cordatum.
° longuin.

SILIQVASTRI TRI-
PLEX VARIETAS.

FORMA.

Non admodum discrepat à præcedente nisi fructu. Est enim caule quadrangulo, sesquipedali, folijs Solani aut Perficariæ, nigrioribus, floribus candidis, pusillis Solani, exiguis foliolis, quorum centrum tenet asteriscus herbicus exiguus, deinde siliqua succrescit nitido virore & læuore, per maturitatem rubra & miniata, aut purpurea, quæ in alia planta longior & minus crassa, acuminatiorq; spectatur, in alia rursus multo breuior, turbinata, cordis effigie, interdum etiam exacte rotunda. Omnes eodem semine prægnantes deprehenduntur.

LOCVS.

Affertur cum priori ex Goa & Calecutijs oris in Europâ, vbi in hortis fictilibusq; vasis colitur, sic enim commodius transferri & hyeme, quæ huic inimica est, sub tectum deferri potest.



QUALITATES.

Excalfacit vehementer ac pariter resiccat, ad quartum vtriusque qualitatis ordinem accedens.

VIRE S.

Vtilitas & vsus vnus & idem sola figura discrepantium huiusmodi generum ad duos & frigidos tumores. Cutis fædationes delere ex melle illita produntur. Iuscula & condimenta colore croceo & gustu piperis comendat, sed abstinendum à nimio vsu, nam malignum & venenosum quid obtinet, quo iocineri alijsque visceribus incommodat.*

CARYO-

CARYOPHILLVS, Græcis, Καρυόφυλλον. Mauritanis, Persis, Turcis, Indis, *Calisur*. Hetruscis, *Garofani*. Italis verò cæteris, *Garofoli*. Germanis, *Niegelein*. Hispanis, *Clauos de espetia*, siue *Clauellos*. Gallis, *Girophles*.

C A R Y O P H I L L I.

F O R M A.



Arbor, quæ Caryophillos pro-
fert, lauri faciem refert, folijs tamē
angustioribus salicis, aut persicæ
mali similibus, sensim per ambitū
sinuatis, multis prædita ramis, flo-
ribus numerosis in primis cædidis,
deinde virefcētibus, postremo ve-
rò rufescentibus, vsq; adeo odora-
tis, vt reliquos flores odoris suavi-
tate superent, è quibus caryophilli
proveniunt, qui nil aliud sunt, quā
rudimentum fructus. Flores enim
qui quaternis foliolis cōstant, huic
fructus rudimento insidet, fibris
numerosis refertus, perinde ferè
ac Myrti flores. Proveniunt caryo-
philli in extremis ramulis Myrti
modo. Ad hæc pediculi, quibus ca-
ryophilli nituntur ij sunt, qui offi-
cinis vulgari idiomate appellantur
Fusti. Nascitur autē arbor ipsa spū-
te ex decidentibus caryophyllis. A-
dolescit intra octennium, perdu-
ratq; in centesimum annum vsq;.

L O C V S.

Nascitur magno prouentu tan-
tum in Moluccis Insulis. Nam quā-
uis in Zeilan, & nonnullis alijs In-
diæ locis proueniat arbor, nusquā
tamen fructum edit, præterquā in
Moluccis. Excultuntur ibi flagel-
lis, emundato prius circa arborem
solo.

Q U A L I T A T E S.

Caryophilli calidi, & siccī sunt *Idem*.

ordine propemodum tertio, odorati, acres, subamari, non sine leuicula adstrictione. Itaq; ro-
borant, aperiunt, incidunt, attenuant, digeruntq;.

V I R E S.

In cibis deuorati ventriculi, iocinoris, cordis, & capitis affectibus auxiliantur. In puluerem *Idem*.
hausti ex vino austero & cydoniorum malorū succo, vomitiones cohibent, cœliacos iuuant,
nauseam remouent, & cibi appetentiā reuocant, roborantq; cum ventriculum, tum etiam ca-
put. Frigefactum iecur belle exalfaciunt, olfacti auxiliantur animi deliquijs, mansiq; anhel-
anti cōmendant, conferunt comitialibus, resolutis, cōuulsis, stupidis, & veteriosis cōcoctio-
ne adiuvant, a sui fluores torrefacti cohibent. Illinuntur quoq; per quā vtiliter cum masti-
ce, rhoe, corallijs, & punicæ arboris floribus, ad ventriculi imbecillitatem. Exacuunt præterea
oculorum aciem, & caligines tollunt, quinetiā nubeculas, & argemas in tenuissimū puluerem
triti, & oculis inditi. Adduntur in Antidotis, & in saccis, qui ventriculo, & capiti roborando
parantur.

C A R Y O

CARYOPHILLI flores domestici, nonnullis Veronicum. Italis, *Garofoni*. & *Garofoli*. Germanis, *Grasblum* / *sive* *Reglinblum*. Gallis, *Oeilletz*, *sive* *Girofles*.

CARYOPHILLI FLORES
DOMESTICI.

GENERA.

Matth.

Varia sunt horum florum genera, colore, & foliorum stipatu differentia. Alij enim maiores sunt, alij minores, alij coccineo colore rutilant, alij saturata purpura nitent, alij candido, alij carneo colore gaudent. Sunt, & versicolores nonnulli albo, rubroque colore mistim respersi, quin etiam spontè nascentes habentur cum rufescentes, tum albicantes.

FORMA.

Idem.

Planta folijs est Tragopogoni modo longis, breuioribus tamen, carnosioribus, pinguioribusque, incuruis, & in acutum desinentibus: Caules edit numerosos, geniculatos, læues, cubitales, tribus, quatuorve in summitate adnatis, in quorum cacumine teres, longiusculusque calyx spectatur superiore parte serræ modo denticulatus, è quo flos speciosissimus oritur caryophyllorum odore præditus. Atqui flores in omni genere omnes ferè stipantur numerosa foliorum serie, perinde ac rosa.

LOCVS.

Idem.

Seruntur à mulieribus, columiturque in fistilibus, aut capsulis ligneis transpositi, sæpiusque irrigati, super fenestras, ac etiam in hortos.

QUALITATES.

Calida, siccaque pollere facultate hosce flores iudicio esse potest odoris fragantia, & saporis amarulentia quædam.

VIRE S.

Idem.

Qui purpureo colore nitent præstant ad omnes cordis affectus, ad vertiginem, apoplexiam, paralytum, & conuulsionem, ex Betonica, aut amaraci decocto poti. Asseruantur saccharo, perinde ac rosæ, non solum ad prædicta omnia viles, sed etiam aduersus venena, venenosorumque animalium ictus. Dantur contra pestilentia contagia. Id quod valentius operatur succus, ex vniuersa planta expressus. Haustus enim quatuor unciarum pondere, vbi morbus inuaserit, liberat.

CARYO-



NOMINA.

351

CARYOPHILLI sylvestres. Italis, *Garofani*, & *Garofoli saluaticchi*. Germanis,
Donnerneglin. Gallis, *Armoiries*, & *Oeillets sauvage*.

CARYOPHILLI FLORES SYLVESTRES.

FORMA.

Folijis, caulibus, floribusque *Matth.*
 exeunt altilibus similibus, sed
 longè minoribus, tenuioribuf-
 que, floribus cum rufescenti-
 bus, tum etiam albis, nullo ta-
 men odore præditis.

LOCVS.

Proueniunt spontè locis in- *Idem.*
 cultis, & aridis, atque saxo-
 fis.

QUALITATES, ET VIRES.

Præstantij quoque ad ea om- *Idem.*
 nia, ad quæ altiles præstare di-
 ximus, verum longè remissius
 operantur.



HYDRO-

HYDROPIPER Græcis, ὕδρωπιον. Italis, Pepe aquatico, & Persicaria. Germanis, Wasserpfeffer / & Muckentraut / & Schmerken. Hispanis, Hierua pexguiera, seu manchas. Gallis, Curage.

GENERA.

Matth.

Dum est generum, alterum minus, alterum maius. Item alterum acrius admodum sapore. Alterum verò omnis acridinis expers, & aspero tantum stringenti quæ gustu præditum.

FORMA MINORIS.

Diosc.

Caulis edit geniculatus, solidus alis multis concavum. Folia menthae maiora, molliora, candidiora quæ, gustu piperis acris, citra tamen ullam odoris gratiam. Fructum acrem, in furculis parvis, prope folia racematim coherentem.

QUALITATES.

Gal. 3.

Calidum est, sed non tantum, ut Piper. Incidit, extenuat, aperit, resoluit, exulcerat, discutit, & digerit.

simp. me.


Matth.

VIRES.

Diosc.

Folia cum semine illita, tumores, veteresque durities discutunt, siccillata delent, quæ postquam inaruerunt, tusa pro pipere in obsonijs admiscuntur. Herba recens commode thalamis sternitur, pulicibus necandis. Suillæ carnes salæ, circumducta herba præservantur à tinea, & vermibus. Quare succus instillatus vermiculosis auribus, opem mirificam præstat.

Matth.

HYDROPIPER SEV
PERSICARIA.

PERSICA-

NOMINA.

PERSICARIA altera. Italis, *Persicaria magiore*. Germanis, Stöckfräut.

352

PERSICARIA ALTERA.

FORMA.

Eadem illi facies est, quæ *Matth.* alteri, nisi quod folia maiora sunt, & nigris maculis infecta, caules vegetiores humi accubantes, & racemi grandiores.

LOCVS.

Nascitur hæc non solum *Idem.* humecto solo, sed etiam in sicco, in agrorum marginibus, & secus itinera.

QUALITATES
ET VIRES.

Cum gustantibus manifestam relinquit adstrictionem: nec vlla sit acredine prædita, excalfacere perinde ac altera haud quaquam potest, sed potius refrigerare, ac siccare.

Z PTAR-



PTARMICA, siue Sternutamentaria. Græcis, *ἡλαριον*. Italis, *Parmica*. Germanis, *Dorant*/vel *Weisser spiser* *Deinsagen*.

PTARMICA.

FORMA.

Matth. Surculos habet tenues, sel-
quidodrantales, rotundos, &
circa eos folia oblonga, oleæ
modo atq; multa: & per ambi-
tum ferrata. Flores mittit in
cacumine anthemidis figura,
minores tamen & umbilico
dilutiores. sapore aded acri, ut
non desint qui pyrethrum
eam faciant.

LOCVS.

Idem. Nascitur spontè in monti-
bus, saxosis locis.

QUALITATES

Parmicæ flores ciendæ
sternutationis vim obtinent,
est enim temperies eius cali-
da, & sicca, viridis etiamnum
ordine secundo, siccata ter-
tio.



VIREs.

Folia cum floribus illita, suggillationes rapiunt. Flores sternutamenta effi-
cacissimè mouent.

PTAR-

Ger-

NOMINA.
PTARMICA ALTERA.

355



Sunt qui plantam, cuius hic
imago spectatur, Dioscoridis
Ptarmicam faciunt: sed re vera
falluntur.

Z 2

PSEV-

racff-

TAR-

PSEVDOSTRVTHIVM, quidam Theriacariam vocant. Germanis, *Stech-
frant.*

PSEVDOSTRVTHIVM.

F O R M A.

Matth. Folia profert longa, subpin-
guia, caules multiplices, folio-
sisque, in quorum summita-
te spicati prodeunt flores.
Radice nititur candida, lon-
ga, digitali crassitudine, & ra-
phani modo acri,

L O C V S.

Idem. Nascitur incultis locis, se-
cus itinera, & in agrorū mar-
ginibus.

Q U A L I T A T E S E T
V I R E S.

Idem. Radix excalfacit, & siccatur
ordine tertio. Incidit, atte-
nuat, resoluit, aperit, digerit.
Sunt etiam, qui eam praeferant
contra venenosorum ani-
malium ictus, non modo vul-
neri admotam, sed etiam in
potu sumptam. Quinetiam
adversus pestilentie contagia.



Cycla-

CYCLAMINVS, Græcis, *Κυκλάμινος*. Mauritanis, *Buchomarien*. Officinis, *Cyclamen*, *Pain porcino*, & *Arthanita*. Italis, *Pain porcino*. Germanis, *Schwechelsbrun*, & *Erddyffel*. Hispanis, *Pain de Puerco*. Gallis, *Cyclamen*, seu *Pain Porcin*.

CYCLAMINVS.

FORMA.

Folia habet hedere aduersa *Diosc.* parte purpurea, in quibus supra, infraque, albicant maculae, caules nudos palmari longitudine, floribus in eorum summitate purpureis, coronatis prominente quodam medio apice, odoris iucundi, radice *Matth.* nigra fessili aliquantum lata, rapi ferè effigie.

LOCVS.

Nascitur umbrosis locis, & *Diosc.* maximè sub arboribus, & in *Matth.* fructetis, secus itinera.

QUALITATES.

Varias vires obtinet, nam *Gal. li. 3.* abstergit, incidit, venarum o- *simp. me.* ra aperit, attrahit, digerit, de- *Matth.* tergit, & prouocat.

VIRE.

Radix tã hausta, quàm cli- *Mesues.* stere infusa lentâ pituitam mi *Diosc.* rificè detrahit. Coli cruciatus tollit à pituita progenitos, aut ab induratis excrementis. Succus in erthinis additur ad expurgandû cerebrum. Finit enim diurnos capitis dolores, ac etiã Hemicranios: resolutis opitulatur, ac omnib⁹

cerebri, & neruorû affectibus, à frigiditate obortis. Aqua è cyclamini radicib⁹ *Matth.* distillata si naribus sursum trahatur, fluentem inde sanguinem mirû in modum sistit. eadè pota sex vnciarû pondere, admista sacchari vncia, manantè è pectore, aut ventriculo, aut iocinore sanguinè mirificè cohibet. contusæ radices recentes illinuntur vtiliter scyrrhosis, durisq; tumorib. & strumis: additur quoq; succus comòdè in vnguents, quæ ad splenis tumorè duritiemq; parant. affricta recens radix hemorrhoidas eiecit, earundè succus aurib. instillat⁹ vnà cû rosâcco, aut vini modico, aurîû sonos, & surditatè tollit. Abdomini illit⁹ vètrè subducit, illita radix serpentîû ictib⁹ auxiliatur. Eadè excauata, oleo repletè, & addito cere momèro, cineri feruenti imponitur. Coquiturq; vnguentû ad perniones vtile.

* CYCLAMINVS longius radicans, Græcis, κυκλαμίνος μακρορίζος.

CYCLAMINVS MACRORRHIZO*

FORMA.

Folijsprouenitalterius, heraceis maculosis, & flores quoque similes promit colosfinos, radice verò differt, quæ infima parte rotunda quidem est, sed superius gracilescit & in longitudinem mite sursum versus protenditur.

LOCVS.

In monte Saleua Galliæ, & alibi etiam inuenitur. *



DRA-

DRACUNCVLVS maior. Græcis, Δρακύντιον ἢ δρακοντὶα μεγάλη. Arabibus, Luf, siue Alluf. Officinis, Serpentaria maior. Italis, Dragona, & Serpentaria maggiore. Hispanis, Taragontia. Gallis, Serpentine.

DRACUNCVLVS MAIOR.

GENERA.

Tria Dracunculi reperiuntur genera: Maior, Minor, Aquaticus.

FORMA MAIORIS.

Maior, caule habet rectum, bicubitalem, leuem, baculi crassitudine, verticilloribus, serpentium maculis, purpureis tamen pluribus, folia rumicis sibi inuicem implicata. Fructum summo caule facit racemosum coloris primum cineracei per maturitatem vero crocei, in purpurâ vergentis, radicem habet prægrandem, rotundam, candidam, tenui cortice obductam.

LOCVS.

Gignitur in umbrosis, prædiocertim circum septa.

QUALITATES.

Quiddam Aro persimile Gal. li. 6. obtinet, tum radice, tum folijs, verum acrius est, & amarior, ac proinde magis calfactoria, & subtilium partium, quin etiam leniter adstringit.

VIREs.

Radix cruda, coactave delingitur ex melle vtiliter anhelosis, astmaticisq; quin etiam conuulsis, tussientibus & destillationibus obnoxijis: ex vino pota venere stimulat: vlcera, quæ cacoëthe vocantur, & phagædenica expurgat, præsertim cum bryonia. fiunt collyria ex ea, & melle ad fistulas, & partus euocandos: illinitur cum melle efficaciter ad vitilignes: polypos, & carcinomata absumit. succus præstat ad oculorum nubeculas, albugines, atq; caligines. idem ex oleo infusus aurium doloribus medetur. à vipera feriri non posse affirmant, qui folia, aut radicem manibus affricuerit.

* CENSURA.

Peritiores omnes putant hanc Iconem esse fictitiam; & forsitan ex serpentaria aliqua conflatam. *



DRACUNCVLVS minor, Græcis, *Ascororia pingē*. Italis, *Dragontea*, & *Serpentaria minore*. Germanis, *Klein Natterwurz*. Gallis, *Petite Serpentaire*.

DRACUNCVLVS MINOR.

FORMA.

DIOSC. Folio constat hederaceo magno, candidis maculis insignito, caule recto, bicubitali, versicolore, purpureis maculis resperso, ita ut anguem planè referat, baculi crassitudine. Fructus summo caule è vagina quadam externa parte herbacea, interna verò nigricanti purpura infecta, corniculi speciem præ se ferens exoritur, qui tandem fracto corniculo in racemi, vix modum emergit, feruenti, ac mordaci gustu, radice niritur rotunda, bulbosa, acri, tenui libro obducta.

Matth.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur in sepibus umbrosis.

QUALITATES
ET VIRES.

Idem.

Iisdem pollet viribus, quibus maiorem pollere diximus. Peculiariter autem folia caseum à putredine defendunt, qui ijs inuoluitur. Estur radix cruda, coctave placentarum loco in conuiuijs cum multo melle in Balearibus insulis.

* DRAC.



* DRACUNCULI folia nouella cum radice.

FORMA.



Cognosci potest ex hac Icone varietas & mutatio foliorum radicumque Dracunculi. Dum enim plantæ adhuc nouellæ sunt, radicula ipsarum oblongæ aliquantum sunt vt Ari, folia primo exortu conuoluta prodeunt, simplicia, sine adnatis, mox appendices annectuntur geminæ, vbi ipsa pediculo coniunguntur, nec mutantur porro sed æstate subinde flaccidiora redduntur, donec eo ipso anno autumnii initio penitus cõcidant. Sed temporis processu auctæ radices protrudunt vere caules macularos pluribus folijs donatos, initio quidem complicatis & non in plura diuisis, sed vt plurimum quasi tribus, quorum inferiora bina parua, medium grandius sit, composita, sed paulatim augetur horum numerus, inq; plures partes di-

uiduntur ipsa folia vbi fructus efformari incipit, vt ex præcedenti imagine apparet. Radicum adultiorum quoq; quibus pusilli fœtus copiose annascuntur, diuersitas multiplex obseruari potest, interdum enim rotundæ, interdum oblongiores, interdum quadrangulæ propemodum inueniuntur, vel aliter etiam effigiata. *

Z 5

DRA-

DRACUNCVLVS aquaticus. Italis, *Serpentaria aquatica*. Germanis, Wasser
Natterwurk.

DRACUNCVLVS AQUATICVS.

FORMA.

Folij exit corni arboris si-
milibus, radice arundinacea,
geniculata, longa, & Ari mo-
do feruens. insuper ex geni-
culis ipsis numerosæ exeunt
fibrae, quibus pertinaciter
humi inhaeret: à radice folia
prodeunt oblonga, è quo-
rum exortu alia exurgunt lon-
gis pediculis nitentia, sed ijs
grandiora, tenuioraque ha-
bentur, è quorum nonnullis,
quæ conclusa sunt, fructus ra-
cematim enascitur. baccis
per maturitatem rufescenti-
bus, in quibus semen est ni-
grum, paruum, & oblon-
gum, crasso quodam succo
obductum.

Locvs.

Nascitur in montanis lo-
cis, sed humectis, & palu-
dibus.

FACULTATES, ET VIRES.

Non differt viribus ab Aro, & alijs Dracunculi generibus, sed facultate im-
becilliore habetur.

DRA-



DRACUNCVLVS hortensis, Italis, *Dragoncello*, & *Dragone*. Gallis, *Targon*.
Germanis, *Dragum* oder *Dragoncell*.

DRACUNCVLVS HORTENSIS.



FORMA.

Caules fundit numerosos, *Matth.*
tenuis, in quibus folia ex-
eunt longalini modo, acri ad-
modum gustu: radicibus co-
haeret humi repentibus. flo-
ribus pusillis, albicantibus,
racemosis semine superua-
cua.

LOCVS.

Seritur in hortis ferè o- *idem*.
mnibus.

QUALITATES ET
VIRE.

Cum insigni acrimonia *idem*.
planta tota sit praedita, haud
verendum est quin valenter
excalfaciat, atque siccet, in-
cidat, digerat, aperiat, & pro-
uocet: mansa pituitam ciet:
deterium dolores mulcet: con-
coctionem adiuuat, & vri-
nas mouet, Estur passim in
acerarijs vnà cum lactucis, a-
lijsq; oleribus.

OPHIO-

OPHIOGLOSSVM, Græcis, ὀφιογλωσσόν. Italis, *Lingua serpentina*, Argentina, *siue herba Lucciola*. Germanis, *Natter Zünglin*. Gallis, *Herbe sans chousture*, siue *Languette de serpent*.

OPHIOGLOSSVM.

F O R M A.

Matth. Vno tantum provenit folio pingui, plantaginis aquaticæ quadantenus simili, nulla per medium excurrente costa: è cuius inferiore sinu, cauliculus exit, pallidam, serpentis modo, in summitate ligulam gerens, unde illi nomen.

L O C V S.

Idem. Nasceitur in pratis, sed ocysimè deperit, cum tantum mense Maio perduret & appareat.


Q U A L I T A T E S

Idem. Exiccat, citra insignem caliditatem.

V I R E S.

Idem. Recentia folia vulnera mirifice glutinant, & enterocelas sanant. Maceratur in oleo, quo diutius insolato, vtuntur chirurgici commodissimè ad prædicta. Datur potanda ex aqua equiseti ad intrinseca vulnera: auxiliatur sanguinem reiicientibus, pota ex aqua foliorum quercus alba vteri excrementa sistit: decoquitur in vino austero ad collachrymantes oculos. Illinitur recens cum adipe gallinaceo ad vulnerum inflammationes.

ARVM



ARUM, Græcis, *ἀγρον*. Mauritanis, *laurus*, *sive Sora*. Siris, *Lupha*. Officinis, *Aron*
sive serpentaria minor. Hetrulcis, *Gigaro*. Germanis, *Klein Watterburg*/Aron,
 Deutscher Zimber. Hispanis, *Taro*. Gallis, *vit de chien*.

ARUM.

CENSURA.

Duum est generū: maius, & Matth.
 minus.

FORMA.

Hederaceis prouenit folijs, *Idem*.
 sed magnis, dracunculi maio-
 ribus, minimè dissectis, maculo-
 sis: caulem edit dodrantalem,
 è cuius fastigio erumpit folli-
 culus in acutum definens, in
 quo fructus reconditur soli-
 dus, pistilli faciem referens, au-
 reo colore: in cuius infima par-
 te crocea quædam veluti semi-
 na spectantur: quæ deinde aci-
 nosa fiunt & per maturitatem
 rubescunt, botrūq; circa cau-
 lem efficiunt: frumenti Indici
 modo. Radix subest alba, bul-
 bosa, oblōga, acerrimi gustus.

QUALITATES.

Terrena essentia cōstat, sed *Gale. 8.*
 calida, proinde extergēdi vim *simp. me.*
 possidet, verū nō valentem,
 veluti dracontium: est itaq; in
 exiccando, calefaciendq; pri-
 mi ordinis. Abstergit, incidit, *Matth.*
 attenuat, digerit, & aperit.

VIRES.

Radix, semē, & folia dracū *Diosc.*
Matth.

culi vires habent. Priuatim autem radix ex fimo bubulo podagris vtiliter illi-
 nitur. Decocta radix, melleque excepta; medetur pituitosis pectoris morbis.
 quare asthmaticos maximè iuuat. Datur elixa, vel seruentibus cineribus tosta
 ex amygdalino oleo vtiliter tussientibus. Id quod commodius præstat lac, in
 quo ipsa fuerit incocta. Elixia subijcitur oleo, & tumenibus hæmorrhoidibus
 vtiliter illinitur. Radicis succus exedentia, & contumacia vlcera sanat: semen
 drachmæ pondere potum, menses, & secundas pellit.

CENSURA.

Nescio sanè qua ratione scripserit Galenus, Arum, quo degustato os totum
 exurit, & acerrimum sentitur, calidū, siccumq; ordine tantum primo haberi.

PISTIL-



PISTILLVM referens Ari flos, & eius radix vegetior.



ARVM

tes: n
ne po
recen

NOMINA.

ARVM minus, Græcis, *ἄρον μικρόν*. Italis, *Gigaro minore*.

ARVM MINVS.

367

FORMA.



Folij exit sagittæ imaginem *Matth.* præferentibus, caule recto, glabro, dodrantali, botrum in cacumine habenti, rubentibus baccis stipatum, in acutum desinentem: Radices fundit tenues, numerosasque, è quibus bulbosi quidam globuli fabarū magnitudine dependunt, gustu per quam acerrimo.

LOCVS.

Nascitur in montibus.

Idem.

QUALITATES ET VIRES.

Excalfacit, & siccit ordine quarto: Ideoq; vrit, attenuat, incidit, & abstergit. Sunt qui radicū farina vtantur ad arceudos à suis mensis parasitos, & voraces lurcones; eandem delicatis cibis admiscen-

tes: nam vbi fauces occupauerit, tam vehementi, ac contumaci ardore afficit, ne post hac quicquam vorare queant, nisi lacte bubulo diutius gargarizato, aut recenti butyro sensim delincto.

BONVS

BONVS Henricus, Italis, *Herba infarinata*. Germ. *Schmerbel* / *sive Gut Heimich*.

BONVS HENRICVS.

FORMA.

Matth. Planta candicat tota perinde ac si tenuissimo farinae polline conspersa esset: quin etiam tactu, aded levis percipitur, vt vngue aliquo peruncta videatur: Folia habet Ari quadantenus similia, caules plures, foliosos, in quorum fastigijs racemosi emergunt flores; Radicem habet vegetam, crassam, multifidamque: croceo colore, acuti lapathi modo: cuius speciem esse censemus.



LOCVS.

Idem. Nascitur sponte ferè vbi-
que in pagorum plateis.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, siccit, aperit,
abstergit, resoluit, & digerit.

VIREs.

Idem. Præfertur ad venenosorum animalium ictus: Radicis succus illitus, scabiem sanat, & cutis maculas extergit, præsertim, si cum aceto misceatur.

ARR.

NOMINA.

ARISARVM, Græcis, *Asiargoy*. Italis, *Arifaro*. Germ. *Klein Krott*.

369

ARISARVM.

FORMA.

Folijz prouenit Ari, longè *Matth.*
tamen minoribus: cauliculum
edit tenuem, in cuius summi-
tate vaginula quædam oritur,
altera parte diuisa, è qua ligula
tenuis, exigui germinis modo
se se exerit, pallido colore. Ra-
dix illi oliuæ instar magna, ob-
longa, candicans, adnatis plu-
ribus vbiq; emergentibus.

LOCVS.

Nascitur in collibus, & cam- *Idem.*
pestribus.

QUALITATES.

Acrius multò Arifarum, *Gal. 6.*
quàm Arum est. *simp. me.*

VIREs.

Radix illita, nomas sistit: si. *Diosc.*
unt collyria ex ea ad fistulas ef-
ficacia: illitu radicis, genitale
animalis cuiusq; in pernici-
em agitur.

Aa

ARI-



ARISARVM alterum: siue Pseudo arisarum. Italis, *Arisaro falso*.

ARISARVM ALTERVM.

FORMA.

Matth. Folia mittit longa, angusta, longis pediculis nitentia: radicem bulbosam, iuglandis magnitudine, numerosis vbiq; adnatis fibris, gustu etiam acuti.

LOCVS.

Idem. Nasctur frequens in agro Romano.

QUALITATES, ET
VIRE.

Idem. Excalfacit radix, siccat, incidit, abstergit, digerit, & aperit.

* APPENDIX.

Non omnino segregari potest à speciebus Arisari cum gustata radix satis prodar acedine suam, id quod ipsemet autor fatetur paulo supra, in descriptione huius plantæ, licet idem pro falso Arisaro habeat.*



HAST.

NOMINA.

371

HASTULA regia, Albucum, Asphodelus mas. Græcis, *Asphodelos*. Mauritanis, *Cheunce*, *Biruach*, seu *Axeras*. Italis, *Anfodillo*. Germanis, *Asfodillwurz*. Hispanis, *Gamonos*, seu *Gamonites*. Gallis, *Aprodiles*.

HASTULA REGIA, SEV ASPHODELVS.

FORMA.

Planta est à radicibus folio. *Matth.*
 fa: folijs porraceis, carinatis,
 caulē edit cubitalem, & sæpe
 maiorē, insigniter leuem, flo-
 res in cacumine albicantes, &
 quandoq; melinos, numero-
 sos, in stelle modum; è quibus
 bacca proueniunt subrotun-
 dæ, herbacei coloris, semine
 intus nigro triquetroq;: Ra-
 dicibus nititur numerosis, ni-
 gricantibus, bulbosis, oblon-
 gis, virescēte intus pulpa, ima
 parte vetricosis, & in tenuem
 caudam desinentibus, succo-
 sis: gustu acri, atq; amaro.

LOCVS.

Nascitur in montibus pin- *Idem.*
 gui solo.

QUALITATES.

Radix extergentis, & discu- *Gal. 6.*
 tientis est facultatis; vltæ au- *simp. me.*
 tem cinis calidior, & desiccā-
 tior, subtiliorq; est, & ad dige-
 rendum potentior.

VIREs.

Radices epotæ vrinæ, & Diocæ.

mensēs ducunt: auxiliantur à serpente demorsis trium drachmarum pondere
 haustæ, sed tota planta ex vino morsus illinire oportet. valent quoq; ad fordida,
 & depascentiæ laceræ; mammarum quoq; & testium inflammationes, tubercu-
 la, forunculosq;. Radicis succus per se, prodest ad purulentas aures: in contrari-
 am aurem infusus, dentium dolorem mitigat: cinis è radice illitus, pilos, capil-
 losq; in alopecij replicat. oleum in excauatis radicibus seruēfactum, pernio-
 nibus, & ambustis medetur: in auribus distillatum, surditati auxiliatur. Semen
 in vino potum scolopendræ & scorpionum venenis mirum in modū resistit. Illi- *Matth.*
 nuntur vtiliter radices in aceto decoctæ lichenosis, scabiosisq;: crispantur quoq;
 capilli abrafo capiti affricta sæpe radice, decoctæ & illitæ parotidas sanant.

Aa 2

* ASPHO-

* ASPHODELVS foemina siue luteus, *Iphyum* Theophrasti quorundam sententia, aut aliorum, *EriZambach* Arabum. Germ. Gelb Affodillwurq.

ASPHODELVS FOEMINA.

F O R M A.

Folia multo angustiora quam albus, & Cypero fere similia, striata saturate virentia promittuntur radicibus multiplicibus longis, minus tuberosis, per laterales fibras sese vndiq; propagantibus, colore luteolis, Caulis hinc emergit cubiti altitudine, rectus, rotundus, in quo flores crebri lutei, fastigiati, stelliformes, gignunt semen nigrum triquetrum, subrotundis capitulis inclusum.

L O C V S.

Hortis est familiaris. Spontè natus quod sciam non reperitur.*



BYLVS

NOMINA.

373

BULBUS vomitorius, Græcis, Βίλβο ἐμετίνος. Mauritanis, Zir. Italis, Cipollacina.

BULBUS VOMITORIVS.

FORMA.

Folia habet esculento bulbo multò latiora, & longiora, radicem similem, nigro obductam inuolucro.

LOCVS.

Nascitur cliuosis locis. Matth.

QUALITATES.

Calidioris est temperaturæ, quàm bulbus esculentus. Gal. 8. simp. me.

VIRES.

Radix mansa, aut decoctum Diosc. eius potum, vesicæ malis medetur. vomitiones mouet.

* APPENDIX.

Videtur depinxisse autor Bulbi Vomitorij loco ob odoris, quem spirant flores, præstantiam familiare Turcis dictum Muscari, ideoq; hoc ipsum hic expressimus.*



Aa 3

SCILLA

SCILLA Græcis, Σκίλλα. Arabibus, Haspel, Hansel, Aschil, siue Alaschil. Italis, Squilla. Germanis, Meerzwibel. Hispanis, Cebolla albatrana. Gallis, Squille, car-pentaire, siue Oignon marin.

SCILLA.

FORMA.

Matth. Bulbo nititur ingenti, subrubro, radicibus inferna sede numerosis: squamis crassis, lento succo prægnantibus, acris, & amaro, folia mittit aloes similia, caulem sesquicubitalem, læuem, & flores in summitate subpurpureos.

LOCVS.

Idem. Nascitur maritimo tractu.

QUALITATES.

Qualitatem admodum incidentem obtinet, non tamen admodum calidam, itaq; secundi ordinis ex-calfacientium fuerit: præstat autem, aut assam, aut elixam sumere, sic enim virium illius vehementia exoluitur.

VIRE.

Diosc. Interna scillæ pars in oleo seruefacta, rimis pedum vtiliter admouetur. decocta in aceto illinitur ad viperarum morsus: tosta, & odoratis medicamentis admista, hausta; vrinam ciet, hydropicos, stomachicos, auriginosos, torminibus, & tussi vetere laborantes, suspiriosos, & reuomentes iuuat, tribus obolis ex melle sumpta, quin etiam comitialibus & resolutis auxiliatur. sed cauendus scil-

Pithagoras.

lus vsus his, quorum intestina vlcibus afficiuntur. Scillinum quoq; acetum admirabilis est ad multa facultatis, si quis enim quotidie parum ebiberit, illi quidem faucium, orisq; partes nunquam male valebunt: os ventriculi beneualebit: facili spiritum ducet: oculi acutissime cernent: flatu nullus in ventre excitabitur, & bene spirans, beneq; coloratus deget. hoc aceto qui vititur cibum bellè conficiet, etiam si licentiosius edat: nihil superuacui in corpore residuebit, non flatu, non bilis, non cruditas, non stercus, non vrina, alius lubrica omnino erit. Morbo comitali diuturno efficaciter profuit, incipiens verò ac nouum perfectè discutit: ad podagras præterea, & ceteros articulares morbos, & ad iccoris, lienisq; duritias efficaciter facit.

CAPPA.



NOMINA.

375

CAPPARIS, Græcis, Κάππαρις. Arabibus, Cappar. Italis, Capparo. Germanis, Capren. Hispanis, Alchapparras. Gallis, Cappres.

CAPPARIS.

FORMA.

Aculeatus est frutex, qui in ter Diosc. ra stratus, magis in orbem euagatur: spinas, vt rubus habet in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructum oleæ similem, qui cum dehiscens panditur, florem candidum promittit: quo excusso, non nihil glandis oblongæ figuræ inuenitur, quod apertum grana acinis puniceorum similia ostendit, parua, rubicunda. Radices spargit ligno las, grâdes, numero lasq;.

LOCVS.

Tenui solo, asperisq; locis, in Idem. insulis, & iuxta rudera nascitur.

QUALITATES.

Radice cortex vincentem habet Gal. 7. qualitatem amaram, proxima acrem, deinde acerbam: qui simp. me. bus palam est, quod diuersis, & pugnantis constet facultatibus. quippe abstergere, purgare, & incidere potest sua amartudine, ex calfacere verò, incidere, digerere, acrimonia: porro densare, constringere acerbitalis, verum imbecillius operantur.

VIRE.

Fructus drachmis duabus in vino potus quadraginta diebus, lienem absumit, Diosc. & urinam pellit: bibitur vtilissimum Ischiadicis, resolutis, conuulsisq; mensis ciet, & caput purgat: seminis, aut aridæ radice ex aceto decoctum, colluto ex eo ore, dentium dolores mulcet. radicum cortex, vlcera vetera omnia, & sordida, callosaq; expurgat: lieno sis, cum hordei farina vtiliter illinitur: cum aceto trita, albas vitiligines abstergit: Radix foliaq; intrita, strumas, ac duritias discutiant, foliorum succus infusus aurium vermiculos enecat. Fructus in ciborum usum venit, sed pa Matth. rum aliter valet ramum ad excitandam cibi appetentiam, & deradendam, deijciendamq; pituitam, quæ ventriculo inhaerit, & ad lienis, & iecoris morbos.

Aa 4

*CAP-



* CAPPARIS Sylvestris seu Fabaginea vel Leguminosa, Pepleos quibusdam dicta, Auicennæ Ardifugi vel Ardifrigi. Rhafi Andirian. Alepi in Syria Morgani.

CAPPARIS SYLVESTRIS.

FORMA.

Egregie virent huius plantę folia, Cappari similia sed minora & oblongiora, crassiuscula, bina vnico pediculo cauliculis teretibus, leuibusq; annexa & sibi inuicem opposita. Flores Capparibus conditis forma congruunt antequam aperiantur, foris herbidi, expansi vero albicant & intus rubent, è medio stamina lutea emergunt, his succedūt siliquę oblongę in quibus semina. Radix subest longa lignosaq;.

LOCVS.

Nobis peregrina est planta, nec nisi in hortis inuenienda. Sed Romę inter rudera sponte nasci perhibent.

VIREs.

Vsurpatur ad vermes, tota enim planta grauis est odoris & saporis amari.*



LEPI-

NOMINA.

377

LEPIDIVM, Græcis, *Λεπιδιον*. Mauritanis, *Saitaregi*, *Hansab*, *Asceitaregi*, *sive Scitharegi*. Italis, *Lepidio*, seu *Iberide*. Germanis, *Wilder Kress*. Hispanis, *Nasturtio montefino*. Gallis, *Passerage sauvage*, *sive Nasturt sauvage*.

LEPIDIVM.

FORMA.



Folia gerit nasturtij: vere *Diosc.* virétiora, caulem cubitalem, *Matth.* aut minorem, florem album, tennemque. Semen circum summos tenuesque cauliculos in siliquis, nasturtij æmulis, sed minoribus, minuto intus semine. Radicem albam, acri sapore.

LOCVS.

Nascitur locis incultis, saxosis: in templorum arcibus, atque sepulchris, secus itinera, in rudibus, & agrorum extremitatibus. *Democr.*

QUALITATES.

Excalfacit & siccatur, magis *Matth.* quam nasturtium extrahit, attrahit, incidit, attenuat, aperit, digerit, & vrit.

VIRES.

Præstat mirum in modum Ischiadicis, si cum Helenij radice, quarta parte horum *Diosc.* reïllinatur. Idem præstat contusa radix & cum salsa axungia illita, quaternis horum *Democr.* ris. sed deinde in balneum descendere ægrum oportet, & locum cum oleo inungere; addita lana: herba lienosis admodum prodest: eadem lepras eximit.

CENSURA.

Qui Lepidium, & Iberidem duas faciunt plantas, manifestè falluntur.

Aa 5

LEPIDIVM,

LEPIDIVM, Paulo Aeginetæ, & Plinio: posterioribus Græcis, *Λεπιδιον*. Italis, *Piperite*, & *Peperella*. Gallis, *Passerage*, siue *Poyuree*. Germanis, *Pfeffer Kraut*.

FORMA.

Matth.

Caulibus cubitalibus fruticat, subalbicantribus: folijs lauri, maioribus tamē, robustis, floribus in cacumine spicatis, tenuibus, ac albicantibus. Radice alba, acerrimi gustu, perinde, ac folia, quę dentibus attrita os vniuersum accendunt.

LOCVS.

Idem.

Seritur in hortis, ac etiam quibusdam in locis sponte nascitur.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Excalfacit & siccit vehementer, ac ea omnia potest, quę lepidium primum, ceterum longē valētius operatur.

LEPIDIVM.



RAMVLVS

Tralis,
caut.

NOMINA.

379

RAMVLVS Lepidij cum flore & semine.



RANVN-

IVLVS

RANUNCULVS, Græcis, *Βαργάνιον*. Italis, *Ranuncolo*, *sive Pie corbino*. Germanis, *Hanen Fuß*. Hispanis, *Ternabelida*. Gallis, *Grenouillette*, *sive Basintz*.

RANUNCULVS.

GENERA.

Matth. Sex nobis Ranūculi recensentur genera: de quibus inferius dicitur.

FORMA.

Diosc. Folijs exit coriandri latioribus, pinguibus, subalbidisq; floribus luteis, & interdū purpureis, caule gracili, cubitali: radice alba, exigua, amara, & ellebori modo fibrata.

LOCVS.

Idem. Nascitur in limitib. humidis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. simp. me. Omnia facultatē vehementer acrem possident, adeo, vt cum dolore exulcerēt. Radix arefacta, sternutatorium est medicamentum, similiter alijs omnibus, quę vehementer desiccant, & vt semel dicam, calida & sicca valde est, tum radix, tum vniuersa herba, adeo vt sua exiccatione, sicca radix dentes quoque frangat.



VIREs.

Diosc. Folia, flores, & cauliculi recentes cuiuscunque generis, exulcerant illita, & crustas non sine dolore exciunt: quare scabros vngues eximunt: scabiē detrahunt, & stigmata delent: pensiles, & fornicantes verrucas, alopeciasque paulisper illita, tollunt, tepente decocto fouentur vtiliter perniones: sicca radix, tritaque sternutamenta ciet, naribus indita.

GENSVRA.

Qui Ranunculum coronopum esse contendunt: ij sanē delirio agitantur.

RANVN-

RANUNCULVS SECVNDVS.

FORMA.



Ranunculus secundus, la-
nuginosior, hirsutior, quàm
primus est, longioribus cauli-
bus, & pluribus foliorum in-
cisuris.

LOCVS.

Plurimus in Sardinia nasci-
tur, quàm acerrimus, quem *Idem.*
sylvestre apium appellant.

QUALITATES,
ET VIRES.

Apium risus quidā hoc ra-
nunculi genus appellauere, *Matth.*
quòd si herbā hanc, quispiam
in edulij vorauerit, eius ner-
ui contrahantur, rictuque os
diducatur: vt grauissimi testan-
tur autores, ita vt qui mortem
oppetunt, veluti ridendum fa-
cie intereant.

RANUNCV-

F O R M A.

Minoribus prouenit folijs,
floribus melinis: sed tota plan-
tagrauem spirat odorem.



RANVM-

RANUNCVLVS QVARTVS.

F O R M A.

Non est abſimilis tertio: ſo DIOſC.
lia tamen magis diuſa ſunt: MATTH.
florem edit lactei candoris.
Radices numeroſas, fibroſas-
que.

* L O C V S.

Nascitur in montibus, &
in hortis. flores numeroſiore
folio luxuriant. *



RANUNCV-

RANUNCVLVS quintus. *Italys, Pie di Gallo. Germanis, Drüßwurß. Gallis, Piepou.*

RANUNCVLVS QVINTVS.

F O R M A.

Matth. Folia mittit secundi ferè similia, atque etiam hirtiora, radices albas, numerosas, eleborimodo, inter quas medium occupat locum, tuberosa radix dependens, veluti ex funiculo, nucis iuglandis magnitudine, albicans rapido, sed acris, & exulcerans.

L O C V S.

Idem. Nascitur locis ingultis, & fecus itinera.

Q V A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Excalfacit & siccac ordine quarto: vlcera, extrahit, incidit, digerit. Radix recens tussa & admota, vesicas excitat, quare ischiadicis vtiliter illinitur.



RANVN-

FORMA.

Folia mittit anemonis pri- *Matth.*
mi familia: caules cubitales,
striatos, flores in summitate
magnos, aureo colore: radi-
ces numerosas, fibrosasq;

LOCVS.

Nascitur in riguis, & hu- *Idem.*
meis locis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Ceteris minus est acris,
qua re minus excalfacit, &
siccat.



Bb

ANEMO-

ANEMONE, Græcis, *Ανεμών*. Italis, *Anemone*. Gallis, *Passe fleur*. Arabibus, *Iackaik*, *Alnahamen*, *Sakaik*, seu *Mamira*.

ANEMONE.

G E N E R A.

Matth. Plura habet genera, quorum quinque nos obseruauimus.

F O R M A P R I M I.

Diosc. Folio prouenit coriandro

Matth. simili, sed frequentioribus incisuris, caulibus lanuginosis, tenuibus, striatisq; in quibus tenuiora folia per interualla spectantur: floribus syluestris papaueris magnitudine, purpurascens, prominente umbilicotenus capitulo, nigro colore, nigrisque capillamentis stipato, perinde ac in papauere. Radix illi inest olea magnitudine, subrotunda, fibrataq; ac sapore acri.

L O C V S.

Idem. Oritur in aruis, & alijs cultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Anemone omnes, acrem,
simp. me. extergendi, attrahendi, & ora vasorum referandi facultatem obtinent.

V I R E S.

Diosc. Succus eum foliorum, tum radice naribus infusus, caput purgat. comminucata radix pituitam trahit: decocta in passo, & illita, sanat oculorum inflammationes, cicatrices eorundem, & hebetudines emendat: fordidavlcera abstergit. Folia, & caules, si cum ptisana cocti edantur, lactis copiam præbent: & in vellere folia supposita, menstrua cient, & lepras illita eximunt.

ANEMO-



NOMINA.
ANEMONE secunda, Italis, *Anemone secundo.*

387

ANEMONE SECUNDA.

FORMA.

Folijs prouenit maioribus, *Matth.*
frequentius laciniatis, cyno-
ctoni aconiti modo; caulibus
alterius similibus, sed aliquan-
to crassioribus, inanibus, & in
rectum spectantibus, quibus
flores insunt in summitate di-
lutiore purpura nitescentes:
capitulo circumquaq; coma-
to: perinde, ac altera. Radicem
habet breuem, rapunculi ferè
figura, fibris adnatis multis: a-
cri gustu.

LOCVS.

Nascitur locis cultis, & præ- *Idem.*
fertim in aruis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Nihil suis in facultatibus à *Idem.*
priori differt.



Bb 2

ANEMO-

F O R M A.

Matth. Folijs est ranunculi primi
similibus, caulibus tenuibus,
sesquipalmatis, rotundis,
in quorum cacumine flores
exerunt albi, ac diluta quadam
purpura nitescentes, inferiori
praesertim sede rosarum ma-
gnitudine, radicem habet fi-
bratam, ac tenuem.

L O C V S.

Idem. Nascentur in collibus.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem. Tota planta caeteris mitior
est, quare minus excofacit, &
siccatur.



ANEMO-

NOMINA.

389

ANEMONE QVARTA.

FORMA.

Folia profert frequenter la-
ciniata, flores in summitate
caulis purpureos, radicem glo-
bosam, & parvam, fibris nu-
merosis stipatam.

LOCVS.

Prouenit cultis locis.

Idem.



Bb 3

ANEMO-

* F O R M A.

Folijs provenit ranunculi
ferè, sed tenerioribus, floribus
aureis, radice parvæ fabæ ma-
gnitudine.*


L O C V S.

Oritur cultis locis, & in arvis.



* ANEMO.

* ANEMONES diuersi flores.



Plurimæ species Anemones habentur aded vt ferè quibus peculiare depingat ab alio nō obseruatas. Ideo non putauī superuacaneum fore, si reliquis, quas coactus fui subdere depictis ab autore nec dum à me cōspectis, adiungerem corollarij vice rariores hosce flores, quorum A. litera insignitus candidus est, & medio luteus, B. Cæruleus, C. aureus, D. Purpureus variegatus venis subrubris, E. Coccineus. Eorum vero stirpes cum radice nondum videri mihi cōtigit.*

PVLSATILLA. Italis, *Pulsatilla*. Germanis, *Rüchen Schell*/ seu *Hacker Kraut*. Gallis, *des coquerelles*.

PVLSATILLA.

FORMA.

Matth.

Cum primum erumpit folia mittit incana, & admodum hirsuta, minutim laciniata, sapore per quam acri: flores prodeunt anteaquam folia emergant purpurei, nigricantes, atque hirsuti, caule rotundum, tenuem atq; incanum. Radix illi subest pedali longitudine, exesa chamæleonis albi modo, sapore potius subdulci, quam acri.

LOCVS.

Idem.

Prouenit locis incultis, aridis, & saxosis.

QUALITATES.

Idem.

Folia, caules, & flores cum acerrimo sint gustu, exalfaciunt, & siccant ordine quarto: incidunt, attenuant, attrahunt, digerunt, expurgant, & exulcerant. Radix verò cum subdulcis sit, non longè aberit à temperatis.

VIRES.

Idem.

Sunt qui radicem maximè præferant contra pestilentia contagia, & pota venena, & virulentorum animalium ictus, si cum vino bibatur, drachmarum duarum pondere, quare in antidotis additur. Aqua è folijs distillata, vulnera sanat, & pota sudorem prouocat.

*PVLSA-



NOMINA.

393

*PULSATILLA lutea. Gâle Diggwurk.

PULSATILLA LVTEA.

FORMA.

Folijs prouenit minus laci-
niatis quidem, sed cætera præ-
cedenti similibus, flos Maij me-
dio luteus subrubens summo
cauliculo insidet, quem subse-
quitur semen papposum, bar-
batumque.

LOCVS.

Gaudet montanis, & in Hel-
uetia frequens est in monte
Gothardi.*



Bb 5

ANAGAL

ANAGALLIS, Græcis, *Αναγallis*. Ital. *Anagallo*. Officinis, *Morsus Gallinae*. Germanis, *Gauchheil*. Hispanis, *Muruges*. Gallis, *Murgelline*, seu *Mouron*.

ANAGALLIS MAS.

G E N E R A.

Diosc. Dūm est generum, Mas alterum, alterum fœmina.

F O R M A M A R I S.

Idem. Planta est parua, humi iacēs, folijs in quadrangulo caule pufillis, subrotundis; floribus phæniceis, & paruo, ac rotundo semine.

L O C U S.

Matth. Nascitur in hortis, culto, ac lato solo.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Admodum extergentis est fœmp. *me.* cultatis, habet etiam quendam calorem attractorium: vis etiam mitigandi illi inest.

V I R E S.

Inflamationes arcet: adaetos corpori aculeos extrahit, no-mas cohibet: succus gargarizatus, capitis pituitam purgat: & naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narem iniiciatur: argemas cum melle emendat: prodest contra viperarum morsus, iocinoris, & renum vitia si ex vino bibatur.



ANAGAL

ANAGALLIS foemina, Græcis, ἀναγallis θήλυς. Italis, Anagallo femi.

ANAGALLIS FOEMINA.



FORMA.

Nihil ab altera differt, nisi floribus. Diosc.
ris colore, qui in hac cæruleus, in
illa phæniceus spectatur.

LOCVS.

Nascitur cultis, & incultis locis. Matth.
cis. Et sæpe in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Vt forma similes sunt, ita facultatibus. & viribus peculiariter autem hæc, procidentem sedem admota reprimat: altera verò euocat, vt quidam volunt.

*ANAGAL-

* ANAGALLIS Aquatica, Germanis, Wasserbungen/Wachbungen. Gallis, Berle.

G E N E R A.

Distingui possunt potissim. duo eius genera, quamvis plura sint strictissimis folijs ab hisce differentia.

F O R M A.

Primum genus recto caule attollitur, folijs oblongis, carnosis, & leuiter in ambitu serratis vestito, ex quorum sinibus enascuntur ramuli copiosis flosculis purpurascensibus ornati, quibus succedit semē minutū exiguis folliculis inclusum, radix est fibrosa, ut aliarum herbarum palustrium. Alterum supinū est, & repit, folia habet rotundiora & flosculos eleganter caeruleos.

L O C U S.

Inuenitur in palustribus, & riuis gaudet.

F A C U L T A T E S.

Apud veterinarios magno est in usu discutiendis tumoribus & scabiei equorum sanandae: in acetarijs sumpta stomachacem emēdat, calculos rumpit, urinam cit, fœtus mortuos pellit, & menses euocat. Cum aceto & butyro tosta & imposita, ac subinde renouata, tumoribus quibusuis & ignibus sacris prodest.*

S V C C I.



NOMINA. 397
 SVCCISA, Officinis, *Morsus diaboli*. Italis, *Morso di diavolo*. Germanis, *Teuffels*
Xbbis.

SVCCISA, SEV MORSVS
 DIABOLI.



FORMA.

Folijs constat plantagini *Matth.*
 angustifolij similibus, leuiorib. tamen, caulibus sesquibitalibus, in quibus minora sunt folia per ambitum denticulata, flores edit scabiosae similes. Radicem habet pollicarem, sed succisam, & veluti demorsam, à qua complures oriuntur fibræ, ellebori modo.

LOCVS.

Prouenit locis incultis, sal *Idem.*
 tibus, ac dumetis.

QUALITATES,
 ET VIRES.

Herba trita & admota, *Idem.*
 presentaneo auxilio, carbunculis pestiferis medetur, aut si vinum bibatur, in quo incocta fuerit. Radix per se, aut vinum in quo efferbuerit potum, non modo vteri dolo-

res mulcet, sed pestilentiae contagia superat. Gustu admodum amara est: quare
 exsiccatur & siccat.

HEDR-

HEDERA, Græcis, *Kieris*. Maurita. *Cissus*. Ital. *Hedera*, seu *Lella*. Germ. *Mauer*
 siue *Baum Ephew*/siue *Ebich*. Hispan. *Hedera*, seu *Eda*. Gallis, *Lierre*.

G E N E R A.

H E D E R A.

DIOSC. Hedera differētiās multas in
 genere sortiē: summas autē ge-
 nere tres, nā altera cādida, alte-
 ra nigra, & tertia, q̄ Helix ap-
 pellat. Nos autē alterā maiore,
 alterā minorem appellamus.

Matth.

F O R M A M A I O R I S.

Idem.

Maior, quā arboreā vocant,
 nō solū in syluis excelsas arbo-
 res scādīt, sed etiā antiqua ēdi-
 ficia, vrbū mēia, sepulchraq;
 adē occupat, vt tandē suo ar-
 etiori cōplexu, ea oīa diruat,
 & vnā cū ijs collabat: folijs suo
 exortu, puenit oblōgis, q̄ dein
 de tēporis tractu triquetra e-
 uadūt, leuia, crassa, robustaq;
 Florere incipit ad finē Autu-
 mni, floribus muscosis, palle-
 scentibus, ē quibus racemosi
 hyeme nascūtur corymbi, bac-
 cis ligustrinis maioribus.

L O C V S.

Idem.

Nascit̄ in syluis, in cāpis, in
 hortis, & ædificiorum muris.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7.

simp. me.

Ex cōtrarijs cōposita est fa-
 cultatib⁹, habet. n. quiddā ad-
 stringētis substantiē, quā terre-
 nā & frigidā esse cōstat: habet & nō nihil acris, quā calidā esse, vel gustus cōpro-
 bat: nec deest tertia: aqueā namq; substantiā quandā tepidā detinet, si viridis sit
 in sicca enim exhalauit.

V I R E S.

DIOSC.

Recētia folia ex aceto decocta, aut cruda, cū pane detrita, lienes sanāt. Folio-
 rū, & corymborū succus narib. infusus, cū melle, pituitā deponit: valet idē con-
 tra veteres capitis dolores, si cū aceto, & rosaceo perfundat: purulentis, aut do-
 lentib. aurib⁹, cū oleo medet: baccē quinq; trite, & in malicorio, cū rosaceo fer-
 uesactæ, si instillet oleū in contraria aure, dolorē dentiū mitigāt: corymbi triti,
 ac subditi, mēses mouēt. Instillat⁹ succus, putrida tædia nariū, graueolētiamq;
 emēdat: Lachryma psilothrū est. Illira pediculos necat. Foliorū succus ex vino
 austero potus, lienolos sanat: consuta recētia folia, in pilci formā, papulosi ex-
 ulceratisq; infantiū capitibus, vtiliter imponuntur.

Matth.

H E D E -



Maier

NOMINA.

399

HEDERAMINOR, Græcis, Κισσός ἑλὶξ. Italis, *Hederaminore*.

HEDERA HELIX, SIVE MINOR.



FORMA.

Folio exit triquetro, ac ma *Matth.*
culofo: sarmentis albicanti-
bus, ac lignosis. Hæc humi
repat, & saxis hæret: fructus
nullo neque flore.

LOCVS.

Prouenit aridis & saxosis *Idem.*
locis, circa sepes, & saxa gran-
diora.

QUALITATES,
ET VIRES.

Potest ea omnia, quæ ma- *Idem.*
ior: sed inefficacior tamen
est.

HEDER-

opro-
dis sic

Folio-
con-
it do-
co fer-
triti,
amq;
vino
is ex-
E D E-

HEDERA terrestris, Græcis *Kiordis* *ἡγεραῖος*. Italis, *Hedera terrestris*. Germanis, *Grundreben* / siue *Gundelreben*.

F O R M A.

Longo hæc reptatu humi serpit, quadrangularibus funiculis, è quibus folia prodeunt rotunda, crispa, subaspera, & per ambitum serrata, flores edit in purpura albicantes, pusillos: Radicibus tenuibus, è funiculorū geniculis prodeuntibus. Plāta tota amara est.

L O C U S.

Nascitur in opacis, circa semitas, urbium muros, & in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Amaro gustu tota plāta est, quare abstergere, extenuare, aperireq; facile poterit.

V I R E S.

Additur in potionibus quæ ad viscerum internorum vulnera parantur: succus cum æruginè mistus, instillatur vtiliter cuniculosis vlceribus: Fit è folijs recentibus oleum, ijs in eo maceratis, diuque æstate insolatis, admirabilis sanè facultatis ad tormina, & cæteros intestinorum cruciatus, cum potum, tum infusum.

HED



ermanis,

NOMINA.
HEDERÆ TERRESTRIS species montana.

401



FORMA.

Viriculos profert vulgari
breuiore: hirsutioresque,
folia circinatæ rotunditatis,
maiora, flosculi quoque paulu-
lum rubescunt, & grandiores
aliquantum sunt quam in ea
quæ passim nascitur.

Locvs.

Nascitur in Thuringia le-
cis montosis & opacis.

QUALITATES ET
VIREs.

Esapore odoreq; validio-
ribus, conijci potest omnia
valentius præstare posse hanc,
quam quæ in planitie proue-
nit. *

Cc

CHELI-

buso-
atis ad

EDE-

CHELIDONIVM maius, Græcis, *χελιδνία μέγα* Kaurō h seu Memiram. Italis, *Celidonia maggiore*. Germanis, *Echelkraut*. Hispanis, *Celiduena*, siue *Terna del-las golundinas*. Gallis, *Chelidoine* seu *eschlere*.

CHELIDONIVM MAIVS.

FORMA.

Diosc. Caule est gracili, cubitali, aut altiore, agnatis foliosis; folijs ranunculi, mollioribus tamen, & colore cesijs: flore violæ albæ, secundum singula folia prodeunte, succo tota planta madet croceo: qui mordax, & acris est, subamarus, & grauitus olens. Radix superne singularis, inferne in multa crocea capillamenta fibratur: siliqua cen corniculati papaueris, tennis, in metæ figuram longa, in qua semen recluditur.

LOCVS.

Mattb. Prouenit propter sepes, in scrobium ripis, secus vias, inter rudera, & in muris, & parietibus.

QUALITATES.

Gale. 8. Extergentis admodum, &
simp. me. calidæ facultatis est, succus eius, & ad acuendum visum, commodus est: utque in quibus crassum quiddam, quiddam in pupilla colligitur digestionem indigens.

VIRES.

Diosc. Radix cum aniso, & vino albo pota, medetur regio morbo, & vlcerebus, quæ serpunt imposita cum vino. Succus oculorum claritatem affert.

CHEL



NOMINA.

403

CHELIDONIUM minus, Græcis, *Χελιδόνιον μικρόν*. Arabibus, *Memiten*. He-
truscis, *Fauoscello*, seu *Celidonia minore*. German. *Feigwurz/Blatter Kraut*, seu
Pfaffenhöddlin. Hisp. *Scrofolaria menor*. Gal. *Conilos de Pres'es*, seu *petite eschlere*.

CHELIDONIUM MINVS.

FORMA.



Folijis prouenit hederæ mi- **diose.**
noribus, rotundiorib⁹, tene-
ris ac subpinguib⁹, humi ac-
cubantibus, sine caule: Radi-
ces habet ex eodē callo com-
plures, pusillas, in granorum
tritici modū aceruatim con-
gestas, quarum tres, aut qua-
tuor in longitudinē exeunt.
Flores fundit luteos, tenuib⁹ **Matth.**
pediculis nitentes: Breui de-
perditur tempore: vere enim
& nascitur, & arescit.

LOCVS.

Nascitur vlginoso solo, **diose.**
iuxta aquas, stagna, & lacus.

QUALITATES.

Cūm acrius sit maiore, illi- **Gal. s.**
tum celeriter cutem exulce- **sim. me.**
rat, itaque hæc herba quarti
ordinis iam absoluti, tum in
calfaciendo, tum in siccan-
do fuerit.

VIREs.

Succus eius per nares pur- **Gale.**
gat, utpote admodum acer. **diose.**
Pforas, & scabros vngues eij-

cit: Decoctum eius ex melle gargarizatum, caput purgat. Idem facit succus e
radicibus expressus; omnia pectoris vitia decoctum extrahit.

CENSURA.

Amentium cuculla digni sunt, qui Chelidonium minus, Vergilij Amellum
esse contendunt.

APPENDIX.

Chelidonium minus tametsi Dioscoridi, & Galeno aded sit acre, ut admo-
tum corpori celeriter exulceret, quod facile de eo credendū est, quod in Græ-
cia prouenit: cūm tamen Italicum nulla sit acredine præditum, calidis, ac sic-
cis qualitatibus penitus destituitur.

Cc 2

AQVI-

AQVILINA, siue aquilegia, Italis, *Aquileia*, *Celidonia maggiore*, seu *Celidonia sal-natica*. Germanis, *Aefelen*. Gallis, *Ancholies*.

AQVILINA, SEV AQVILEIA.

FORMA.

Matth. Planta est fruticosa, folijs maioris Chelidonij quadantenus similibus, subalbicantibus, per ambitum diuisis: caules edit numerosos, tenues, sesquicubitales. Flores in cacumine emicant purpurei, aut candidi, aut lutei, in stellæ modum radiantes, quatuor inferiori sede corniculis, concavis, & sursum reflexis, è quibus capitula suboriuntur melanthij modo, quæ nigrum, pellucidumq; concludunt semen.

LOCVS.

Oritur in montibus, syluosis locis, & feritur in hortis.

QUALITATES ET VIRES.

Semen drachmæ pondere potum ex Cretico vino, & croci momento ictericiam sanat: sed ægros subinde in lecto suadere oportet.



*AQV

* A Q V I L E G I Æ flores varij.



Non tantum color diuersi-
tatem parit multifariam in flo-
ribus hisce, sed & figura discre-
pare ijdem quotidie depræ-
henduntur. Nam fœtura non
solum multiplici flores den-
siores & nitidiores stipantur,
aut colorum distinctiones
nonnunquam in diuersis non-
nunquam in vnico flore variz
commendantur, sed & diuer-
sas sortiuntur facies interdum,
sive naturæ lusu sive artificio
quodam, vt inuersi * flores
propemodum videantur, aut
degenerant † sæpiusculæ &
strigiosiores apparent, & tum
quidem aut colore languidio-
re & quasi dilutiore spectan-
tur, aut profus virorem in-
duunt. *

Cc 3

CARYO-

CARYOPHILLVS Indicus, Italis, *Garofano Indiano*. Germanis, *Goldfarb Dosten*, vel *Indianisch Neglin*.

CARYOPHILLVS INDICVS.

GENERA.

Duo habet genera: Maius, & Minus.

FORMA MAIORIS.

Matth.

Planta est fruticosa, caulis bicubitalibus, & quandoq; maioribus striatis, rectis, subrufescentibus, & quibus numerosa prodeunt folia, tanacetum amula, sed maiora, & magis diuisa: flores è calice oblongo torosoque ac longo pediculo nittentes exeunt aerei, magni, numerosis admodum stipatis folijs, odore minus quam in altero graueolenti, semine tenui, oblongo, nigro: Radix illi est brevis, multifidaq;.

LOCVS.

Seritur in hortis, colitur in scetilibus, & arculis, spectaculi gratia.

QUALITATES ET VIRES.

Idem.

Excalfacit, & siccit, quo fit, vt in medicum vsum venire possit. vbi abstergere, extenuare, digerere, ac reserare sit opus.

CARYO.



NOMINA.

407

CARYOPHILLVS Indicus minor: Italis, *Garofano Indiano minore.*

CARYOPHILLVS INDICVS MINOR.



FORMA.

Flore tantum á maiore di- *Matth.*
stat, quippe qui in hoc genere
minorum spectatur bino, ter-
noque foliorum stipamento:
color illi inest aureus, subni-
gricansque, & leni quadam
purpura adumbratus, aspectu
admodum iucundo, adeo
quod ex oloferico, quod velu-
tum vocamus, à natura facti
videantur: sed odore sunt gra-
ui, & qui caput feriat.

LOCVS.

Visitur passim super fene-
stras in fictilibus, atque etiam
in hortis.

QUALITATES ET VIRES.

Excalfacit, siccat, attenuat,
incidit, & abstergit, ac aperit
valentius, quàm maior.

Cc 4

AVRI-

AVRICVLA muris, Græcis, Μυρίς αἰθρῶν. Italis, Orecchia di topo. German. Wildt Mangoldt mit blawen Blumen. Hispanis, Oreja de ratton. Gallis, Orelge de ratte.

F O R M A.

DIOSC. Planta est caulibus pluribus ab vna radice, aliquatenus ab imò rubentibus, & concavis, folijs angustis, oblongis, dorso acuto, ac elevato, nigricantibus, per intervalla assidue germinatis, atq; in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus, flosculo, ut anagallidis, cæruleo. Radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata.

L O C V S.

Matth. Oritur in pratis, in campis, & hortis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Desiccat ordine secundo: simp. me. cæterum nullam evidentem caliditatem possidet.

V I R E S.

DIOSC. Radix illita ægilopas sanat.

AVRICVLA MVRIS.



Isatis

ISATIS domestica, siue Glastum, Græcis. *ισάνης ήνερος*. Italis, *Guado domestico*.
Germanis, *Weid*. Hispanis, *Pastel*. Gallis, *Gueda*, seu *Pastel*.

ISATIS DOMESTICA.



FORMA.

Folia profert plantagini si- *Matth.*
milia, verum pinguiora, ni-
grioraque: caulis illi est bi-
cubitalis, floribus in summi-
tate numerosis, parvis, tenui-
busque, aureo colore.

LOCVS.

Seritur passim in campis ad *Idem*.
lanificia caruleo colore infi-
cienda.

QUALITATES.

Facultatis est valenter exic- *Gale. 7.*
cantis, nondum tamen mor- *simp. me.*
dentis: est etiam simul ama-
ra, atq; adstringens.

VIRES.

Illita folia tumores omnes *Diosc.*
discutiunt: cruenta vulnera
glutinant: sanguinis proflu-
uia sistunt, ignem sacrum, ex-
edentia, putrescentia, ac ser-
pentia vlcera sanant.

Cc 5

ISATIS

ISATIS sylvestris, Græcis, *ισάνς ἀγρία*. Italis, *Guado saluatico*. Germanis, *Wildt Weidt*. Gallis, *Pastel saunage*.

ISATIS SYLVESTRIS.

F O R M A.

DIOSC. Folia fert maiora, lactuæ proxima: caules tenuiores, multifidos, quadantenus rubentes, in quorum cacumine folliculi multi dependent, quandam linguarum faciem referentes, in quibus semen: flore luteo, tenui.

L O C U S.

Matth. Nascitur in campestribus, incultis locis, & in pascuis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Manifestè iam acre quid-
simp. me. dam tum gustu tum actione præfert, proinde valentius quàm sariua desiccatur, atq; valentius humidis putredinibus resistit.

V I R E S.

DIOSC. Eadem quæ & supradicta præstat, potu, & illi tu lienosis auxiliatur.



TELE-

Te
cca fa
inacue
Fab

manis,

NOMINA.

411

TELEPHIVM, Græcis, τηλέφιον. Italis, Fauagrassa. Gallis, Reprise: Ioubarbe
des vignes. Germanis, Knabenkraut/Wundkraut/Gethenne/Schmerwurzel.

TELEPHIVM SIVE FABARIA.

FORMA.

Folia promit portulacæ *diosc.*
milia, quin etiam caules non
absumiles; alas binas in singu-
lis foliorum geniculis, anne-
ctit. Ramuli à radice seni, se-
ptemve prodeunt, folijs re-
ferti cæruleis, crassis, lentis,
carnosis, flore luteo, aut can-
dido.

LOCVS.

Nascitur in cultis, & maxi- *Idem.*
mè inter vites. Quin etiam *Matth.*
faxosis locis, in tectis, & anti-
quis parietibus.

QUALITATES.

Telephium exiccantis, ex- *Gal. 3.*
tergentisq; est facultatis, non *sim. me.*
tamè insigniter calida: verum
in hoc forsità quispiam ipsum
primum esse ordinis censet: de-
ficcat tamen secundo ordine
intenso, aut certe principio
tertij.

VIRES.

Telephij folia senis horis illita, vitiliginem sanant, sed postea locus hordea- *diosc.*
cea farina illini debet: peruncta ex aceto in sole, idem quoq; præstant. sed vbi
inarduerunt, absterguntur.

APPENDIX.

Fabaria Telephij notas omnes habet. verùm de viribus dubitandum est.

* TELE-

* TELEPHIVM vel Crassula purpureo flore. Germanis , Knabenkraut
Weibse.

TELEPHIVM.

FORMA.

Parum discrepat ab altero; teneriores tamen sunt & magis rubent cauliculi. Folia quoq; non ita cærulea sunt, & flosculi suavi purpura rubent. Radice nitur paulo minore quam præcedens.

LOCVS.

Nascitur multis locis in Germania, præsertim montanis & opacis ad Rhenum.*



AGA-

AGARICVM, Græcis, *Agarikon*. Maurit. *Garicum*. Italis, *Agarico*, & *fongo di larice*. Germ. *Dammen Schwam*. Hisp. *Agarico*. Gall. *Agaric*.

AGARICVM.

GENERA.

Duo eius habentur genera, Mas alterum, alterum Fœmina.

FORMA.

Fungus est in Larice nascens, non tamen vna & eadem semper mole proueniens. Qui autem fœmina vocatur rotundior, cãdidior, friabilior, leuiorq; habetur, quin etiam primo gustu dulcis, mox amarus percipitur, & facie summa rimosus spectatur. Mas verò, qui rotundior habetur, cum compactior, durior, villosior, lignosiorq; sit, inutilis putatur.

LOCVS.

Nascitur plurimum in Tridentinorum montium syluis, vbi larices arbores crescunt.

QUALITATES.

Is primo quidem gustu (vt prædiximus) dulcis, sed paulo post subamarus percipitur, acrimoniæ ac leuiculæ adstrictionis particeps, quin etiam laxa cõsistentia præditus, quibus omnibus palam est, quoddam compositum sit ex aërea ac terrea substantiâ a caliditate extenuata. Hac itaque ratione & digerendi & calcificandi vim habet, & crassitudinem incidendi, tum viscerum infarctus expurgandi.

VIRE.

Efficax est contra tormina & cruditates: prodest contusis & ab alto deuolutis: ictericis, hydropicis, spiriosis, iecinorosis, nephriticis mi-

risicè auxiliatur: si vrina agrè excernatur, si vuluæ strangulatus vrgeat, si pallor in corpore addit, drachmæ pondere dari solet. Tabidis ex passio, lienosis ex oxymelite vtiliter propinatur. Manditur ac postea deuoratur siccus vbi ventriculus cibi tenax non sit, & acidos mittat ruminibus medetur. Aluum purgat, & veramque bilem, & pituitam pellit: venenorum antidotum est. Serpentium venenosorum morsibus mirificè auxiliatur, tribus obolis ex vino sumptum. Verum agarici proprium est, cerebrum, neruos, & omnium sensuum organa expurgare, pulmones & pectus, a lentis, crassisque & putrescentibus excrementis detergere, atque contumacem materiam omnem in articulis existentem exoluere. Resolutis, stupidis, comitiali-farctu prouenientibus, mirum in modum auxiliatur. Recensetur quoque inter medicamenta, que ad cordis affectus prestare dicuntur.

RHA-



RHABARBARVM, Italis, *Reobarbaro*.

RHABARBARVM.

FORMA.

Caule provenit à radice brevis, sed crasso, è quo circumquaque folia numerosa exeunt, ex angusta origine, in amplum definitia, deorsumq; spectantia, lanugine quadam per ambitum obducta. Hæc dum adoleſcunt viridia, adulta verò lutea spectantur. E medio foliorum stipatu cauliculus assurgit, qui summo fastigio flores mittit cæruleos: odore acuto simul, & graui. Radix pedale longitudinem superat, colore ex ruto nigricante. Crassitudo radices non omnibus plantis eadem inest: verum quæ ad summam crassitudinem excreuerunt, humani cruris molem equare solent: numerosis adnatis vndiq; fibris. Interna pulpa aurco colore nitet, rubris quam plurimis intercurrentibus venis: succo madet copioso tum croceo, tū purpureo, qui suo lentore manus implicat, & colore inficit.

LOCVS.

Oritur in Tragodytica regione, quæ propriè Barbaria appellatur, vnde illi nomen: quinetiam, in Catai regno, eminentibus quibusdam montibus & saxosis, sunt qui scribant Rhabarbarum in India oriri.

QUALITATES.

Constat tum aqueis, tum terrenis qualitatibus, quæ adstringentem illi facultatem tribuunt, quin etiam acris & igneis.

VIREs.

Omnis penitus noxa vacat: aded, vt quouis tempore dari possit non solum pueris ætate tenellis, sed & vtero gerentibus. Sinceri macerati dilutum, vbi abstersione, deiectione, & infarctus liberatione sit opus, mirificè confert. Atqui vbi adstringere ac roborare oporteat, ipsum quidem in puluerem contritū exhiberi debet. Id quod vehemētius operatur, quod igni prius fuerit tostum: Deijcit Rhabarbarum cum bilem, tum pituitam: eique propria facultas est abstergendi, roborandiq; cum ventriculum, tum etiam iecur: atq; eorum punitiones amouendi. Sanguinem pellucidum reddit, obstructions aperit, & qui ab his proueniunt morbos, sanat. Idcirco ictericos, hydropicos, lienosos, ac diuturna febre laborantes iuuat. Datur vtiliter ab alto deuolutis drachmæ pondere addito Mumie, & rubiæ radices momento ex vino austero. Opitulatur singultientibus, ac dysentericis, præsertim illud, quod igni fuerit tostum.

* APPENDIX.

De pictura Rhabarbari ab autore expressa tanquam adhuc incerta, nihil habeo quod affirmare queam. *

GEN.



NOMINA.

415

GENTIANA, Græcis, *Γεντιανή*. Arabibus, *Gentiana*, seu *Gentiana*. Italis, *Gentiana*. Germanis, *Entianwur*. Hispanis, *Gentiana*. Gallis, *Gentiane*.
GENTIANA.

GENERA.

Trium est generum. Maior. **DIOSC.**
Minor. *Miniina*.

FORMA.

Maior folijs provenit par-
tim proximè radicem planta-
gini similibus, subrubris, par-
tim à medio caule, & præfer-
tim iuxta cacumen paulum
dissectis: caule cauo, ac læui,
digiti crassitudine, genicula-
to, bicubitali: femine in calici-
bus lato, læui, glumoso, satis
ad sphondilij semen acceden-
te. Radice longa, crassa, ama-
ra, subluteo colore.

LOCVS.

Nascitur in sublimium mon- **DIOSC.**
tium iugis, vmbrosis, & vligi- **Matth.**
nosis locis. Ac etiam in eorun-
dem montium pratis, ac pascuis.

QUALITATES.

Radix efficax est, vbi exte- **Gal. li. 6.**
nuatione, purgatione, abster- **sim. me.**
sione, obstructionis liberatio-
ne opus sit. Nec mirum si hæc
possit, cum impense sit amara.
Excalfacit ordine tertio, & sic- **Auicem.**
cat secundo.



VIRE.

Radix datur vtiliter drachmarum duarum pondere cum vino, pipere, &
Ruta à serpente demorsis. Eiusdem succi drachma, laterum dolore affectis,
e sublimi deturbatis, ruptis, & conuulsis prodest: Epaticis, & stomachicis ex a-
qua porta subuenit. Radix collyrij modo subdita partus eiicit. Imposita, vt Ly-
cium, vulneraria est: & ad cuniculosa vlcera vtilis. Id quod etiam facit succus.
Radix vitiliginem abstergit. Aqua è radicibus distillata febres ab infarctu pro-
uenientes, mirifice pellit. ventris tineas necat, maculas qualescunque in facie
delet.

* GEN-

F O R M A.

Puniceos gerit flores, folijs
à priore parum differens nisi
acuminatiora essent. radix in-
uenitur nonnunquam bra-
chiali crassitudine, duos pe-
des longa in summo diuisa in
caules prodeuntes, quorum
aliquando tres, quatuor, quin
que vel sex etiam enascuntur.

L O C V S.

Prodit in alpium iugis.

F A C U L T A T E S.

Aiunt soluere & purgare
vehementius priore.*



GENTI-

NOMINA.

417

GENTIANA minor, Græcis, Γεντιανή μικρά, siue γαυβήτις. Italis, Gentiana minore. Officinis, Cruciata. Germ. Kreuzwurz/Sperenstich/leu Madelger.

GENTIANA MINOR.

FORMA.

Caule exiit rotundo, geniculo Matth. lato, dodrantali, ac etiam maiore, in cacumine rufescente. folia in caule prodeunt è geniculorum alis bina, paribus intervallis distincta, oblonga, subpinguia, vulgaris saponaria æmula, superioribusq; gentianæ folijs similia. Flores, qui purpureo sunt colore, summo caule in orbem exeunt. Radix illi alba, longa, locis pluribus in crucis modum secta, amaro admodum gustu.

LOCVS.

Nascitur secus itinera in montibus & locis non cultis.

QUALITATES, ET VIRES.

Radix præstat contra pestilentia contagia in antidotis addita. Eaque omnia potest, quæ Gentiana maior.

Dd

GEN-



GENTIANA minima, Italis, Gentianella, & Pettimborfa. Germ. Lungenblum.

GENTIANA MINIMA.

FORMA.

Radicibus, prouenit numerosis, tenuibus, albicantibus, per quam amaris. cauliculis lētis, humi accubantibus. floribus ex cæruleo purpurascētib; minoris Gentianæ similibus, per inde ac folijs.

LOCVS.

Nascitur in collibus, locis incultis, & in campestribus.

QUALITATES, ET VIRES.

Parum viribus à Gentiana differt. Contusa radix, & ventri adhibita, teretes tinea necat. Exulceratas strumas sanat radicū siccatū pulvis inspersus: Cum melle autem illitus, cutis vitia quæcunque, & maculas abstergit.



ARISTO.

ARISTOLOCHIA, malum terræ & venenum terræ, Plinio referente, Græcis, *Αριστολογια*. Arabibus, *Zaraund*, *Mafmocræ*, seu *Zaraund*. Hispanis, *Astronomia*. Gallis, *Sarrasine*, siue *Aristologie*.

ARISTOLOCHIA.



GENERA.

Trium est generum, Rotunda quæ *εργαλιν*, longa, quæ *μακρά*, & tertia, quæ *κληματίς* dicitur.

FORMA ROTUNDÆ.

Rotunda, quæ *σέμιν* vocatur, *Diosc.* folijs crescit hederaceis, præstanti odore, cum acrimonia quadâ, mollibus subrotundis: multis ab vna radice germinibus, prælongisque palmitibus. Floribus subalbicantibus, *Matt.* oblongis, ex paruo capitulo in auriculæ modum desinentibus, graueolentibusque, colore intus ex atro purpurascens, fructu viridi, rotundo, iuglandis magnitudine: Radice rotunda, tuberola, mali quantitate, vegeta, ponderosa, buxco intus colore, graui autem & amaro sapore.

LOCVS.

Nascitur in campetribus, in pratis, & in Apulia Monte Gargano.

QUALITATES.

Omnium generum subtilissima *Gal. 6.* est rotunda, & ad omnia efficacior. *simp. me.* Itaque in quibus crassum humorem validius extenuare oportet, illic vsus est rotundæ. Excalfacit ordine tertio inchoante, & siccat secundo. *Mesue.*

VIRES.

Rotunda omnibus venenis resistit, & venenosorum animalium moribus: eadem cum vino, pipere,

re, & myrrha pota drachmæ pondere mensis, secundas, partus & cætera vuluarum onera eiicit: idem quoque subdita facit: singultibus, suspirijs, horroribus, laterum doloribus, lienosis ac conuulsis ex aqua pota singulariter auxiliatur. Aculeos & spicula extrahit, ossium plet: gingiuas & dentes extergit. Dolores ab infarctu, aut crassitie crudorum humorum, flapondere pota, pituitam deiecit, quare humidæ tussi, & asthma etiam antiquo nō solum haustis, sed suspirio prodest: Ad hoc enim parantur ex ea pastilli hoc modo. Sumuntur aristolochiæ rotundæ, auripigmenti eiusque partes æquales, & excipiuntur oui vitello, & formantur inde pastilli. E quibus vnus incenditur. Et fumus per infundibulum per os sumitur. *Gal. 6.* *simp. me.* *Mesue.*

CENSURA.

Errant, qui maiorem Fumariam Aristolochiæ rotundæ vice in vsu trahunt.

ARISTOLOCHIA longa, Græcis, *ἀριστολόχια μακρά*. Italis, *Aristolugia longa*.

ARISTOLOCHIA LONGA.

F O R M A.

Diosc. Longa, quæ mascula & dactylitis appellatur, folia mittit rotundæ latiora, longiora quæ caulibus tenuibus, sesquido drantalibus: Floribus, ut in rotunda auricularem formam referentib⁹. aliquanto tamen maioribus. è quibus fructus enascuntur virides piri similitudinem referentes: in quibus semen: Radice nititur digiti crassitudine, dodrantis longitudine: buxo intus colore, & amato gustu.

L O C V S.

Matth. Vera prouenit in Italia: sed tantum in Apulia & Calabria.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Minus tenuitatis obrinet, *simp. me.* quam rotunda, sed nec ipsa inefficax est, verum abstergerendi, utq; excalfaciendi vim possidet, minus quidem, quam rotunda abstergit, & digerit, sed non minus calefacit, imo forsân plus quoq;. Itaque in quibus vsus est modicæ absterfionis commodior est longa, nempe in carnum exulcerationibus, & fermentationibus vteri. At in quibus crassum humorem validius extenuare oportet, illic rotundæ vsus esse debet.

V I R E S.

Ad ea omnia præstat, ad quæ rotunda, peculiariter autem aduersus anguium venenosorum morsus, & venena, tum ex vino drachmæ pondere pota, tum quoq; exterius illita, Menses, partus, & secundas eiicit, pota cum pipere, & myrrha. Id quod etiam præstat subdita.

* ARISTO-



*ARISTOLOCHIA longavulgaris vel maior, quibusdam Saracenica vel Clematis. Aristolochia tertia apud Plinium. Gallis, *Saragine*. Germ. *Osterrucey*.

ARISTOLOCHIA LONGA VULGARIS.

FORMA.

Caules huius omnes rectè assurgunt ad cubiti altitudinem & altius nonnunquam in quibus lutei flores, & fructus turbinati, parui omni magnitudine, semine intus lato, ad exortus foliorum accrescunt, quæ pediculo annectuntur longiore, quam in reliquis speciebus fieri solet, hederæ aut asari folijs non absimilia, ampla, venosa. radix quam cæterorum exilior, flaua odorata, amara, aromatica, acris, multipliciter sese sub terra serpendo propagans.

LOCVS.

Passim nascitur in Italia & Germania, copiose vero in vineis Alsatiæ.

FACULTATES.

Eosdem usus creditur præstare, quæ rotunda quanquam ignauius. Nec defunt qui tradant ea grauem febrem finire, sed nidore suditis carbonibus febricitantem suffire præcipiunt & ita febri promittunt liberari. Addunt vulneribus illitu mederi: cum cypero aut dracunculi semine, adiecto melle narium carcinomatis resistere, in oleo decoctam & suillo adipe algentium horrores discutere.*

Dd 3

Pisto-

* *PISTOLOCHIA*, *Aristolochia* quartum genus apud Plinium, vel *Polyrrhizos*.

PISTOLOCHIA.

FORMA.

Plin.

Tenuior est quam proxime dicta, densis radices capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Quæ tam in rectum quam obliquum sparguntur. ipsa herba penè humi sternitur, foliaq; habet partim nullis partim brevissimis petiolis annexa. flos similis est prioribus, minor tamen est, & nigrior, vel potius magis rubens, interdum etiam ex herbaceo flavescent, Semen fuscum in vasculis ceu lagenulis continetur.

LOCVS.

Prouenit locis siccioribus, saxosis & apricis.

FACULTATES.

Plin.

Conuulsis, ex alto præcipitatis, radice pota ex aqua utilissima esse traditur. Semine pleuriticis auxiliari, neruos confirmare & excalfacere puratur.*



DVLCS

DVLcis radix, Glycyrrhiza. Græcis, Γλυκύριζα. Mauritanis, Sm. Italis, Regol-
tia. Officinis, Liquiritia. Germanis, Eckeritz, siue Elisholz. Hispanis, Regalza.
Gallis, Reclisse, siue Regalisse, seu Heulisse.

DVLcis RADIX.



FORMA.

Surculis fruticat bicubitali. **Diosc.**
bus: folijs lentisci, densis, pin-
guibus, ac gummosis: floribus
hyacinthinis: fructu platani fe-
re simili, asperiore tamen, qui
siliquas lentium modo habet,
easq; fulvas & paruas. Radici-
bus est longis, samentosisq;
buxeo colore, gustu dulci ac
subacerbo.

LOCVS.

Nascitur sponte in monte **Matth.**
Gargano Apuliæ, & seritur in
hortis, & viridarijs.

QUALITATES.

Familiaris est radice natura **Gal. 6.**
nostræ temperaturæ, sed cum *simp. me.*
adstrictio quædam adiuncta sit,
vniuersum eius temperamen-
tum quantum ex caliditate, &
adstrictione est, tepida potissi-
mum caliditatis fuerit, quam
proximè accedens ad tempe-
ramentum. Abstergit, mun- **Matth.**

dat, lenigat, mulcetq; humorum acrimoniam.

VIREs.

Radice succus in arteriæ scabritia efficax est, si linguæ subditus eliquescat: **Diosc.**
estuant stomacho, iocinori, thoraciq; conuenit. Sanat vesicæ scabiem, & re-
num dolores, cum passo potus. Idem sitim sedat, vulnera conglutinat illitus.
Eiusdem farina pterygij vtiliter adhibetur. Ardoribus vrinæ mirificè auxilia-
tur. Mansa radix, præsertimq; recenter effossa, non solum sitim sedat, sed etiam
famem, seruatq; vires diebus pluribus. Idem præstat concretus succus in ore
contentus. Pectus, & pulmones iuuat, quare datur vtiliter suspiriosis, phthisi-
cis, pleuriticis, & tussientibus.

* GLYCYRRHIZA vulgaris. forte Radix Scytica apud Theophrastum. Germ.
Gemein Süßholz.

GLYCYRRHIZA VULGARIS.

FORMA.

Suffrutex est præcedenti
Dioscorideo similis, virgas e-
mittens bicubitales & altio-
res, lignosas, semestres, folia
quoq; in pediculo seriatim si-
bi inuicem opponuntur sub-
rotunda, glutinosaq;. Floscu-
li in summitate purpurascen-
tes post se relinquunt semina
siliquis maiusculis inclusa,
quæ non tam dense stipantur
vt platani pillulam efformet,
sed singulæ singulis pediculis
adhærentia aliquanto spacio
à se inuicem distant, radicibus
propagatur sarmentosis, præ-
longis, dulci succo præditis,
intus flauescens, & mire
vinacibus.



LOCVS.

Seritur in hortis & alicubi
sponte nascitur. Imprimis ve-
ro hac radice nobilis est ager
Bampergensis.

QUALITATES.

Calore temperato humentiq;, recens potissimum & sicco abundans & mo-
derata quadam absterfione naturæ conueniens & amica est, viscerumq; obstru-
ctiones expedit.

FACULTATES.

Præstat omnia & potiora in super, quam suæ Glycyrrhizæ tribuunt Diosco-
rides & Galenus. Acres & sallos humores retundendo thoracis & trachæ vi-
tia sanat, asperitates lenit & concoctionem iuuat.*

CEN-

CENTAVRIVM magnum, Græcis, Κενταύριον μέγα. Aphris, Chentaurion kibir, seu
Saurion habre. Italis, Centaurea maggiore. Germanis, Keupentic. Hispanis,
Ruipontic. Gallis, Rhepontico.

CENTAVRIVM MAGNUM.

FORMA.

Folia pmitiuglâdis, oblonga, viridi brassicarû colore, in
ambitu ferrata. Caulē ceu ru-
micis bicubitalē tricubitalē
ve, multis ab radice adnatis: in
quib. capita sunt oblōga, papa-
ueris magnitudine, Cnici figu-
ræ quib. flos exit cæruleus, &
semē Cnico simile, papposa la-
nugine circūstante. Radix est
illi crassa, pōderosa, solida, tri-
pedalis, rubeo succo pregnās,
cū adstrictione aliqua, & dul-
cedine acris, & rufescens.

LOCVS.

Plurimū provenit, idq; præ-
stās in Gargano Apulię mōte,
quin etiā in Monte Baldo in
Veronensi agro, ac etiā in alijs
nonnullis Italia mōtibus, sed
Apulo longē infirmius.

QUALITATES.

Radix sicut gustu cōtrarias
qualitates, ita in vsu cōtrarios
effec^{to} demonstrat. Gustu itaq;
acris, simulq; adstringēs appa-
ret, cū lenicula quadam dulce-
dine. Lenit, trahit, aperit, ro-
borat, adstringit, puocat, vul-

VIREs.

Radix medetur ruptis, cōvulsis, pleuriticis, agrē spirantibus, diurnæ tussi,
sanguinemq; expuentib. duarum drachmarū pondere in aqua pota, si febris sit,
sin aut in vino. Præstat & ad tormina, & vteri dolores: subdita, menses & partus
extrahit. Tusa recens, aut arida ante madefacta vulnera glutinat & coniungit.
Carnes in ollis coalescūt, si tusa simul decoquatur. Datur vtiliter hydropicis,
Ictericis, & Iecinorosis, tū vino macerata, tū in puluerē pota: Eiisdē succus vn-
ciæ pondere haustus, ac etiam vulnere illitus, auxiliatur à serpente demorsis.

CENSURA.

Qui putāt Centaurij magni radicem legitimam esse Rhaponticū, magno in
errore versantur.

Dd 5 CENTAV-



CENTAVRIVM minus, Græcis, Κενταύριον μινός. Arabibus, Chantaurion sege, & segir, seu katarion sages. Italis, Centaurea minore. Hetruscis, Biondella. Germanis, Taufent gällden Kraut, Sieberkraut, Erdgall, siue Diberkraut. Hispanis, Fel de tierra. Gallis, Repeyeret, siue Centaure poulet.

CENTAVRIVM MINVS.

FORMA.

DIOSC. Herba est hyperico, aut Origano similis, caule anguloso, palmum excedere: floribus in umbellæ ferè modum comantibus, è puniceo in purpuram vergentibus, folijs oblongis ac parvis: semine tritico simili: radice pusilla, lævi, & superuacua.

LOCVS.

Nascitur in pratis, pascuis, & campestribus.

QUALITATES.

Gal. li. 7. Radix prorsus inefficax est, simp. me. sed ramuli eius, & potissimum folia, & flores, vtilissima sunt. Vincit in eis qualitas amara, paululum habes adstrictionis, atque ob huiusmodi temperamentum, admodum exiccatorium est medicamen, expers mordacitatis.

VIREs.

DIOsc. Herba recens rufa, vulnera glutinat, vetera vlcera purgat, & cicatrice obducit: bile, crassosq; humores per aluū ducit, si decocta deuoretur. Ius decocti conuenientissimè ischiadicis infunditur. Siccus cum melle mistus caliginem oculorum purgat. In vellere subditus, menses, & partus extrahit, haustus verdè neruorum vitij medetur. Datur foliorum, & florum decoctum vtiliter potandum tertianarijs, quòd bilem per inferna deijciat. Idem, pariterque succus iocinoris, ac lienis, obstructiones, & duricias tollit: aluitineas pellit, cum potus ex melle drachmæ pondere, tum umbilico illitus. Herba, comaq; decoctum, varos, albos, lentigines, ac cæteras cutis infectiones exterit. Instillatur succus vermiculosis auribus, quin etià illinitur contra papulas, & manantia capitis vlcera.

*CENTAV-



*CENTAURIUM luteum, perfoliatum, vel diaphyllum. Germanis, Gess. Tan-
sent gliden.

CENTAURIUM LUTEUM.

GENERA.

Duo sunt Centaurei lutei
genera, hoc potiss. differentia,
quod alterum angustiora & non
perfoliata folia habeat, alterum
latiora & caulem undique am-
bientia.

FORMA.

Herbula est pusilla, alterius
Centaurei minoris magnitudi-
ne, folijs rotundis eleganter ve-
stito cauliculo, qui per mediū
ipsorum traicitur. Flores lutei
sunt interdum pallidiores, in-
terdum crocei magis, semina
profert pusilla, in rotundis ca-
psulis.

LOCVS.

Nascitur in aruis, & non-
nunquam in vetustis muris, præ-
sertim in agro Bononiensi.

QUALITATES,
ET VIRES.

Quamvis eam amaritudinem non habeat quam Centaurium minus, amara
tamen est euidenter, & ad vulnera valet.*

CHAMA.



CHAMÆLEON albus, Græcis, Καμαλέον λευκός. Mauritanis, Chameleon lente, seu Chamalium. Italis, Carlina, & Chameleone bianco. Hispan. Cardo pinto. Gal-
lis, Carlina, siue Chameleon blanc.

F O R M A.

D I O S C.

Planta habet sylibo, aut sco-
nilia, asperiora tamē,
et ac nigro Chamæleo
validiora. Caulē non pro-
mit, verū ex medio spinas
Echini marini, aut Cinaræ
modo erigit. Flores emittit
purpureos veluti papparum
lanugines: semen cnico simi-
le: radicem in latis collibus,
crassam, in montosis verò gra-
ciliorem, in profundo albā,
aliquatenus odoratam, dul-
cem, & odore graui.

L O C V S.

Matth.

Nascitur in collibus, cum
in latis, tum in montosis lo-
cis, quin etiam in incultis, a-
rido solo.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 8.

Excalfacit ordine secundo
simp. me. absoluto, siccat verò tertio.

C H A M Æ L E O N A L B V S.



V I R E S.

D I O S C.

Pota radix acetabuli mensura latas interaneorum tineas pellit. Hydropicis
datur commodissime drachmæ pondere ex vino albo. Eiusdem decoctum po-
tum vrinæ difficultatibus subuenit. Hausta in vino serpentium venenis resistit.

Matth.

Enecat tamen canes, fues, & mures. Vulgus radicem magnificat contra pesti-
lentiæ contagia, si quotidie drachma deuoretur.

CHAMÆ.

N O M I N A.

429

CHAMÆLEON niger, Græcis, Καμυλέων μέλας. Arabibus, Chamæleon melamos. Italis, Chameleone nero. Germanis, Eberwurk. Hispanis, Cardo pinto. Gallis, Chiardonette.

CHAMÆLEON NIGER.

FORMA.



Folij exit scolymo mino- DIOSC.
ribus, tenuioribus, & rubro
colore distinctis, caule do-
drantali, digitali crassitudine,
subrubro, & in umbella flo-
res spinosos, tenues, hyacin-
tino colore, versicolorésve.
Radice crassa, nigra, dēsa, in-
terdum exesa: quæ dissecta fla-
uescit, & cōmanducata mor-
det.

L O C V S.

Prouenit in campestribus, *Idem.*
& in maritimis, siccis, & cli-
uosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Radix lethale quiddā ob- Gal. li. 8.
tinet, detergit, digerit, & e- simp. me.
mollit, siccatur ordine tertio,
& exalfacit secūdo absoluto.

V I R E S.

Trita radix cum chalcanti exiguo, & axungia scabiem abigit: cocta in aceto,
addito sulphure, & bitumine impetigines, vitilignesque sanat. Decoctum in
ore detentum, dentium dolorem mitigat, phagedænas tetraq; vlcera illitu sa-
nat.

CHAMÆ-

Matth. Non defunt qui hanc plantam legitimum nigrum Chamæleonem esse contendunt, verum cum plures in ea (quantum video) desiderentur notæ, ego quidem, eorū sententiæ haud ita facile subscribam.

* APPENDIX.

Non differt à Chamæleonte albo, nisi quod in caulem creuerit.*



LABRUM

NOMINA.

431

LABRVM VENERIS, Græcis, *Διλας*. Aphris, *Dilfacos*. Italis, *Cardo panni*, & *Disfaco*. Germanis, *Rartendstil*. Hispanis, *Cardencha*, seu *Cardo pentecador*. Gal-
lis, *Cardon*, & *Carder*.

LABRVM VENERIS.



GENERA.

Duum est generum. Sati- *Matth.*
uum, & sylvestre.

FORMA.

Satium caulem habet al- *Diosc.*
tum, spinis horridum, folijs
lactucæ, spinosis, binis, geni-
cula singula complectentib.
prælongis, bullisq; quibusdā
refertis, ipsisq; pariter acu-
leatis, concavo alarum sinu ē
foliorum cōnexu, in quo im-
ber aut ros asseruetur. In ca-
cumine caulium singula fur-
culis capitula insunt oblōga,
echinata spinis, quæ arefacta
candida spectantur, dissecta-
que medullatenus vermicu-
los ostendunt.

LOCVS.

Seruntur in campis ab Ita- *Matth.*
lis multis in locis ad lanificia,
quin etiā & sponte nascitur,
nonnullis in regionibus.

QUALITATES.

Radix exiccat ordine secundo, atque nonnihil abstergit.

VIRE.

Tula radix & vino decocta, vsq; dum sit ceræ crassitudo, sedis rimas & si-
nus curat: sed aenea pyxide recondenda, pensilibus verrucis, & formicantibus
vtiliter adhibetur. Capitulorū vermiculi in folliculo collo suspensi, produntur
quartanis febribus remedio esse. Expetuntur piscatoribus, quod ijs hamis im-
positis, pisces hac esca mirum in modum alliciantur.

Gal. 6.
simp. me.

LABRVM

LABRVM Veneris alterum, iisdem appellatur nominibus, quibus primum ap-
pellari diximus.

LABRVM VENERIS ALTERVM.

F O R M A.

Matth.

Facie à priori parum admo-
dum differt, sylvestrius tamē
est, & spinis longè horridius.
Echinata capitula setis quoq;
compluribus scatent, aculeis
non adeò firmis, atque adun-
cis, vt in altero genere.

L O C V S.

Idem.

Nascitur sponte in campe-
stribus, in agrorum, & scro-
bium aggeribus, secus itine-
ra, & prope sepes.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.*Idem.*

Non differt suis omnibus
in facultatibus ab altero.



VIRGA

NOMINA.

Virga pastoris, Italis, Virga di pastore, & dissaco minore.

433

Marth.

VIRGA PASTORIS.

FORMA.



Folijs caule echinatis capi- *Idem.*
tulis, ac cæteris suis partibus
Veneris labrū æmulatur, sed
omnibus gracilioribus, mino-
ribus, & infirmioribus capi-
tulis adeo parvis ut oliuæ ma-
gnitudinem vix æquent, te-
nuibus capillamentis refer-
tis.

LOCVS.

Prouenit vmbrosis, & vli- *Idem.*
ginosis locis. * In hortis se-
mel sata vix potest iterum ex-
tirpari, ita è semine hinc inde
sparsa repullulat.*

QUALITATES, ET VIRES.

Non crediderim ego hanc *Idem.*
plantam à Veneris labro ad-
modum distare, imbecillioris
tamè esse facultatis haud ne-
gauerim.

Ec

SPI-

SPINA alba Græcis, *ἄγρια λευκή*. Arabibus, *Bedeguar*. Italis, *Spina bianca*.

SPINA ALBA.

F O R M A.

Diosc. Folia fert albi Chamæleonis, angustiora tamen, candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caule bicubitalem, & maiorem, pollicari, aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum. In cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus & oblongū: flores purpurei, ex quibus semen gignitur Cnici modo, sed rotundius.

L O C V S.

idem. Nasclitur in montibus, & syluosis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. Radix desiccatoria est, &
simp. me. modicè adstringens: semen vero tenuis essentia, & calidæ facultatis habetur.

V I R E S

Diosc. Pota radix celiacis, stomachicis, & ijs, qui cruenta extussunt, efficax est: vrinam cit: tumoribus illinitur: Decoctum eius in ore detentum, & in collutionibus adhibitum, dentium dolores mulcet. Epotum semen conuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur.

*Sper-



*SPINA alba putata, alijs Echinopus, nonnullis Acanthium, vulgo Sphærocephalus, quibusdam Chamæleon niger, alijs Crocodilium, Ger. Diefenbäff.

GENERA.

Plurimum est generum, è quibus duo vulgatiora.

FORMA.



Prior Sphærocephalus echinatum gerit capitulum flosculis candidis ceu stellulis è quorum singulis apices extant cærulei pulcre exornatum. Caulis altus folijs vestitur latis, aculeato ambitu horrentibus prona superficie ex albidis, supina ex atro virentibus. Radice nititur oblonga alba, quæ altero à fatu anno lignescit. Semina in capitulis villosa dense stipantur, & ventorum flatu decussa passim se propagant.

LOCVS.

Habetur in hortis, & sponte nascitur saxosis & fluuijs imminentibus collibus.

VIREs.

Decoctum echinati capitis vna cum caule & seminibus, quæ admodum sunt amara, mirifice prodest in doloribus dentium.*

Ec 2

*SPINA

* SPINA alba putata flore cæruleo.

F O R M A.

Differt à priore, quod humilior sit, & candidiora proferat folia, quæ angustiora magisq; laciniata esse observantur. Flores in globulis cærulei elegantissimi disponuntur, summo cauli insidentibus, è quibus semen relinquitur ut in præcedente hirsutum, sed grandius.

L O C U S.

Peregrina cum sit planta non nisi in hortis quærenda erit.*



CAR-

NOMINA.

437

CARDVVS, Scolimus. Græcè, *Σκόλιμος*. Arabibus, *Raxos*, *Harxos*, siue *Sacolomas*.
Italīs, *Cardo*, *Carciofo*, & *Archichioco*. Germ. *Strobildorn*. Hispanis, *Cardo de*
comer, seu *Cardos*. Gallis, *Artechault*, siue *Carciophe*.

CARDVVS NON ACULEATVS.

GENERA.

Plura habentur genera. sed *Matth.*
dum tantum hic meminisse
sat fuerit, nepe satini & spon-
tè nascentis. satini duo sunt
genera: alterum aculeatum,
& alterum sine aculeis.

FORMA.

Qui aculeis caret, folia pro *Idem.*
mit grandia per ambitum la-
ciniata, auersa parte subalbi-
cantia numerosaq; : caulem
edit longum, foliosum, capite
echinato, sine aculeis tamen.
Et quadantenus pini cono si-
mile.

LOCVS.

Seritur passim in hortis, & *Idem.*
viridarijs.

QUALITATES.

Excalfacit ordine secundo *Gal. 8.*
completo, aut tertio incipi- *simp. me.*
ente, & exiccat secundo.

VIREs.

Radix contusa, & illita, cum alarum graueolentiam, tum corporis totius e- *Diosc.*
 mendat. Eadem decocta in vino bibita copiosam, fetidamq; vrinam ducit.
Herba cum recens tenerescit, in olera asparagi modo transit. Melancholicum *Gal. lib. 2.*
succum gignit carduus pro obsonio sumptus. Non solum foliorum carinas *de ali. fac.*
mangonio elaboratas, albicantes tenerasq; , sed etiam caules vorant Itali cum
sale, & pipere secundis mensis, sed fructus quoque tum crudos tum iussulis in-
coctos.

Ec 3

CAR-



CAR-

CARDVVS aculeatus, Græcis *Σκόλη & ἀκανθόδης*. Italis, *Cardo*, & *Carciofo* *st-*
nos.

C A R D V V S A C U L E A T V S.

F O R M A.

Matth.

Folia gerit alterius magis
divisa, magisq; laciniata, te-
nuibus circumdata spinis: cau-
lem quoque alteri similem,
striatum subalbicantem, in
cuius summitate echinatum,
aculeatumque extuberat ca-
put, flore hyacinthino: semi-
ne Cnici minore. Radice niti-
tur crassa, firma, non in suavi.

L O C V S.

Idem.

Colitur in hortis ad men-
sarium bellaria.

V I R E S.

Idem.

Idem prestare potest, quod
alter.



*SCOLY.

NOMINA.

439

*SCOLYMVS sylvestris. Germanis Schönharle.

CARDVVS SYLVESTRIS.

FORMA.



Sylvestris Scolymus non alte affurgit, folijs aculeatis, caulibus duorum dodrantum altitudine, colore atro rubente, odore vinoso, in summitate crescunt capitula, in quibus semen & pappi albid.

LOCVS.

In Bohemia & alibi sponte nascitur.

VIRE.

A fœminis vsurpatur in lixiuo ad abluendos capillos qui flavescent inde & pulcriores efficiuntur, & à pediculis & lendibus immunes redduntur.*

Ec 4 POTE

POTERIVM, Græcis, Ποτέριον. Italis, Poterio.

POTERIVM.

FORMA.

Diosc. Largè fruticat, cortice obductū tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, tenuib⁹, tragacanthæ proximis, folijs parvis, rotundis, flore exiguo, candidi coloris, semine superuacuo, sed gustu acuto, & odorato. Radices mittit binum, ternumve cubitorum, nervosas, & firmas, quæ proximè terram incisæ, succum fundunt gummi similem.

LOCVS.

Idem. Nascitur in aquosis, & collibus.

QUALITATES.

Gal. 3. Desiccandi absq; morfu facultatem possidet, adeo, vt & nervos incisos glutinare credatur. Radices eius potissimum sunt eiusmodi.

VIRES.

Radices tusæ præcis nervis, & vulneribus glutinandis illinuntur. **Deco-**
rum quoq; earum, nervorum affectibus prodest.

ACAN-



NOMINA.

441

ACANTHIVM, Græcis, ἀκάνθιον. Italis, Acanthio.

ACANTHIVM.

FORMA.

Planta est albæ spinæ simi- Diosc.
lis, folijs extremo ambitu acu-
leatis, & araneosa lanugine
obductis, ex qua collecta, &
neta telas bombycinis similes
texunt.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & Matth.
locis incultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Folia & radices ad remedia Diosc.
opistotoni vsurpantur in po-
tu.



Ec 5 ACAN-

Deco-

ACAN-

ACANTHVS, Græcis, *ἄκανθα*. Italis, *Acantho*, siue *Branca Orfina*. Germanis, *Do-
ren-Kraut*. Hispanis, *Terua giguante*, & *Branqua Vrsina*. Gallis, *Branze Orfint*.

ACANTHVS.

FORMA.

DIOSC. Folia habet multò lactuca-
ceis latiora, & longiora, eru-
cæ diuisura, nigricantia, pin-
guia, læuia, caulem bicubita-
lem, digitali crassitudine, læ-
uem, prope verticē ex inter-
uallis circumdatū foliolis, ceu
nucamenta quædam oblon-
ga referentibus, spinosis, è
quibus flos prodit albus; se-
men oblongum, luteum. Ca-
put thyrsi specie. Radicibus
nititur longis, mucosis, ru-
bris, & glutinosis.

LOCVS.

Idem:

Nascitur in hortis, petro-
lis, & riguis.

QUALITATES.

Gal. li. 6.

simp. me.

Folia quidem mediocriter
digerentem facultatem obti-
nēt. At radix exiccatoria est,
& leuiter incisoria, & tenuiū
partium.



VIRES.

Radices vltis igni, & luxatis artubus illitæ subueniūt: potæ vrinam cient, sed
aluum cohibent: ruptis, cōnuulsis, tabidis mirè profunt.

APPENDIX.

Tametsi Acanthus, qui nostris in hortis feritur, folia spinosa non habeat,
non tamen ob id spurium id esse fuerit credendum. Siquidem (vt Plinius est
autor lib. & cap. 22.) duo Acanthi habentur genera, alterum crispum aculea-
tumque, alterum læue.

ANONIS

NOMINA.

443

ANONIS sive Ononis, Græcis, *dyovis*, sive *dyovis*. Officinis, & Herbarijs, *Rest. a*
bou. Italis, *Ononide*, & *Bonaga*. Germa. *Stallfrant*/sen *Hawbachel*. Hispanis,
Gatillos, & *Gatibines*. Gallis, *Bugraves*, sive *Burgundes*.

ANONIS, SIVE ONONIS.

FORMA.



Ramos habet fruticosos, **Diosc.**
dodrantales, aut maiores, fre-
quentibus geniculis cinctos,
cauis alarū multis: folijs len-
ticulæ tenuibus, pusillis: ad
pratēsis loti folia accedenti-
bus, subhirsutis, non iniucun-
dè olentibus. Rami acutiori-
bus spinis, & veluti spiculis
firmioribus, horrent. Radi-
cem mittit candidam.

LOCVS.

Nascitur plurima in pratis, **Matth.**
quin etiam in incultis locis.

QUALITATES.

Radix exalfacit tertio qua **Gal. li. 7.**
dantenus ordine: cortex eius **simp. me.**
maximè est vtilis, habēs quip-
piam & absterforium, & in-
cisorium, proinde non tan-
tum vrinas prouocat, sed &
lapides confringit.

VIREs.

Radicis cortex ex vino potus, vrinas ciet, calculos comminuit, & vlcera **Diosc.**
margines erodit. Radicis ex posca decoctum collutione dentium dolores mul-
cet. Decoctum eius potum hæmorrhoidas sanare creditur.

*ONONIS

* ONONIS lutea, montana, Natrix alijs.

ONONIS LVTEA.

F O R M A.

Eradice singulari, simplici, parua, lignosa, cauliculi furculosi oriuntur, dodrantes, albicantes, ab imo vsq; ad summum folijs paruis, crassiusculis, ternis plerunque, oblongis, saluginosis vestiti. Flores in summis coliculis lutei pallescentes leguminum specie, è quibus filiquæ fiunt semine plenis, colore pullo. Herba tota est hirsuta & pinguis, odorata, sed hircinum quiddam olet.

L O C V S.

Frequens Monspelij inter segetes & prope mare.*



CARDVVS

CARDVVS lacteus. Italis, *Scardacio bianco*, seu *Cardo del latte*. Germanorum *Oeficinis*, *Carduus diue Maria*, & *Carduus lactarius*. Germanis verò ipsis, *Unser Frauen Distel*. Gallis, *Chiardon de nostre Dame*.

CARDVVS LACTEVS.

FORMA.



Folia fundit magna, pingua, per *Matth.* ambitum laciniata, ac tenuibus, acutisq; aculeis circumquaq; stipata: albicantibus vbiq; maculis: caulem profert bicubitalē, & sæpe maiorem, spinis horrentem, brachiatum. Echinatis, aculeatisq; in summitate capitibus, qui æstate media florent cinaræ modo, floribus purpureis capillaceis. Semine Cnici minore, papposa lanugine obducta. Radice nititur, valida alte descendente, amaro sapore.

LOCVS.

Nascitur sponte in campestribus, *Matth.* incultis locis, secus itinera, & agrorum marginibus.

QUALITATES.

Radix exalfacit, abstergit, aperit, prouocat, & attenuat. *Idem.*

VIRES.

Radicis decoctum datur vtiliter potandū ad iocinoris, & vasorum infarctus, & remorantes vrinas, quare confert hydropicis, ictericis, ac nephriticis. Idem menses elicit, tum porum, tum in defensionibus additum: Radicum siccarū puluis: propinatur ex prillana cum fœniculi semine, & longo pipere ad lac augendum. Stillatitia foliorum aqua vtuntur quidam ad lateris dolorem, valentiusq; id præstare aiunt, si cum seminis drachma propinetur.

TRAGA-

TRAGACANTHA, Græcis, Τραγάκantha. Italis, Tragacantha. Arabibus, Chitirā. Chatech, seu Alchatad. Germ. Dragant. Hispan. Alquetira.

TRAGACANTHA.

FORMA.

Diosc. Radice nititur lata, & summo cespite lignosa, vnde furculos humiles, frequētes, robustos latissimè fundit, in quibus minuta folia, multa, & tenuia exoriūtur, quæ sub se spinas albas, rectas, & firmas occultant. Est etiam Tragacantha lachryma, quæ vulnerata radice manat.

LOCVS.

Matth. Nascitur in Apulia in monte Gargano, ac etiam in alijs longinquis meridianisq; regionibus, vnde ad nos comportatur lachryma.

QUALITATES.

Gal. 6. Tragacanthæ lachryma similem gummi vim obtinet emplasticam quandam, quæ humorum acrimoniam obtundit, & sanè similiter illi desiccatur.

VIRES.

Lachryma cutis spiracula obstruit: additur in oculorum medicamentis: præstat & contra tussim, exasperatas fauces, retusas voces, & cæteras destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoque linguæ liquecit: in passo madefacta drachmæ pondere bibitur contra renum dolores, & vesicæ rosiones, misto cornu cerui vsto, & eloto, aut scissi aluminis momento: quæ tosta fuerit dysentericis auxiliatur ex cydoniorum vino hausta. In summa vbi læuigare, obtundere, & reprimere opus est, præstantissimum semper fuerit medicamentum.

ERYN-



ERYNGIVM, Græcis, ἑβγγιον. Italis, Iringo. Germ. Drachen Distel / siue Mannstreu. Hispanis, Cardo corredor. Gallis, Paracault.

ERYNGIVM.

G E N E R A.

Tria eius habentur genera. *Matth.*
Montanū, siue campestre. Ma-
rinum & planum.

F O R M A.

Montanum folia fert Car-
dioidia, lata, per ambitum lacini-
ata, aspera, gustu aromatica, sed
vbi adoleuit circa complures
caulium eminentias in spinas
aculeatur, in quorum summi-
tatibus globosa capitula dura-
rum, acutissimarumq; spina-
rum ambitu stellatim circum-
uallantur; quorum colos alias
virides, alias albus interdū cæ-
ruleus inuenitur. Radix oblon-
ga, lata, foris nigra, internè cā-
dida, pollicis crassitudine, &
odorata.

L O C V S.

Nascitur in asperis, campe-
stribus & in sabulosis pratis. *Matth.*

Q U A L I T A T E S.

Caliditate quidem aut parū *Gal. li. 7.*
aut nihil, quæ temperata sunt *simp. me.*
superat, siccitatem verò in te-
nui essentia consistentem, nō
paruam obtinet.

V I R E S.

Pota radix, menses & vrinas pellit, tormina inflationesq; discutit, contra iocinoris vitia,
serpentium morsus, & hausta venena, vino pota prodest. Bibitur aduersus plurima cum semi-
nis pastinacæ drachma. Appensa illitave tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite
opisthoronicis, & comitialibus medetur. Eiusdem decoctum expedit iocinoris & lienis in-
ferno, vbi ranæ non sint ad manus, valet & contra cordis affectus. Præstat quoque contra
stranguriam, obstruosos renes, & vuluarum præclusiones. Illita ex melle infixa corpori extra-
quàm maximè utilis, qui morbi Gallici vlcerebus laborant, si diutius quotidie ea vtantur in
pocu.

C E N S V R A.

Magno admodum tenentur errore, qui Eryngium Mauritanorum seculum esse contendunt,
ERYN-



ERYNGIVM marinum. Italis, *Iringio marino*.

ERYNGIVM MARINVM.

FORMA.

Matth. Folia edit alterius longè
latiora, circinata, & in am-
bitu aculeata, & cespicio resper-
sa colore. Caulem carnosio-
rem, crassio-rem, atque stria-
tum, capitulis caeruleis, ma-
ioribusque. Radices habet
prælongas, teneras, ac mol-
les digitali crassitudine.

LOCVS.

Idem. Nascitur in maritimis, nō
longè à littoribus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Radix minus siccat, quàm
altera, sed eandem possidet
vires.



ERYN-

ERYNGIVM planum, siue læue. Italis, *Iringoliscio*, & *Iringosenza spine*.

ERYNGIVM PLANVM.



FORMA.

Folijs exit latis, oblongis, minimè laciniatis, in ambitu tamen serratis caulibus compluribus, ramosis: oblongis in summitate capitulis; ipsisque subasperis. Radice vegeta ceteris crassiore.

LOCVS.

Prouenit in Austria in Viennensi agro, campestribus locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Radix minus quàm cetera præscripta siccatur, minùsque ad omnia præstat.

Ff ALOE,

ALOE, Græcis, *Αλόν*. Aphris, *Saber, Paber, siue Subar*. Ital'is, *Aloe*. Germanis, *Allepatick / & Bitter Aloes*. Hispanis, *Hierua babosa*. Gallis, *Aloes*.

FORMA.

DIOSC. Folijs prouenit scillæ similibus, pingibus, modicè latis, rotundis retrorsum pandis, quæ utrinq; ex obliquo longioribus interuallis striantur, & in mutas spinas desinunt, caule antherico non dissimili, flore albo, ac purpureo, fructu hastulæ regię cognato: Tota planta grauius olet, & gustu est amarissima. Radice vnica cœu palo, in terram depacta.

LOCVS.

DIOSC. Plurima præpinguisq; in India gignitur, ex qua coactus succus affertur. Nascitur, & in Asia, & Arabia in locis quibusdam maritimis & Insulis, vt in Andro.

QUALITATES.

Gal. 6. simp. me. Est Aloe non simplicis naturæ, sed vt indicio est gustus, adstringit simul, & amara est: adstringit quidem mediocriter, sed vehementer est amara: subducit & aluum: Exiccatur quoq; ordine tertio, excalfacit verò aut primo intenso, aut secundo exoluto. Repellit, digerit, extergit.

VIRES.

DIOSC. Sanguinis reiectiones sistit: regium morbum purgat drachmæ pondere ex aqua frigida. Deuorata cum resina, vel melle cocto, aluum soluit. cæteris medicamentis admista præstat vt minus stomachum lædant: sicca & inspersa vulnera glutinat, & vlcera ad cicatricem perducit cohibetq;. Eadem peculiariter pudendorum vlcibus medetur. Condylomata, & sedis rimas ex passo sanat: hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis fluxiones sistit. Priuatim scabras lippitudines, pruriginēq; in oculorum angulis permulcet: temporibus, & fronti ex aceto, & rosaceo illita, capitis dolorem sedat: cum vino autem capillum fluentem continet. Vtile stomacho est medicamentum, vt si quid aliud. Infestissima est his, qui citra vitiatos humores, ex calida, siccaq; intemperie affliguntur: proximam ab his læsionem percipiunt, qui siccam intemperiem habent, etiam cum frigiditate coniunctam. Deijcit aloë non modo bilem, sed pituitam ipsam: Quotidianus eius vsus à mortiferis morbis tueretur: sanis omnes, intellectumq; acuit: Iecur ab infarctu purgat: hæmorrhoidibus, ac cæteris sedis inflammationibus nocet (scilicet pota, non tamen exterius admota) ex aceto & felle bubulo vmbilico, ventriq; illita, intestinorum animalia necat.

Gal. li. 6. simp. me. & 8. de com. me. sec. locos. Matth.

ALOE.



*ALOE

N O M I N A.

451

* *ALOE AMERICA.* Italis, *Aloe americana.* Hispanis, *Cardon,* & *Maguay dellas Indias.* Valentinis, *Fily agulla.* Indis, *Magne y & Metl.*

A L O E A M E R I C A.

F O R M A.



Folia promit alterius, multo maiora, quorum ambitum duri muniunt aculei, nigricantes, & fibris intus albis firmisque tota substantia plantæ contextitur, ut si euellatur aculeus qui in summo est, filamenta quædam robusta veluti acui appensa simul extrahantur: radices sparguntur in obliquam summam tellure in multam longitudinem, unde soboles enascitur viuacissima, quæ paucis annis crescit in arboream amplitudinem, ut palmæ caudex, non tamen apud nos attollitur, neque floret. Scribunt tamen aliqui in hortis Pisanis vere, ex medio foliorum scapum elatum fuisse breuibus folijs & raris qui paucis diebus ad altitudinem vndecim cubitorum adoleuerit, & sparserit in cacumine circumquaque ramos veluti latam umbellam constituentes, in qua flores in æstate sursum spectantes, digiti longitudine, exterius herbacei intus pallidi, explicati in sex foliola, sine fructu deciderint, (hunc autem in India ferre Cytinis Mali Punici similem indicant quidam) caulibus vero aduentante hyeme exaruerit instar Ferulæ.

L O C V S.

Nascitur copiose in Mexico, & nostri quoque hortica participes facti sunt.

Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Folia abundant succo amaro & acrimonia tamen in Italia & apud nos tanta illi amaritudo, quanta in America regione, qui vlcera sanat, & contra viperarum morsus utilis est. Eorumdem fumus per os ac nares haustus morbo Gallico medetur, sed ad id vehementer sudores mouet ut vires admodum debilitet. Præterea tradunt in India arborescere hanc plantam, ut ex ea trabes fiant, succum radici melleum inesse, ex folijs contusis & maceratis extrahi linum, quo lintea texunt molliissima candidissimaque, & huiusmodi plura alia, quæ ex varijs auctoribus passim cognosci possunt, *

F f 2

A B S I N -

vlcera ad
r. Condy-
laxiones si-
tempori-
illam flu-
est his qui
laxationem
eijcit aloe
teris sedis
de bubulo

* A L O E

ABSINTHIUM Græcis, *ἄλβιον*. Mauritanis, *Absynthium*. Italis, *Assenzo*, & *Assentio*. Germanis, *Wermut*. Hispanis, *Assentios* siue *Alofua*. Gallis, *Aluque*, siue *Abfince*.

ABSINTHIUM.

G E N E R A.

Matth. Quatuor Absynthij nominantur genera: vulgare, Ponticū, Maritimum, siue Seriphium, & Santonicum; Ponticum tamen à vulgari non diuidit Dioscorides. * Plura etiam habentur quæ apud alios Auctores picta & descripta inueniuntur. *

F O R M A V U L G A R I S.

Matth. Caule exit ramoso, folijs incanis, amaris, multipliciter sectis artemisiæ modo, floribus meliniparvis, semine rotundo racematim dependente: radice diuulsa, duraq;

L O C V S.

Idem. Prouenit ferè ubiq; & feritur, & per se quoq; in hortis nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6. simp. me. Adstrictoriam, amaram, & acrem simul qualitatem possidet, exalfaciens pariter & extergens, & roborans, & desiccans, ex acrimonia quoque constat, quod maiori portione calidum sit magis, quàm frigidum. Itaq; calidum fuerit excessu primo, & siccū tertio. Atqui succus longè quam herba calidior est.

V I R E S.

Diosc. Bilem expurgat, vrinam cit, crapulam præsumptum arceat: cum scfeli, & Celtica nardo potū, inflationibus ventris, & stomachi doloribus auxiliatur: fastidia discutit & arquatos sanat, epoto quotidie eius diluto, aut decocto: Menses elicit tum haustum, tum ex melle suppositum. Bibitur vtiliter contra fungorum strangulationes ex aceto: ex vino sumptum aduersatur Ixiæ, cicutæ, muris aranei, & marini draconis venenis. Illinitur ex melle ad fugillata, & oculorum caligines, quin etiam & ad purulentas aures. Admouetur iocinori præcordijsq; cum cerato ciprino, stomacho quoque diuturna valetudine laboranti, cum rosaceo: aquæ intercutem cum ficis, loliacea farina, & aceto, subuenit & lienosis. Præstat ad ea omnia vinum, quod ex eo paratur. Contentam in ventre pituitam oblatum nihil adiuuat, nec eam, quæ in thorace, & pulmone continetur.

* ABSIN-



NOMINA.

453

* *ABsINTHIUM* Montanum. Germanis, *Bergwerthut*. Italis, *Affenzo mon-*
tano. Hispanis, *Alofenamontesina*. Gallis, *Aluyne montaigne*.

ABsINTHIUM MON- TANVM.



FORMA.

Vulgari absinthio tam ra-
dice, quam caulibus, nec
non folijs floribúsque prorsus
simile est, sed exilius, ad sum-
mum duorum dodrantum al-
titudinem attingens, amari-
tudo illi, quæ priori, sed gra-
tior, & minus tetro abomina-
biliq̃ue odore saporeq̃; com-
mendatur.

LOCVS.

Nascitur in montibus, plu-
ribus in locis.*

Ff 3

ABSIN-

ABSINTHIUM Ponticum, Græcis, Αψινθιον ποντικον. Italis, Assenzo Pontico.

ABSINTHIUM PON-
TICVM.

FORMA.

Matth. Folijs, caulibus, floribus, semine, ac cæteris suis partibus, prouenit vulgari absinthio longè minoribus, vt ex appicta hic imagine constat.

LOCVS.

Idem. Nascitur plurimum in Pontico, vnde illi nomen: quin etiam in Vngaria, & Bohemia.

QUALITATES.

Gal. li. 11. Quum duplex in omni absinthio facultas, & qualitas sit: *cap. 16.* vtique in Pontico adstringendi qualitas non parua est, in reliquis omnibus amara quidem qualitas est vehementissima, *Metb. med.* adstrictio verò, aut planè obscura, aut prorsus nulla sentitur. Proinde Ponticum ad iocinoris, & ventriculi inflammationes eligi præstat. Id autem est tum folio tum flore longè quam cætera absinthia minore. Odor quoque illi non modo non insuauis, verum etiam aromatum quid præferens, ac reliquis omnibus est fœdus, quare hæc fugere conueniet, & Pontico semper vti.

VIRES.

Fit è recentibus floribus, & saccharo simul contusis Antidotum ad hydrophem præstantissimum, cuius longo vsu per plures sanatos vidimus. Parandi ratio hæc est. Sumito florum vncias tres. Sacchari albi libram vnã, contendantur in mortario diligenter. Et deinde pyxide vitrea recondita insolentur per mensem.

ABSINTHI-



NOMINA.

455

ABSINTHIUM marinum, siue Seriphium. Græcis, Ἀψίνθιον θαλάσσιον. Italis, *Assenzo marino*. Aquileiensibus, *Santonio*.

ABSINTHIUM MARINUM.



FORMA.

Folij exit, quæ ad terram *Matth.* sunt, vulgari absinthio similibus, sed quæ in caulibus habentur, longè minoribus, caulibus gracilibus, minuto semine refertis, gustu amaro & odore graui.

LOCVS.

Nascitur in maritimis. *Idem.*

QUALITATES.

Specie, & gustu absinthio *Gal. 6.* simile est. *sim. med.*

VIRES.

Folia per se, aut cum orizæ *DIOSC.* cocta interaneorum animalia, & teretes tineas adiecto melle enecant: aluum leuiter laxigant. Id quod cum lenticula decocta pariter præ-

stant. Eius pabulo pecora maximè pinguescunt.

FF 4

* ABSIN-

* ABSINTHII marini genera

A. Absinthij marini Autoris, flosculi, quos in summo gerit, sublutei tenues, è quibus minutum semen. B. C. Folia eiusdem. D. E. Alia species folijs magis albis, simplicibus, indiuisis. F. Aliud, cum Autoris absinthio marino conueniens, sed magis dissectis folijs. G. aliud à perito rei herbariæ pharmacopæo Veronensi, Francisco Calceolari missum minoribus folijs, ferè quanta hic pinguntur. H. aliud, Bononiæ marinum dictum, folijs minus candidis, fusciginosis cum amaritudine, abundat seminibus parvis, cubitalis est planta, multos ramulos habens. Folia primum nascentia succulenta sunt & viridia vt solet marinis stirpibus euenire. *



† A. ABSIN-

† A. ABSINTHIUM Seriphium Ægyptium & Semen sanctum, Schcha Arabum. * Santonici species maiuscula, & longiusculis foliolis.

F O R M A E T

L O C V S.



† Ægyptium pumila est *Matth.* planta in Ægypto proveniens, folijs minutis Abrotani fœminæ ferè similibus: furculis cōpluribus gracilibus, breuib. ac foliosis, A. minuto semine gustu amaro non tamen vehementer.

Semen sanctum planta est admodum fruticosa, caulibus & ramis numerosis refertis minuto semine, oblongoq; racematim prodeunte amariuscule gustu, odoreq; non ingrato. * Folia pusilla sunt, colore cinereo nostri Absinthij amula. Nascitur in terra sancta. * Affertur ex Alexandria Ægypti, ac alijs meridionalibus locis. *Matth.*

Q U A L I T A T E S,

E T V I R E S.

Ægyptiū ijs omnibus præditum est facultatibus quibus & Italicum. Semen sanctum oblinitur passim Saccharo à pharmacopæis, daturque vtiliter infantibus & pueris ad intestinorum vermes.

F f 5

* ABSIN-

F O R M A.

Herba est fruticosa Absinthio pontico similis, maioribus tamen folijs candida lanugine pubescentibus, flosculos promit croceo rubore variegatos, è quibys semen paruum amarum acre oritur. tota planta amara est, & cum aromatica qualitate aliqua odorata.

L O C V S.

Nascitur Massiliæ in maritimis, petrosis, apud nos vero culturæ assuetum in hortis habetur.*



ABROTO-

NOMINA.

459

ABROTONVM, Græcis, ἀβροτον. Mauritanis, Catsum, Kefum, seu Gaißum.
Italīs, Abrotano. Germanis, Stabwurtz/ sine Schoßwurtz/ sine Cettwurtz. Hisp.
Abrotono, & Hierua Lombiguera. Gallis, Auren, & Garderobe.

ABROTONVM MAS.



GENERA.

Duum est generum, alterū Matth.
mas, alterum foemina.

FORMA MARIS.

Sarmentosa est planta, cau- DIOSC.
libus gracilibus veluti absin-
thium. Folia habet tenuia Matth.
numerosa, longiusculaq; o-
dore graui sed medicato: Flo-
res mittit exiguos. Semen mi-
nutum, rotundum, copiosum-
que, ramulos fere totos com-
prehendens.

LOCVS.

Nascitur sponte in colli- Idem.
bus arido solo, ac etiam pas-
sim in hortis colitur.

QUALITATES.

Calidum & siccum est or- Galen. 6.
dine tertio. Digerendi etiam, simp. me.
ac incidēdi vim quandam ha-
bet, rarefaciendi, & morden-
di: tenuium enim est partium.

VIREs.

Semen crudum tritum, &
ex aqua feruēfactum in potu
auxiliatur orthopnoicis con-
tem potum exitiālibus venenis, antidotum est. Horroribus ex oleo illinitur.
Serpentes cum substrātū nidore fugat: quin etiam cōtra eorum ictus po-
tū ex vino prodest: priuatim efficax est contra scorpionum & phalangiorum
ictus: oculorum inflammationibus cum pane aut ootoneo cocto commodē
illinitur. Tritum & cum hordeacea farina coctum, tubercula discutit.

*ABROTA-

*ABROTANVM fœmina, Chamæcyparifus. Germ. Garten Cypref. Italis,
Abrotano femina, herba Camphorata, Santolina, Ciprefina, Creffolina.

ABROTANVM FOEMINA.

F O R M A.

Herba est fruticofa, ligno-
fis ramis, folijs albis tenuibus
minutiffime diuifis, & qua-
druplici ordine, veluti paruis
apicibus compofitis, odore
medicato, fapote amaro, flo-
re aureo corymbaceo, in fa-
figijs furculorum longis pe-
diculis infidente.

L O C V S.

Nafcitur in campis & vi-
netis, apud nos verò horten-
fis eft.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Eafdem qualitates ac vires
habet, quas Abrotanum mas,
Ipfius femen in vfu eft ad ne-
candos vermes, fi intra cor-
pus fumatur.*



V E R O.

VERONICA ita Germanorum Officinis vocata, Italis, *Veronica*. Germanis,
Ehrenpreis/ aut *Grundheyl*.

VERONICA.



G E N E R A.

Duum est generum: Mas, *Matth.*
 & femina.

F O R M A M A R I S.

Mas caule exit dodrantali,
 aut minore, rubescente, lanu-
 ginosoq; folijs oblongis, hu-
 mi accubantibus, nigricanti-
 bus, hirsutis, & in ambitu ser-
 ratis: flores edit summis cau-
 libus dilate purpurascences,
 & semen in siliquis loculi fa-
 ciem referentibus. Radice ni-
 titur tenui, quæ in plures di-
 uaricatur fibras.

L O C V S.

Nascitur locis incultis.

Q U A L I T A T E S.

Cum gustu amara adstrin- *Idem.*
 gensque manifestè appareat,
 calidæ & siccæ facultatis o-
 mpino fuerit.

V I R E S.

Medetur cruentis vulneri- *Idem.*
 bus, quin etiam diurnis vl-
 ceribus. tumores præterea in
 vniuersum discutit, præcipueque quæ in cervice oriuntur. Datur vtiliter po-
 tandus foliorum pulvis drachmæ pondere cum ad pestilentes febres, tum ipsa
 pestilentia affectos cum theriacæ tribus obolis ex vino meraco; sed illico affe-
 ctos sudare oportet. Datur eadem potanda ex sua ipsius stillatitia aqua contra
 tussim, & omnia pectoris, & pulmonum vitia; quin etiam tabidis, & suppara-
 tis: aperit quoque iocinoris, & lienis obstructions: vterum, renes, & velicam
 expurgat.

VERONICA

VERONICA fœmina, Italis, *Veronica femina*. Germanis, *Ehrenpreis Weib*.

VERONICA FŒMINA.

F O R M A.

Caulem edit lanuginosum,
folia rotundiora minime den-
ticulata, subpinguia, flores ex
luteo purpurascens, semen
orbiculatis vasculis conclu-
sum: radicem maris similem.

L O C V S.

Nascitur in inculto solo &
asperis tractibus.

Q U A L I T A T E S,

E T V I R E S.

Non differt à mari, sed ad
omnia imbecillior habetur.



Hysso-

HYSSOPVM, Græcis, *Ἱσσοπός*. Arabibus, *Cyfe*, seu *Tabes*. Italis, *Hissopo*. Germ. *Eysop*/sive *Hyssop*. Hispanis, *Hissopo hierua*. Gallis, *Hissope*.

HYSSOPVM.



GENERA.

Duum est generum: *Hortensis*, & *Montanum*.

FORMA.

Hortense frutex est surculis numerosis ex vna radice prodeuntibus, lignosis, sesquipedalibus, folijs in vniuerso caule oblōgis duriusculis odoratis feruido, & amaro gustu: Flores edit spicatos in summis caulium partibus cæruleo colore: Radicem multifidam ac lignosam. *Montanum* surculis folijs floribus, & cæteris in vniuersum partibus nihil ab *hortensi* differt, nisi quod *hortensis* syluestriusque apparet, rudioribus folijs & asperioribus, & gustu amarioribus, nec vsq; adeo acrib. mire scit tamē in hortos translātū, sitq; *hortensis* per quā similitimum.

LOCVS.

Hortense seritur passim in hortis, & viridarijs. *Montanū* sponte in montib. provenit.

QUALITATES.

Deliccat, & exal facit ordine ter-

Galen. 3.
simp. me.
Matth.

VIRE S.

Decoctum eius cum ficis, mellē, & ruta potum peripneumonici, diuturna tussi laborantibus, suspiriosis, deffilationibus, & orthopnoicis: ventris tinea enecat, cum ficis detritis viridibus deoratum aluū subducit, sed vehementius addita iridis radice, cardamomo, aut irione: Crassum enim humorem deijcit: & præsertim decoctū ex oxymelite, colorem in corpore gillata discutit. Decoctum cum aceto dentium dolorem in collutione mulcet. Adversatur serpentium moribus, cum sale & cumino admotum: Ex oleo illitum pediculos necat, & cantharidis pruriginem tollit: comitiales iuuat quouis modo sumptum. Discutit eius vsus contumaces inflationes, cibi appetentiam inuitat, menses, & vrinas ciet, & febrium horrores excutit, visum acuit, Præstat hæc omnia quoque *montanum* etiam efficacius.

Matth.
Mesue.

GRATIO-

GRATIOLA, quibusdam Gratia dei. Italis, *Gratiola*. Foroiulienfisbus, *Stancia cavallo*.

GRATIOLA.

FORMA.

Matth. Planta est dodrantalis, caulibus quadrangularibus, folijs hyssopi paulò latioribus, ac longioribus: floribus in purpura albicantibus, amaro admodum gustu: quadam cū obscura adstrictione.

LOCVS.

Idem. Nascitur in pratis vliginosis, & palustribus.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, siccit, incidit, attenuat, aperit, deijcit, abstergit, vulnera glutinat.

VIREs.

Aluum vehementer purgat, bilem pituitamq; deijcit: vulnera celeriter sanat, si trita superponatur.



CENSURA.

Qui hanc plantam Mesuis Eupatorium esse contendunt, omnino errant.

STOECHAS,

NOMINA.

465

STOECHAS, Diosc. *σίζυγ.* Galeno *Στοχάς.* Mauritanis, *Astochados*, *Astuhorados*, *sive Astuchudes*. Italis, *Stechade*, seu *Steca*. Officinis, *Stichados*. Germanis, *Stichasfrant*. Hisp. *Tomani*, *Cantuello*, *Cantuesso*. Gallis, *Srechados*.

STOECHAS.

FORMA.



Planta est Lauendulae haud *Matth.* absimilis, folijs oblongis, crassius incanis, acervatim in uniuerso caule exeuntibus, surculis pluribus, ab vno caule fructuatis: lignosis, flores edit in spicatis, oblongisq; capitulis thymi modo, subcaeruleis, in quib. semen oritur melissophylli non ab simile. Radix est illi lignosa ac multifida.

LOCVS.

Prouenit in Stæcadibus in *Diosc.* fulis, & Massilia regione.

QUALITATES.

Stæchadis quidem qualitas amara est. Et mediocriter *Gal. lib. 3.* subadstringens. Cæterum temperies composita, nempe ex terrena essentia frigida exigua, unde sanè adstringit: & ex attenuata altera terrena copiosiore. à qua utique amara est: Ob utrorumque verò conuenientiam, & coitum, refert, extenuat, extergit, roboratq; tum viscera omnia, tum totius corporis habitum.

VIREs.

Foliorum & capitulorum decoctum hyssopi modo ad pectoris vitia efficax *Diosc.* est. Antidotis vtiliter miscetur. Deijcit tum pituitam, tum atram bilem. Cerebrum, nervos, & sensuum meatus mundat, ac roborat. Datur vtiliter contra qualescunq; frigidos morbos. Itaq; comitialibus conueniens fuerit auxilium, addita scilla, aut eius aceto. Balnea, fomenta, ac Laconica, quæ ex ipsius decocto, aut vapore fiunt, oculos narium meatus aperiunt, nervorum, & articularum cruciatus leniunt, ac interna viscera frigido humore affecta roborant. Abstinendum tamen ab ea biliosis est, præsertim, si eorum ventriculus sit bile refertus.

Gg

ORIGA-

ORIGANVM, Græcis, *ἐϋκάρυον*. Mauritanis, *Fundenigi*, *sive Fundenigi*, *sive Fondenegi*. Italis, *Origano*. Germanis, *Frembde Wolgemut*. Hispanis, *Oregano*. Gallis, *Origan*, *seu Mariolaine bastarde*.

ORIGANVM.

GENERA.

Diosc. Duo eius habentur genera, Heracleoticum, & Onitis.

FORMA PRIMI.

Diosc. Folium habet hysopo non dissimile, umbellam autem non in rotæ speciem orbiculatam, sed veluti multifidam: semine in summis virgis haud quaquam denso, amaraci modo spicato.

LOCVS.

Matth. Prouenit in Creta, & Cypro: & alijs Aegæi maris insulis.

QUALITATES.

Galen. 3. Heracleoticum efficacius simp. me. est onitide, omnes verò incidendi, extenuandi, calefaciendi facultatem possidet, hacq; tertio excessu, obtinent.



VIRES.

Decoctum cum vino potum demorosos à serpente sanat: Qui autem cicutam aut maconium hauserunt, ijs ex passo: si verò gypsum, aut ephemerum, ex aceto mulso propinatur: ruptis, conuulsis, hydropicis cum sicu esui datur. Aridum acetabuli mensura potum, in aqua multa, atros humores per aluum extrahit, menses ciet & tussi cum melle delinctum medetur. ad pruriginem, psozam, regiumque morbum, decocti ius in balneis prodest: herba autem substratu serpentes fugat.

ORIGA-

N O M I N A.

ORIGANVM onitis, Græcis, ὀρίανος ὀνίτης. Italis, *Origano onite*.

467

ORIGANVM ONITIS.

FORMA.

Câdidiore est folio, & hyf. *Diosc.*
fopo similis: semen veluti
coniunctos corymbos habet.

LOCVS.

Nascitur in Creta, & alijs *Matth.*
nonnullis Ægei maris insulis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Vis ei origani Heracleoti. *Diosc.*
ci, sed ad omnia minus effi-
cax.



Gg 2

*ORIGA-

F O R M A.

Similimum est Oniti ab
Autore depicto, sed nō idem.
ab Origano vulgari, cui⁹ icon
sequitur, nō multum differt,
nisi quod habeat multas, pul-
cras & oblongas quasi spicas,
purpureas. caulis etiam totus
purpurascit, semē gignit ruf-
fum, pusillum, vt reliqua Ori-
ganigenera.

L O C V S.

Crescit in Gallia, prope
Monspellium.*



ORIGA-

cen-
didi fun

ORIGANVM vulgare, Italis, *Origano nostrano*. Germanis, *Wolgemut*.

ORIGANVM VVLGARE.



FORMA.

Folia mittit amaraci maio- *Matth.*
ra, subhirsutaq; , caules com-
plures pilosos, flores in sum-
mitate purpureos in umbellæ
multifidæ modû, radice sum-
ma tellure vagante.

LOCVS.

Nascitur inculto solo secus *Idem.*
itinera, in collibus, & apricis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Excalfacit quidẽ, quòd gu- *Idem.*
stu subacris sentiatur, & siccat
quoque similiter, sed haud
strenuè. Aperit, digerit, inci-
dit, & resoluit, sed longè mi-
tius quàm præscripta origani
genera.

CENSURA.

Hanc plantam Pseudoori-
ganum magis appellandum
didi sunt, non purpurei.

Gg 3 TRAGORI.

TRAGORIGANVM, Græcis, τραγορίγανον. Italis, *Tragorigano*.

T R A G O R I G A N V M.

F O R M A.

Diosc. Tenuis est frutex folio & ramulis sylvestri serpyllo similis, quanquam in lætiori solo latioribus folijs inueniatur. atque glutinosis: floribus in summis caulibus subpurpureis.

L O C V S.

Idem. Prouenit copiosum in Cilicia, in Creta, in Chio, Cooque, & apud Smyrnas.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit, aperit, attenuat, urinam ciet.

V I R E S.

Idem. Decoctum potum bilem eijcit. Bibitur ex acetovtiliter lienosis, & ex vino contra ixiæ venena. Menses trahit, peripneumonicis, tussientibus, ex melle in eclegmate datur. Grata, ac mitis eius potio est: quare cibum fastidientibus & stomacho acida ructanti imbecilloque præbetur: item si maritima iactatione nausea, & æstus præcordiorum exciteretur. Tumores verò cum hordeacea farina illita discutit.



P V L E-

NOMINA.

471

PVLEGIVM, Græcis, Πάληγον. Mauritanis, *Alnam, Alnegem, seu Alnegem.* Italis, *Puleggio.* Germanis, *Poley.* Hispanis, *Poleo.* Gallis, *Pulege, & Poulter.*

PVLEGIVM.

FORMA.

Herba est humi repēs, ser-
pylli modo: caulibus dodran-
talibus gracilibus, folijs ama-
raci æmulis, pauld tamē maio-
rib⁹ oblōgiorib⁹q;: flores in
toto caule ad summum vsq;
per intervalla propē foliorū
exortū, verticillatim enascun-
tur, colore purpureo langue-
scēte. Radix illi gracilis, & ca-
pillosa summo cespite vagāte.

LOCVS.

Nascitur humectis, & vli-
ginosis locis. *Matth.*

QUALITATES.

Cū acre, & subamarum *Galen. 6.*
sit, valde tum excalfacit, tum *simp. me.*
extenuat. Porrd quod abūdē
excalfaciat, magnū est signū,
quodd illitum rubificat, & ex-
ulcerat quoq;: si diutius tole-
retur. Quodd verō extenuet
satis indicat, cū humida, cras-
sa, & lenta ex thorace & pul-
mone excreatu facili reddat,
menselq; moueat.

VIRES.

Potum menstrua, secundas, ac partus eijcit, pulmonis vitia ex melle, & aloe
potum extrahit, & conuulsis auxiliatur: Nauseas, stomachi erosiones ex posca
permulcet: atram bilem per aluum exigit. Bibitur in vino vtilissimē contra ser-
pentium morsus, de festos animo recreat cum aceto naribus admotum. Are-
facti cinis gingiuas corroborat. cum cerato varos extinguit. Lienosis cum sale
corrigit, ac eiusdem inflationes, duritiasq; in defessionibus mirificē iuuat.
Decoctum potum vrinas ciet: ictericos, & hydropicos curat: capitis, & ner-
uorum affectibus ex frigidityte prognatis succurrit: visum acuit.

Gg 4

Dicta-



Dictamnvm, Græcis, Δίκταμνος. Arabib. Mescatremfir, Anegen araba, sine
Bari. Italis, Dittamo di Candia. Germanis, Wilder Poley. Hispanis, Dittamo.
Gallis, Dittamo Real.

DICTAMNVM CRETENSE.

FORMA.

Diosc. Cretensis herba est pule-
Theoph. gio similis, maioribus tamen
libr. 9. de folijs, quæ tomento quodam
histo. 1. spissa lanugine pubescunt. Ra-
Vir. 1. 12. mulis tenuioribus, in quorū
Aeneid. summis partibus flores exeunt
purpurei. Et deinde semen.
Rara hæc herba est.

LOCVS.

Theoph. Nascitur in Creta Insula in
ibidem. vno tantum loco, ipsoque ad-
modum exiguo.

QUALITATES.

Galen. 6. Tenuiore essentia constat,
simp. me. quam pulegiū. cætera illi si-
Diosc. mile. Sed efficacius multo.

VIRES.

Diosc. Defunctos partus extrahit,
non modò potum, sed appo-
situm quoque aut fustitum:
succus per se illitus, aut cum
hordeacea farina, purgandi vim habet. Herba impactos pedibus, reliquove
corpore aculeos illitu extrahit: valet ad lienis dolorem. Radix eius gustu cale-
facit, partus accelerat. Succus ex vino potus, auxiliatur à serpente demorsis.
Tanta herbæ facultas est, ut olfacta abigat feras, quæ venenato ictu seuiant, ap-
pensaq; conceptum exanimet: vulneribus ferro illatis, & venenatis ictibus in-
fusus succus, præsentaneum est auxilium.



DICTA-

DICTAMNVM album, Italis, *Dittamo bianco*. Germanis, Gemeiner Diptam.
Gallis, *Diptam bastarde*.

DICTAMNVM ALBUM.



F O R M A.

Planta est insignis, spectatē *Matth.*
que pulchritudinis, folijs fra-
xini adeo similibus, ut à qui-
busdam chamæmelia: hoc est
infima fraxinus appellari so-
leat. Caulē gerit sesquicu-
bitalem, rotundum, in cuius
cacumine flores exeunt pur-
purei, citrei mali æmulo. O-
dore quadā cum graueolen-
tia, acuto, nō tamen iniucun-
do. Radice nititur diuarcata
& sæpè singulari, albicante
tenui intus matrice, dum re-
cens est hircum olente, flores
in triquetras siliquas abeunt,
scabro exterius cortice, in
quibus semen.

L O C V S.

Nascitur in collibus, cliuo- *Idem.*
sis, & saxosis.

Q U A L I T A T E S.

Radix cuius est vsus amara
est: excalfacit: attenuat, ape-
rit & abstergit.

V I R E S.

Valet radix aduersus vene- *Idem.*
na, & venenosorum animalium

ictus. Necat interaneorum vermes drachmæ pondere hausta: datur contra
frigidos vteri morbos, nam & menses, & secundas, & emortuum fœtū educit,
tum supposita, tum cum pulegio suffita, tum ex vino meraco duarū drachma-
rum pondere pota. valet quoq; ad alui torsiones, & ad eijciendos renū calcu-
los. Additur quoq; vtiliter in potionibus interiorū vulnerum. Datur comitia-
libus, & in alijs cerebri affectibus. Præstat contra pestilentie contagia, quoquo
modo sumatur. In summa ad multa radix utilis est: Siliquæ & flores contactu
pruritus faciunt, & in calidioribus regionibus cutem exulcerant.

C E N S V R A.

Qui album Dictamnium Dioscoridis Tragium esse contendunt, delirio pro-
culdubio afficiuntur.

G g 5

PSEUDO-

PSEVDODICTAMNVM, Græcis, *Ψευδοδιταμνον*. Italis, *Dictamo falso*.

PSEVDODICTAMNVM.

F O R M A.

Matth.

Caulibus exit dodrantalibus, lanuginosis albicantibusque, è quibus folia erumpunt ex interuallis bina, subrotunda, dictamni tomento pubescentia, è quorum omnium exortu flores exeunt purpurei verticillatique vt in apiastro, & marrubio: sapore pulegij, sed minus acri.

L O C V S.

Idem.

Nascitur in Creta exoluto solo.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 6.

simp. me.

Pseudodictamnium ad omnia imbecillius dictamno habetur.

V I R E S.

Minus dictamno acre gustu sentitur: eisdem tamen effectus præbet, sed inefficacius multo.



SALVIA

SALVIA Græcis, *Ελελίσσακος*. Mauritanis, *Aelüsacos*, seu *Elisacos*. Italis, *Salvia*. Germanis, *Salbey*. Hispanis, *Salvia*, & *salua*. Gallis, *Saulges*.

SALVIA.



G E N E R A.

Duum est generum, *Alte-Theoph.*
rum quidē vrbānum, alterum *li. 6. ca. 2.*
sylvestre, quod *sphacelus ap. de histo.*
pellatur. *plant.*

FORMA VRBANÆ.

Frutex est ramosus, longus, *Diosc.*
virgas habens quadrangulas *Matth.*
& canas, folia menthæ, maio-
ra, longioraq; asperiora, cras-
siora, & quæ sensim attrito-
rum quasi indumentorum sca-
britiem referant, hirsuta, sub-
albida, odore per quā iucun-
do sed graui. Flores gignit in *Diosc.*
summis caulibus purpureos,
sylvestris hormini æmulus, &
femen quoq; simile. Radice
nititur lignosa, fibrosa q;.

L O C V S.

Colitur passim in hortis, & *Diosc.*
sponte quoq; per se nascitur, *Matth.*
arido, & aspero solo.

Q U A L I T A T E S.

Euidenter calefacit, & *le. Gal. 6.*
uiter adstringit. *simp. me.*

V I R E S.

Menses cit, & vrinas, decoctum foliorum, ramorumq; potum, & partus ex- *Diosc.*
trahit. Auxiliatur quoq; *pastinaca marina* ictibus: capillos denigrat: vulne- *Matth.*
rum sanguinem cohibet, tetra vlcera purgat. Foliorum ramorumq; ex vino
decoctum fori restium pruritum tollit. Folia ab vtero gerentibus denora- *Aetius.*
ta, conceptum roborant ac retinent, si eadem fluida, laxaq; fuerint, succi he-
mina cum sale pota, prolificas reddit mulieres, si quarto à lecubito die biba-
tur, & viris deinde semisceant. Datur succus cyathorum duorum mensura
vtiliter potandus sanguinem expuentibus. Præstat salua ad omnes capitis pi-
tuitosos affectus, omnesq; articulorum dolores, tam in potionibus, quam in
fomentis.

SALVIA

SALVIA minor, Græcis, Σαλῶλα. Italis, *Salvia minore.*

SALVIA MINOR.

F O R M A.

Folia habet alterius angustiora, & postrema parte auriculata, caules quoq; tenuiores, cætera verò similia sunt.

L O C V S.

Nascitur spontè in Hispania, & Gallia Narbonensi, exolutis locis. Et feritur quoque in hortis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Ea omnia præstare valet, quæ Salvia maior.

*SALVIA CRETICA
B A C C I F E R A.

In Creta nascitur Salvia quædam longe tenerior nostrate, lanuginosiorque & candidior, odore quoque præstat & facultatibus, denique hoc peculiare habet ut globuli quidam rotundi gallarum instar illi adnascantur, quibus vesci solent incolæ cum pane. *



MENTHA,

MENTHA, Græcis, *ῥέγιον*. Arabibus, *Nahanaha*. Germanis, *Mint*. Hispanis, *Hierua buena*, & *Ortelana*. Gallis, *Mente*.

MENTHA.

GENERA.

Duum est generum sativa, *Matth.* & sylvestris. Atqui sativa duum quoq; generum est, alterum maius, alterum minus.

FORMA MAIORIS.

Planta est odorata, folijs salvia minoribus, per ambitum denticulatis, caulibus numerosis, floribus in summitate spicatis, subpurpureis, pilosisque, vivax admodum est, namque in hortis semel tantum lata, tam vestibuli fertilitate durat, ut vix in posterum extirpari possit.

LOCVS.

Seritur passim in hortis. *Idem.*

QUALITATES.

Gustu est acris, calidaq; *Gal. 6.* cultate prædita, ex tertio *simp. me.* dantenus excalfacientium ordine, sed minus excalfacit quam calamintha. Habet & in se quiddam amarum, & acerbum: substantia est tenuium partium. Adstringit quoque *Diosc.* ac siccat.

VIRE S.

Succus ex aceto potus sanguinem sistit: teretes ventris tineas necat: venem stimulat. Terni rami cum acidi mali punici succo poti, singultus, vomitiones, choleraq; sedant: Folia cum farina hordeacea illita, suppuraciones discutunt. Mammæ item tensas, aut lacte turgentes compescit. Cum sale canum moribus illinitur: vulvæ ante coitum admota, conceptionem impedit. Lactis coire non patitur in ventriculo, si folia lacti immergantur. In summa stomacho utilis est, & in condimentis peculiarè gratiam habet. Aqua stillatitia è tota menthæ planta puerperarum mammis cum linteolis admota lactis conceptionem inhibet, animum olfactu excitat, vlcera manantia in infantium capitibus mirè sanat.

MENTHA.

MENTHA altera, Italis, *Menta minore*, siue *Menta gentile*.

MENTHA ALTERA.

FORMA.

Menth. Folijs exit brevioribus angustioribusque: caulibus rubentibus, floribus quoque rubentioribus: eximio odore.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in hortis, & viridarijs.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Ea omnia potest, quibus alteram præstare diximus.



MENTHA.

NOMINA.

479

MENTHASTRUM, siue Mentha sylvestris, Græcis, ἡδύσμου ἀγρίου. Italis, *Mentastro*. Germanis, *Wildt Minz*. Gallis, *Mente cheuahne*.

MENTHASTRUM, SIVE
MENTHA SYL-
VESTRIS.



FORMA.

Folia profert menthæ lon- *Matth.*
gè maiora, hirsutiora, ac can-
didiora: caules cubitales, &
flores spicatos, colore sub-
purpureo, tenuibus unde-
quaque pilis: bene quoque
olet.

LOCVS.

Nascitur plerunque vligi- *Idem.*
no solo: & propè riuos a-
quarum.

QUALITATES.

Excalfacit, attenuat, ad- *Matth.*
stringit, incidit, & aperit.

VIRES.

Suffiti vapor scæminas à *Idem.*
partu purgat. Datur eius de-
coctum vtiliter anhelosis, &
agrè spirantibus, quin etiam
mulcendis torminibus qui à
flatu oriuntur. Substratū, vel
accensum serpentes fugat.

Infillatur succus vermiculosis auribus. Item tum potus, tum testibus illitus.
nocturnas pollutiones prohibet. Auxiliatur potus, regio morbo affectis: stru-
mosos illitus iuuat: ex aceto potus ventris animalia pellit: Folia tam pota quàm
illita, præstant aduersus venenosorum ictus.

MENTHA

MENTHA Græca, Italis, *Menta Græca*, siue *Salvia Romana*, siue *Herba di Santa Maria*: Nonnullis *Lassulata*. Gallis, *Coch*. Germanis, *Büser Frauen Wünn*.

MENTHA GRÆCA.

FORMA.

Matth.

Folij exit saluæ longioribus latioribusque betonica faciem quadatenus referentibus, circumquaq; serratis: caulibus cubitalibus: nonnunquam maioribus in quorum cacumine flores exeunt corymbacei, melino colore. Planta est in vniuersum amara, non tamen vehementer, subadstringens, & grauiter odorata.

LOCVS.

Idem.

Habetur sata copiosa in hortis.

QUALITATES.

Excalfacit, siccat, aperit, roborat, abstergit, & prouocat.

VIRE.

Idem.

Auxiliatur vterinis affectibus: frigefactum iecur excalfacit, & vasorum obstructions aperit: illinitur ex irino, aut nardino oleo lienosis, & ex vino feruescitur, vrinæ suppressionibus: Lentigines, alphas, & alias cutis fæditates emaculat, illitus noctibus succus: idem Lumbricos enecat: ventriculum roborat tam haultus, quàm illitus, & vomitiones compescit. Tota planta tam substrata, quàm suffitu serpentes abigit, & eorum venenis resistit, quia etiam infarctus expedit, & caput roborat.

CALAMIN-



CALAMINTHA, Græcis, Καλαμίνθα. Arabibus, & Officinis, Calamentum. Ita-
lis, Calamento. Etruscis, Nipotella. Germanis, Wilder Rosy. Hispanis, Neve-
da. Gallis, Poullio sauvage.

CALAMINTHA.



G E N E R A.

Trium est generum: Prima **DIOSC.**
quam nepetâ Latini vocant,
Montana altera, & altera
menthastro cognata.

F O R M A P R I M Æ.

Folijs oritur pulegio maio- *Matth.*
ribus, subrotundis, hirsutis,
per ambitum leuiter serratis,
caulibus cubitalibus, angulo-
sis, foliosisq; atq; pilosis. Flo-
res edit exiguos, purpurascen-
tes, qui à medio caule vsq; ad
sumum, vt in pulegio erum-
punt, at in cacumine copio-
siores habentur. Radices te-
nues, multifidasq;.

L O C V S.

Nascitur in inculto solo, in *Idem.*
apricis, collibus, secus itinera
& sepes.

Q U A L I T A T E S.

Essentia est tenui, & calida, *Gal. li. 7.*
siccaq; tēperie, ex tertio quo- *sim. me.*
dāmodo ordine. Horum ma-
nifesta sunt inditia partim gu-
stu apparentia, partim experi-
entia cognita: Gustu siquidē
acris, & palam calida est, ac
paululum omnino subamari-

habet. corpori autē in exterius admota, primum quidē valde excalfacit, & mor-
dicat, cutemq; laniat, postremo etiam exulcerat.

V I R E S.

Foliorum, florumq; decoctū potum: menses, & vrinas pellit, ruptis, conuul- **DIOSC.**
sis, egrē spirātibus, torminibus, horroribusq; auxiliatur. Regium morbū expur-
gat: ex vino præsumpta venenis resistit. Tineas, cæteraq; interiorū animalia, cū
sale, & melle pota enecat. Elephāticos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebi-
batur. folia detrita, & ex vellere supposita, menses eliciunt: partus enecant: Ac-
censa aut substrata, serpentes fugant: Ex vino cocta, & illita, nigris cicatricibus
candorem reddunt: succus vtiliter instillatur vermiculosis auribus.

Hh

CALA.

CALAMINTHA montana, Græcis, Καλαμίνθα ὄρεϊν. Italis, Calamento, *sive* Ni-
porella montana. Officinis, Calamentum montanum. Germanis, Bergminz.

CALAMINTHA MONTANA.

FORMA.

DIOSC. Folia habet ocimi, incana,
furculos, & caules angulosos,
& purpureum florem.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur in Montibus.

QUALITATES, ET
VIREs.

DIOSC. Paribus cum nepeta tum
qualitatibus, tum viribus præ-
stat.



CALA.

CALAMINTHA aquatica. Italis, *Calamento aquatico*. Græcis, Καλαμίνθα ὕδρως. Germanis, Wassermünz/Wasserpoley/Froschmünz.

CALAMINTHA AQUATICA.



FORMA.

Menthastris cognata est, fo-
lijs oblongioribus hirsutisq;
caule, & ramis maioribus,
quam superior.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, *Idem*.
asperis, & aquosis locis.

FACULTATES, ET
VIRE.

Suis in viribus, & faculta-
tibus, ceteris inefficacior est.

CENSURA.

Decipiuntur, qui Gatta-
riam herbam tertiam cala-
minthe speciem esse contem-
dunt.

HERBA gattaria, Italis, *Herba gatta*. Germanis, *Nept/Zam Rosenkraut*.

HERBA GATTARIA.

FORMA.

Muth. Planta est vulgaris notitia, folia mittens apiastri, aut vrticæ æmula, sed incana, & minora, caules edit quadrangulos, bicubitales, ramos numerosos, & pariter in canos, flores albos circa caules, at qui in summitatibus exeunt, spicati spectantur: Radices habet multifidas: odor vniuersæ plantæ acutus, caput feriens.

LOCVS.

Idem. Nascitur in campestribus & in agrorum marginibus.

QUALITATES.

Feruido quidem gustu herba est, cum amaritudine haud obscura, excofacit, & siccatur calaminthæ modo.



VIRES.

Valet ad omnes capitis, pectoris, ventriculi, ac vteri morbos, à pituita generatos, menses elicit tam pota, quam in defcessionibus addita. herbæ vfus steriles prolificas facit, vbi causa fuerit ab humida frigidaq; intemperie: succus narius inditus, pituitam valenter trahit, & visum acuit: In summa vbi excofacere opus sit, Gattaria plurimum præstat.

Th

NOMINA.

485

THYMVM, Græcis, Θύμος. Mauritanis, Hæser. Italis, Timo. Germanis, Römischer Quendel. Hispanis, Tomilho salero. Gallis, Tim, seu Mariolaine de Angleterre.

THYMVM.



GENERA.

Dnum est generum: Can- Theoph.
didum & nigrum. lib. 6. c. 2.
de plant.

FORMA.

hist.

Surculosus est frutex, ex- DIOSC.
libus folijs, multis, & angu-
stis circumdatus: capitulis in
cacumine flore purpurascen-
te refertis.

LOCVS.

Gracili solo & petroso pro- Idem.
uenit.

QUALITATES.

Thymum incidit, & excal- Gale. 6.
facit manifestè. simp. me.

VIRES.

Cum sale, & aceto, pitui- DIOSC.
tam per aluum detrahit. De-
cocti ius prodest Orthopnoi-
cis, & anhelatoribus: tineas
faciles reddit excreationes. Recentis tumores discutit cum aceto illitum: con-
cretum sanguinem dissolvit: peniles verrucas tollit. Ischiadicis illitum cum
vino, & polenta subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest.

Hh ;

SATV-

SATVREIA, Græcis, Θύσση. Italis, Coniella, Sanoreggia, seu Satureia.

SATVREIA.

GENERA.

Matth. Duo eius sunt genera, Alterum quidem thymo cognatum, Alterum vero fruticosius, & maioribus folijs.

FORMA PRIORIS.

Diosc. Thymo tota ferè facie similis est, minoribus tamen folijs, & caulibus, & tota planta tenerior, spicam defert florum plenam coloris herbacei. Aut in purpuram languescens.

Matth.

LOCVS.

Idem. Gignitur in apricis, aspero, & arido solo, & feritur in hortis.

QUALITATES.

Paulus. Tymbra sylvestris eadem, quæ thymum præstat: Hortensis autem altera quidem imbecillior est, sed ad ciborum vsum gravior, & accommodatior habetur.

VIRE.

Diosc. Eadem potest, quæ thymum, si modo consimili sumptetur.

SATV



NOMINA.

487

SATVREIA altera. Italis, Coniella, seu Sauoreggia maggiore, seu Peucarella. Germanis, Pfeffertraut, Kloster Ysop, Saturon.

SATVREIA ALTERA.

FORMA.



Ramis multis fruticat, rotundis, atque lignosis, folijs thymo maioribus, subasperis, quæ circum furculos plura simul per intervalla erumpunt: è quorum exortu spicati quidam processus, foliolis quibusdam cæteris longè minoribus stipati prodeunt, è quibus flores exeunt parvi, ac subpurpurei. Radice nititur multifida.

LOCVS.

Non solum feritur in hortis, sed sponte per se nascitur in apricis collibus, & in torrentium alueis.

QUALITATES.

Thymo suis in qualitatibus Idem. similis est, proinde exalfacit, attenuat, aperit, incidit, digerit, & aperit.

VIRES.

Viribus ab altera non differt, Thymi enim facultatibus omnibus referta est. Idem.

Hh 4

SER-

SERPILLVM, Græcis, *Ἐριλλός*. Maurit. *Hemen*. Italis, *Serpillo*, seu *serpollo*. Germanis, *Quendel*. Hispanis, *Serpollio* seu *serpam*. Gallis, *Serpulet*.

SERPILLVM.

GENERA.

DIOSC. Duum est generum, Hortense alterum: Alterum sylvestre, & huius quoque duo sunt genera.

FORMA HORTENSIS.

DIOSC. Folia & ramulos origani habet, sed candidiores, odore sampuchii, floribus subputpureis in spicatis capitulis: gustu admodum acri. Non serpit humi, sed ad palmi altitudinem increscit.

Plinius.

LOCVS.

Matth. Seritur in hortis non solum ad coronas, sed ad ciborum quoque usum.

QUALITATES.

Gale. 6. Vsq̃ue aded excalfacit, vt & simp. me. menses, & vrinas moueat: est Matth. autem & gustu admodum acre. Excalfacit, exiccat, digerit, incidit, & aperit.



VIRE S.

Menses potu, & vrinam ciet: Torminibus, ruptis, vulsisque auxiliatur: aduersus serpentes, potu illitūve prodest. Diurnos capitis dolores mulcerum rosaceo, & aceto sincipiti illitum, veteranos iuuat: succus cruentos vomitus sedat, drachmarum quatuor pondere ex aceto potus. Additur bellē in ciborum condimentis.

SER-

SERPILLVM sylvestre, Græcis, Ερπυλλος ἄργιος. Italis, *Serpello*, seu *Serpillo salu-*
tico.

SERPILLVM ALTERVM.

GENERA.

Aliud satureiatum, hoc est *Theoph.*
satueiæ odore: aliud citrea- *lib. 6. c. 7.*
tum, quod citrei mali odorem *de plant.*
respiat. *hij.*

FORMA.

Ramulos, quod zigis appel- *diosc.*
latur, edit tenues, furculosos, *Matth.*
folijs refertos longioribus,
durioribus, angustis. Flores
iucundè olent. Quod verò ci-
treum malum respicit, latius
prouenit, humi repens, leuioribus
folijs in girum sese vnâ
cum ramusculis diffundenti-
bus.

LOCVS.

Nascitur in collibus, & mon- *Idem.*
tibus apricis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Omnia genera paribus pol- *Idem.*
lent facultatibus, verum ta-
men sylvestre ad omnia valen-
tius habetur.

Hh 5

AMA-



AMARACVS, Græcis, Σάμυλον, ἄμαρακος. Italis, & Officinis, *Maïorana*.
Echruſcis, *Perſa*. Arabibus, *Merſenius*, ſeu *Morſanguis*. Germanis, *Weyeran*.
Hiſpanis, *Maïorana*. Gallis, *Marone*. ſive *Mariolaine*.

GENERA.

Matth. Duum eſt generū maius, q̃
vulgò cognitū eſt: & minus,
quod tenuifolium vocatur.

FORMA MAIORIS.

Idem. Herba eſt ramoſa: caulibus
tenuibus obſequioſis, folijs
oblōgis incanis, piloliſq; cau-
liculos circūqua; veſtienti-
bus, flores edit in ſummis cau-
libus ſpicatos, herbacei colo-
ris, compactili ſquamarum
congerie, vt in origano: è qui-
bus minutum oritur ſemen.
Radicem habet lignoſam, ac
multifidam, ſeritur ſemine,
furculo ac viuiracide.

LOCVS.

Idem. Colitur in hortis, & ſetili-
bus: In Ægypto autē, Cipro,
& Cizico ſpontè prouenit.

QUALITATES.

Gale. 6. Tenuium eſt partium, ac
ſimp. me. digerentis facultatis. Deſic-
Matth. cat enim & excalfacit ordi-
ne tertio. Planta eſt odorata
tota, & in medicamētis ad plu-
ra admodum vtilis. Digerit,
attenuat, aperit, & roborat.

AMARACVS.



VIREs.

DIOsc. Succus decocti potus conuenit hydropicis iam incipientibus, & ijs, quos v-
rinæ difficultas, & tormina excruciant: folia ex melle illita ſuggillata deſcēt. Men-
ſes trahunt ex peſſo ſubdita: illinuntur ſcorpionum icibus, additis ſale, & a-
ceto. luxatis, tumoribusq; cerato excepta imponuntur: proſunt ad oculorum
Matth. inflammationes cum hordeacea farina polline illita. Præſtat amaracus ad o-
mnes frigidos capitis, & neruorum affectus, tam illita, quàm pota: foliorum
ſuccus naribus inſuſus pituitam à capite trahit, & cerebrum roborat: valer ad
pectoris vitia. ſtomacho vtilis eſt, tum pota tum illita herba: iocinoroſos, & lie-
uorosos iuuat: confert ad vteri flatus ac ceteros eiufdem frigidos morbos.

ANA-

N O M I N A.

491

AMARACVS tenuifolia, Græcis, Σάμψυκος, & ἀμάρακος λεπτόφυλλος. Italis,
Maïorana gentile. Etruscis, Persa gentile.

• AMARACVS TENVIFOLIA.

FORMA.

Amaracus tenuifolia, folijs, *Matth.*
cauliculis, floribusq; exit te-
nuioribus, & odore lōgè præ-
stantiori.

LOCVS.

Colitur à mulieribus Italis *Idem.*
in fictilibus, & in hortis.

FACULTATES, ET
VIRE.

Ea omnia præstare potest, *Idem.*
de quibus in altero diximus
genere.



SER-

SERTVLA Campana, Græcis, *Μελιλωτος*. Arabibus, *Alchimel melueh*. Italis, *Meliloto*. Hispanis, *Corona de Rei*. Germanis, *Ziger Kraut*.

MELILOTVS SIVE SERTVLA CAMPANA.

FORMA.

DIOSC. Planta est cubitalis, statim à radice fruticosa, ramis exilibus, folio trifolio proximis, floribus melinis, parvis, filiquis repandis, numerosis, pluribus, è ramusculorum cacuminibus dependentibus, in quibus semen concluditur minutum, subrufum, odoris non ingrati, cuius est usus.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur in Campania circa Nola, quin etiam in Cizico, & Calcedone.

QUALITATES.

Galen. 6. Mistæ facultatis est: habet sim. me. enim quiddam adstringens, sed & digerit, & concoquit. Copiosior enim in ea est substantia calida quam frigida.

VIREs.

DIOSC. Inflammationem omnem emollit, præsertim, quæ in oculis, vtero, sede, & testibus erumpunt, si ex passo cocta illinatur, addito oui luteo affato. Recentes meliceridas per se cum aqua & vlcera in capite manantia, illita cum cretacia, vino aut galla sanat: Stomachi dolores, & cruda & cocta cum aliquo ex antedictis leuat: Doloribus aurium mitigandis, cruda ex passo instillatur: In aceto aut rosaceo calefacta capitis dolorem lenit.

CENSURA.

Cum veræ legitimæq; meliloti semen, cuius debet esse usus, ad nos non deferatur: nonnullis sylvestris loti flores, quidam cuiusdam aurei Trifolij ipsius vice usurpant, sed neuter tamen meliloti vim possidet.

MARYM.



NOMINA.

493

MARVM, Græcis, Μαγρον. Italis, Maro.

MARVM.

FORMA.

Surculosa est planta: flore DIOSC.
origani, odoratiore, folijs
multo candidioribus.

LOCVS.

Nascitur in Cizico; & iuxta DIOSC.
Magnesiam copiosissima. Gale.


QUALITATES.

Herba est parum acris, a- Galen. i.
maraverò plurimum. de Anti.

VIRES.

Vim habet sisymbrio con- DIOSC.
similem: substringit enim &
modicè calefacit: qua de cau-
sa illita serpentia viscera sistit,
& in calidas illitiones addi-
tur.

RVTA.



RUTA, Græcis, *Πήρων*. Mauritanis, *Sedeb*, seu *Sedab*. Italis, *Ruta*. Germanis, *Rauten*, seu *Weinraut*. Hispanis, *Aruda*. Gallis, *Rut*.

RUTA.

GENERA.

Matth. Sativa altera, altera verò sylvestris, quæ duplex habetur. Montana, & quæ peculiariter Harmola dicitur.

FORMA SATIVÆ.

Idem. Planta est perpetuò virens, folijs crassiusculis, subpinguibus, ex angusta origine in latitudinem sese pandentibus; colore saturate viridi. Ramos mittit copiosos, furculososque, flores in summitate luteos, hyperici æmulos, & quibus capitula oriuntur quadruplici apice coronata, in quibus pusillum continetur semen nigro colore.

LOCVS.

Matth. Seritur in hortis, apricis
Plin. gaudet, & siccis, terra; maximè lateritia.

QUALITATES.

Gale. 8. Excalfacit ordine tertio. est
simp. me. autem non solum gustu acrised amaro. itaq; digerit atque incidit crassos lentosque humores. Est & tenuium partium.



VIRES.

Diosc. Vrinam ciet: menstrua pellit. Lethalium medicamentorum antidotum est, & præsertim semen potum: folia cum iuglande, & ficu præsumpta, inefficaces venenorum vires reddunt, & pestilentie contagia superant. Contra serpentes, eodem modo sumere convenit. Sumpta genituram extinguit, cum anetho sicco decocta tormina sedat: Pota ex oleo feruefacta, ventris tineas excutit: Hydropicis vtiliter cum ficu illinitur: Deuorata visum acuit. Succus in malicorio calefactus aurium doloribus efficaciter infunditur. Trita, & indita sanguinem è naribus fluentem sistit: Manfa ceparum & alliorum acrimoniam domat.

RUTA

RVTA sylvestris, Græcis, Πίνζαρον ἄγριον. Italis, *Ruta saluatica*. Germanis, *Wildrauten*.

RVTA SYLVESTRIS.



FORMA.

Folijs, caulibus, ramis, floribus *Matth.*
& capitulis hortensi similis est, sed
folijs gracilioribus, caudice verò
crassiori, lignoso, ac firmo, acriori
quidem, & amariori gustu.

LOCVS.

Nascitur in montibus saxosis, & *Idem.*
apricis.

QUALITATES.

Ex quarto est ordine exalfacien- *Gal. 8.*
tium. Itaq; hortensi valentius admo *sim. me.*
dum operatur.

VIREs.

Si copiosius estur interficit: si colligatur dum florem promit, cutem inflat, *Diose.*
& rubore cum pruritu vehementi inficit. Itaque perunctis manibus, & facie,
eam colligere oportet. Semen eius potum contra intestina vitia efficax est. In
antidota commodè additur. Prodest comitialibus & coxendicum doloribus:
menstrua mouet, partus enecat, & utpote noxia herba cibis abdicatur.

RVTA

RUTA sylvestris altera, Græcis, Πύλλον ἄγριον, ἢ ἀρμολα. Arabibus, Harmel.
Italīs, Ruta saluatica secunda.

RUTA SYLVESTRIS HARMOLA.

FORMA.

DIOSC. Frutex est, qui ab radice plu-
Matth. res emittit caules folijs mul-
to, quàm alterius rutæ longio-
ribus, tenerioribusque, odo-
re graui, floribus candidis, è
quibus capitula summis ramis
oriuntur, satiuæ rutæ maiora,
tenuibus quibusdam foliolis,
ipsisque acutis circumqua;
stipata. in quibus triangulum
occluditur semen; subrufo
colore & amaro gustu.

LOCVS.

DIOSC. Prouenit in Cappadocia,
& Galatia Asiæ finitima, in
collibus, & læto solo.

QUALITATES.

Gale. 7. Vis eius tenuium est parti-
simp. me. um, & calida tertio abscessu:
Ideo crassos humores secat,
& digerit, & vrinam ciet.



VIRES.

DIOSC. Semen cum melle, vino, croco, & fœniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur
Matth. contra retusam oculorum aciem: cætera cum sylvestri ruta paria habet.

GALE.

GALEGA, siue Ruta capraria. Ethruscis, *Lauanese*. Germ. *Geißrauten*.

GALEGA SIVE RUTA CAPRARIA.

FORMA.

Caulem mittit sesquicubi- *Matth.*
talem, ramosum, folia è ramis
vtrinq; prodeunt dena vnde-
nave ab vno pediculo emer-
gentia, oblonga, subpinguiaq;
flores in summitate purpu-
rascentes, è quibus siliquæ o-
riuntur semen continentes.

LOCVS.


Prouenit passim secus iti- *Matth.*
nera, in scrobium aggeribus,
& lato solo.

QUALITATES, ET
VIRE.

Vis illi maxima contra pe- *Idem.*
stilètiā: plurimos enim hu-
iusce plantæ vsu præseruatos
scimus: mirificè quoq; valet
aduersus lethalia venena o-
mnia, & contra ferarum o-
mnium venenosos ictus, in
quem vsu succum biben-
dum iubent. & herbam ipsam

vulneri admovent. Datur succus ad cochlearis mensuram necandis intestino-
rum vermibus. Datur idem vtiliter in principio pestilentia affectis, aut eius de-
coctum, ex aceto paratum, addita theriaca, & Armenio bolo. verum à potu su-
dare ægrum oportet. idem præstat ad pestilentes febres in quibus exanthema-
ta, siue maculæ cutaneæ quas pestechias vocant, emerferint. Quæ quidem o-
mnia, sua ipsius speciali dote planta hæc præstat.

II Moly,



MOLY, Græcis, Μόλυ. Italis, Moli.

FORMA.


Diosc. Folia habet graminis latiora, humi sparsa: florem alba violæ similem, sed minorem, magnitudine violæ purpureæ æmulum lactei coloris: caulem cæcidum quaternum cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid, quod allij speciem referat: Radix parva bulbosa.

LOCVS.

Pēn. Nascitur circa Pheneum, & in Cillene Archadiæ.

QUALITATES, ET VIRES.

Contrahentis est facultatis. Mirum in modum valet ad vuluæ apertiones, si tritum cum Irino vnguento in passo subijciatur.



PANÆ

NOMINA.

499

PANACES Heracleum, Græcis, *πέραξ ἡρακλείου*. Arabibus, *Steusir*, *sive Ieusir*.
Italis, *Panace Heracilio*. Huius lachryma, Græcis, *ὀποπέραξ*. Latinis, *Opopanax*.
Officinis, *Opopanaxum*. Italis, *Opopanaco*. Hispanis, *Opoponague*.

PANACES HERACLEUM.



FORMA.

Folij est asperis ad terram ia- **Diosc.**
cētibus, herbacei coloris, mul-
tum ad ficulnea accedentibus,
in ambitu quinq; partito diui-
sis. caule ut ferula altissimo, la-
nugine quadam canescente.
folijs etiam minutoribus re-
fertus: muscarijs ceu anethi in
cacumine: luteis floribus, & se-
mine subamari gustus.

LOCVS.

Nascitur in Cyrene Lybia, *Idem.*
& Macedonia.

QUALITATES.

Opopanax ipse ad plurimos
est vsus aptissimus, ut potè ex- **Galen. 8.**
calfaciens, emolliens, digerēs: **simp. me.**
excalfacit ordine tertio, & sic-
cat secundo. Cortex radice,
exiccatorium simul & excalfa-
ctorium est medicamentum,
sed minus quàm succus; quin
& nonnullam habet extergen-
di facultatem: fructus calidus
& ipse est, ac mensibus mouen-
dis accommodum.

VIRES.

Opopanax conuenit febrium horroribus, vulsis, ruptis, laterum doloribus, **Diosc.**
torminibus, & vrinae stillicidijs: bibitur ex vino aut aqua multa contra vesicae
scabiem: Menses trahit, vteri inflationes, duritiasq; ex melle dilutus discutit.
Ischiadicis vtiliter illinitur. carbunculos rumpit: cauis dentium inditus dolo-
rem mulcet. Illinitur commodissimè vnà cum pice mistum rabidarum bestia-
rum moribus: concisa radix, subpositaq; partus extrahit: Ad vetera vlcera effi-
cax est. Ex melle illita nudata ossa carne circumuestit. Semen cum Absinthio
potum menses pellit, cum aristolochia praestat ad venenosorum animalium i-
ctus: & bibitur in vino contra vuluae strangulatus.

Ii 2

PANA-

PANACES Asclepium, Græcis, *πάνακες ἀσκληπείου*. Italis, *Panace Asclepio*.

PANACES ASCLEPIVM.

FORMA.

Diosc. Caulem emittit tenuem, geniculatum, circa quem folia funduntur fœniculo similia, maiora tamen, & hirsutiora, odorata: in cacumine umbella habetur, vbi flores emicant aurei, acris gustus, & odorati. Radix parua est, tenuis, & amara.

LOCVS.

Matth. Prouenit in montibus apertis.

QUALITATES.

Gal. s. Minus est calidum, quàm *simp. me.* heracleum.

VIRE S.

Diosc. Flores & semina ex melle illita, contra vlcera, phagedenas, & tubercula auxiliarem vim habent: bibuntur aduersus serpentium morsus ex vino, & illinuntur ex oleo.



PANAX

NOMINA.

501

PANAX chironium, Græcis *πανάκι*, siue *πανάκι χείρωνιον*. Italis, *Panace chironio*.
Herbarijs quibusdam flos solis. Germ. Heyden Ysop.

PANAX CHIRONIVM SIVE FLOS SOLIS.



FORMA.

Folium habet amaraco si. Diosc.
mille. flos aureus, radix parua,
siue tenuis, quæ non altè de-
mittitur: gustu acri. Flos au- Matth.
tem solis, quem panacem chi-
ronium nonnulli faciunt, fur-
culos mittit ab radice nume-
rosos, tenues lignososque, in
quibus folia sunt oblonga hyf-
sopi ferè æmula, concomitan-
tibus minoribus foliolis cu-
mulatim prodeuntibus: flo-
rem pentaphylli, aureum, sed
maiores. Radicem item li-
gnosam adstringenti gustu, mi-
nimè acri.

LOCVS.

Nascitur flos solis in mon- Matth.
tibus, & collibus apricis. Chi- Diosc.
ronium verò panax in Pelio
monte.

FACULTATES.

Panaces chironium, facul- Gal. 8.
tatem Asclepio similem ha- simp. me.
bet.

VIRE.

Pota panacis chironij radix serpentium venenis resistit: illita coma eadem Diosc.
præstat. Solaris verò floris vis conglutinandis vulneribus ac sanguinis fluxioni Matth.
cohibendæ admodum efficax est sanat quoq; tum oris, tum pudendorum vlce-
ra. Datur quoq; vtiliter ad cruenta sputa, & ad dysenteriam, cum radicibus con-
tritius. In summa, vbi agglutinare, cohibere, roborare sit opus, ea omnia perin-
de præstat, ac omnia lymphitorum genera.

CENSURA.

Falluntur qui solis florem chironium esse panacem putant, cum autem pa-
naces chironium, Asclepij vires habeat, & exaltat, & radicem habeat acrem
non video cur ijs subscribere queam.

li 3

*PANAX

*PANAX chironium minus, Flos solis minor, Græcis ἡλιάνημος λεπτόφυλλος.

PANAX CHIRONIVM MINVS.

F O R M A.

Non discrepat forma à
præcedente, sed magnitudi-
ne sola, & foliorum angustia.

L O C V S.

Nascitur in locis incultis
apricis, omnemque cultum
respuit vt prior.*



*HELI-

NOMINA.

503

*HELIANTHEMON Peruvianum. Flos Solis. Sol Indicus. Germanis, Sonnenblum.

HELIANTHEMON PERUVIANVM.

FORMA.



Semestrium herbarum omnium facile maxima est, si excipias, quæ pedamento egent. Caulis fere brachium æquat crassitudine, pedes vero vicenos longitudine superat. Huic folia lata, crenata, in mucronem collecta vegeti ad iungunt pediculi. Fastigio insidet capitulum strobilo simile. Sed rotundius latiusque quod in florem tandem explicatur amplissimum, stellato umbone, folijs oblongis aurei coloris ceu radijs cincto, quæ ubi decidere post se relinquunt semen ordine dispositum in alveolis ceu apum fauis.

LOCVS.

Nascitur in Peru & nunc in multis hortis etiam apud nos inuenitur.

QUALITATES.

In secundi gradus sine calida putatur & sicca in eiusdem principio.

VIRE.

Multæ æstimationis est ad glutinanda vulnera eius gummi & vniuersa plantæ vim diureticam sortita est, atq; ad expellendos calculos efficacem.*

11 4

*HELIAN-

*HELIANTHEMON PERUVIANVM Proliferum.

Differt à priori multitudine florum. Maximus enim in fastigio summo flos expansus, numerosa sobole inferius annata circundatur, id quod interdum natura luxu, interdum industria fieri solet.*



LIGVST-

NOMINA.

505

LIGVSTICVM, Græcis, *Αιγυσιον*. Italis, *Ligustico*. Germanorum vulgo, *Wilder Galgan*.
der *Diptam*, & *Roskümich*, alijs *wilder Galgan*.

LIGVSTICVM.



FORMA.

Cauliculum fert anethige- *Diosc.*
niculatum, tenuem, & in cir-
citu folia fertulae campanæ
molliora, odorata prope ver-
ticem graciliora, & longè ma-
gis diuisa: in cacumine musca-
rium, in quo semen dependet
nigrum, solidum, & oblon-
gum, fœniculo proximum, a-
cre, & aroma olēs. Radix can-
dida, & odorata, Heracleotici
panacis similis.

LOCVS.

Gignitur in altissimis, aspe- *Idem.*
risq; montibus, ac umbrosis,
maximè circa fluenta.

QUALITATES.

Radix & semen ex genere *Gal. li. 7.*
excalfacientium sunt, aded vt *simp. me.*
vrinas cieant, menses prouo-
cent, & flatus discutiant.

VIRES.

Radicis, seminisque vis, excalfactoria est, & concoquens: prodest ad intesti- *Diosc.*
nos dolores, & ventriculi inflationes, præstat contra serpentium ictus, vrinas
& menses potu trahit. *Idem* præstat apposita radix.

li 5

LIGVSTI-

LIGVSTICVM alterum, Italis, *Ligustico falso*.

LIGVSTICVM ALTERVM.

FORMA.

Matth.

Caule exit ferulaceo, alis frequentibus, è quibus rami disparibus exeunt interuallis: folijs quinque ex vno petiolo prodeuntibus, per ambitum serratis, Muscarijs fœniculi similibus: semine quoq; simili, sed longiore, crassioreque: Radice nititur vegetiore, exterius subnigra, acuto simul, & subamaro gustu, odoris nō iniucundi.

LOCVS.

Idem.

Gignitur in altis montibus: apricis tractibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Radicis & seminis vis ex-calfactoria est: flatus pellit, frigefacta viscera iuuat, & vrinam mirificè ciet.



PASTI-

PASTINACA domestica, Græcis, Σταχυίς. Arabib. *Iezar*, *Gezar*, *sen Giezar*.
Ital. *Pastinaca domestica*. Germanis, *Pastenei* seu *Pastinachen*. Hispanis, *Ca-
naria blanca*. Gallis, *Pasténades*.

PASTINACA DOMESTICA.



GENERA.

Duum est generum, alterum domesticum, alterum agreste.

FORMA.

Domestica caule exit cras- *Matth.*
so, striato, folijs Elaphobosci
maioribus, pluribus virisque
ex vno pediculo prodeuntib.
terebinthi modo, subasperis,
& per ambitum denticulatis,
umbellas magnas in summi-
tate gerit, floribus melinis, se-
mine forniculi maiore, acuto,
& amariuscule gustu, odora-
toq;. Radicem habet crassam,
teneram, albam, odoratamq;,
non sine adnatis.

LOCVS.

Seritur passim ab olitori- *Matth.*
bus in hortis, sumiturque fre-
quenter in cibis.

QUALITATES.

Pastinaca sativa imbecil- *Galen. 3.*
lior, sylvestris ad omnia po- *simp. me.*
tentior est; vrinas mouet, &
menses prouocat, tum herba
quidem tota, tum maxime se-
men ac radix. Habet porro etiam absterforium quippiam.

VIRE S.

Semen potum vel admotum, menstrua mouet, atque eos iuuat, quos vrinae
difficultas torquet, aut lateris dolor excruciat, aut si aqua curem subiit. Prodest
& serpentium moribus, nam id praesumentes serpentium ictu non affici tra-
dunt. Conceptus adiunat. Radix vrinam pellit, venerē stimulat, partus admo-
tā eicit, folia trita, & cum melle imposita, phagedenas vlcerum purgant. Atqui
ad haec omnia sylvestri inefficacior, & in cibo aptior.

PASTI-

PASTINACA sylvestris, Græcis, Σταφυλινὸν ἄγριον. Italis, *Pastinaca saluatica*.
Germanis, Wild Möhren.

PASTINACA SYLVESTRIS.

F O R M A.

Diosc. Folia habet gingidij latiora
subamara, caulem rectum, sca-
brum, umbellam similem ane-
thi, in qua flores insunt candi-
di, & in medio purpureum
quiddam. Radix illi est dodran-
talis digiti crassitudine odora-
ta, quæ cocta manditur. Semē
habet pilosum, acre, & odora-
tum.

Matth.

L O C U S.

Matth. Prouenit campestri, ac læto
solo, locis præsertim incultis,
& in collibus amœnis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 3. Ad omnia potentior est,
simp. me. quàm fatiua, magis enim ape-
rit, & magis abstergit.

V I R E S.

Diosc. Præstat omnia quæ dome-
stica, sed longè quidem valentius operatur.



CARO-

CAROTA, Italis, *Carota*, & *Carotola*. Germanis, *Rot und weisse Möhren*.

CAROTA.



GENERA.

Duum est generum, alterū *Matth.* radice rubra, alterum alba.

FORMA.

Folia, caules, rami, umbel- *Diosc.*
la, flores, ac semen, sylvestris
Pastinacæ per omnia similia
sunt. Radix in vno genere pur
purea, ac cruenta habetur, in
altero alba, napi ferè similis,
sapore subdulci, odore nō in-
suavi.

LOCVS.

Seruntur ab olitoribus pas- *Matth.*
sim in hortis in ciborum vsu.

QUALITATES.

Semen & radices, pares cū *Idem.*
domestica pastinaca faculta-
tes habent.

VIREs.

Non valde distant suis in viribus à domestica Pastinaca. In cibis sumpta radix
inflar, & concoctu non adeò facilis est. Rubra coquitur in aqua, & deinde tes-
sellatim inciditur, & in acetarijs cum pipere estur. Alba verò rapi, aut napi mo-
do in carniū iure coquitur.

SESSELI

STO

NOMINA.

SESELI Massiliense, Græcis, *Σέσλη*. Arabibus, *Sesalios*. Barbaris, *Sisileos*. Of-
ficinis, *Siler montanum*. Germanis, *Steinbrech*. Gallis, *Sermontain*.

SESELI MASSILIENSE.

GENERA.

Diosc. Quatuor Seseli genera nu-
merantur, Massiliense, Creti-
cum, Æthiopicum, Pelopon-
nense.

FORMA MASSI- LIENSIS.

Diosc. Folia habet fœniculi simi-
lia, crassiora tamē, caulem ve-
getiorem, umbellam anethi,
in qua semen provenit oblon-
gum, angulosum, degustanti
statim acre. Radicē gerit lon-
gam, iucundi odoris.

LOCVS.

Matth. Nascitur in altis montibus.

QUALITATES.

Galen. 8. Radix, atque etiam semen
simp. me. vsq; aded exalfacit, vt admo-
dum urinā mouere queat, sed
& medicamētum est tenuium
partium.

VIRES.

Diosc. Semen & Radix potu stranguriæ & orthopneæ medetur, suffocationib. mu-
lierum, & comitialibus profunt, menses, & partus trahunt; tussim veterem sa-
nant. Semen cum vino potum concoquit, & tormina discutit. Epialis febribus
vtile, contra perfrictiones in itineribus cum pipere, & vino bibitur. Datur in
potu capris, ac ceteris pecudibus, quo facilius suos fortus enitantur.

*SESELI



NOMINA.

*SESELI Massiliense nonnullorum, Gallis herbarijs Fœniculum tortuosum vocatum.

SESELI MASSILIENSE
NONNVLLORVM.

FORMA.

Tota ferè candida est herba, folia cinerea sunt, exigua & valde diuisa, flores singuli folijs quinis constant, & coniuncti umbellam purpurascens efficiunt, radice nititur longa admodum, sapore tamen ignauo præditam. Semen gignit subamarum, calidum manifestè.

LOCVS.

Crescit in agro Monspe-
sulano.

QUALITATES, ET VIRES.

Nō inepte pro Sesele Mas-
siliense vsurpatur.*



SESELI

SESELI Æthiopicum, Græcis, Σέσλη αἰθιοπικόν. Italis, Sefeli Ethiopico.

F O R M A.

DIOSC. Folia habet hederæ maiora, & ad periclymeni modum oblonga. Frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus (seu spithamæ longitudine) capitulo anethi, semine tritici modo denso, nigro, amaro, Massiliensi odoratio- re, & acriore, multum suavi.

L O C U S.

Matth. Nascitur in apricis montibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Nulla qualitarum & virium cum altero intercedit differentia, nisi quod cum Æthiopicum acrius sit, valentius sua expedit munia.

SESELI ÆTHIOPICVM.



*SESELI

N O M I N A.

513

*SESELI *Aethiopicum* vulgare, *Ceruicellum*, *Ceruaria*, *Elaphoboscus*, Germanis, Weiß Hirschwurzel.

SESELI *ÆTHIOPICVM* VVLGARE.

FORMA.



Folia habet oblonga magis quam rotunda, crenata subtus cæsa, annexa pediculis suis vni costæ nervosæ infima parte circumdante caulem è radice crassâ pilosâque, intus candida, amari saporis, prodeuntem diuisumq; in ramos plurimos umbellas albis floribus sustinentes, è quibus oritur semen cartilagineum, album, amarum.

LOCVS.

Nascitur in frutetis montium.

QUALITATES, ET VIRE.

Eadem illi ascribunt quidam, quæ Diosc. *Æthiopico* suo. Imprimis vero ad colicos dolores ipsius radix commendatur.*

Kk

SESELI

SESELI Peloponnense, Græcis, Σέσλη πελοποννήσου. Italis, Sefeli Peloponese.

SESELI PELOPONNENSE.

FORMA.

Diosc. Folia mittit cicutæ latiora,
& crassiora, caulē supra Maf-
filienfis magnitudinem feru-
laceum, & latam in cacumine
ymbellam, in qua semen lati-
us odoratū & carnosius pen-
det.

LOCVS.

Diosc. Nascitur in asperis, riguis,
& collibus, & in Ida monte,
& etiamnum in Insulis.

QUALITATES, ET
VIREs.

Eadem præstare potest, quæ
& cætera genera.



ANI-

O
dicu
adue
Lac
tum,
pani
ctus
culos

NOMINA.

515

ANISVM, Græcis, *ἄνισον*. Mauritanis, *Aneisum*, siue *Anexissum*. Italis, *Aneiso*, & *Aniso*. Germanis, *Anis*, & *Enis*. Hispanis, *Matabalua*, & *Terna dulce*. Gallis, *Anis*.

ANISVM.

FORMA.



Caulem edit rotundum, *Matth.* cubitalem, ramosum, umbellam candidam mellis odore, semen oblongum, iucunde odoratum, sapore sanè misto ex dulci, acriq; ac etiam amariusculo, ad multa utile.

LOCVS.

Seritur in campis, hortis, *Diosc.* & viridarijs. Sed optimum *Matth.* est quod in Creta, & Aegypto nascitur.

QUALITATES.

Semen maximè utile est, *Gal. 6.* acre, subamarum, vt propè *simp. me.* adurentium accedat caliditatem. Est autem in siccando tertij ordinis, sicut in calefaciendo. Aperit, concoquit, *Matth.* digerit, incidit; prouocat, & flatus pellit.

VIREs.

Oris halitum iucundiorem facit, doloris leuamentum præstat, urinam ciet, *Diosc.* discutendi vim habet. Hydropicis potum, sitim extinguit. Animalium venenis aduersatur. Valet, & ad inflationes. Aluum, & alba fœminarum profluvia sistit. Lac ad mammas elicit. Venerem stimulat, capitis dolores leuat, naribus suffitum, cum rosaceo tritum instillatumq; fractis auribus medetur. Inspergitur *Matth.* panibus odoris, saporisq; gratia; Datur tostum cum mentha ad cœliacos affectus. Singultum sedat, tam haustum, quàm olfactum; somnum conciliat, & calculos pellit.

Kk 2

CARVM,

CARVM, Græcis, Καρόδ. Arabibus, Coreuit, Karania, seu Carui. Italis, Caro, & Caruo. Germanis, Matt Rümich, Wiesensümmel. Hispanis, Alcaranea. Gallis, Carui.

CARVM.

FORMA.

Matth. Planta est Pastinacæ sylvestris non absimilis, caulibus ab vna radice pluribus, quadrangulis, cubitalibus, umbellula floribus candidis referta, semine antii longiore, anguloso, subnigricante, radice longa, sapore amariuscule simul & acri.

LOCVS.

Idem. Nascitur in pratis, & præsertim in montibus, & conuallibus.

QUALITATES.

Gal. 7. simp. me. Cari semine excalfacit, & siccat tertio quodammodo ordine, moderatè acrem qualitatem possidens.

Matth. Aperit, incidit, digerit, concoquit, prouocat, & flatus pellit.

VIRE S.

Diosc. Vrinam concitat, stomacho vtile, os commendat, concoctionem adiuuat, vtiliter miscetur antidotis: Radix cocta pastinacæ modo manditur. Herba pro olere estur. Seminis farina admiscetur vtiliter cataplasmatibus, quæ ad fugillata parantur.

CENSURA.

Ridendus sanè error eorum est, qui rubram carotam, carum legitimum esse contendunt.

ANE




NOMINA.

317

ANETHVM, Græcis, *ἀνθον*. Mauritanis, *Xebet, lebet, seu Sebet*. Italis, *Aneto*. Germanis, *Dillen* seu *Hochkraut*. Hispanis, *Heneldo*. Gallis, *Anet*.

ANETHVM.

FORMA.



Adeo ex omni parte scæni-*Matth.*
culum æmulatur; vt sapius le-
gentes fallat, nisi gustum con-
sulant. confurgit itaque cauli-
bus sesquicubitalibus, ramo-
sis, folijs capillorum speciem
referentibus, floribus luteis,
flore, & umbella scæniculi, Ra-
dice neq; adeo longa: neque
multis subnixa fibris.

LOCVS.

Seritur in hortis ad cibo-*Idem.*
rum obsonia, & in medicum
quoq; vsum.

QUALITATES.

Adeo excalfacit, vt haben-*Gal. 6.*
dum sit, aut secundi ordinis in *simp. me.*
tensi, aut tertij remissi; exic-
cantium verò ordinis est se-
cundi incipientis, aut primi
finientis. ideoq; meritò in o-
leo decoctum digerit; dolo-
rem sedat, somnum conciliat,

& crudos humores concoquit.

VIRES.

Aridi comæ, seminisq; decoctum potu lacuocat, inflationes, & tormina se-*Diosc.*
dat, aluum, vomitionesque sistit, vrinas ciet, singultum leuat, oculorum aciem
hebetat, genituram restinguit assidue sumptum; vteri affectibus in deflectioni-
bus vtile est. cremati seminis cinis illicus condylomata tollit.

Kk 3

CvMI-

CVMINVM sativum, Græcis, *Kéuvov*. Arabibus, *Camium*, seu *Kemum*. Italis, *Comino*, & *Cimino*. Germanis, *Rümmel*. Hispanis, *Comino*. Gallis, *Comin*.

CVMINVM SATIVVM.

GENERA.

Diosc. Duum est generum, sativum alterum, alterum sylvestre.

FORMA SATIV.

Matth. Exit caule sceniculaceo, folijs quoq; ferè similibus, sed rarioribus, semine in umbella subflavo, cum granedine quadâ odorato, sceniculi maiore.

LOCVS.

Diosc. Seritur passim in Italia in campis, sed sponte quoq; per se provenit in Æthiopia, Egypto, Galatia, Cilicia, & Terentia. Tractu gaudet calido, & putrescibili. Quare frequentissimum in maritimis nascitur.

QUALITATES.

Galen. 7. Semen qualitatibus est exco-
simp. me. facientis, perinde ac anisi, ligustici, & cari, ex tertio ordine excofacientium.



VIRE.

Diosc. Excofacit, adstringit, exiecat. Ad tormina, inflationesq; convenit coctum, & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca: Demorsis a serpente in vino. Auxiliatur impositum testium collectionibus, impositum cum vva passa, aut loliacea farina, ceratove mensium abundantiam inhibet. Contritum in aceto, & naribus obiectum sanguinis profluvia sistit, colorem bibentium aut perunctorum mutat in pallorem.

CVMP-

CVMINVM sylvestre, Græcis, Κέμινον ἄγριον. Italis, *Comino*, seu *Cinino saluatico*.

CVMINVM SYLVESTRE.

GENERA.

Duosylvestris cumini affi. Diosc.
gnantur genera, primum, &
secundum.

FORMA PRIMI.

Frutice assurgit paruo, cau- Diosc.
le dodrantali, ac tenui, qua-
ternis, aut quinis folijs, tenui-
bus veluti serratis, & gingidij
diuisura. in cacumine capitu-
la quina, aut sena habet, mol-
lia, rotunda, in quibus semen
est acerosum gustu satiuo a-
ctiore.

LOCVS.

Nascitur in collibus, in Ly. Diosc.
cia, & Galatia Asia, atq; Car-
thagine Hispania.

QUALITATES.

Calefacit, exiccat, aperit, Matth.
digerit, incidit, resoluit, &
prouocat.

VIRE.

Bibitur semen ex aqua aduersus tormina, inflationesq; Item ex vino contra Diosc.
venenatas bestias. Singultus ex aceto sedat, stomacho vtile quem humor vexat.
Sugillata tollit, si manducatum cum melle, & vva passa illinatur. Idem praestat
ijsdem adiectis ad testium inflammationes.

Kk 4

Cvml-

CVMINVM sylvestre alterum, Græcis, κύμινον ἄγριον ἑταρον. Italis, Cimino sa' uati-
co secondo.

CVMINVM SYLVESTRE ALTERVM.

F O R M A.

Diosc. Planta est sativi non dissimi-
lis, quod à singulis floribus ela-
ta promit cornicula, in quibus
semen est melanthio simile.

L O C V S.

Matth. Nascitur in collibus apricis.

Q U A L I T A T E S.

Matth. Semen excalfacit, siccit, ape-
rit, prouocat.

V I R E S.

Diosc. Epotum semen omnium ser-
pentium moribus præsidio est,
calculosis, & ijs qui urinæ stilli-
cidio vexantur, aut cōcretum
sanguinem cum lotio reddunt
auxiliatur. Sed apij semen fer-
uefactum postea bibendum est.



Conso-

N O M I N A.

521

CONSOLIDA Regalis. Italis, *Consolida Reale*, seu *sperone da cavaliere*. Germanis, *Nittersporen*. Gallis, *Pie d'Allouette*, seu *consolida royalle*.

CONSOLIDA REGALIS.

F O R M A.



Caulem gerit vnicum, ramu
lis multis, tenuibus, longis, di-
uisis, sylvestris melanthij mo-
do. Flores edit purpureos cor-
niculatosque, corniculis ipsis
sursum spectantibus, semē fert
melanthio simile in parvis cor-
niculis, filiquisve conclusum.

L O C V S.

Nascitur plurimum in cam-
pis inter segetes. *Matth.*

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Auxiliatur oculorū Epipho- *Idem.*
ris, inflammationibusq; per se
recens admotum, & eorūdem
tumorib. ex melle. Datur quo-
que iſtericis vtiliter illico à bal-
neo, & ex dulci vino ad vrinae
ardores, calculos eicit, vulne-
ra recentia glutinat, & vlcera
sanat.

Kk 5

AMMI,

AMMI, Græcis, *ἀμμή*. Arabibus, *Hanochab*, *Anazaue*, *Nacachau*, seu *Nacachane*.
Officinis, *Ameos*. Italis, *Ammi*. Hispanis, *Ammi*. Germanis, *Ami*.

A M M I.

F O R M A.

Matth. Caulem emittit fœniculaceum, folijs agrestis pastinacæ, semine in umbellis exili, & cumino minutiore, Origani resipiente, odoratum, & acutum.

L O C V S.

Idem. Nasçitur in monte Gargano, quod Italum est, quod verò peregrinum ex Alexandria apportatur, Arabicum est.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Maximè est vtile, facultatis est exaltatorig & desiccatorig, tenuium partium, gustu subamaro, & acri: & clarum est, quod & digerat, & urinam moueat, fuerit autem in calefaciendo, desiccan doque ex ordine tertio intenso.

V I R E S.

Diosc. Semen facit ad tormina, urinæ difficultatem, serpentium ictus, si cum vino bibatur. Menses prouocat. Miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, vt inde exortis urinæ difficultatibus resistat: suggillata cum melle tollit colorem potu aut illitu mutat in pallorem: suffitu cum vna passa aut resina vulvas purgat. Quod ex Alexandria Egypti ad nos confertur, steriles prolificas reddit, si à purgato prius corpore, sumatur tritum in puluere drachmæ pondere diebus aliquot continuis mane ex vino meraco, aut carniū iure.

Matth.

C E N S V R A.

Rarò admodum legitimum Ammi in myropolijs habetur.

CORIAN-



NOMINA.

CORIANDRVM. Græcis, *κένανιον* & *κέναννον*. Mauritanis, *Rus* & *Rusiera*. Kuzibara seu Kuzibara. Italis, *Coriandro* seu *Coriandolo*. Germanis, *Coriander*. Hispanis, *Culantro*, seu *Ciliandro*. Gallis, *Coriandre*.

CORIANDRVM.



FORMA.

Tenui provenit caule, ses- *Matth.*
quicubitali longitudine, ramis
numerosis, folijs interne par-
thenio proximis, quæ verd in
caulib. habentur, & tenuiora
sunt, & magis diuisa, flores in
caulium summitatibus candi-
cant, è quibus racematim ori-
tur semen rotundum, ac stria-
tum. Plâta virescens grauius
spirat fœtido cimicum odore.
At semen siccū exuta graueo-
lentia odoratum euadit, & ad
multa vtile.

LOCVS.

Nascitur sponte in campis, *Matth.*
& inter segetes, seriturque in
campis, & hortis.

QUALITATES.

Ex contrarijs componitur *Galen. 8.*
facultatibus, plurimum habēs *simp. me.*
essentiæ amara, q̄ tenuiū par-
tiū est, & terrena, nec parū ē
humiditatis aqueæ obtinet, q̄
repentis est facultatis. Habet
autē & adstrictionis paucillū.
Dioscor. tñ frigida facultatis *Diosc.*
Coriandrū existimat, cui iustia
gatur Auicenna, Archigenes,

VIRE.

& *Rufus.*
Illitum cum pane, & polenta, ignib. sacris, & vlceribus, quæ serpunt, medet. *Diosc.*
Epynictidas cū melle, & vna passā testiu inflammationes, carbunculosq; sanat
cū faba fresa, strumas, & tubercula discutit, sumptū mentem non sine periculo
mouet, quare continuo, & copiosiore vsu abstinendū: succus cū cerula, argen-
tiq; spuma ex rosaceo, & aceto illitus arduentes summæ cutis inflammationes e-
mendat. Semen datur cochlearij mensura vtiliter ad acidus ructus, stomachū
corroborat, & caput, defluxionibus ventris accommodè administratur; con-
coctionem cibi adiuvat. Tritū recentibusq; carnib. aspersum prohibet, ne tam
cito ætatis tēpore putrescant. Ex aqua aut potū, celiacos & dysentericos iuuat.

HIERA-

HIERACIVM, Græcis, *Ἱεράκλειον*. Italis, *Hieracio*. Germanis, *Habichtskraut*.

HIERACIVM.

G E N E R A.

DIOSC. Duo Hieracij recensentur genera, maius, & minus.

F O R M A M A I O R I S.

Idem. Magnum caulem emittit, asperum, subrubrum, spinosum, cauum, folia ex intervalis rariuscule diuisa per ambitum soncho similia, luteos flores in oblongis capitulis.

Matth. Vnica nititur radice, recta, lacteo succo pregnante, in summa herba est lactucae sylvestri similis.

L O C V S.

Matth. Nascitur in campestribus, & collibus incultis locis, & aliquando inter segetes.

Q U A L I T A T E S.

DIOSC. Vim refrigerandi habet, & modicè substringendi.



V I R E S.

Idem. Stomacho æstuanti, inflammationibusque illitum prodest. Succus epotus ventriculi erosiones mitigat. Herba cum radice illita vibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Succus cum lacte mulierum sanat omnia oculorum vitia, ad id edoctis ab accipitre medicis, aiunt enim eos herbam pede scalpere, & emanantem lachrymam in oculos transferre ad nubeculas abstergendas. Idem in posca potus, alium citat: In vino verò medetur serpentium ictibus: urinæ difficultatibus succurrit haustus.

HIERA-

NOMINA.

525

HIERACIVM minus, Græcis, *Ιεράκιον*. Italis, *Hieracio minore*. Germanis, *Ha-*
senstrauch.

HIERACIVM MINVS.

FORMA.



Herba Cichorio ferè simi- **DIOSC.**
lis est, sed asperiora ei folia *Matth.*
sunt, cauliculi tenues, viren-
tes, subasperi, in quorum ca-
pum flores exeunt lutei
cichoreæ figura, qui mature-
scentes in pappos euadūt. Ra-
dix illi multifida tenuisque.

LOCVS.

Nascitur in pratis in cam- *Matth.*
pestribus secus itinera, locis-
que incultis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Vim suam ad eadem ad que
superior impendit.

APIVM,

potus
cich-
ad id
anan-
posca
cultu-

ERA-

APIVM, Græcis, Σέλινον κνππείον. Arabibus, Charfi, Charfi, seu Cheres. Italis, Petrosimolo, sed Thusi in Pitrosello. Germanis Peterfilien/ seu Peterfilin. Hispanis, Perexil. Gallis, Persil de Iardin.

APIVM HORTENSE.

FORMA HORTENSIS.

Matth.

Notissima planta vulgare nostrum Petroselinum est: exit enim folijs Coriandri æmulis compluribus ex vno ramulo prodeuntibus, per ambitum frequenter laciniatis, sed quæ in caule sunt mutata forma, longa angustaque spectantur. Flores habet exiguos candicantes, & semen Aniso simile. Radice nititur digitali, dodrantali longitudine, albicante, dura intus matrice, raro diuaticata, quæ carniū iuribus passim incoquitur.

LOCVS.

Idem.

Seritur ubiq; ab olitoribus passim in hortis.

QUALITATES.

Gal. li. 8.

Vique adeo calidum est, vt vrinam & menses cieat. Flatus quoque discutit, & magis semen quàm herba ipsa.

VIRE S.

Diosc.

Illinitur cum panē, aut hordeacea farina vtiliter oculorū inflammationibus, astuantem stomachū mulect. Mammarum duritiā ex lacte concreto contractam reprimi: vrinam cieat, siue crudum, siue coctum edatur. Foliorum & radicum decoctum venenorum noxæ resistit, cum vomitiones excitet: aluum cohibet. Semen vehementius vrinam impellit. Auxiliatur contra serpentium venena, aut epotam argenti spumam. Inflammationes discutit. Admiscetur medicamentis, quæ dolorum leuamenta præstant. Thoracis quoque & tussis remedijs. Folia concisa, & cum vino, & oleo de scorpionibus in patella feruefacta, pubique calida admota remorantem vrinam cient.

Matth.

APIVM



NOMINA.

527

APIVM palustre, Græcis, ΕΛΕΟΣΤΕΛΙΝΟΥ. Mauritanis, *Asaris*. Italis, *Apio*, & *Apio aquatico*. Germanis, *Eppich*, seu *Eppich*. Hispanis, *Perexil daga*, & *Apio*. Gal-
lis, *Perfil de leau*.

APIVM PALVSTRE.

FORMA.

Folia gerit hortensis maio- *Matth.*
ra, solidioraque; caulem quo-
que vegetiorem, odore etiam
acutiore, grauiorēve, & qui ca-
put feriat. Radice tamen, flo-
ribus, & semine ferè similibus.

LOCVS.

Prouenit palustribus, & v- *Idem.*
lignosis locis, & feritur quo-
que in hortis.

QUALITATES, ET VIRES.

Eadem illi sunt vires, quæ *Diosc.*
hortensi inesse diximus.



PETRO-

PETROSELINVM Macedonicum, Græcis, Πετροσέλινον. Italis, Petrofelino Macedonico. Hetruscis, Pitrofello Macedonico.

PETROSELINVM MACEDONICVM.

FORMA.

Diosc. Planta est ramosa, vulgari
Matth. petroselino folijs, pxiima, cau-
le crasso, frequētibus alarum
cauitatibus, floribus albis, se-
mine ammi simile, odoratio-
re, sapore acri, & amaro, aro-
ma olente.

LOCVS.

Gal. li. 8. Prouenit optimum in Ma-
simp. me. cedonia in præruptis locis.
& lib. 1. de Nascitur & in Epiro, & Cicla
Anti. dibus insulis, feritur etiā nūc
Matth. in hortis in Italia.

QUALITATES.

Gal. li. 8. Semen maximè vsui est, cum
simp. me. tota etiam herba, vnà cum ra-
dice similem, sed imbecillio-
rem facultatem sortiatur. Est
autem vt gustu acre cum ama-
ritudine, sic & in operibus ca-
lidum, vnà cum incidendi ef-
fectu. Fuerit itaq; ipsum ter-
tij ordinis, tū calefacientium,
tum exiccantium.



VIRES.

Diosc. Semen vrinam cit, & menstrua. Prodest contra stomachi, & coli inflationes.
Laterum, renum, & vesicæ doloribus in potu subuenit: admiscetur antidotis v-
rinam cientibus & in theriacis.

LEVISTI-

NOMINA.

529

LEVISTICVM vulgare, Græcis, *ἰπποσέλινον*, Italis, *Leuistico*. Germanis, *Siebstockel*. Gallis, *Ache*, & *Achelarge*.

LEVISTICVM VULGARE, SEV
HIPPOSELINVM.



FORMA.

Caulibus exit crassis bicu-
bitalibus, fruticosisque, ra-
mis multis, multisque alarum
cauitatibus, folijs palustris a-
pij, sed longè maioribus, mu-
scarijs in cacumine grandiori-
bus, albis refertis floribus, se-
mine oblongo fœniculi ma-
iore, tota planta grauius o-
let.

LOCVS.

Seritur in hortis.

Idem.

QUALITATES.

Excalfacit, & siccatur ordine
tertio, quo fit, vt aperire, in-
cidere, digerere, & prouoca-
re valenter possit: perinde ac
cætera selinorum genera.

VIRES.

Ea omnia præstare valet,
quæ de palustri apio dicta
sunt: sed eo imbecillius est.

APPENDIX.

Tametsi vulgare Leuisticum Hipposelinum legitimum non sit, quod co-
ma, & semine illi non respondeat, cum tamen cæteris selinis grandius sit, &
totafacie simile, nemo nobis facessere debet, si hanc plantam Hipposelinum
appellauimus.

LI

SMYRNI-

SMYRNIVM, Græcis, *Σμύριον*. Latinis, *Olus atrum*. Arabibus, *Smirnon*. Italis, *Smirnio*, seu *Macerone*. Hispanis, *Apio Macedonico*. Gallis, *Maccron*.

F O R M A.

DIOSC. Caulem habet, & stolones multos, folia latoria, subpinguia, robusta, ad terram infracta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucundo. colore in luteum languescente. capitibus caulium orbiculatis ut anethi. semine brassicæ rotundo, nigro, acri, myrrha sapore, ita ut alterum alterius loco cedat. Radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus.

L O C V S.

Idem. Nasceitur in saxosis, & collibus, atque squallidis, & limitibus, terrenis. Acetiam in hortis feritur.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 8. Ex eodem genere & ipsum
simp. me. cum apio est, & petroselinum: fueritque apio calidius, petroselino vero imbecillius, calidum siccumque tertio ordine.



V I R E S.

DIOSC. Folij in muria maceratis ad obsonia vtuntur, aluum sistunt. Radix potius præstat aduersus serpentium ictus, tussis, & Orthopneas mitigat, vrinæ difficultati medetur: illita recens tumores, collectiones duritiâsq; discutit. vulnera ad cicatricem perducit. partus abortu vitiât, si feruefacta subijciatur, semen lienis, renum, & vesicæ vitij prodest. Menfes, & secundas pellit. Commodè datur Ischiadicis in vino. Inflationes stomachi lenit, sudores ciêt, & ructus. Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

SMYR-

SMYRNIUM Creticum, Italis, Smirnio di Candia.

SMYRNIUM CRETICVM.

FORMA.



Folia fert nostrate Smyr- *Matth.*
nio crassiora, quina ab vno
pediculo exeuntia, & per am-
bitum serrata, præter quàm
in altera parte propè pedicu-
lum, quo in loco succisa spe-
ctantur. Longè autem diuer-
sa habentur, quæ in caule sunt.
Ea enim rotunda visuntur,
caulibus per medium transe-
untibus perfoliata vocatæ
modo. nullis in ambitu den-
ticulis. Caulem edit firmum,
striatum, & subter folia geni-
culatum. Umbellas in sum-
mis caulibus gerit, floribus
albicantibus, semine rotun-
do, anguloso, & in acutum
desinente, sapore acuto, &
amariuscule. * Radix est prio-
ris Smyrni sed minor.*

LOCVS.

Nascitur in Creta Insula, & *Idem.*
feritur nunc in Italia.

QUALITATES,

ET VIRES.

Non differt suis in qualitatibus, & viribus ab Italico Smyrnio.

Idem.

L I 2

IMPE-

pota
e dif-
vul-
r, se-
lom-
& ru-

MYR-

IMPERATORIA, Italis, *Imperatoria*. Germanis, *Meiſterwurk*. Officinis Germanorum, *Magiſtrantia*. Gallis, *Orruche*, ſeu *Imperatorie*.

IMPERATORIA.

FORMA.

Matth.

Folijs exit Sphondylii, minoribus tamen, ſolo accubantibus, robuſtis, hirsutis, aſperisque: caule bicubitali, purpureſcente, rotundo, hirsutoque, in cuius cacumine umbella floribus candidis ornatur, è quibus poſtea ſemen prodiſt acutum, ac odoratum. Radix ineſt ei non longa, mediocriter craſſa, rugoſa, dura, quæ foris nigricat, intus verò viſceſcit, gultu admodum acri, mordax, ſubamara, & odorata.



LOCVS.

Idem.

Nascitur in altis montibus.

QUALITATES.

Idem.

Excalfacit ordine tertio completo, aut quarto inchoante. Incidit, trahit, aperit, digerit, attenuat, prouocat, reſoluit, venena diſſipat. Zedoariaque facultatibus pollet.

VIRES.

Idem.

Diſcutit mirificè tum inteſtinorum, tum ventriculi flatuſ. Cir menſes, atque vrinam. Fouentur eius decocto vtiliter in dolore dentes, præſertim ſi in vino aſtero radix decoquatur. Eadem ex vino pota vteri ſtrâgulationibus prodeſt, conceptus adiuuat, quos frigiditas intercipit, concoctionem roborat. Comanducata cerebri pituitam trahit. Puluis radicis ex ſaluia decocto hauſtus, auxiliatur reſolutis, comitialibus, veternoſis, conuulſisq; . Oris halitum commendat, & omnes roborat ſenſus. Præſtat ferè ad venena omnia, omniumque venenoſarum ferarum morſus, ac icтус. Aſthmaticos, anhelosq; iuuat, obſtructiones aperit. Hydropicos, ac lienosos curat. In ſumma excalfacit vniuerſas corporis partes, quas frigus occuparit.

* IMPE-

NOMINA.

533

*IMPERATORIA Alpina, vel Aстранtia Alpina. Germanis, Bergsfrenk.

IMPERATORIA ALPINA.

FORMA.

Minor est quam præcedens, omnibus suis partibus, nam & angustiora folia & pedicillos teneriores profert ex radice non abfimili nostræ Imperatoriæ, & æquali etiam, gustu acriori & magis virente.

LOCVS.

Prouenit in alpihus apud Heluetios.

QUALITATES.

Calida est & sicca, vt vulgaris Imperatoria, qua superior esse facultatibus omnibus videtur, & ad agendum promptior.

VIREs.

Vtuntur hac planta ad & cerebrum expurgandum, flatus discutiendos, quartanas, partus eruendos, colicisq; dolores sedandos, id quod vulgaris nostra quoq; præstare potest.*

LI 3

FOENI-



FOENICVLVM, Græcis, *Μάραθρον*. Arabibus, *Raionigi*. Italis, *Finocchio*. Germanis, *Fenchel*. Hispanis, *Hinoio*, *sive Funco*. Gallis, *Fenoil*.

FOENICVLVM.

FORMA.

Matth.

Caulem edit anethi, sed crassiorē, nec proceriorem, striatum, geniculatumque, folijs numerosis, capillaceis, cauis alarum multis. Umbellis cacumina occupantibus, anethi æmulis, melinis floribus, & semine oblongo, gustu acuto, quadam cum leniuscula amaritudine, odorato. In quodam verò genere hortis Italicis familiare, semen dulce percipitur, & crassiori quoque mole spectatur. Radice nititur longa, digitali crassitudine, acuto, ac amariusculo sapore, cum dulcedine quadam.



LOCVS.

Idem.

Seritur in hortis, vineis, & apricis locis.

QUALITATES.

Gale. 7.
simp. me.

Tam valenter exalfacit, vt ex tertio exalfacientium ordine censerī possit, deficcatur verò non æquē. Sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit: syluestris verò cum semine, tum radix, valentius calefacit, & siccat.

VIRE S.

DIOSC.

Herba deuorata, aut semen cum Ptilana potum mammas lacte replet. co-mæ decoctum in renum doloribus infusum prodest. Bibitur ex vino contra serpentium ictus. Menses ciet, contrita radices, & cum melle illita canum moribus medentur: Succus caulium, & foliorum præstat instillatum ad excitandam oculorum aciem. Erratici autem potæ stranguriæ medentur. Menses suppositæ ciet, aluum sistunt. Radice, aut semine potu calculos committunt, regium morbum expurgat, lactis abundantiam facit. Decoctum foliorum haultum puerperas purgat.

DAVCVM

NOMINA.

335

DAUCUM, Græcis, Δαύκον. Mauritanis, Dacu Glezar, siue Gez ar. Italis, Dau-
co. Germanis, Berwurh. Hispanis, Dauco. Gallis, Carote saunages.

DAUCUM.



GENERA.

Trium est generum, Cre- DIOSC.
ticum, Aliud Apio simile, &
Tertium Coriandro.

FORMA CRE- TICI.

Cretecum folijs est fœnicu- DIOSC.
lo simile, minoribus tamen,
& tenuioribus, caule dodran-
tali, umbella coriandri, flore
albo, candido, hirsuto, sua-
uissimi manducando odoris.
Radix digitali crassitudine, & Matth.
dodrantali longitudine ado-
lescit.

LOCVS.

In saxosis nascitur, & locis DIOSC.
sole illustratis.

QUALITATES.

Agrestis quidem domesti- Gal. 6.
co minus est esui idoneus. sim. med.
Caterum in omnibus vehe-
mentior. At domesticus co-
mestibilis quidem sed imbe-
cillior. Acrem & calefacien-
tior. Id quod Domestici
quoque semen præstare potest.

VIRE S.

Cretecum omnium probatissimum, Semen omnium potum vrinas, & men- DIOSC.
ses, atque partus extrahit. Torminibus liberat, vetorem tussim mitigat. Ex vino
potum auxiliatur Phalangiorum ictibus, tumores illi discutit, cretici pecu-
liariter radix maximè præstat contra venenatorum ictus ex vino pota.

Ll 4

*DAUCVS

FORMA.

Quæ apud nos habetur pro Daucio Cretico, planta est folijs ferè fœniculi, nigrioribus & minoribus, femine oblongo acuminato subalbido hirsuto aromatici saporis cum manditur & odorato. Flores in summitate cauliculorum palmi altitudinem raro excedentium, nisi soli luxuria adiuuentur, umbellam candidam constituunt. Radice nititur crassa, & longa.

LOCVS.

In montibus Vicentinis hic Daucus plurimus prouenit.

FACULTATES.

Huc refer quæ suo ascribit Autor, nam figura non differt à vero Cretico qui ad nos afferri solet, viribus tantum eo paulo inferior.*



DAVCVM

DAUCVM alterum, Græcis, Δαῦκον ἑτέρον. Italis, *Dauco d'altra specie*. Germanis, Schwarze Hirschwurzel.

DAUCVM ALTERVM.

FORMA.



Folij est coriandri, flori-
bus in umbella albis, capite,
& semine anethi, muscario
pastinacæ, semine oblongo
ceu cumini, acri. Radice pa-
stinacæ sylvestris, superiore
parte villosa.

LOCVS.

Nascitur in maritimis, pro-
montorijs, & montibus, &
collibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Viribus ijsdem refertus est, *Galen.*
quibus & Creticum, sed non *Diosc.*
adeo efficacibus.

LI SENA,

SENA, posterioribus Græcis, *Σίνα*. Arabibus, *Sene*. Italis, *Sena*. Germanis, *Senet*. Gallis, *Sene*.

FORMA.

Matth. Folijs est Glycyrrhizæ proximis, crassis, subpinguibus, fabarum recentium sapore, caule cubitali, à quo ramuli exeunt flexiles. Flores ei emicant aurei, veluti brassicæ, purpureis intercurrentibus venulis, quibus succedunt folliculi falcati, adeoque sui naturæ compressi, ut superior membrana inferiori cohaereat, in quibus semine continetur subuirescens, vinaceorum nucleis simile. Folliculi è ramusculis prominent tenui pediculo nitentes. Planta est frigoris impatiens.

LOCVS.

Idem. Seritur in Hetruria, in agro præsertim Florentino in campis.

QUALITATES.


Idem. Aperit, aluum citat, digerit, concoquit, excalfacit, attenuat.

VIRE.

Idem. Educit bilem tum atram, tum flavam, ac etiã pituitam, quod sanè experientia comprobatur.

Mejue. Mundat cerebrum, iecur, lienem, pulmonem, atque omnes corporis sensus, viscerum obstructions aperit. Auget iuuentutem, seniumque retardat, & animum hilarem facit. folia in capitis perfusionibus vtiliter decoquantur, addita præsertim Anthemide. Roborat enim hoc modo cerebrum, nervos, oculorum aciem, & auditoriam facultatem. Optima demum in vniuersum est Medicina morbis omnibus diuturnis, & melancholicis. Ideoque delirij, amentia, resolutioni neruorum, phthiriasi, cephalalgia, scabiei, pustulis, pruritui, & Epilepsia. Cor etiam roborat præsertim vbi eis commisceatur medicamentis, quæ ad cordis affectus sunt idonea. Est præterea Sena clemens, & nullius incommodi medicamentum, adeo ut tuto dari possit cum pueris ætate tenellis, tum etiam vtero gerentibus. Fit ex folijs vinum vindemiae tempore, quod ea omnia præstat potum.

* SENA



NOMINA.
 *SENA Alexandrina, Gallis, *Sene de Leuant.* Hispanis, *Sen de Alexandria.*

339

SENA ALEXANDRINA.

FORMA.

Oblongiora & in acumen
 vergentia habet folia, omni-
 bus suis partibus tenerior est
 vulgari.

LOCVS.

Ex Alexandria Egypti ad
 nos conuehitur.

FACULTATES.

Valentius præstat ea vni-
 uersa quæ vulgo vñtata.*



COLLY-

COLLVTEA, Græcis, Κολλυτρία. Italis, Collutea. Germanis, Schaffinsen.

COLLVTEA.

FORMA.

Theoph.
lib. 3. c. 11.

Arbor est magnitudine præstans, fructum in Siliqua ferens magnitudine lentis, quo oves mirum in modum pinguescunt; Folium habet non absimile fœnogræco.

LOCVS.

Matth.

Nascitur plurima sponte in Ananiensium, & Tridentinorum agro.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Semen potum vomitiones ciet, perinde ac genista, & alium quoque citat, non sine incommodo tamen, quam pecudibus nihil tale efficiat.



*COLV.

*COLUTEA Scorpioides. Græcis, Κολοιυτῆα σκορπιειδής.



FORMA.

Sic vocata est hæc planta, quoniam folio coluteæ & penè flore proueniat. Caule quoque lignoso simili eidem sed graciliore, siliquis verò Scorpioidi perquam respondentes. Radix buxæ subdulcis amaritudinem habet admixtam, ingrato sapore.

LOCVS.

Nascitur in syluis, & prope fluminum carpidines. Inuenitur etiam in montibus.

QUALITATES.

Gustata astringit, & linguã vrit.*

PYRE-

PYRETHRUM, Græcis, Πύρεθρον. Arabibus, Macharcaraba, seu Hacharcharba. Italis, Piretro. Germanis, Bertram. Hispanis, Pelitre. Gallis, Pyrethre.

PYRETHRUM VERVM.

FORMA.

DIOSC. Folia caulemq; mittit perinde ac sylvestre daucum & faniculum, umbellam anethi circinnatæ rotunditatis. Radicem longam pollicis crassitudine, feruidissimo gustu.

LOCVS.

Matth. Prouenit in montibus.

QUALITATES.

Gal. lib. 8. Pyrethri radice potissimè
simp. me. vtimur, causticam, vrentem-
ve facultatem obtinente, qua
vtique dentium refrigerato-
rum dolores lenit, & ad rigo-
res ante periodos ex oleo cō-
fricatur.

VIRES.

DIOSC. Mansa pituitam elicit, ideo
in dentium dolore cocta in
aceto, & colluto inde ore au-
xiliatur. sudores ciet perun-
da ex oleo corpori, diuturnis horroribus efficax est, stupidis quoque ac reso-
lutis mirifice confert.



PYRE-

NOMINA.

343

PYRETHRUM alterum, seu PseudoPyrethrum. Italis, *Piretro secondo*, sine
Piretro falso. Germ. *Beimlein Bertram*.

PYRETHRUM ALTERUM.

FORMA.

Folia fert Libanotidis, seu *Matth.*
Anthemidis crassiora, cau-
lem ramosum, foliosumque,
flore maioris Bellis gradio-
rem, colore intus aureo, &
per ambitum candido, Radi-
cem pollice crassior, mul-
tifidamque.

LOCVS.

Nascitur in Boemiar mon- *Idem.*
tibus, ac etiam inibi in hortis
feritur.

QUALITATES.

Radix vrentis est faculta- *Idem.*
tis, quadam cum lenicula ama-
ritudine. Ideoque fuerit ex
quarto excalfacientium or-
dine.

VIREs.

Et si viribus videatur altero infirmioribus, potest tamen eius vicem com- *Idem.*
modè explere.

ROSMA-



ROSMARINVM, Libanotis. Græcis, Λιβανωτίς. Mauritanis, Xaier almeriem.
Alpinalfach, seu Cachola. Italis, Rosmarino.

GENERA.

ROSMARINVM.

DIOSC. Duo eius habentur genera, vnum fecundum, quod duplex est, alterum sterile.

FORMA.

DIOSC. Folia habet fœniculi, crassiora, & latiora in rotæ speciei humi sparsa, iucundè olentia, caulè cubitalem aut maiore, multis concavum alis. In cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, Sphondylion simile, acre, resinaceum, & quod in mandendo linguam exurat. Radix Thus redolet, candida, prægrandis. Alterū omnino cōsimile. Semen ferens latum nigrū, vti Sphondylion, odoratū minime exurēs. Radice foris nigra, intus si frangatur alba. Quod autem sterile dicitur, illorum planè similitudinē refert, sed neq; caulē, neq; florem neq; semen profert.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur in saxosis & asperis.

QUALITATES.

Galen. 8. Omnes eiusdem sunt facultatis, emollientis, & digerentis, abstergentis, & incidentis.

VIRE.

DIOSC. Trita omnium herba communiter hemorrhoidum profluvia sistit. sed inflammationes, & condylomata mitigat. Cōcoquit strumas, & abscessus, qui ad maturationem agrè perducuntur. Sicca radices cū melle vlcera purgant: cum vino potæ torminib. medētur, & serpentū moribus opē ferunt. Vrinascient, & menses. Veteres tumores illi discutiunt. Succus cum herbæ, tum etiam radicis, ex melle illitus oculos exacuit. Idē præstat epotū semē. Valet ad comitiales, diuturnaq; pectoris vitia. Datur cōmodè Ictericis cū vino, & pipere. Sudores mouet ex oleo perunctū. Illinitur podagris cū aceto, & Loliacea farina, Vitilignes purgat, addito quā acerrimo aceto. Semine secundi generis vtendo, nam primi quod cachrym appellant, sua acrimonia arteriam exasperat.

ROSMARINVM.



NOMINA.

545

ROSMARINVM coronarium, Græcis, *Λιβανὸς στεφανομακρὸν*. Arabibus, *Elkialgeber*. Italis, *Rosmarino coronario*. Hetruscis, *Ramerino*. Germanis, *Rosmarin*. Hispanis, *Romero*. Gallis, *Rosmarin*.

ROSMARINVM CORONARIVM.

FORMA.

Rosmarinū, quo coronarij **Diosc.** vtūtur, ramos mittit tenuēs, & circa eos folia oblonga, angusta, densa, subter incana, superne virētia, & odorata. Flo- **Matth.** ret bis in anno, vere videlicet & Autumno, floribus odoratis, in purpura albicantibus.

LOCVS.

Nascitur sponte nōnullis in **Matth.** regionibus, vtpote in prouincia Narbonēsi, & seritur passim in hortis, & viridarijs.

QUALITATES.

Excalfacit, attenuat, digerit, resoluit, aperit, roborat, incidit, abstergit. **Idem.**

VIREs.

Ictericos sanat, si decoctum **Diosc.** eius ante exercitationes bibatur. Prodest ad frigidos ventriculi affectus, ad celiacas **Matth.** passiones, & vomitum cibi, si cum pane deuoretur, aut sicci puluis ex vino meraco bibatur. Prodest tum lienosis, tum iocinerosis, non solum enim vasorum infarctus expedit, sed sua adstringenti vi etiam roborat. Valer ad capitis defluxiones, ac etiam ad eius frigidos morbos, nempe ad comitiales, stupidos, vternos, resolutosq; Additur vtiliter in capitis lotionibus, & articulorum fomentis. Cohibet alba veri profluvia diutius sumptum, visum acuit, si eius folia, & flores cum pane, & sale dum floret quotidie edantur. Mansum oris halitum commendat. Sistit hoc decocto calido os colluatur. Sicci farina inspersa, vulnera glutinat, quæ prius vino, in quo decoctum fuerit, fuerint elota. Parantur è virgis denticulata, & carbones ad picturas delineandas. Flores saccharo asseruati valent ad omnia prædicta. Præstat etiam admodum in obsoniorum vsu.

Mm

ROsMA-



ROSMARINVM sylvestre, Italis, Rosmarino saluatico. Germ. Wild Rosmarin.

ROSMARINVM SYLVESTRE.

FORMA.

Matth. Crescit hæc planta cubitali altitudine, fruticosa, virgis tenuibus, lignosis, rufescentibus, fragili tamē materie. Folia in his erumpunt numerosa, coronarij rorismarini æmula. prona parte viridia, supina verò rufescentia, rubroque nitentia pediculo. In surculorū summitatibus corymbacea coma visitur rubro colore, è qua flores prodeunt subulrei. Radice est infirma, & superuacua, planta est odorata.

LOCVS.

Idem. Nascitur in Boemia, & Polonia vliginosis locis.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, attenuat, aperit, roborat, concoquit, resoluit, incidit, & digerit.



VIRES.

Idem. Præfertur Boemis contra tineas, & blattas, quæ vestes lacerant, quare ijs interponunt. Sed ad ea omnia efficax est, ad quæ coronarium Rosmarinum præstare diximus, præterquam ad ciborum condimenta.

*ROSMARINUM

NOMINA.

*ROSMARINVM sylvestre minus.

547

FORMA.



Multo minor & tenerior est priore, lignosis atque tenuibus virgis ultra palmi altitudinem paululum assurgēs, vel ad plurimum dodrantem æquans. Folia acuminatiora sunt, & inferiore parte cæsia. In furculorum summitatibus flosculi prodeunt rubelli, è quibus semen, prioris plantæ semini simile. Odor ipsius vix percipi potest.

LOCVS.

Nascitur in Borussia in syluis umbrosis vliginoso solo prope priorem, quæ ibi humanam staturam pene superat.*

Mm 2 SPHONDY-

SPHONDYLIVM, Græcis, Σφονδύλιον. Italis, *Sfondilio*. Germ. *Werentflau*.

SPHONDYLIVM.

FORMA.

DIOSC. Folia quadam tenus platani, & panacis habet, caules fœniculaceos, cubitales, aut maiores, in quorum cacumine semen duplex, fœseli simile, sed latius, candidius, & magis paleaceum, grauis odoris, flores eius albi, aut pallētes. Radice Raphani candida.

LOCVS.

Idem. Nascitur in palustribus, & aquosis.

QUALITATES.

Galen. 8. Semen acre est, & siccantis simp. m. facultatis, & radix nimirum similis est.

VIRES.

DIOSC. Eporum semen pituitam per aluum extrahit. Medetur iocinoris vitij, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vteri strangulationibus, & veterinosos suffitu reuocat. Infunditur commodè cum oleo capitibus lethargicorum. Item capitis doloribus, cum ruta illitum serpentina vlcera cohibet. Radix eadem præstat: peculiariter autem circumrasa & iniecta callos fistularum derodit. Recentium florum succus infunditur purulentis auribus.



FERVLA,

FERULA, Græcis, Νάβη, Italis, Ferola. Hispanis, Cananheia. Gallis, Ferule.

FERULA.

FORMA.



Ferula grandis admodum Theoph. surgit, vnico tantum caule ac li. 6. ca. 2. geniculato, folia, & cauliculi de bisfo. quidam erumpunt, ac alter- plant. natim exeunt folia, quæ grandia, mollia, multifida sunt, adeo vt capillamenti modò ferè spectetur, præsertim quæ terræ proxima sunt. Flos melinus, semen obscurum, anetho simile sed maius. Finditur cacumine, & in stipites haud magnos disperditur, quibus flos, semenq; insidet. Annuo caule constat. Radice altè descendit, eademq; singulari innititur.

LOCVS.

Æstuosis nascitur locis, qua- Matth. re Apuliæ solum maximè ferularum est ferax.

QUALITATES.

Ferulæ semen excalfacit, & Galen. 8. attenuat. At interna eius pars simp. me. recens adhuc, quam medullam vocant, adstringenti pollet facultate.

VIRES.

E viridi caule medulla pota valet ad cruentas excretiones. Datur ex vino Diosc. contra viperarum morsus. Erumpentem è naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxiliatur, sudores ciet vncto ex oleo corpore. Caulis si edantur capitis dolores faciunt. Asinis gratissimæ sunt in pabulo feru. Plin. læ, cæteris verò iumentis præsentaneo veneno. Murenis infestissima ferula est, tacta siquidem ea moriuntur.

PEUCEDANVM, Græcis, Πευκέδανος. Arabib, Herbatum. Italis, Peucedano.
Germanis, Harstrang.

PEUCEDANVM.

FORMA.

DIOSC. Caulem emittit tenuem,
gracilentum, fœniculo simi-
lem, comam habet statim à
terra copiosam, spissamq; flo-
re luteo. Radice nigra, crassa,
succosa, graui odore.

LOCVS.

Matth. Prouenit in montibus.

QUALITATES.

Galen. 8. Peucedani radice quidem
simp. me. maximè, sed & succo, & liquo-
re vtimur. Sunt enim hæc o-
mnia eiusdem specie faculta-
tis, sed valétior succus admo-
dum excalfaciens, & digerès;
incidit quoque, & extenuat.

VIRES.

DIOSC. Ex aceto, & rosaceo illitum
veternosis, phreneticis, comi-
tialibus, & diuturnis capitis
doloribus, resolutis, ischiadi-
cis, conuulsis, & omnibus in
vniuersum neruorum vitijs
ex oleo, & aceto illitum prodest, eius olfactu respirant vuluæ strangulatus, &
veternosi reuocantur. Incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conue-
nièter ex rosaceo instillatur. Dentium dolorem mulcet eorum cauis inditum,
contra tussim efficacissimè ex ovo assumitur, suspitijs, torminibus, & inflatio-
nibus subuenit. Ventrem leuiter emollit. Lienem absomit, difficiles partus
mirè adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distentiones potum, vuluam
aperit. Radix ad eadè vtilis est, sed inefficacior. Farina eius sordida vlcera pur-
gat, & vetera cicatrice obducit, squamas ossium detrahit.

MELAN-



NOMINA.

551

MELANTHIVM, siue Git, Græcis, Μελαγχθιον. Mauritanis, Xamin, Sunis. seu Sunci. Italis, Melanthio, seu Niella. Germ. Schwarß Rûmmel/ siue Schwarß Coriander. Hispanis, Neguilla, & Alipiure. Gallis, Barbue poyurette, siue Nielle. Officinis, Nigella.

MELANTHIVM SATIVVM.

GENERA.

Duum est generum, satiuû, Matth. & sylvestre, quod duorum pariter generum est.

FORMA SATIVI.

Surculus exit exilibus, cubitalibus, folijs Senecionis, sed magis diuisis. Floribus in cacumine ceruleis, & in stellæ modum radiantibus, è quibus capitula oriuntur parua, oblonga, pluribus coronata apicibus in internam partem reflexis, intercurrentibus intus membranis, vt in papaveris capitibus. Semen intus continetur paruû, nigrû, & quandoq; subflauû, odore eximio, sapore amariuscule, simul & acuto.

Diosc.

Matth.

LOCVS.

Seritur in hortis.

Idem.

QUALITATES.

Exalfacitatq; desiccatur. dine tertio, videtur et tenui esse partium, in summa ubi incisione, extersione, desiccatione, & exalfactione est opus, præstantissimû id remediû est.

Galen. 7.

simp. me.

VIRES.

Illitum fronti capitis doloribus subuenit, discutit recentes oculorum suffusiones, tritum, & naribus infusum, cum aceto illirû lepras, lentigines, duritias, tumoresq; vetustos tollit, circûlcarificatos clauos excutit, cû veteri vrina impositum, teretes vètris tineas expellit, peruncto ex aqua vmbilico. Destillatione laborantes adiuvat tritû in linteis, & olfactum, vrinâ, & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit. Ex vino potum aufert spirandi difficultatem. Incensum serpentes fugat, & phalangiorum ictibus auxiliatur.

Diosc.

Mm 4

MELAN-



MELANTHIVM sylvestre, Græcis, *Μελάνθιον ἀγρίον*. Italis, *Melanthio saluatico*,
& *Niella saluatica*.

MELANTHIVM SYLVESTRE.

F O R M A.

Matth. Folijs exit satiuo tenuiori-
bus, multifidis, & capillaceis,
caulibus ferè similib⁹, quem-
admodum & floribus, capitu-
la gerit satiuo maiora, sed fa-
cie haud longè dissimilia, se-
mine intus nigro, acuto, ama-
riusculo, & odorato.

L O C V S.

Idem. Nascitur in campestribus,
in incultis præsertim agris.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Semen excalfacit, incidit,
aperit, attenuat, extergit.

V I R E S.

Idem. Ad omnia efficax habetur,
perinde ac satiuum.



MELAN-

NOMINA.

553

MELANTHIVM sylvestre alterum, Italis, *Melanthio saluatico secondo*. Germanis, Wilder Schwarß Kümme/ Hornkümme/.

MELANTHIVM SYLVE-
STRE ALTERVM.



FORMA.

Nullis prorsus foliorum, *Matth.* caulium, ac florum notis ab altero differt. Solùm itaque capitula disparia sunt. In hoc enim genere longiora sunt, & in quinque sexve diuicata cornibus.

LOCVS.

Nascitur in inculto solo, *Idem.* & in agris.

FACVLTATES,
ET VIRES.

Præstat eadem, quæ alte- *Idem.* rum.

Mm s

PSEUDO-

PSEUDO Melanthium, Italis, *Melanthio falso*, *Ruosola*, seu *Gittone*. Germanis, *Kornneglin* / *Naden*.

PSEUDO MELANTHIUM.

FORMA.

Matth.

Caulem edit bicubitalem, pilosum, in quo utrinque per intervalla bina exeunt folia oblonga, hirsutaque. In cacumine flores exeunt purpurei, roseique. semen in calycibus oblongis concluditur, nigrum, melanthio simile, sed amarum, nulloque odore præditum.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in arvis inter segetes.

FACULTATES.

Idem.

Excalfacit, attenuat, aperit, abstergit, & resolvit.

VIRE.

Idem.

Farina eius melle excepta, & illita, lentigines, albos, & cæteras cutis sæditates extergit, lumbricos pota interimit, urinam ciet, & menses.

VISCUM,




NOMINA.

555

VISCUM, Græcis, ἰξός. Arabibus, *Dabach*. Italis, *Vischio*, seu *Pania*. Germanis, *Dogelstein* / seu *Wistel*. Hispanis, *Visco*. Gallis, *Guy*.

VISCUM.



FORMA.

Viscum planta est brevis, *Matthi*. ramusculis in crucis modum prodeuntibus, folijs binis in ramusculorumsummitatibus vtrinq; emergentibus, oblongis linguarum instar, crassis, solidisq; , colore submelino. Baccas fert copiosas pisorum magnitudine, albicantes, tenui tunica obductas, substantia intus tenaci, glutinosaq; , ac molli, in qua semen est parvum.

LOCVS.

Nascitur tantum in arboribus, nempe quercu, *Idem*. castanea, Ilice, Pino, pyro, maloq; , sylvestri pruno, terebintho, ac fortasse alijs in arborib; , ijsq; praesertim in quibus maiores turdi stabulantur. Ex eorum enim fimo Viscum gignitur, quodd baccas eius edant, & semen vna cum stercore ibi relinquant.

QUALITATES.

Viscum ex plurima aërea, *Gal. 6.* & aquea calida, paucissima *simp. med.* terrena substantia constat, nã

acrimonia in eo amaritudinem excellit. Itaque etiam effectus substantiae respondent, si quidem valenter ex alto humores extrahit, nec tenues tantum, sed crassiores, eolq; diffundit, ac digerit.

VIRES.

Emollit, discutit, extrahit, parotidas, tubercula, ceterasq; collectiones ad *Diosc.* maturitatē perducit, cum resina, & pari cera mistum, vetera ulcera, abscessusq; quos cacoethes vocant, ex thore mollit. Lienem cum calce, gagate, aut Asio lapide absumit. Cum Sandaraca, aut Auripigmento illitum vngues extrahit. *Li. Matthi.* gnum verò caudicis eius, quod in quercu nascitur (vt quidã scribunt) si in puluerem contritū potandum exhibeatur maximum est Epilepticis auxilium. Sed in quadragesimū diem vsq; potandū est. Idem collo suspensum, aut brachio ad alligatū cum suo cortice grauidarum conceptū adiuvat.

*VISCVM.

FORMA.

Differt à vulgari visco bacca-
rum racematim coherentium
copia, ceteris partibus cum eo-
dem prorsus conuenit.

LOCVS.

Rarum est, & in Heluetia re-
pertum.*



APARINE,

APARINE, Græcis, *Αραρίνη*. Italis, *Aparine*, seu *Speronella*. Germanis, *Klebe*
kraut.

FORMA.

Ramis multis, & parvis fru- **Diosc.**
 ricat, asperis, quadrangulis,
 per interualla orbiculato fo-
 liorum ambitu, vt in rubia.
 flos albus, semen durum, ro-
 tundum, concauum, album,
 vmbilici figura, asperitate,
 vestium tenaci.

LOCVS.

Nascitur plurimum in agris *Matth.*
 inter lentes, secus itinera, & *Theoph.*
 propè sèpes.

QUALITATES.

Modicè tum abstergit, tum *Gal. 6.*
 desiccatur, habetque nonnihil *simp. ms.*
 subtilium partium.

VIRE.

Seminis, caulium, & folio- **Diosc.**
 rum succus ex vino potus,
 auxiliatur contra viperarum,
 axungia trita strumas discutit, ea pro colo pastores vtuntur ad eximendos ex
 lacte pilos,

ALYSSVM,



ALYSSVM, Græcis, Ἀλυσσόν, Italis, *Alisso*.

ALYSSVM.

VIREs.

Diosc. Exiguus est frutex, vnicaulis, subasper, rotundis folijs, fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen quadantenus latum.

LOCVS.

Idem. In montibus, & asperis locis emicat.

QUALITATES.

Gal. 6. simp. me. Non solum mirificè iuuat demorsos à cane rabido, sed & rabienti quoq; data sæpè in totum sanauit, atque hoc ex totius similitudine substantiæ effecit. Dictumque prius est talem facultatem ex sola excipi experientia, & planè nulla constare methodo. Quod si quis ad multa experia-
tur, cognoscat facultatem habere mediocriter siccificam, & digerentem, cum absterforij non nihil.

VIREs.

Diosc. Eius decoctum singultum sine febre potu discutit. Idem efficit si quis eam teneat, aut odoretur. Cum melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emendat, confusa in edulio rabiei canis mederi putatur. Domibus appensa salutaris esse creditur. & hominibus, atq; brutis fascini amuletum.

* APPENDIX.

An Veterum Autorum hoc sit Alysson, cum alijs adhuc subdubito.*

VINCE-



VINCETOXICVM, Asclepias, Hirundinaria, Italis, *Vincetossico*. Germanis,
Schwalbenwurz.

VINCETOXICVM.



FORMA.

Folij3 prouenit Laurinis in *Matib.*
cacumine acutioribus, virgis
compluribus fruticat, exili-
bus, obsequiosisque, circa
quas folia per intervalla v-
trinq; bina spectantur. Flores
edit tenues, subalbidosque,
è quibus acutæ, tenuesq; pro-
ueniunt siliquæ, candida in-
tus lanugine, & semine, vt in
nerio. Radicibus nititur nu-
merosis, exilibus, longis, al-
bicantibus, & in girum se dif-
fundentibus mansu subdul-
cibus, sed inodoris.

LOCVS.

Nascitur in incultis locis, *Idem.*
secus itinera, in montibus, &
collibus, & saxosis tractibus.

QUALITATES.

Radices excalfaciunt, & *Idem.*
siccant ordine primo, dige-
runt, aperiunt, & resoluunt,
atque ex totius similitudine
substantiæ venenis resistunt.

VIRES.

Dantur radices ex vino potandæ magno auxilio ad venenosorum animali- *Idem.*
um ictus, demorsus quoque à serpentibus, & cane rabido vtiliter præbentur.
Bibuntur quoq; quotidie aduersus pestilentie contagia. Dantur vtiliter vnà
cum citrei mali semine ad omnes cordis affectus. Ex vino meraco potæ tor-
mina mulcent. Earundem ex vino albo decoctum, selibræ pondere haustum
diebus pluribus hydropicos iuuat. verum statim à potu sudor prouocandus
est, ictericos ad bonum colorem restituunt, vrinam cient, & tussi, & cæteris
pectoris vitij3 opitulantur. Non defunt qui has radices laudibus efferant ad
fractos, & ab alto deuolutos, vbi dentur potandæ ex vino aut maioris symphi-
ti decocto.

* VINCE-

FORMA.

Folijis conspicitur alterius
nigrioribus, virgisque lon-
gioribus non consistentibus
sine pedamento, quo nixa in-
terdum sex cubitorum altitu-
dinem attingunt. Flores edit
quoque similes figura, sed co-
lore purpureo nigricante. Si-
liquis & radicibus non longè
abest à vulgari.*



ATRA-

ATRACYLIS, Græcis, Ατράκτυλις. Italis, Attratile, & Cartamo saluatico.

ATRACYLIS.



FORMA.

Atractylis, vel Cnicus syl-
vestris, spina est Cnici simi-
lis, folia longiora ferens in
summis virgis, magna parte
nuda asperaque, qua formina
profusis vtuntur, capitula in
cacumine spinis horrent. Flos
luteus, quibusdam in locis
purpureus inuenitur. Radix
tenuis, superuacua.

LOCVS.

Prouenit inculto solo in Matth.
collibus, & asperis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Coma, semen, & folia te-
runtur cum pipere, & vino v-
tilissimè contra scorpionum
ictus. Percussos tradit quàm
diu ea teneantur herba, nul-
lum experiri dolorē, ipsumq;
deposita statim recrudescere.

Nn

CAR-

CARDVVS benedictus, Italis, *Cardo benedetto*, *Cardo santo*, *sive herba Turca* Germanis, *Kardobenedict*.

CARDVVS BENEDICTVS.

F O R M A.

Matib.

Caulibus est rotundis, flexilibus, lentis, spinosis, humi accubantibus, folijs longis, vtrinque lacinitatis, hirsutis, & cum adoleuerint per ambitū aculeatis, capitula summis caulibus gerit longis, ac pungentibus aculeis rigentibus folijs circumquaque stipatis, è quibus melius flos emicat, pappo intus semine cinare simili, & albicante. Radice nititur alba multifidaque.



L O C V S.

Idem.

Colitur diligenter in hortis.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Herba est vehementer amara. Ideoque exaefacit, siccatur, aperit, abstergit, & digerit. magni nominis, magnæq; existimationis planta est apud omnes nationes.

V I R E S.

Idem.

Præstat maximè contra pestilentiam, item aduersus venena lethalia, tam interius sumpta, quàm venenosorum animalium moribus illita. Sanantur hac herba quartana, aut alijs febribus laborantes, quarum circuitus cum frigore & horrore adueniunt. Idem præstat aut epoto herba decocto, aut stillatitia aqua, aut foliorum pulueris drachma. Præstat eadem ad Epilepticos infantes. Alui tinea necat, & vteri vitijs auxiliatur. Herba ipsa tam recens, quàm sicca pota, & exterius admota, contumacia vlcera sanat, quamobrem decoctis miscetur, quæ è ligno Guaiaco parantur aduersus Gallicam luem.

CLINO?

CLINOPODIUM, Græcis, κλινοπόδιον. Italis, *Clinopodio*. Germ. *Witbel Dost*.

CLINOPODIUM.

FORMA.

Frutex est folijs serpyllo simi **Diosc.**
lis, furculosus duum dodran-
tum altitudine. Flores marru-
bij modo ex interuallis distin-
cti, speciem lecti pedum præ-
bent.

LOCVS.

Nascitur in petrosis.

Diosc.

QUALITATES.

Calefaciendi vim obtinet, *Gale. 7.*
nondum adurendi, est verò *simp. me.*
essentia tenuium partium. ita-
que exiccare, ac excalfacere
poterit ordine tertio.

VIREs.

Bibitur herba, & succi eius **Diosc.**
decoctum ad conuulsa, rupta,
strangurias, serpentium ictus.
Menses, & partus pellit, &
pensiles verrucas, quas acro-
chordonas vocant eiecit, ali-
quot diebus potum. Alium
sistit decoctum ad tertias po-
rumque, si febrim sentiunt ex
aqua, alioquin ex vino.



APPENDIX.

Cum Clinopodium adeo tenuium esse partium (vt scribit Galenus) vt ex
tertio excalfacientium, siccantiumque ordine habeatur, atque operæ pretium
esse, vt quæ in huius censu sunt plantæ, aut gustu acres, aut admodum amaræ
percipiuntur. Cumque neutra qualitas in clinopodio, cuius hic imaginem de-
dimus, reperiatur, non ausim ego ipsum legitimum facere Clinopodium. Sed
potius alterum statim sequens, cui præter acredinem & odoris fragrantiam,
cæteræ astipulantur notæ.

CLINOPODIVM alterum, Italis, *Clinopodio*.

CLINOPODIVM ALTERVM.

FORMA.

Matth. Folij est serpylli modo oblongis in cacumine mucronatis, floribus inter folia subpurpureis balaufti effigie, caulibus exilibus, angulosis, è quibus folia per intervalla exeunt vtrinque bina: fapor illi acutus.

LOCVS.

Idem. Nascitur in campestribus. inculto solo, & saxosis locis.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem. Cum non dubitem, quin hæc planta legitimi Clinopodij faciem referat, fateri ac affirmare cogor id ijs viribus esse præditum, de quibus in præcedenti capite diximus, de Clinopodij viribus.



LEON.

NOMINA.

565

LEONTOPETALVM, Græcis, λεοντοπέταλον. Italis, *Leontopetalon*. Germanis, Löwentap.

LEONTOPETALVM.



FORMA.

Caulē mittit dodranta- DIOSC.
lem, aut altiore, plurimis
alis concavum, & in cacumi-
ne semina parua duo, aut tria
in siliquis ciceris modo. Flo-
res anemonæ similes, * Lutei
instar centaurei lutei. * folia
brassicæ, sed papaveris diui-
fura, radicibus nigris, rapæ si-
milibus, strumolis.

LOCVS.

Nascitur in aruis, & segeti- Idem.
bus.

QUALITATES.

Digerendi facultatem, & Gale. 7.
exiccandi, calefaciendique in *simp. me.*
tertio ordine possidet.

VIRES.

Radix auxiliatur serpen- DIOSC.
tium ictibus, ex vino pota, nec
alia res celerius dolorem fi-
nit, miscetur & ischiadico-
rum clysteribus.

Nn 3

TEV-

TEVCRIVM, Græcis, Τεύκριν. Italis, *Teucris*. Germanis, *Batengel*/oder *Kutt*/marrrost.

TEVCRIVM.

FORMA.

DIOSC. Herba est virgæ referens effigiem, trissaginis similitudine, tenui folio, non multum à cicere alieno.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur vbertim in Cilicia iuxta Gentiadem, aut Cissadem.

QUALITATES.

Gal. 3. Incidentis & tenuium partium facultatis est, quare lienes sanat. Ponatque ipsum quispiam in tertio exiccantium, secundo verò calefacientium ordine.

VIREs.

DIOSC. Recens cum posca, aut aridorum foliorum decoctum, potu lienem potenter absorbit. Lienosis cum aceto, & ficis illinitur. Itē serpentium moribus ex aceto solo.



TRIS.

mnes
cos, st
drach
tur po
tur ide
tum, i
diebu

TRISSAGO, Græcis, *Xapaidrys*. Arabibus, *Damederios*, *Camadrins*, *sive Kemadrins*. Hetruscis, *Querciola*, & *Chamedrio*. Italis cæteris, *Calamandrina*. Germ. *Gamanderle* *sive* *Klein Bathengel*. Hispa. *Chamedreos*. Gallis, *Germandree*.
TRISSAGO, SEV CHAMEDRYS.



FORMA.

Herba est dodrantalis, folia *Diosc.* habes exigua, & amara, querc^o effigie, & diuisura. Flore paruo, penè purpureo. Odoris *Matth.* non ingrati. Carpitur semine pragnans.

LOCVS.

Nascit^r in petrosis, & asperis, *Diosc.*

QUALITATES.

Vincentem habet qualita- *Gale. 8.* tem amaram, & est quodam- *simp. me.* modo acris. Ponatq^{ue} eam quispam in tertio ordine excafcientium, & desiccantium, plus tamè desiccet, quàm calefacit.

VIRES.

Recentis decoctum bibitur *Diosc.* in tussi, in durato lieni, vrinae difficultate, & incipiente hydropo. Cit menses, partus extrahit. Lienem ex aceto pota consumit. Aduersus serpentium venena ex vino pota, illitaque efficacissima. Vetera vlcerapurgat ex melle illita, cum oleo illita caliginè oculorum discutit. Præstat quoq^{ue} ad o- *Matth.*

mnes frigidos capitis morbos, nempe ad comitiales, veterinosos, melancholicos, stupidos, resolutos, convulsosque, & ad diurnos capitis dolores. Semen drachmæ pondere potum bilem per vrinas ducit. Ideoque conuenienter datur potandum icteris. Instillatur foliorum succus ad vermiculosas aures. Datur idem aduersus intestinorum vermes. Id quod etiam præstat vinum bibitum, in quo florens herba die ac nocte fuerit macerata. Decoctum aliquot diebus potum mirificè tertianis febribus medetur.

CHAMEDRYS altera, Italis, *Calamandrina seconda*, & *Querciola seconda*. Germanis, *Felde Cypressen*.

CHAMEDRYS ALTERA.

F O R M A.

Matth.

Folij exit quercus effigie, sed magis quam in altera lacinjatis, tenuibus, subnigricantibus, copiosioribusque, caules edit quadrangulos, tenues, lignosos, sesquidodrantales, furculosis ramis repletos, in quibus flosculi purpurei inter folia rutilant, & caules ipsos ambiunt, alterius chamedrys modo. Radicem habet multifidam albicantem. est autem planta aspectu iucundo, & eleganti, amara tamen, odore non iniucundo resinam olente.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Cum adeo amara non sit ut altera, ea quidem minus calida, siccaque fuerit, itaque ad omnia munia imbecillior, non tamen multo.



C E N S V R A.

Quod hanc planta (ut credo) resinam respiciat, non desunt scriptores, qui putent eam legitimam esse Dioscoridis Chamæpitum: sed hallucinantur.

LYCHNIS.

LYCHNIS, Græcis, *Λύχνης*. Italis, *Lichnide coronaria*. Germanis, *Margenvösp*
lin.

LYCHNIS.



FORMA.

Coronaria Lychnis flore *Diosc.*
est albæ violæ simili, sed pur-
pureo, quo corollæ factitan-
tur. Folijs longis, tomento-
sis, albicantibusque, caule
lanuginoso, incano, cubito
maiore, flore inodoro, sed
pulchro. Sylvestris per *Diosc.*
omnia urbanae similis.

LOCVS.

Seritur in hortis, ac etiam *Matth.*
spõte per se provenit, quam
sylvestrem appellant.

QUALITATES.

Semen calidum est secun- *Galen. 7.*

do quodam modo ordine, aut iam etiam tertio, siccum sanè eodem quoque *sim. me.*
modo.

VIRE.

Semen duarum drachmarum pondere potum, bilem per alium detrahit. *Diosc.*
Ictus à Scorpione subuenit. Aiunt huius herbæ appositu Scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

CENSURA.

Sunt qui Pseudomelanthium in segetibus nascens sylvestrem Lychnidem
faciant. Atqui cum Dioscorides agrestem Lychnidem urbanae per omnia simi-
lem esse scribat, eamque sæpius viderim in inculto solo, non possum horum
placitis subscribere.

Nn 5

LILIVM.

LILIVM, Græcis, *Kelyov*. Italis, *Giglio bianco*. Arabibus, *Sufen*. Germa. *Silgen* seu *Silgen*. Hispanis, *Azucena*, seu *Lirio blanco*. Gallis, *Lis*.

FORMA.

Matth. Folia fert longa, nunquā non virentia, lævia, pingua, Pancratio similia, caulem profert bicubitalem, rotundum, rectum, lævem, pinguem, firmum, minoribus folijs ab imo ad summum circumæstitum, è cuius cacumine terni, quaternive ramuli exeunt, è quibus oblonga prodeunt capitula herbaceo colore, quæ tractu tēporis lilia fiunt eximij cādoris calathi figura, extrinsecus striata, resupinis per ambitū labris, luteis aliquot ligulis ex calathi fundo (vt in croco) sursum spectantib. è quorum medio longum producit germen, rotundo in cacumine capitulo, herbacei coloris. Radice nititur bulbosa albicante, compactili squamarum serie.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in hortis, & viridarijs.

QUALITATES.

Gale. 7. Lilij flos temperaturam mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua utiq; amaritudinem habet, partim ex aquea, eaque temperata. Quod autem ex eo conficitur oleum, citra morsum digerendi, simulq; emolliendi facultatem obtinet. Porro Radix foliaque desiccant, abstergunt, & digerunt moderatè, in radice plus abstergetis facultatis est, quàm in folijs.

VIRE S.

DIOSC. Folia herbe illita auxiliantur contra serpentium ictus, seruesacta ambustis proficiunt. Accito condita vulneribus opitulantur. Inassata radix, & ex rosaceo trita igni ambusta sanat. Vulnam emollit, menses ciet. vlcera cicatrice obducit. Cum melle detrita neruis præcis luxatissimæ medetur. Vitiliginis, furfures, lepræque emendat, & vlcera in capite manantia expurgat. Faciem abstergit, & erugat. teritur in aceto cum hyoscyami folijs, & farina tritici mulcendis testium inflammationibus. Semen potum aduersatur serpentium morsibus, ignibus sacris. Semen, & folia, cum vino illinuntur. Oleum quod è floribus paratur vteri duritias commodissime emollit: valet quoque ad omnes frigidos neruorum affectus, ad emollienda articulorum impedimenta, & scyrrhosos tumores. Illinitur vtiliter puerperis in vteri doloribus. Additur in clysmatibus emollientibus. Elixir radix ex vetere axungia illita pedum clauos eicit. Eadem ex adipe, & oleo impolita defluxos pilos replicat.

MAR-



MARTAGVM chymistis, Italis, Martagon, & Giglio saluatico. Germanis, Golde-
wurz.

MARTAGVM.

FORMA.



Folia promit vulgaris saponariae æmula, quæ ex interval-
lis orbiculariter caulem am-
biunt, in cuius cacumine flo-
res emicant tenui pediculo
nitentes liliorum effigie, sed
minores, quorum folia quo-
que retroflexa cernuntur, pur-
pureo colore, punctis qui-
busdam rufescentibus resper-
sa. Ipsique flores odorati sunt,
& aspectu iucundi. Radicem
habet lilio similem, sed luteo
colore.

LOCVS.

Prouenit in montibus, & Idem.
cliuosis locis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Radix ad ea omnia commo-
da est, ad quæ Lilij.

BALLO-

BALLOTE, Græcis, Βαλλον. Italis, *Marroliobastardo*. Germanis, *Schwartz Andorn*. Hispanis, *Marroio negro*. Gallis, *Marrubin noir*.

BALLOTE.

FORMA.

Diosc. Caules edit quadrangulos, nigros, subhirsutos, complures ex vna radice, folijs maioribus, quam marrubij, hispidis, & per intervalla in caule dispositis, subrotundis, grauculentibus. Candidi flores, verticillato ambitu caulem coronant.

LOCVS.

Matth. Nascitur in agrorum marginibus, & secus vias.

QUALITATES.

Paulus. Planta est acris, & absterfrix facultatis.

VIRES.

Diosc. Vis eius efficax aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis, eadem feruenti cinere calefacta quousque flaccescant, illita condylomata reprimunt, purgant cum melle etiam sordida vlcera.



MAR-

MARRUBIUM, Græcis, *Πεδάσιον*. Mauritanis, *Farfisio*, sive *Frasium*. Italis, *Marrubio*. German. *Andorn*, sive *Eungenkraut*. Hispan. *Marroio*. Gallis, *Marrubin*.

MARRUBIUM.

FORMA.



Frutex est ab radice ramosus, Diosc.
candicans, subhirsutus, quadran-
gularib⁹ ramis, folium pollicem
equat, subrotundum, hispidum,
rugosum, amaro gustu, semen in
caulibus, & ex interuallis, flores
verticillato ambitu, asperi.

LOCVS.

Nascitur propter ædificia, rui- Diosc.
nas, & rudera. Et in arceis viarum. Matth.

QUALITATES.

Marrubium vt gustu amarū est Gale. 8.
ita vt si quis vtatur, consentien- simp. me.
tem huic saporis actionē reperi-
et. Iecur, ac lienem obstructione
liberans, & thoracem, pulmo-
nemq; expurgans, ac mēles pro-
uocans: sed & illium detergit, ac
digerit. exalfacit quidem secun-
do ordine iam completo, & ter-
tio siccat.

VIREs.

Folia sicca cum semine in aqua Diosc.
decocta, aut viridium succus da-
tur cum melle suspiriosis, tussien-
tibus, & ad tabitudinē redactis,
crassam ē pectore pituitam, cum

sicca Irīde eiicit. Mulieribus à partu non purgatis datur, vt menstrua, & secun-
das extrahat. Item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut à serpenti-
bus demorsi sunt. Vescicam, renescq; la dir. Folia ex melle illinuntur sordidis vl-
ceribus purgandis. Pterygia, nomasq; sistunt. Laterum dolores mitigat. Succus
folijs contulis expressus, soleq; coactus, ad eadem pollet. Cum vino, & melle
illitus, oculorum claritatem adiuvat. Naribus regium morbum expurgat, &
dolentibus auribus instillatur per se, & cum rosaceo. Decoquantur marrubij Matth.
binæ vnciæ vnà cum buglossi, helenij, & eupatorij radicum sesquidrachma,
Rhabbarbari drachma, & agalloci pari pondere ex vini albi generosi libris 3. ad
Ictericam. Nam vbi diebus decem continuis huiusce decocti binas vncias affe-
cti porauerint, præstantissimum reperient medicamentum, vbi tamen morbus
ab obstructione prouenerit.

MELIS-

MELISSOPHYLLVM, Melissa siue melitena. aut Apiastrum, Græcis, *Μελισση*. Arabibus, *Bederangie*, siue *Bederangi*, siue *Marmacor*. Italis, *Melissa*, *Cedronella*, & *Aranciata*. Germanis, *Melissen* / *Wutterkraut*. Hispanis, *Torongil*, seu *Hierua Cidreira*. Gallis, *Melisse*, & *Pom cirade*.

APIASTRV, SIVE MELISSOPHYLLVM.

F O R M A.

DIOSC. Cauliculi, & folia essent Balote similia, nisi maiora tenuioraque, nec ita hirsuta spectarentur. Citreum malum olent.

L O C V S.

Matth. Seritur passim in hortis, ac etiam sponte per se nascitur in collibus, & montibus.

Q U A L I T A T E S.

Auic. lib. Excalfacit, siccaturque ordine viribus ne secundo cordis.

V I R E S.

DIOSC. Folia cum vino pota, aut illita profunt contra phalangiorum, & scorpionum ictus, & canis quoque morsum. Folia auxiliantur fungorum stragulationibus in potu addito nitro. Illita cum sale strumas discutunt, vlcera purgant, articulares dolores illita sedant.

Scrapio. Melissophylli proprium est animum hilarem reddere, humenti ac frigido ventriculo

auxiliari, concoctionem adiuuare, cerebri obstructions referare, deficientem animum reuocare, cordis imbecillitatem roborare, quinetiam eius pulsus reprimere, animi sollicitudines fugare, ac sollicitas imaginationes tollere, quæ & ab atra bile, & ab exusta pituita gignuntur. Vires deiectionarias possidet. nec adeo imbecilles, quin atrabiliaris vapores à spiritibus, & à sanguine, qui cordi, & arterijs inest educere queat. quod in cæteris corporis partibus efficere nequit.

MOLV.



NOMINA.

575

MOLVCA, Italis, *Melissa Constantinopolitana*.
MELISSA MOLVCA, SIVE CONSTAN-
TINOPOLITANA.

GENERA.

Duum est generum, altera *Matth.*
levis, altera *aculeata*.

FORMA.

Vtraque folio est *melysso*- *Idem*.
phylli quadantenus simili, bre-
uiore tamen, & minus denti-
culato, sed in altero genere cir-
cumquaque aculeato, amaro
sapore, nec vlllo citrei mali o-
dore, profert calyces quosdam
tintinnabuli effigie herbaceo
colore, in quibus semen ori-
tur.

QUALITATES, ET
VIRES.

Aperit, attenuat, excalfacit, *Idem*.
abstergit, venenis resistit, & a-
nimalium venenosorum icti-
bus mirifice auxiliatur, tum po-
ta, tum quoque illita. Ictericos
iuuat, interaneorum animalia
necat. Datur vtiliter succus pe-
stilentibus febribus affectis.

MELIS-



MELISSA Moldauica, Italis, *Cedronella di Moldauica*. Germanis, *Türkisch Melissen*.

MELISSA MOLDAVICA.

FORMA.

Matth.

Caules edit bicubitales, quadrangulos, subrufo-fuscescentes, ramososq; folia in ramis ipsis verticillata figura, sed longe minora. flores in summitate purpureos, salvia æmulos, verticillatimque inter folia emergentes. Tota planta citrei mali odore quàm belle spirat. Radice nititur vnica, sed fibrata.

LOCVS.

Idem.

Seritur in hortis, sed ex Muldauia primum ad nos delata est, vbi spontè per se provenit.

QUALITATES.

Idem.

Excalfacit, siccaturque ordine secundo, aperit, attenuat, & incidit.

VIRES.

Idem.

Vires habet Apiastro per omnia similes.



STA

NOMINA.

577

STACHYS, Græcis, Σταχὺς. Italis, Stachi.

STACHYS.



FORMA.

Frutex est Marrubio simi- Diosc.
lis, sed lōgior, folia ferens nu-
merosa, hirsuta, rara, prædura,
cana, odoris iucundi, & com-
plures virgas, ex vna radice ex-
euntes Marrubio candidio-
res. Flores spicatos, subpur- Matth.
pureosq; * & plerumq; sub-
luteos. *

LOCVS.

Nascitur in montibus aspe- Diosc.
ris.

QUALITATES.

Frutex est stachys gustu acri, Galen. 8.
& amaro, tertij ordinis excal- simp. me.
facientium.

VIRES.

Foliorum decoctum potu Diosc.
pellit menstrua, & secundas.

Oo

PSEYDO-

PSEVDOSTACHYS, Germanis. Niechender Andorn / Fels Andorn.

PSEVDOSTACHYS.

Pseudostachys hanc plantam appellare libuit, quod & ipsa stachym in multis notis referat.

* Planta est caule quadrato, folijs hirsutis, albis, maioris saluæ figura, verbasci folia colore referentibus. flores gerit Marrubij purpureos, semen rotundū vasculis inclusum.*



PHYLL.

PHYLITIS, Græcis, Φυλλίτις. Italis, *Lingua ceruina*, ac pariter *Fillite*. Officinis, *Falso, Scolopendria*. Germanis, *Nitschungen*. Hispanis, *Lingua ceruina*. Gallis, *Lang de Cerf*.

PHYLITIS.

FORMA.



Folia promit Rumici simi. Diosc.
lia, longiora, & viridiora, fe-
na, aut septena, quæ parte in-
teriore læuia cernuntur, à ter-
go autem penfiles quasi ver-
miculos tenues ostēdunt, gu-
stu acerbo. Neq; caulem, neq;
semen profert.

LOCVS.

In umbrosis, & opacis hor. Diosc.
torum locis emicat.

QUALITATES, ET
VIRE S.

Cum qualitatē sit acerbæ, Galen. 8.
non absurdè diarrheas, siue *simp. me.*
profluvia, & dysenterias pota
iunat.

Folia in vino pota serpenti. Diosc.
um morib⁹ aduersantur, qua-
drupedibus per os infusa au-

xilio sunt, & si dysenteria aut resoluta alius exercet potur datū.
Expertum quoque est à compluribus valere phyllitim ad splenis affectus. *Matth.*
Utuntur quoq; quidam stillatitia eius aqua contra singultum, & cordis pullum,
atq; in animi deliquijs, eandem gargarisandam quoque præbent ad prolapsam
columellam. Siccorum foliorum farina ex earundem aqua excepta, & adinota
refrigerat ventriculi, & iocinoris ardores.

CENSURA.

Aberrant qui phyllitim Asplenium, siue scolopendrium esse censent.

PHALANGIVM, Græcis, *Φαλάγγιον*. Italis, *Falangio*. Germanis, *Weisser Weiden/Grasgilgen*.

PHALANGIVM.

FORMA.

Diosc. Ramuli sunt illi duo, aut tres, pluresve, in diuersa tendentes. flos candidus, lilio similis multas incisuras habēs, semine nigro (postea enim contrahitur) lato ad lenticulæ dimidiatæ figuram, multo tenuiore. Radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur. Folliculi in quibus semen concluditur phalangij formam referunt, vnde illi nomen.

Matth.

LOCVS.

Diosc. Prouenit in collibus. Et in

Matth. montibus.

QUALITATES.

Galen. 8. Est autem facultatis tenuissimæ, um partium, desiccantis.

VIRES.

Diosc. Huius folia, semē, flos cum vino pota auxiliantur contra scorpionum, phalagiorumq; ictus, tormina quoq; discutunt.

Galen.



TRIFO-

NOMINA.

381

TRIFOLIUM, Græcis, Τριφυλλον. Italis, Trifoglio bituminoso. Germ. Dartselce.

TRIFOLIUM ASPHALTITE.

GENERA.

Plura sanè habentur gene- Matth.
ra, nempe Asphaltite, Pra-
tense, Acetosumq;.

FORMA ASPHAL-
TITIS.



Frutex est qui supra cubiti Diosc.
altitudinem attollitur, virgas
habens tenues, iunceas, & ni-
gras, vnde ramulares ena-
scuntur appendiculæ, in qui-
bus terna singulis germina-
tionibus exeunt folia, loto ar-
bori similia. ijs recenter ena-
tis erucæ odorine est, vbi au-
tem adoleuerunt bitumen
olent. Florem edit purpure-
um, semen quadantenus la-
tum, subhirsutum, ex altera
extremitate exertum anten-
næ modo corniculû gerens.
Radix tenuis, longa, valida.

LOCVS.

Nascitur in Sicilia, & in I- Scriboni-
talia circa Lunæ portum. usLargus.

QUALITATES.

Vis plantæ est calida, & sicca, vt bitumen cui odore est similis, vtrinque ter- Galen. 3.
tio ordine. simp. me.

VIREs.

Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ difficultati, comitialibus, & ijs Diosc.
qui aquæ intercutem principia sentiunt, foeminis quoq; vuluæ vitijs oportu-
nis, auxiliantur. Menles ciunt. Ternæ drachmæ è semine dari debent, è folijs
verò quaternæ, contra serpentium ictus trita folia ex oximelite pota præsidio
sunt. Quidam terna folia, aut semina in tertianis cum vino potui dedere, & in
quartanis quaternæ. Radix antidotis inseritur.

Oo 3

TRIFO-

TRIFOLIUM Pratenſe, Italis, *Trifoglio*. Germanis, *Wiesenlee*.

TRIFOLIUM PRATENſE.

G E N E R A.

Matth. Trium eſt generum, foliorum, & florum diuerſitate differentium.

F O R M A P R I M I.

Matth. Primum folijs eſt ſubrotundis, maculoſis, longo pediculo nitētib; obſequioſo, flexilique; floribus in capitulis ſubpurpureis, aut albicantibus, in cauliculorum ſummis emicantibus.

L O C U S.

Idem. Naſcitur in pratis, & herboso ſolo.

F A C U L T A T E S, E T
V I R E S

Idem. Sunt qui Trifolij pratenſis ſuccum miris laudibus efferrant ad oculorum nubeculas, vulnera, & cicatrices. Idem tempeſtates pronunciat, inhorreſcit enim & folia contra tempeſtates ſubrigit. Vniuerſa florentis plantæ decoctum potum, alba veri profluua cohibet. Semen, & flores ex aqua decocti, & ex oleo admoti, duros emolliunt abſceſſus.



TRIFO-

TRIFOLIUM pratense alterum, Italis, *Trifoglio indifferenter dicitur*. Germanis, *Epiglee*.

TRIFOLIUM PRATENSE ALTERVM.

FORMA.



Cauliculis assurgit lentis, *Matth.*
obsequiosisque, folijs in vno-
quoq; pediculo ternis, varia
tamen facie perinde ac bitu-
minosum. Namque quædam
quæ ad radicem sunt Acetosi
trifolij modo quod oxym vo-
catur trina ex vnico pediculo
emergunt, cordis faciem qua-
damtenus imitantur, cætera
verò longa sunt, & in cacumi-
ne acuminata, vt in Asphalti-
te. flores in capitulis sunt illi
purpurei in flocci modum.

LOCVS.

Prouenit sponte in pratis, *Idem.*
& viridarijs, & herbosis locis.

FACULTATES, ET
VIRES.

Idem præstare potest, quod *Idem.*
alterum.

TRIFOLIUM acetosum, Græcis, *ὄξυς*. Barbaris, *Alleuia*, *sive Luiola*, *sive Paniculi*. Italis, *Trifoglio acetoso*. Germ *Gauchbrodt* *Saurfleec*.

TRIFOLIUM ACETOSUM.

*GENVS.

Differt primo sexu, Fœmina enim flore albo conspicitur, venis purpurascētibus distincto. Mas totus purpureus, rarus inuentu. Deinde habetur quoddam genus totum supinū & repens luteis flosculis. *

FORMA.

Matth.

Vulgaris Oxys cauliculis exit abvna radice plurib⁹, exiguis, rotundis, ac tenuibus, quorum singulis ternis in summitate sunt folia, cordis figura, mollia, acido gustu. flores edit albos, stellæ figura. Radicem habet subrusam, compactili squamarum serie obductam. *Alterum genus quod serpit & flosculos habet flavos, eosdem paruulos itidem stellatos, foliolis non differt à vulgari nisi quod hirsutiora sint & breviori pediculo annexa, semen gerit in corniculis oblongis, quæ attracta semen expuunt. Sed adeo concidunt rimulæ vt non appareat dissiliisse siliquas. *



LOCVS.

Idem. Nascitur opacis locis, propter sepes, & itinera.

FACULTATES, ET VIRES.

Idem. Tota planta refrigerat Oxalidis modo, proinde deuorata sitim extinguit, iecur refrigerat, & cor corroborat. Stillaticia eius aqua datur vtiliter potanda acuta pestilentiq; febre laborantibus. atqui longè præstat herbæ succus ex saccharo potus. Illinitur idem per se Erysipelatis, & inflammatis locis, colluiturq; ex eo os vbi lingua, palatum, faucēsve calida fluxione laborent. In summa ad ea omnia censetur vtilis Oxys, quibus Oxalis auxiliari valeat. Datur ad stomachum dissolutum. edunt & qui enterocellem habent.

TRINI-

TRINITAS, Italis, *Herba Trinita*. Germanis, *Gulden Leberkraut*.

TRINITAS.



FORMA.

Folia fert triquetra, æderæ minoris magnitudine, quæ aduersa parte cyclamini modo subpurpurea sunt, superiore verò parte maculis quibusdam albicantibus resperguntur. Caules habet tenues, in quorū cacumine primo statim vere flos emicat cæruleus in stellæ modum, è quo capitulum oritur echinata quadantenus specie, in quo semen oblongum subcæruleumque. Radicibus est numerosis, tenuibus, subrubentibusque.

LOCVS.

Prouenit locis opacis, & in frutetis. *Idem.*

FACULTATES, ET VIRES.

Vulneraria est herba, tam admota, quàm in potionibus sumpta, quin etiam ad eterocelas mirificè præstat, epota foliorū farina ex vino austero diebus pluribus continuis cochlearij mensura. Decoquitur tota herba ex eodem vino ad columellæ, fauciumque inflammationes.

Oo 5

POLIVM,

POLIVM, Græcis, Πόλιον. Mauritanis, *Cahade*, sine *Iahade*. Italis, *Polio*. Gallis, *Iue muscate*.

POLIVM.

GENERA.

Matth. Duo Polij extant genera, montanum, & alterum fruticosius, non vsque adeo valens odore.

FORMA MONTANI.

Matth. Planta est candicans, folijs oblōgis, & per intervalla caules ab imo ad summū vestientibus, pluribus etiam minoribus inter maiora subnascentibus; caules habet copiosos, rectos, rotundos, lignososq; albicantes, & qui in cacumine capitula edant florida, candicantia, thymi figura: tota plāta odorata est, sed non sine odoris gravitate, acuitateque.

LOCVS.

Matth. Prouenit in mōtibus, exoluto solo.

QUALITATES.

Galen. 8. Amarum est gustantibus, & modicè acre. Vis quoque Polio inest reseransimp. me. di, incidendi, attenuandi, & abstergendi.

Matth.

VIREs.

Diosc. Foliorum decoctum potu auxiliatur serpētium moribus, hydropicis, morbo regio, & lienosis cum aceto: stomachum verò malè habet, caput doloribus afficit. Aluum & menses ciet: substratum, suffitūve serpētes abigit. Illitū vulnēra conglutinat. Omnia viscera obstructione liberat, aridum eū fuerit, maligna vlcera sanat, viride verò magna vulnera. Adalligatur fronti contra oculorum suffusiones, protinus vbi inuentum sit, nec alia herba magis conuenit.

POLIVM



NOMINA.

587

POLIVM alterum, Græcis, Πέλιον ἔργον. Italis, *Polio secondo*. Herbarijs nonnullis, *lana muscata*. Germanis, *Marienfraut*/wisd Lauendel.

POLIVM ALTERVM.

FORMA.

Folijs, caulibus, capitulis, ac *Matth.* floribus altero similis est.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, *Idem.* saxosis, & excultis locis.

FACULTATES, ET VIRES.

Ab altero facultatibus non *Idem.* differt.

APPENDIX.

Tametsi hæc plantam sciam *Idem.* non esse secundum Polij genus à Dioscoride conscriptū, cum tamen omnibus suis partibus, sapore, odoreque montanum polium referat, non quidem temerè factum putavi, eam inter Polij genera fore recensendam, & præsertim, cum omnibus Polij facultatibus sit prædita.

SCORDIVM,



SCORDIVM, siue Triflago palustris, Græcis, *Σκώδιον*. Arabibus *Scordeon*, siue *Scordeum*. Italis, *Scordio*. Germanis, *Wasserbatenig* / seu *Sinoblochsraut*. Hispanis, *Scordio*. Gallis, *Chamaraz*.

SCORDIVM.

FORMA.

DIOSC. Folij erūpit triflaginis maioribus, nec sic in ambitu diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustu amaris, & adstringentibus, caulibus quadrangulis, subrubro flore.

LOCVS.

Idem. Nascitur in montibus, & palustribus.

QUALITATES.

Galen. 8. simp. me. Ex multiformibus id tum facultatibus, tum saporibus constat, nam & amarum quid obtinet, & acerbum, & acre, & maxime allio assimilis eius est acrimonia, unde mea sententia, nomenclaturam obtinuit: expurgat igitur, simulque excalfacit viscera.

VIRES.

Matth. Herba vim excalfactoriam habet, urinam ciet, cocta recens, aridave cum vino bibitur ad venenatos serpentium morsus, ad stomachi quoque rosiones, dysenteriam, & urinæ difficultatem binis drachmis ex aqua mulla. Crassamen purulentum è pectore expellit. Aridæ farina facit ad veterem tussim, rupta, conuulsq; si cū nasturtio, melle, & resina misceatur in elegmate. Inflammata modicè præcordia cerato excepta recreat. Menses imposita mouet, vulnera conglutinat, vetera vlcera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. Sicca excrementa in carne cohibet. Succus ad eadem vitia bibitur. Laterum dolores ab obstructione, & frigore natos sanat epotum.

ALLIA



ALLIARIA, Ital's, *Alliaria*. Germanis, *Knoblauchstrauch* / *Leuchel* / *Saßtraut*. Gal-
lis, *Alliaire*.

ALLIARIA.



FORMA.

Huius folia cum primùm erum- *Matth.*
punt, ferè rotunda spectantur, viola-
ria similitudine, postquam verò ad-
oleuerint, per ambitum serrata eua-
dunt, ut quadantenus apiastri faciem
representent, leuiora tamen sunt, &
prope caulem latiora, quæ digitis at-
trita, gustataque allij odorem, sapor-
emq; reddunt. Caulem profert bi-
cubitalem, rotundumque, flores al-
bos, & semen nigrum tenuibus sili-
quis inclusum. Radix, quæ longius-
cula est, eundem cum folijs odorem
retinet.

LOCVS.

Iuxta sepes, & in agrorum margi- *Idem.*
nibus nascitur.

QUALITATES.

Excalfacit, attenuat, aperit, inci- *Idem.*
dit, digerit, prouocat.

VIREs.

Semen emplastri modo vuluæ admotum, mulieres vteri strangulatu oppress- *Idem.*
as liberat, & excitat.

TVSSI-

TVSSILAGO, Græcis, Βήρυον. Officinis, Farfara, seu Vngula caballina. Italis, Farfara, seu Farfarella, & Vnghia di Cavallo. Germ. Rosshub/ Eselschuff/ siue Brandelattich. Hispanis, Vnha de Asno. Gallis, Pas de Asne. siue Tacconner.

TVSSILAGO.

GENERA.

Matth. Tria Bechij numerantur genera, quamuis Dioscoridi vnum tantum sit genus.

FORMA PRIMI.

Diosc. Folia promit maiuscula, quam hedere, sex aut septem, à radice à terra subalbida, superne virentia, in plures angulos exeuntia. Caudis dodrantalis, flos luteus, vere prodit, quo vnà cum caule confestim exiit. Inde nonnulli his vacare existimarunt. Radix tenuis est.

LOCVS.

Diosc. Nascitur in amœnis & riguis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Modicè est actis.
simp. me.

VIRES.

Diosc. Folia ex melle trita, igni sacro, & omnibus inflammationibus, illitu medentur. Arida suffitu ita vt fumus per infundibulum hianti ore rapiatur, hos sanat, qui sicca tussi, atque orthopnea infestantur. Pectoris vomicas rumpunt. Eundem effectum præbet suffita radix. Eadem decoctâ in hydromelite, & pota e-mortuos partus eijcit.



*TVSSIL-

*TVSSILAGINIS FLORES.



Malè pinguntur flores in-
ter folia iam grandia prode-
unt. Primo vere namq; ori-
untur nudi, & in pappis ab-
eunt nudi pereunt.*

TVSSILA-

TVSSILAGO maior, Petasites, Græcis, *ἑχέριον μέγα*. Italis, *Farfara maggiore*. Germanis, *Pestilenzwurzel*.

TVSSILAGO MAIOR.

Matth.

FORMA.

Caulem edit, antequam folia emergant in ipso Veris principio, concavum, dodrantalem, pinguem, purpurascens, parvis & oblongis circum vestitum folijs. In cuius cacumine flores exeunt spicati, subpurpurei, qui vna cum caule paulo post contabescunt, & in pappos dissoluuntur. Eodem fere tempore folia à terra emergunt, altera parte incana, quæ antequam adolescant Tussilagini ante scriptæ similia spectantur. Verum posthac in tam magnam crescunt amplitudinem, ut Personatæ folijs longè maiora habeantur. Horum singula pediculo nituntur purpureo, alba lanugine obducto. Radicem edit longam, brachij quandoque humani crassitudine, intus candidam, amaram, atque odoratam.



Matth.

LOCVS.

Crescit humectis & vliginosis locis, & præsertim prope rivuos aquarum, perinde ac altera.

Idem.

QUALITATES.

Radix excalfacit, attenuat, incidit, & abstergit, ut eius evidens indicat amritudo.

VIRES.

Constat radicem multis experimentis præstare contra pestilentiam, & pestilentes febres, ubi eadem in pulverem contrita duarum drachmarum pondere ex vino propinetur, & deinde sudare cogantur ægri. Quamobrem Germanis pestilentiæ radix appellatur. Præstat eadem ad vteri præfociones, & cruciatus, eodem modo sumpta. Propinatur item veterinarijs, & pastoribus contra quadripedum vermes, & equis qui anhelandi difficultate laborant. Reliquæ cum Tussilagine communia habet.

*PETASI-

NOMINA.

*PETASITES FLORE ALBO.

393

FORMA.



Mense Februario suos pro-
mit flores nondum emortis fo-
lijs, denfos, pusillos, multos, ra-
cemosos, minores quā in vul-
gari, similes tamen, sed albos
totos, qui in pappos similiter
abscunt. Folia oblongis pedicu-
lis insident, Tussilaginis folijs
æqualia. Radix intra terram
quoquo versum reptat, & sin-
gulis annis, annatis nouellis se
propagat.*

Pp

Tvssr.

TVSSILAGO altera, siue Farfugium, aut Farragum, aut Chamelence. Calcha palustris. Italis, *Farfugio*. Germanis, *Dotter Blumen*.

TVSSILAGO ALTERA, SIVE
FARFUGIVM.

FORMA.

Matth. Folijs exit nigre populi amplioribus ad tussilaginis faciem inclinantibus, atqui non tot exsertis in ambitu angulis, nec à terra tam albicantibus. Caulem edit sesquidodrantalem, à quo plures egrediuntur rami, in quorum summitate flores exeunt aurei, magni, rosarum figura. Radicem habet albam, & subamaram, floret vere, Aprili præsertim mense, & Maio quoq;.

LOCVS.

Idem. Nascitur circa riuos aquarum in conuallibus, & pratis.

QUALITATES, ET
VIREs.

Vbi vulgaris, ac vera Tussilago non fuerit ad manus, Farfugium eius loco bellè substitui potest, nam ijs ferè viribus præstat.



ARTE.

NOMINA.

595

ARTEMISIA, Græcis, *Apyuloria*. Italis, *Artemisia*. Germanis, *Weyfuss* / & *S.*
Johannus Gûrtel. Hispanis, *Artemisia*. Gallis, *Armasse*.

ARTEMISIA.

FORMA.



Artemisia exit caulib⁹ plu- *Matth.*
ribus, rectis, sesquicubitalib⁹,
interdum rubentibus, rotun-
dis, striatisq;. Folia gerit absin-
thio leuiora, pinguiora, supi-
na parte albicantia, sed quæ in
caule sunt longè minora spe-
ctantur. Flores copiosissimi in
caulium ramusculis racema-
tim exeunt, parui, pilosi, odo-
rati, albicantes, è quibus mi-
nutum oritur semen. Radi-
cem habet lignosam, multifi-
dam minimi digiti crassitudi-
ne. Tota planta odore spirat
haud ingrato.

LOCVS.

Magna ex parte in monti. *Diosc.*
bus nascitur. Imo ferè ubiq; *Matth.*
locorum.

QUALITATES.

Excalfacit, & modicè desic. *Gal. 6.*
cat. quodd autem ad calefactoriam attinet, excessus est secundi. quod verò ad re- *simp. me.*
siccationem, aut primi intensi, aut secundi incipientis, est quoq; & modicè te-
quium partium.

VIRES.

Conuenienter adijcitur seruefacta in muliebres desessus ad detrahendos *Diosc.*
menses, partus, secundasq;. Item ad præclusiones vuluæ, & eiusdem inflama-
tiones. calculos comminuit, remoratam vrinam ciet. Et menses publi illita pel-
lit. succus vuluæ inditus ex myrrha, eadem quæ infessio trahit. Coma tribus
drachmis eorundem eiiciendorum gratia sumitur.

Pp 2

AMBRO-

AMBROSIA, Græcis, *Ἀμβροσία*. Italis, *Ambrosia*.

F O R M A.

Diosc. Pusillus est frutex, ramosus trium palmorum altitudine, folijs rutæ circa inum caulem exiguis, cauliculi feminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem patiunt, odore vinoso, suau. Radice tenui, sesquipedali.

L O C V S.

Matth. Prouenit in montibus, & collibus, amœnis locis.

Q U A L I T A T E S.

Cataplasmate imposita vim habet adstringentem, & repellentem.

V I R E S

Gal. 6. Vis eius reprimere, ac repellere, & illitæ adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

P S E V D A M B R O S I A.



* A P P E N D I X.

Missa est Autori hæc planta, quam quidam Nasturtium verrucarium appellant, pro Ambrosia, pro qua etiam alij, vnde idem accepit, sibi hanc missam fatentur, id quod monendum censui lectorem, ne turbaretur si in hanc iconem incideret. Nec desunt qui pro Coronopo habeant, sed non astringit ipse radix odore & sapore Nasturtium referens, & Psyllij nihil habet, nec graminis. Sed folia Nasturtio pene similia sunt, maioribus tamen diuisuris, pluribusque: depressa rotunda asperaq; promit semina racematim coherencia, luteis intrus granulis referta. Prouenit passim secus itinera, odore destituitur, sola acredine nares feriens.*

AMERO-

NOMINA.

597

AMBROSIA altera. Germ. Klein Draubenkraut.

AMBROSIA ALTERA.



Hanc plantam Ambrosi- Matth.
am quoq; nobis vocari libu-
it, quod omnibus ferè notis
Ambrosiam referat.

Pp 3

BOTRYS,

BOTRYS, Græcis, Βότρυς. Italis, Botri. Germ. Traubenkraut / Mattenkraut / Eyscher Beysfuß. Gallis, Pijment, Migraine, Millegraine, seu Patience.

BOTRYS.

FORMA.

Matth. Folijs prouenit Cichorij, aut quercus modo lacinatis, sinuosisq; ramis numerosis, tenuibus, semine copiosissimo, racemosoq; refertis. Plāta tota rufesit, & resinoso quodam succo mader, adeo ut comprehēsa manibus hæreat, odorem quidem acrem spirat, & qui graueolētia quadam nares afficiat, non tamen sine aliqua suauitate.

LOCVS.

Diosc. Inuenitur in conuallibus, & in torrentium alueis.

QUALITATES.

Matth. Excalfacit, & siccit, aperit, incidit, abstergit, & crassa excrementa expectorat.

VIREs.

Diosc. Pota orthopneas mulcet.

Matth. Præstat eadem ad omnes pe-
ctoris, & thoracis affectus pi-
tuitosos, quinimo etiam sup-
puratos adiūuat, quin etiam
asthmaticos, & suspitiosos tū
herba ipsa ex decocto dulcis
radicis pota, tum ipsius herbæ decoctum pluribus diebus haustum, addito vio-
laceo melle, aut saccharo. Purulenta expuentibus mirificè auxiliatur. Herba i-
psa facit quoque ad vteri cruciatus si in calenti tegula vino irrorata calefiat, &
ventri imponatur. Puerperarum à partu dolores mulcet. Concisa, & in patella
ex oleo lini, & ouorum vitellis calefacta, vnà cum parthenij, & anthemidis
floribus, adeo ut placenta formam recipiat, & deinde calida ventri illinatur.
Suffiuntur eiusdem herbæ vapore vtiliter femina ad menses ciendos, & emor-
tuos fetus eijciendos. Herba ipsa arida vestib^o interposita à tincis, & blattis eas
tuctur, & odoratas reddit.

GERA-



NOMINA.

599

GERANIVM, Græcis, *Τεράνιον*. Italis, *Geranio*. Officinis, *Rostrum Ciconia*, vel *Rostrum grus*, vel *Acus muscata*. Germanis, *Welscher Storchschnabel*. Hispanis, *Pico de cinguenba*. Gallis, *Bec de Ciconne*.

GERANIVM.

GENERA.

Sex Geranij genera nobis *Matth.* reperta sunt, ut inferius patebit. Dioscoridi duo tantum habentur, Plinio tria.

FORMA PRIMI.



Geranium folijs est anemo *Matth.* nes, diuisuris longioribus in vnoquoq; folio senis. Caulem mittit ab ipsa radice rectum, tenuem, geniculatumq;. Flores è geniculis in caule prodeunt punicei rosarum sylvestrium ferè figura, sed longè minores, & quinq; tantum folijs referti, è quibus rostellum oriuntur inferna parte lunati. Radice nititur rotunda, nucè pontica maiore, subnigricante, & dulci sapore prædita.

LOCVS.

Nascitur copiosum in Dal. *Idem.* maria incultis locis.

QUALITATES, ET VIRE.

Radix drachmæ pondere in vino pota vulnè inflationes discutit. Reficiens. *Idem.* tibus se ab imbecillitate veillissima est. Bibitur contra phthysim drachma in vini cyathis tribus bis in die. Succus radicis auribus medetur, Epystotonicis semen drachmis quatuor cum pipere & myrrha potum, auxiliatur.

Pp 4

GERA-

GERANIVM secundum. Italis, *Geranio secondo*. Germanis, *Tauben Fuß*.

GERANIVM II.

F O R M A.

Matth. Folijs est malvæ minoribus, pediculis tenuibus, longis, & subrubentibus: caulibus gracilibus, flexilibus, floribus puniceis, è quibus acuminati apices oriuntur, gruinis capitulis similes. Radicem habet tenuem, drantalem, & fibrosam.

L O C U S.

Matth. Nascitur secus itinera, locis incultis, & in hortis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem. Additur à Chirurgicis in potionibus intrinsecorum vulnorum, & fistularum, quinetiam radicibus, & folijs ad recentia vulnera, & vlcera sananda, vtuntur. Fotu quoq; vsurpantur ad articulorum dolores.



GERA-

GERANIVM tertium. Italis, *Geranio terzo.* Germanis, *Storchschnabel.*

GERANIVM III.

FORMA.



Folijis viret cicutæ minori. *Matth.*
bus, seu Myrrhidis proximis,
minus tamen laciniatis, humi
accubantibus, quæ senescētia
rubescunt: caules habet bre-
ves, rotundos, pilolos, ruben-
tesque: in quorum summitati-
bus spectantur flores punicei,
parvi, stellæ figura, è quibus a-
cuti oriūtur apices gruinis ro-
stris similes, sursum spectan-
tes, capitulis balauftij effigie:
radice nititur candida tereti,
ac dulci.

LOCVS.

Nascitur in ruderibus, circa idem.
sepes, secus itinera, & saxoso,
& extenuato solo.

QUALITATES,
ET VIRES.

Iisdem cum secundo gene-
re viribus pollet.

Pp 5 GERA-

GERANIVM quartum. Italis, *Geranio quarto*. Germanis, *Gottes gnad* / *Blatt*
Hanenfuss.

F O R M A.

Matth.

Folijs assurgit ceteris grandioribus, ranunculi æmulis, octonis, circumquaq; diuisuris, numerosis, humi accubantibus, prælongis, ac firmioribus pediculis, nitentibus: caules edit pinguiusculos, & articulatos, ramis copiosis, in quorum cacuminibus, flores emicant in cæruleo purpurei, cæterorum maiores. Quibus flaccescentibus græua (vt in cæteris) prodeunt capita, prono in summitate rostro, triplici apice in coronæ modum rescisso. Radicē quoq; cæteris longiorem habet, crassiorē, robustiorēq; colore rufescente, & lignosa int⁹ matrice.

L O C V S.

Idem.

Prouenit in pratis in Germania & Boëmia.

F A C V L T A T E S,
E T V I R E S.

Vulneraria est herba, & præsertim radix tam in potionibus addita, quàm exterius admota.

GERANIVM IIII.



GERA-

GERANIVM quintum. Italis, *Geranio quinto*. Germanis, *Rupprechtskraut*.

GERANIVM V.

FORMA.



Folia promit pentaphylli *Matth.* modo diuisa, magis tamē per ambitum serrata: subhirsuta, & praelongis pediculis, ipsisq; pilosis nitentia: caules habet dodrantes, tenues, & lanuginosos. Flores ex purpura rufescentes, è quibus parua, acutaque oriuntur siliquulae, hirsutae, ac subasperae, in quibus semen concluditur. Radicem habet dodrantalem, sed tenuem.

LOCVS.

Nascitur arido solo.

Idem.

QUALITATES,
ET VIRES.

Germanorum medici hanc *Idem.* tritam recentemq; peculiari-
ter commendant ad Erysipe-
las, ad inflammationes mam-
millarum, & oris, & pudendo-
rum vlcera.

GERA-

GERANIVM sextum, Italis, *Geranio festo*.

GERANIVM VI.

FORMA.

Matth.

Folia profert Altheæ proxima, caules plures, lentos, geniculatos, hirsutos, flores paruos, rubêtes, balauftij effigie, è quibus rostrata prodeût capitula. Radix illi est sesquidrantalis, digiti crassitudine, quæ humotenus rubescit.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in montibus, & præsertim in Baldo monte in agro Veronenfi.

QUALITATES,
ET VIRES.*Idem.*

Viribus præstat vulnerarijs, & ijs omnibus, quibus & cætera genera.



GNAPHA-

NOMINA.
GNAPHALIUM, Græcis, Γναφάλιον. Italis, Gnasalio.

605

GNAPHALIUM.

FORMA.



Gnaphalium planta est inca- *Matth.*
na tota, tomentosaque, cauli-
bus compluribus fruticans, cir-
ca quos totos folia insunt cras-
siuscula, oblonga, lanuginosa,
ac mollia: quæ verò in caulium
summitate spectantur in rosæ
modum orbiculata sunt. Radi-
cem habet multifidâ, ac ligno-
sam.

LOCVS.

Prouenit raris in locis in Ita- *Idem.*
lia, & gaudet apricis, & siticu-
lofis.

QUALITATES.

Gnaphalium, ideo sic nomi- *Gal. li. 6.*
natum est, quòd folijs eius mollibus, *ἐν τῇ γναφάλιον*, hoc est, pro tomentis vtan- *simp. me.*
tur: sunt autem candida, & mediocriter adstringunt, proindeq; sunt, qui ex vi-
no austero dysentericis propinent.

VIREs.

Bibuntur efficaciter folia ex vino austero ad dysenteriam. Quinetiam ad *DIOSC.*
diarrheam & cæliacas passiones. Profunt quoque enterocellis in puluerem *Matth.*
hausta.

GNAPHA-

*GNAPHALIUM vulgare, Impia Plinij, Herba tormalis. Germa. *Nhutfrant*.

GNAPHALIUM VVLGARE.

F O R M A.

Incana tota est, vt prior, & quæ tomenti vicem præstare possit, caules pmit exuccos, mollibus, lanuginosisque folijs refferos, diuicatos in ramos complures, quorum nouelli superât longitudine vetustiores, & rotunda florû capitula quæ modo nata sunt altius surgentia despiciunt inferius relicta ortu priora. Semine pusillo seipsam serit quotannis, radice namque pusilla non diuturna nititur.

L O C V S.

Nascitur in locis sabulosis apricisque aggeribus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Eadem huic ascribuntur, quæ priori.*



TYPH.

NOMINA.

607

TYPHA, Græcis, Τύφη. Italis, *Mazza sorda*. Germanis, *Mosstolben*/ seu *Narren-
folben*. Hispanis, *Bohordo*, seu *lunco Amacorocado*. Gallis, *Mache*, seu *Masse de runc*.

TYPHA.



FORMA.

Folium edit Cyperidi si- *Diosc.*
mile, caulem album, leuem,
æquabilem, florem in cacu-
mine ambientem, densum,
qui in pappos soluitur, quod
paniculam aliqui vocant.

LOCVS.

Gignitur in palustribus, & *Idem*,
aquis stagnantibus.

FACULTATES, ET VIRES.

Huius herbæ flos suillo *Idem*,
adipe eloto exceptus, am-
bustis medetur.

FILIP-

FILIPENDULA, Italis, *Filipendula*, Quibusdam *Oenanthe*, sed falso. Germanis, *Nerter* *Steinbrech*/Erde *Eicheln*.

F O R M A.

Matth. Folij est numerosis ab vno pediculo vtrique seriatim dependentibus, pimpinellæ siue sanguisorbæ modo, magis tamen sese stipantibus, oblongis, & per ambitum denticulatis, caulibus, sesquicubitalibus, in quorum fastigijs flores sunt albi, in umbellæ ferè speciem coherentes, atque odorati. Radices habet multifidas, funiculi modo exiles, sed globulis numerosis refertas perinde, ac in præonia fœmina, sed longè minoribus, oblongis, & rariusculis.

L O C V S.

Idem. Nascitur in pratis & herbosis locis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Radix pota urinæ remoratui, eiusque stillicidio auxiliatur. Item renum, tum calculis, tum doloribus. Eadem stomachi inflationes discutit. Medetur sulphureis, & ægrè spirantibus, omnibusque in vniuersum morbis, quos pituita excitauerit. Radicum siccarum puluis vtiliter inspergitur comitialium cibis.



OENAN-

OENANTHE, Bulbocastanum, Tralliani, Græcis, Οἰανθή. Italis, *Enante*. Germanis, *Erd Reften*.

OENANTHE I.



FORMA.

Folia habet pastinacæ, florum candidum, caulem crassum, palmi altitudine, semen atriplicis. Radicem magnam in multa rotunda capitula extuberantem.

LOCVS.

Nascitur in petris. *Bulbo-dioscastanum agris innascitur. *

QUALITATES, ET VIRES.

Semen, caulis, & folia cum *Idem*. mulso vino pota, secundas eiciunt. Radix ex vino urinae stillicidio conuenit.

APPENDIX.

Si huic plantæ caules inessent crassi, assererem profecto legitimum esse Oenanthe.

Qq

OENAN-

OENANTHE secundum Italis, *Filipendula secunda*.

OENANTHE II. ET III.

FORMA.

Matth. Folijs est pyrethri, aut pastinacæ sylvestris non absimilibus, caule fœniculaceo, qui umbellas in summitate gerat, è ramis dependentes. Radicibus per omnia filipendulæ similibus.

LOCVS.

Idem. Prouenit in collibus, & locis à Sole illustratis.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem. Creditur ijdem esse viribus, quibus filipendulam præstare diximus.

OENANTHE TERTIVM.

Matth. Folia promit Gingidij, caulem fœniculaceum striatumq; è cuius ramis umbellæ oriuntur candidæ, Radicibus numerosis filipendulæ similibus, sed vegetioribus globulis.



LOCVS.

Idem. Nascitur in amœnis tractibus & in montibus.

QUALITATES ET VIRES.

Idem. Nihil differt suis viribus à præscriptis.

OENAN-

NOMINA.

611

OENANTHE aquatica, repens. Italis, *Filipendula serpeggiante*.

OENANTHE IIII.

FORMA.



Herba est humi serpens, *Matth.* folijs tertij ferè similibus, ex-
lioribus tamen, & magis laci-
niatis, caule sinuoso, striato-
que. Capitulis in summitate
hirsutis, in quibus semen. Ra-
dices mittit plures, rapuncu-
li ferè effigie, non solum in
imacaulis parte, sed etiam in
ramis, qui humi serpentes, ra-
dices quoq; faciunt.

LOCVS.

Nascitur in incultis locis. *Matth.*
* In paludibus sponte nasci-
tur sine radicum tuberculis,
has enim in hortos translata
aut in aridam deplantata sibi
demum adsciscit.*

QUALITATES, ET VIRE.

Et si nihil certi de eius viri- *Idem.*
bus, nobis constet: putamus
tamen à cæteris Filipendulis
non multum differre.

APPENDIX.

Oenanthe, has plantas, ideo appellare libuit, quòd ita Filipendulam, cuius
sunt species, vulgares vocent. Atquire vera nec oenanthe sunt, nec eius spe-
cies.

Qq 2

CONY-

CONYZA, Græcis, *Koniza*. Italis, *Coniza*, seu *pulicaria*. Germanis, *Geel Wint*. Hispanis, *Artadegua*. Gallis, *Herbe aux puces*.

CONYZA.

GENERA.

DIOSC. Tria eius habentur genera, maius, minus, & medium. * inueniuntur etiam plura, & nos quartum adiecimus. *

FORMA MAIORIS.

Idem. Folij est oliuæ similibus, latioribus tamen, & frutice altiori, graui odore, hirsutis, pinguibus, caule binum cubitorum, flore fragili, lutei coloris, qui in pappum abit. Radicibus superuacuis.

LOCVS.

Matth. Nascitur in campestribus, in collibus, & amœnis locis.

QUALITATES.

Gal. 7. Conyza maior, & minor adsimilis, sunt tum temperaturæ, tum facultatis. Gustui amaræ, & acris. Excalfaciunt, & admodum luculenter, adeo ut tertij sint ordinis excalfacientium, & desiccantium.



VIRES.

DIOSC. Frutex totus suffitu, substratq; serpentes fugat, culices abigit & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, tuberculis, ac vulneribus. Flores, & folia cum vino ad menses, partusq; eiiciendos bibuntur. Item contravrinæ stillicidia. Arquat morbum, & tormina, comitiales pota ex aceto adiuuant. Decoctum in defensionibus vuluæ affectibus medetur, impostus succus abortum facit. Herba ex oleo efficaciter horribus oblinitur.

CONY-

NOMINA.

613

CONYZA minor, Græcis, *Kovlza μινωα*. Italis, *ConiZa minore*.

CONYZA MINOR.



FORMA.

Folijs prouenit alterius angustioribus, frutice breuiori, pedali longitudine, & odore quidem præstantiori, cætera verò maiori similia habet.

LOCVS.

Prouenit secus itinera, in campestribus, & in amœnis.

QUALITATES, ET VIRES.

Adsimilis cum maiori est Galen. temperaturæ: quinetiam fa-
diosc. cultatis,

Q 3

CONY-

CONYZA tertia, Græcis, *Κονίζα τρίτη*. Italis, *ConiZaterZa*. Germanis, *Gelb Mung*.

CONYZA TERTIA.

FORMA.

Diosc. Caule est crassiore, & molliore, folijs mediæ inter maiorem, & minorem, amplitudinis, minime pinguis, multo tamen grauioris odoris, & iucundioris.

LOCVS.

Diosc. Prouenit humectis locis.

QUALITATES, ET VIRES.

Diosc. Potest omnia quæ priores, sed imbecillius operatur. Peculiariter autem auxiliatur siccæ farina dysentericis, si quotidie drachmæ duæ propinentur ex vino rubro austero.

Matth.



*CONF

NOMINA.
*CONYZA QVARTA.

615



FORMA.

Rubicundum profert cau-
lem è radice tenui alba, qui fo-
lijs angustis, aliquantum pilo-
sis, in acumen desinentibus, &
parum incis, vestitur. In sum-
mo aliquot ramuli sustinent
flores luteos, præcedenti simi-
les quibus proculdubio etiam
papposum semen respondet.*

LOCVS.

Nascitur in pratis.

Q9 +

HEME-

HEMEROCALLIS, Græcis, *Ημερόκαλλις*. Italis, *Hemerocalle*, & *Giglio saluatico*. Germanis, *Seydnisch Eßien*. Hispanis, *Lirio amarillo*. Gallis, *Luiaune*.

HEMEROCALLIS.

FORMA.

Diosc. Folium, & caulem habet Lili, herbacei coloris, ut porrum. Flores in caule per singulos exortus terni, aut quaterni erumpunt lili diuisura, quoties dehiscere cœperunt, colore per quàm pallido. Radix magna est, atq; bulbosa.

LOCVS.

Matth. Prouenit in segetibus, & campestribus inter vepres.

QUALITATES.

Gale. 6. Hemerocallis radicem habet lili radici similem, non figura tantum, sed & viribus. prodest non secus atque illa igni ambustis, quippe quæ leuiter digerentem facultatem habeat, & cum hoc repulsorium quiddam.



VIREs.

Diosc. Pota radix, aut cum melle, & lana in pello supposita, aquam educit, & sanguinem. Folia trita mammarum inflammationes à partu contractas, oculorumque collectiones mitigat. Radix, & folia igni ambustis vtiliter illinuntur.

HEME

HEMEROCALLIS altera, Italis, *Giglio saluatico secondo*. Germanis, *Eurefisch*
Goldwurz.

HEMEROCALLIS ALTERA.



FORMA.

Alteram facie æmulatur, *Matth.*
sed radicem habet, quæ plu-
ribus, & paruis coagmenta-
tur bulbis. quin etiam flores
profert Martagi modo re-
pandos, prioris hemerocallis
colore, ut eius imago quam
hic adiecimus palam demon-
strat.

LOCVS.

Prouenit in montibus. *Idem.*

QUALITATES, ET
VIRE.

Eadem præstare possunt,
tum radix, cum folia, quæ
prior.

Qq. 5

LILIVM

LILIVM conuallium, Italis, *Lilio conuallio*. Germanis, *Meienblumfin*. Gallis, *Muguet*.

LILIVM CONVALLIVM.

FORMA

Matth. Folia profert, quadantenus plantaginis effigie, sed tenuiora, laeua, neruisque carentia, cauliculos iunceos, triangulares, tenues, ac molles, obsequiososque, in quibus flores exeunt plures balauftij, aut arbuti florum effigie: odore eximio, & per quam iucundo, è quibus baccæ enascuntur virides, quæ per maturitatem rufescunt. Radices demittit laxas, longas, fibris, capillamentisq; refertas, nullis adiacentibus bulbis.

LOCVS.

Idem. Nascitur in montibus, & in eorum conuallibus.

QUALITATES.

Idem. Flores exalfaciunt, attenuant, digerunt, prouocant.

VIRES.

Idem. Aiunt iuuare cor, atque cerebrum, ac omnes principes facultates. Idcirco resolutis, comitialibus, conuulsis, vertiginosis, veteriosisque, animi deliquio laborantibus, & cordis pulsatione affectis inhihent. Item agrè parturientibus stillatitiam florum aquam vtiliter potandam censent, & oculorum inflammationes eandem sanare putant.

CENSURA.

Qui Liliū conuallium Ephemerum alterum faciunt, ijs mens sana non est. LEV.



LEUCOIVM, Græcis, *Λδκρίον*. Mauritanis, *Keiri*, *Cheiri*, *sive Alcheiri*. Italis, *Viola bianca*, & *paonazza*. Germ. *Rot Braun*, vnd *weiß*. Deil. *Hisp. Violetas amarillas*, & *violetas blancas*. Gallis, *Viola rouges, blanches, seu Violet*.

LEUCOIVM ALBYM, ET PURPUREVM.

GENERA.

Tria Leucoij visuntur gene. *Matth.*
ra, nempe Album, Purpureum, & Aureum.

FORMA.

Profilunt omnia genera cu- *Matth.*
bitali altitudine, ramosa, fruticosaq; caulibus brassicæ exilioribus, sed foliorū facie variant. Namq; tametsi omnibus folia sunt oblōga, id tamen q̄ luteis exit floribus, folijs est longioribus, numerosioribus, viridioribus, ac magis in acutum definitibus. Cætera verò nempe album, & purpureum folia gerunt breviora, latiora, & minime mucronata, quin etiam superne, inferneq; canescentia.

LOCVS.

Seritur in hortis, & scitilibus *Idem.*
ad exornandas ædium fenestras.

QUALITATES.

Leucoij frutex vniuersus ex- *Galen. 7.*
tergētem facultatem possidet, *sim. me.*
ac tenuium est partium, plus tamen flores, & inter hos qui sunt sicciore, magis etiam quā virides: Radices similis quoq; sunt facultatis, nisi quatenus

crassioris sunt essentia, & magis terrena.

VIREs.

Sicci flores oculorum cicatrices crassas extenuant, tum menses quoq; decoctum eorum mouet, & secundas, fœtumq; emortuū elicit, & si bibatur viuum quoq; perimit, & abigens est medicamentum. Est enim id vt si q̄ aliud amarum. Sic decoctū eius si non merū fuerit, sed aqua mistum vteri phlegmonas perfusum sanat. potissimū quæ diuturno tempore ad scirrhi modū induruerit, sic cum cerato vlcera ægrè ad cicatricē peruenientia curat. Sunt verò etiā q̄ cum melle ad oris vlcera adhibeant. Semē quoq; iisdē facultatib⁹ præstat. Radices ex aceto illitæ lienes induratos sanant. Quinetiam phlegmonas in articulis induratas.

LEV-



LEYCOIVM aureum, Græcis, *Δευόιον αργέον*. Italis, *Viola gialla*. Germanis, *Gelb Negel Weiß*.

LEYCOIVM AVREVM.

FORMA.

Matth. Folijs est longioribus, numerosiorib⁹, viridioribus, & magis in acutum desinentibus. Flores edit luteos, odoratosque.

LOCVS.

Idem. Seritur passim in hortis, & siccilibus.

QUALITATES ET VIRES.

Diosc. Præstat ea omnia, quæ cætera genera, sed longe valentius. Ideoque præcipui est in medicina vius.



Phil.

NOMINA.

621

PHYLLVM, Græcis, Φύλλον. Germanis, Welsch Vingelfraut.

PHYLLVM.

GENERA.

Duum est generum, θηλυγονον, DIOSC.
 & ἀρρενονγονον.

FORMA.

Telygonon provenit musci DIOSC.
 modo, folio oleæ, sed colore
 magis herbaceo, caule tenui,
 breui radice exili, florem album
 profert, semen papaveris ma-
 iusculum. Arrhenogonum verd
 cætera huic simile habet, solo
 fructu distat, habet enim race-
 mosum quiddam deflorentibus
 oleis non dissimile.

LOCVS.

In saxosis nascitur.

Idem.

VIREs.

Arrhenogonon pota masculini sexus partus, vt telygonum fœminei, face-
 reproditur.

TESTI-

TESTICVLVS, Græcis, *ἄρχυς*, & *ἀρρενογόνορ*. Mauritanis, *Chast*, *Alchelb*. Italis, *Testicolo di cane*. Officinis, *Testiculi vulpis*. Germanis, *Snabentrant*. Hispanis, *Coyon de perro*. Gallis, *Coullon de Chien*.

GENERA.

TESTICVLVS.

Duo tantum genera Dioscoridi recensentur. Sed reuera plura passim spectantur, vt ex iconibus hic seriatim appictis palam fiet.

FORMA.

DIOSC. Is qui Cynosorchis dicitur folijs exit circa caulem, & ima eius parte in terra striatis Oleæ molli similibus, longioribus, angustioribus, lauibus, caule dodrantali, florib⁹ purpureis, radice oblonga oliuæ modo, angusta, duplici ordine, superiore que plenior est, inferiore que mollior, & rugosior. Alter verò Serapias appellatus, folijs est porri, latoribus, oblongis, pinguibus ex alarum sinu inflexis, caule palmeo, floribus planè purpureis. Radice testiculis simile.

LOCVS.

DIOSC. Nascit^r in petrosis, & sabuletis.

QUALITATES.

Gale. 8. Cynosorchi vis inest humida, & calida, ac gustatibus dulcior apparet.

simp. me. Caterum maior

radix multam videtur habere humiditatem excrementitiam, & flatuosam. Altera verò, minor videlicet, contra admodum elaborata est, ita vt eius temperamentum ad calidius, & siccius vergat. Orchis verò, quem & Serapida nuncupant, sicciorē facultatem obtinet, quàm vt primi ordinis haberi mereatur.

VIREs.

DIOSC. Eduntur Cynosorchis radices coctæ, vt bulbi, ex quibus si maiores edūt viri, mares generare dicuntur, si minorem sœminæ, alterū sexum. Illius verò radix qui Serapias appellatur, illita tumores discutit, vlcera purgat, & serpere eadem non patitur, abolet fistulas, & illitu inflammationes delet. Aride radices nomas inhihent, sanantq; putredines, & oris vlcera cacoethe. Aluum sistunt è vino potæ. De hac eadem, quæ de Cynosorchi produntur.

TESTI-



NOMINA.
TESTICULI SPECIES II.
ET III.

623



FORMA.

Secundi, tertijq; Testicu- *Matth.*
li forma ex duabus his ima-
ginibus circumscribi potest.

LOCVS.

Nascitur in pratis mon- *idem.*
tium, collibus, & herbosis
pascuis.

VIRE.

Vires cum cæteris vnifor-
mes habet.

TESTI-

FORMA.

Matth. Ex hac imagine facile quis-
piam quarti testiculi formam
concipt.

LOCVS.

Idem. Nascitur in montibus, &
præsertim in pratis.

VIRES.

Idem. Vires illi eadem sunt quæ
& cæteris.



TESTI-

NOMINA.
TESTICVLISPECIES V.

625

FORMA.



Folia gerit plantagini pro-
xima, gemina, supernè striata,
caulè dodrantalem, glabrum,
leuemq; flores spicatos, can-
didos, odore longe suauissi-
mo, radices (vt cæteri) duas o-
leæ magnitudine, longiuscu-
las, nonnihil hirsutas.

LOCVS.

Prouenit in syluis & valli-
bus, & locis syluestribus, her-
boso solo.

VIRES.

Ea omnia potest, quæ cæte-
ragenera.

Rr

PALMA

PALMA Christi maior. Italis, *Palma di Christo maggiore*. Germ. *Sandlbaum*.

PALMA CHRISTI MAIOR.

G E N E R A.

Duum est generum, Alterum maius, Alterum minus.

F O R M A M A I O R I S.

Matth.

Maius folia habet alij, latiora, nigris infecta maculis, caulem rotundum, laevem, florem spicatum, varium, in purpura albicantem, odore non ingrato. Radices duas, quæ sanè caninos testiculos referrent, nisi processibus quibusdam, quasi digitis humanam manum exprimere viderentur.

L O C V S.

Idem.

Nascitur in montibus, potissimum in pratis, & herbosis locis.

Q U A L I T A T E S , E T V I R E S.

Idem.

Ea omnia præstat, quæ canini Testiculi. Peculiariter autem radices potæ crassâ corporis excrementa pellunt, faciemq; detergunt. Dantur maniacis magno iuuamento, quin & in nernorum affectibus. Semen drachmæ pondere in vino potum comitialibus conuenit. Febrem quoque quartanam curant radices duarum drachmarum pondere haustæ.

Nicolaus Florentinus.

PALMA



NOMINA.

627

PALMA Christi minor. Italis, *Palma di Christo minore*. Germanis, *Brendelin*.

PALMA CHRISTI MINOR.

FORMA.



Folijs constat croci, caule *Matth.*
dodrantali, iunceo, læuiq; in
cuius cacumine flos emicat
purpureus amaranthi æmu-
lus, saturationi tamen purpu-
ra splendens, qui recens odo-
rem quàm suauissimum spi-
rat.

LOCVS.

Nascitur in pratis altorum *Idem.*
montium.

QUALITATES, ET VIRE.

Florum exicatorum pul- *Idem.*
uis datur vtiliter potandum
dysentericis, ex aqua in qua
ferrum extinctū fuerit. *Idem*
totius plantæ stillatitiam a-
quam præstare aiunt.

Rf 1

HORMI-

HORMINVUM, Ὠρίνον. Italis, *Horminio*. Germ. Welsch Tag und Nacht.

HORMINVUM.

G E N E R A.

Diosc. Horminum duplex habetur,
domesticum & sylvestre.

F O R M A D O M E S T I C I.

Diosc. Planta est folijs marrubio si-
milis, sed maioribus, caule se-
micubitali, quadrangulo, cir-
ca quem eminentiæ filiquis si-
miles prodeunt, quæ ad radi-
cem spectant.

Matth. Flores edit in
caule secundum folia per in-
terualla prodeuntes purpu-
reo colore, in quibus diuer-
sum semen concluditur.

L O C V S.

Idem. Seritur in hortis.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Diosc. Semen ad venerem stimu-
landam bibi cum vino volunt.
Purgat cum melle argemas, al-
buginesq; illitum ex aqua tumores discutit, eo etiam aculei ex corpore extra-
hantur. Idem effectus est illitæ herbæ.



HORMI-

NOMINA.

629

HORMINVM sylvestre, Græcis, Οἶκινος ἄγριος. Italis, Horminio saluatico. Germ.
Wilder Scharlach/Wilde Salbey.

HORMINVM SYLVESTRE.

FORMA.

Folio est Saluiae ferè simili, Matth.
caule sesquipedali, aspero, qua-
drangulo, subhirsuto, striatoq;
flore saluiae, purpurascente, sili-
quis numerosis in humum re-
flexis, in quibus semen rotun-
dum, fusco colore.

LOCVS.

Prouenit in campestribus, in Idem.
pratis, secus itinera, & herbosis
locis.

QUALITATES, ET VIRES.

Eadem omnia præstat, quæ Idem.
de domestico scribuntur.



Re. 3

SCLA-

SCLAREA, Italis, *Sclarea*, *Scarleggia*, seu herba di san Giovanni, quilibet Matrisalvia. Germanis, *Scharlach*. Gallis, *Orual*, seu *Toutrebonne*.

SCLAREA.

FORMA.

Matth.

Folij exit hormino quadruplo maioribus, ac latioribus, subasperis, crispis, humi accubantibus, caule sesquipedali, & quandoq; maiori, hirsuto, firmo, quadrangulo, à cuius medio plures oriuntur rami, in quibus spicati exeunt flores subpurpurei, odore eximio, & quadam cum gravitate iucundo, ex his calyculi oriuntur, in quibus habetur semen nigrum pellucidum, ac rotundum. Radice nititur multifida subnigricante.



Locvs.

Idem.

Seritur in hortis, & viridarijs.

FACULTATES.

Idem.

Excalfacit, attenuat, discutit, aperit, resoluit.

VIRES.

Idem.

Folia ex aceto imposita, panos per se, vel cum melle discutit. Item forunculos anteaquam acuminentur. Itale mulieres feminis granum oculis caligantibus intromittunt, nec inde auferunt nisi caligine soluta.

APPENDIX.

Idem.

Sclarea & si Dioscoridis Horminum non est, ego tamen Horminum maius, aut odoratum appellauerim.

SECV-

NOMINA.

631

SECURIDACA, Græcis, *Ἡδύραρον*. Vnguentarijs, *Pelecium*. Italis, *Securidaca*.
Germanis, *Groß Peltſchen*.

SECURIDACA MAIOR.

GENERA.

Duum est generum, Alce- *Matth.*
rum maius, Alterum minus.

FORMA MAIORIS.



Folij exit ciceris, vndecim *Matth.*
ex vno processu erumpenti-
bus, cauliculis edit tenuēs,
lentosq; floribus diluto co-
lore, purpurascētib; ut in
piso, sed minoribus. Siliquas
habet quadamtenus falcatas,
prestas, adunco cacumine, in
quibus rufum concluditur se-
men ancipitis securis effigie.
Vnde illi nomen. amaro sape-
re. Radice vnica nititur, pau-
cis adnatis fibris.

LOCVS.

Nascitur in segetibus, & hordeis.

QUALITATES.

Diosc.

Hedyſari semen colore rufum est, vtrinque anceps, uti securis. Amarum, & *Gal. 6.*
subacribum apparet. *simp. me.*

VIRE.

Semen haustum stomacho vtile, cum melle ante coitum subditum concipi- *Diosc.*
endi spem adimit. Additur in Antidotis. Viscerum obstructions expurgat. *Gal. ibid.*
Idem præstant totius fruticis ramuli.

Rr 4

SEC-

SECVRIDACA minor, Græcis, ἡδυσσάγον μικρόν. Italis, *Securidaca minore*. Germanis, Klein Pelschen.

SECVRIDACA MINOR

FORMA.

Matth.

Maiori ferè adsimilis est, folia tamen minora spectantur, numerosiora, & in cacumine rerusa. Quin etiam & caules, & rami & cæteræ quotquot sunt partes minores habentur. Flores edit alteri haud absimiles, sed pusillos, è quibus cornicula proueniunt rotunda, incurua, acuminato cacumine, quæ per maturitatem rufescunt. Semen in his contentum alteri simile est, sed minus, ac tenuius.

LOCVS.

Idem.

Nascitur & ipsa inter segetes in agris.

QUALITATES, ET
VIREs.

Ea omnia, quæ maiori ascribuntur, ea quoq; in minori reperiuntur.



ONOSMA

NOMINA.

633

ONOSMA, Græcis, ὄνοσμα. Italis, Onosma.

ONOSMA.

FORMA.



Oblonga folia habet, an- Diosc.
chuse modo, lōgitudine qua-
tuor digitorum, & vnus lati-
tudine, mollia, in terra iacen-
tia, sine caule, sine semine, si-
ne flore. Radice nititur ob-
longa, tenui, infirma, rube-
scente.

LOCVS.

Gignitur in asperis.

Idem.

QUALITATES.

Onosma ex acri & amara Gal. li. 6.
constat substantia. simp. me.

VIRE.

Folia ex vino pota partus Diosc.
extrahunt. Prægnās si eam su-
pergradiatur abortum facere
dicitur.

Rr 5

NYMPHÆA,

NYPHÆA, Græcis, Νυμφαία. Mauritanis, Nilofar, seu Nilufar. Barb. Nenusfar. Italis, Nimphea. Germanis, Weiß Seeblumen, & Haarvurg. Hispanis, Escudotes del rio, & Higos del rio. Gallis, Blanc de eau, siue Lunet de eau, siue Lu de stagn.

NYPHÆA ALBA.

G E N E R A.

Matth. Tria eius habetur genera, duo magna, alterum quidē album, alterum Luteum, & tertium, quod paruum appellatur.

F O R M A A L B A E.

Diosc. Folij est fabæ Egyptiæ, minoribus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs demersis, pluribus ex eadem radice prodeuntibus. Flore albo, Lilio simili, & in medio crocos habente, cū defloruerit, ut rotundum malum, aut papaueris caput extuberat, nigro semine, denso, & lato, lēti gustus. Caulis est levis, niger, minimè crassus, Egyptiæ fabæ cognatus. Radix nigra, crassa, scabra, clauæ similis.

L O C U S.

Idem. Nasquitur in paludibus, & stagnantibus aquis.



Q U A L I T A T E S.

Galen. 3. Nymphaeae tum radix, tum semen desiccadi vim habet, citra morsum. Porro *simp. me.* nonnullam etiam abstergendi vim obtinet.

V I R E S.

Diosc. Sicca cum vino pota celiacis, dysentericisque auxiliatur, & Lienem absumit. Radix stomachi, & vesicae doloribus illinitur, vitiliges ex aqua emendat, imposita cum pice alopecij medetur. Eadem contra veneris insomnia bibitur. *Matth.* Paratur e floribus oleum ipsis in eo insolatis, quo vtuntur medici, ubi refrigerare ac humectare sit opus. Soporiferi enim quidpiam illi inest, folia recentia renibus admota seminis profluvia sistunt.

NYPHÆA

NYPHÆA altera, Græcis, Νυμφαία ἑτέρα. Italis, Nimpheaglia. Germanis, Gelb Seeblumen.

NYPHÆA LVTEA.

FORMA.

Folijs estant edictæ, radice Diosc. alba, scabra, flore luteo, nitente rosæ simili.

LOCVS.

Prouenit & hæc in stagnis, Matth. lacubus, & paludibus.

QUALITATES.

Desiccandi vim habet tum Gal. li. s. semē, tum radix citra omnem simp. me. morsum, & nonnihil abster-
gunt.

VIRES.

Huius semen & radix, con- Diosc. tra sceminarum profluua efficaciter ex vino nigro bibuntur, cætera cum altera paria sunt. Attamen huius radix ad Gal. mulierum profluua imbecilior.

CENSURA.

Qui putat Arabum, & Græcorum Nymphæas diuersas esse plantas, proculdubio hallucinantur.

NYPHÆA



NYPHÆA parva, Græcis, Νυμφαία μικρά. Italis, Nimpheapiccola. Germanis,
Klein Seeblum.

F O R M A.

Matib.

Folijs est aliarum facie si-
milibus, sed brassicæ marinæ
pauld maioribus. Flore candi-
do, capitulis exiguis, vt in cap-
pari, semine intus papaueris
magnitudine.

L O C V S.

Idem.

Nascitur in Lacubus, & pa-
ludibus, circa eorum litora, in
aqua tamen, nec alibi eam vi-
dere licuit, præterquam in
Boëmia.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.*Idem.*

Imbecillioribus longè viri-
bus est, quàm cætera de qui-
bus diximus.

N Y M P H Æ A P A R V A.



*NYPHÆA

*Nymphaea parua alia.

FORMA.



Folij est circinatarum rotunditatis, subtilissimis, prodeuntibus à radice longa duos digitos, inferius recurva, colore partim viridi, partim sublutea, superius praesertim, nodis quibusdam protuberantibus, inaequaliter compacta, quorum singulis in medio nigricantia duo puncta insunt, à fibris quae deciderunt, relictæ, enascuntur ab hac fibræ complures, albæ, crassiusculæ, spogiosæ ad octo digitorum longitudinem, sapore nullo insignes. Floræ non vidi.

Locvs.

Nascitur in Heluetia sub Suamedinga pago.*

ANDRO-

ANDROSACES, Græcis, ἀνδρόσακος. Italis, *Androsace*.

F O R M A.

DIOSC. Androsaces herba est amara, tenues spargens iuncos, sine folijs, folliculos in capitibus habens, in quibus semen continetur.

L O C U S.

Idem. Gignitur in Syria maritimis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Androsaces humida, & asimp. me. cris herba est.

V I R E S.

DIOSC. Ea drachmis duabus ex vino pota hydropicis copiosam urinam ciet: eundem effectum præstat, & semen potū, & herba decoctum: podagris vtiliter illinitur.



ANDROSA-

ANDROSACES ALTERA.



Sunt qui putent hanc plantam Androsacem legitimā esse, quod è Syriæ maritimis allatam sciant. Verùm cùm folia in summitate gerat, non possum ego facile eorum subscribere placitis, eam tamen hic excudi curauimus, ut aliorum quoque sit iudicium.

Matth.

ASPLENYM.

ASPLENVM, quod Scolopendrium aliqui vocant, Græcis, *ἀσπλην*. Maurica, *Scolofendriou. siue Sculufendrium*. Officinis, *Cetrach*. Italis, *Aspleno*, & *Cetrach*, seu herba indorata. Hispanis, *Doradilha*. Gallis, *Cetrach*.

ASPLENVM.

FORMA.

Diosc. Folijs est multis scolopendrea animali similibus, ab radice vna prodeuntibus, nec caulem, nec florē, nec semen habet. Folia polypodij modo diuiduntur, subterflauescentia, hirsutaq; superne viridia.

LOCVS.

Diosc. Nasctur in parietibus, faxisq; siliceis (oppidorum mœnijijs) & opacis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Asplenium tenuium quidē simp. me. partiū, non tamen calida herba est, hac vtiq; ratione, & lapides frangit, & lienes liquat.

VIRES.

Diosc. Folia in aceto feruefacta, & per dies quadraginta pota, lienem absumunt, quibus etiam contritis, lienem ex vino illini oportet, stranguariæ & regio morbo prodest, singultum sedat. Calculos in vesica comminuit, conceptum adimere creditur per se aut cum Muli liene appensa. Tradunt nocte silente Luna huius rei gratia effodienda. Ponitur in decoctis, quæ ad melancholicos parantur morbos.

HEMIO-



NOMINA.

641

HEMIONITIS, Græcis, Ημιωνίτις. Italis, Hemionite. Germ. Welsch-Hirschzung.

HEMIONITIS.

FORMA.



Folium emittit dracunculi, Diosc.
lunatum, radicibus cohæret
multis, tenuibus, nunquam
florem, neq; semen, neq; cau-
lem gignit, austero tota planta
sapore.

LOCVS.

Nascitur in petrosis. Itaque Diosc.
Romæ nasci eum scribunt pro-
pe magnum amphitheatrum,
quibuldam in rudibus, aut
ædificiorum ruinis.

QUALITATES.

Adstrictionem simul & a-Gal. 6.
maritudinem possidet. simp. me.

VIRES.

Ex aceto potali nem abfu-
mit.

Ss

Italis,

Italis, Sfera cavallo, ita appellatur, quod equis calceos ferreos calcata extrahat, Chymistis Lunaria minor. Quibuldam securidaca etiam nuncupatur.

S F E R R A C A V A L L O.

F O R M A.

Matth.

Folij exit minori Securi-
daca proximis, pusillis, cor-
disq; faciem referentibus, in-
curua secundum longitudi-
nem excurrente linea, pluri-
bus vtrinque longo pediculo
emergentibus siliquis oblon-
gis, pressis, numerosis, altera
parte sinuatis incisuris diui-
sis, foraminum rotundorum
speciem referentibus, promi-
nente vtrinque orificio. Caules
habet angulosos, striatosq; ra-
mulis numerosis refertos, se-
men siliquis prodit lunatum,
bicorne. Vnde apud chymi-
stas Lunaria nomen adinue-
nit.

L O C V S.

Idem.

Oritur in altis montibus.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem.

Nullum quod sciam habet
in medicina usum, quamvis
non desint herbarij, qui eam in potionibus vulnerum addant. Chymistae hac
tantum ex argento viuo argentum purum fieri fabulantur.

L V N A.



NOMINA.

643

LVNARIA minor, siue Lunaria Botrytis. Italis, *Lunaria del grappolo*. Germanis, *Monrauten* / *Monfraut*.

LVNARIA MINOR.

FORMA.



Caulis constat simplici, de- Matth.
drantali, rotundo, lento,
gracili, è cuius medio in la-
tus ramusculus exit coltæ ef-
figie, cui folia insunt vtrin-
que septem, aut plura, lunata, cra-
ssa, firmaque brassicæ marinæ
modo. flores profert in sum-
mitate caulis oxalidis mino-
ris modo, semine rufo, rotun-
do, in vna modum racema-
tim coherente.

LOCVS.

Nascitur in altis montibus *Idem*.
herboso loco.

QUALITATES, ET VIRE.

Vulneraria est planta, effi- *Idem*.
caxq; vulneribus recentibus
glutinandis. sanat pota intrin-
secas corporis fracturas, & ex-
trinsecas quoq; illita, quare
miris celebratur laudibus ad puerorum enterocellas. Datur vtiliter, commo-
deq; dysentericis, planta tota in puluerem contrita ex vino austero pota. Albas
vteri fluxiones supprimit, quemadmodum, & rubentes.

SS 2.

*LVNA-

In Anglia quædam species
huius nostræ Lunariæ inueni-
tur quæ pluribus folijs dona-
tur, & nonnunquam pluri-
bus etiam racemulis, quam
deliniri iussi, vt alijs quoque
herbarum inuestigatoribus
hæc varietas innotesceret.*



CHAMÆ-

NOMINA.

645

CHAMÆMELON, Græcis, Ἀγέρις. Italis, Camamilla. Germanis, Camillen.
Hispanis, Manzanilla. Gallis, Camenima, & Camomille.

ANTHEMISSIVE CHAMÆMILLA.

FORMA.



Rami sunt illi dodrantes, Diosc.
& sæpe maiores, fruticosi, alis
multis, concaui, tenuibus fo-
liolis, paruis, numerosis, ro-
tundis capitulis, floribus in
medio aureis, foris fecus or-
biculato ambitu candidis, &
odoratis.

Locvs.

Prouenit iuxta semitas in Diosc.
aruis, inter segetes & in pra-
tis.

QUALITATES.

Chamæmelum tenuitate Galen. lib.
quidem rosæ per simile est, ca. 4. & 6.
lore verò ad olei facultates simp. me.
magis accedens, animalium
familiares, tum temperatas,
quapropter lassitudinibus, si
quid aliud confert, doloresq;
sedat, mitigatque. Præterea
tensa remittit, & laxat, quæq;
mediocriter dura sunt, emollit, quæque constipata rarefacit, ex-
calfacit, & de-
siccatur ordine primo.

VIREs.

Poru, & infusione menstrua pellit, partus, vrinam, calculosq;, aduersus in-
flationes, & ilei tormina bibitur. Bilem suffusam expurgat, iocinoris vitia sanat.
Eius decocto vesicæ fouentur, & renes in calculi dolore, vrinam ciet, Agilopis
illita medetur, commanducata vlcera eruptiones in ore sanat. In summa o-
mnibus ferè humani corporis morbis medetur.

Ss 3

*CHAMÆ-

*CHAMÆMELVM Romanum flore multiplici.

FORMA.

Multo suavius, & Aromaticum quiddam olet, & tenerioribus repit cauliculis, foliolis quoq; brevioribus ornatur, & imprimis floribus comendatur adeo dense stipatis foliorum luxuria, vt nonnunquam centrum luteum prorsus operiant.

LOCVS.

Instructiorib; tantum hortis familiaris est in Germania. Sed circa Aurelias sponte nasci quidam referunt.

QUALITATES, ET VIRE.

Præstantior est facultatibus suis quam vulgaris, Et præcipue ex huius floribus, succo & vino albo syrupus conficitur ictero splenis & hydropi utilissimus.*



ADONIS.

NOMINA.

647

ADONIS, Eranthemum quorundam. Germ. Feldtröſſin/ Margrethen Bſſimlin.

ADONIS.



Sunt qui hanc plantam, *Matth.* quam quidam Virgilij Adonidem vocant, eam Chamæmeli speciem faciant, quæ flore purpureo provenire asserit Dioscorides. Sed proculdubio falluntur, quod ipsiusmodi Anthemidis flores in medio aureo sint colore, & per ambitum, ut in Amello.

* Huius vero flosculi apices quidem luteolos habent sed raros & sæpius nigros circa capitulum fuscum & obscure virens, & folia in rubore splendentia versus medium atra, calix quinque folijs constant, quæ & ipsa rubent intrinsecus. caules tenuibus folijs vestiuntur, sylvestris nigellæ similioribus quam Chamæmeli vel Anthemidis folijs. Echinatum capitulum efficiunt semina coherentia, quæ sub finem æstatis delapsa crescunt, perficiunt autem caulem & florem sequenti æstate.

te. Herba subamara est & herbaceum quid redolet. radice nititur gracili, fibrata & lignosa.

LOCVS.

Nascitur in agris tantum, inter segetes, & à quibusdam in hortis colitur.

FACULTATES.

Eius semina ad frangendum calculum efficacissima sunt.

SS 4

*ADONIS

F O R M A.

Præcedenti in cunctis similis est, præterquam quod flores pallidos habeat, in medio tamen similiter nigricantes, aut in purpuram vergentes. gustu etiam respondet priori.

L O C U S.

Nascitur iisdem quibus prior, locis.*



P A R T H E.

PARTHENIVM, Græcis, *παρθένιον*. Officinis, *Matricaria*. Italis, *Matricaria*, seu *Amarella*. Germanis, *Mutterkraut* / siue *Mettram*. Gallis, *Matricaire*.

PARTHENIVM.



FORMA.

Folij exit coriandri, tenui- Diosc.
bus, flore per ambitum albo,
intus melino, odore subuiro-
so, sapore amaro.

LOCVS.

Seritur in hortis, ac etiam Matth.
sponte nascitur.

QUALITATES.

Excalfacit, siccatur, aperit, Idem.
abstergit, prouocat, resoluit,
flatus pellit.

VIRES.

Siccatum cum aceto mul- Diosc.
so, aut sale potum, non secus
atq; epithymum bilem, & pi-
tuita detrahit, suspiriosis pro-
dest, & melancholicis: herba
sine floribus pota calculosos,
& anhelatores iuuat. Valet
decoctum ad infedendum in
duritia vuluarum, & inflam-

mationibus. Illinitur sacro igni & in collectionibus cum flore. Epotus succus Matth.
drachmæ pondere cum saccharo ventris tineas perimit. Illitus, impetigines, al-
phos, & lentigines emaculat. Peculiariter autem auxiliatur omnibus vteri af-
fectibus, quos flatus, aut pituitosus humor excitauerit: menses ciet, & secundas.
calefit recens super tegula: & irrorata vino ventri illinitur contra vteri dolores.

TANACETVM, siue Athanasia, Italis, *Tanaceto*, siue *Daneda*. Germanis, *Rein-
faren*.

FORMA.

Matth. Foliagerit maioris millefo-
lij æmulis, aliquanto tamen
maioribus, amaro sapore, &
odore graui, caulibus bicubi-
talibus, floribus melinis, au-
reis globulis similib⁹, umbel-
latim quadantenus micanti-
bus. Radice nititur vnica com-
pluribus adnatis fibris.

LOCVS.

Idem. Prouenit in hortis, ac etiã
alibi sponte per se nascitur.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, exiccat, abster-
git, aperit, flatus pellit.

VIRES.

Idem. Alui, ventriculi, & vteri fla-
tus discutit. Lumbricos pel-
lit, vrinam ciert, & menses, cal-
culos eijcit, obstructions vis-
cerum aperit.



BYPHTHAL-

NOMINA.

BUPHTHALMUM, Græcis, Βύφαλον. Latinis, *Oculus bouis*. Italis, *Buphtbalmo*,
sive *Occhio di bue*. Arabibus, *Bihar*. Germa. *Kinds Aug*. Gallis, *Oiel de Bœuf*.

BUPHTHALMUM.



FORMA.

Caules emittit tenues, mol
lesque, folia fœniculi, luteum
florem, anthemide maiorem,
oculi similitudine, unde no-
men traxit.

LOCVS.

Circa oppida nascitur, & in *idem*.
campestribus.

QUALITATES.

Flores anthemidis floribus *Gal. li. 6.*
simillimi sunt, sed multò illis, *simp. me.*
tum maiores, tum acriores,
proinde & vehementius dis-
cutiunt.

VIRE.

Flores cum cerato triti, tu- *Diose.*
mores, duritiasque discutiunt.
Aiunt epotam herbam post
exitum à balneis, Regio mor-
bo correptis colorem tractu
temporis reddere.

*BUPHTHAL-

*BYPHTHALMUM flore purpurascēte.

FORMA.

Hęc eadem cum priore est,
in eo autem differt, quodd flo-
res huius foliosa à parte exter-
na vel in totum purpurascūt,
vel saltem per medium purpu-
rascens quiddam habent. Cau-
lis quoque in priore plane vi-
ridis, in hoc purpureus est.

LOCVS.

Nascebatur in horto cuius-
dam Iurisperiti Geneuæ, trās-
lata fortè illuc ex vicinis mon-
tibus Allobrogum.*



BELLIS

BELLIS maior, Italis, *Primo fiore maggiore*, seu *Fiore di prima vera*, nonnullis *Primula vera maior*. Germanis, *Gensblum*/Ruhblum, & *Johansblum*.

BELLIS MAIOR.



GENERA.

Complura Bellidis haben- Matth.
tur genera.

FORMA MAIORIS.

Folia gerit prope radicem, Matth.
quercus modo serrata humi
accubantia, crassiuscula, ro-
bustaq; sed quæ in caule sunt
angustiora, ac longiuscula spe-
ctantur senecionis quodante
nus emula, complures ab una
radice emittit caules, cubita-
les, teretes, robustos, è quo-
rum summis partibus flores
exerit anthemidis, aut parthe-
nij maiores, qui estate ferè to-
ta perdurant, colore intus au-
reo, & per ambitum cædido.
Radix illi est multifida, haud
valde descendens.

LOCVS.

Nascitur in pascuis, pratis, Idem.
secus itinera, & in agrorum
marginibus.

QUALITATES, ET VIRES.

Prestant flores ad strumas & caluarię fracturas, qui etiam ad thoracis vlcera, Idem.
quæ in eius cavitatem penetrarunt, in quem vsum Bellim in potionib. addunt.
Sunt qui omnia genera commendent ad Ischiadicis, & resolutos, commansa
folia sanant cum oris, tum linguę exulceratas pustulas. Eadem tula genitalium
inflammationes extinguunt ac etiam resoluunt. Herba ipsa recens ex oleo & a-
ceto deuorata, aluum adstrictam lenit. Id quod etiam præstat ex iure pinguium
carnium decocta, & vnà cum iure sumpta.

*BELLIS

*BELLIS media, siue syluatica, seu montana.

G E N E R A.

Duo habentur genera, mas & femina forte, differunt enim colore, magnitudine & latitudine foliorum.

F O R M A.

A. Caules plures habere solet, à duobus ad octo, singulos cum singulis floribus, nisi præter naturam duo siue distincti siue in vnum confusi flores vni cauli insideant, quod non raro ei accidit, & tum caules non rotundi sed latiores sunt. Folia ei sunt oblongiora, angustiora, caules quoque longiores. In B. vero latiora sunt folia & caulis magis rubet, singularis. Fortè autem cum herba adultior est, in hac quoque specie plures fiunt caules, Sapor utriusque acris, tenuium partium, ferè ut virgæ aureæ & radix ferè similiter transuersa odore non ingrato.

L O C V S.

Nascitur in syluis & in Salena monte.

Q U A L I T A T E S.

Calida & sicca videtur in tertio gradu.*

BELLIS MEDIA.



BELLIS

N O M I N A.

655

BELLIS minor, Italis, *Primofiore minore, fior di primavera.* Germanis, *Mäpfleiben.*
Gallis, *Marguerites, seu Pasquette.*

BELLIS MINOR.

F O R M A.

Folijs provenit alterius mi *Matth.*
noribus, minimè sinuatis, hu
mi accubantibus, cauliculos
edit tenues, obsequiosos, rō-
tundos, dodrâte minores. Ra-
dicem alteri longè minorem
multifidamque.

L O C U S.

Nascitur in pratis, & pa- *Idem.*
scuis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Præstat omnia quæ maior. *Idem.*



BELLIS

BELLIS minima, Italis, *Margarite*, & *fiori di prima vera gentili*. Germanis, *Tausenfchön*.

BELLIDIS SPECIES.

G E N E R A.

Matth. Pluribus spectantur generibus, quæ florum varietate dignoscuntur.

F O R M A.

Idem. Folia tametsi in omni genere habeantur longiuscula, & crassiuscula, solo procumbentia, atq; per ambitum sensim serrata; flores tamen coloribus, & foliorum stipatu inter se variant. Siquidem in uno genere cetero tenus aurei, & per ambitum rubentes cernuntur, in altero verò ex candido rufescentes, aut versicolores. Sūt etiam qui intus rubescant, & in ambitu albicet, quin etiam in quodam genere flores habentur exilibus admodum foliolis, ipsisq; versicoloribus aded vbiq; stipati, vt sericinos floccos penè referant.



L O C V S.

Idem. Seruntur in hortis, & ficilibus ad coronamenta.

Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Omnia genera paribus viribus pollent.

PÆONIA

NOMINA.

657

PEONIA, Græcis, ΠΑΟΥΑΙΔΗ, seu παυαία. Arabibus, Feonia. Italis, Peonia. Germanis, Peonien. Hispanis, Rosa del monte, seu Rosa albardeira. Gallis, Pivoine, seu Pynoine.

PEONIAMAS.



GENERA.

Duum est generum, Mas DIOSC. & Fœmina.

FORMA- RIS.

Mas folia iuglandis habet. *Idem.*
Radix ei inest digitali crassitudine, & palmi longitudine, alba, gustu adstringens: Flores & fructus fœminæ similes.

LOCVS.

Prouenit in altissimis montibus, & præruptis. *Idem.*

QUALITATES, ET VIRES.

Ijs tum qualitatibus, tum *Matth.* viribus præstat, quarum & fœmina, de qua statim dicitur.

T t PEONIA

PÆONIA fœmina, Græcis, Παιωνία, siue Παιωνία Ἰηλεία. Italis, Peonia fœmina.

PÆONIA FŒMINA.

FORMA.

DIOSC. Folia Smyrnij more diuidentur. flores mittit summo caule grandes, è quibus siliquæ oriuntur amygdalis similes, in quibus cum dehiscent multa grana exigua, rubra, acinis punicorū similia, inueniuntur. Radices habet ceu glandes circiter septem, aut octo, vt in haustula regia.

LOCVS.

Idem. Nascitur in altis montibus, saxosis, & præruptis locis.

QUALITATES.

Gal. 6. Radicem habet leuiter adstringentem, quadā cum dulcedine, & si pluscūm denribus mandās, acrimoniā item quāpiam subamaram subesse percipies. Expurgat porro etiam iecur obstructū, & renes, præsertim quæ acris & subamara est. Est autem facultate omnino resiccatōria vehementer, haud tamen insigniter calida, sed aut ad symmetrum, aut paulò calidius temperamentum attingens est.

VIRE.

DIOSC. Sicca radix fœminis, à partu non purgatis datur, ciet menses, amygdalæ magnitudine pota, ventris doloribus cum vino hausta auxiliatur, valet contra renum morbum, & renum, & vesicæ dolores, decocta in vino aluum sistit. Rubra grana, rubentes menses sistunt decem, aut duodecim pota ex vino austero, stomachicis, & erosionibus ea esse prodest. à pueris pota initia calculorum eximunt, grana nigra auxiliantur nocturnis suppressionibus, Vulvæ strangulationibus, atq; doloribus. xv. numero pota in aqua mulsa, aut vino. Præstat collo suspensa Radix comitialibus pueris, & pota capitis affectibus auxiliatur, & idem facit semen.

LITHO.



LITHOSPERMVM minus, Officinis, *Milium folis*. Græcis, *Αἰθάρειον μικρόν*.
 Italis, *Lithospermo minore*, *Miglio saluatico*, seu *Milium folis*. Germanis, *Rein*
Weerhirse / seu *Steinsamen*.

LITHOSPERMVM MINVS.

F O R M A.



Planta est fruticosa, cauli- *Matth.*
 bus pluribus referta, sesqui
 pedalibus, lignosis, firmis, in
 quibus folia insunt oleæ mi-
 nora, & semen circa folio-
 rum exortum, album, milij
 simillimum, pellucidumq;
 sed lapidea ferè duritie. Ra-
 dices habet tenues, nume-
 rosasque.

L O C V S.

Nascitur arido, & sabulo- *Idem.*
 solo.

Q U A L I T A T E S,
 E T V I R E S.

Semen cum vino albo po. *Diosc.*
 tum, calculos frangit & vri-
 nam pellit. Semen datur v- *Matth.*
 tiliter potandum diebus plu-
 ribus sesquidrachmæ pon-
 dere addita Asplenij semi-
 drachma, & succini scrupu-
 lis duobus ex succo plantaginis aut portulacæ aut lactucæ ad gonorrhæam co-
 hibendam, peculiariter autem iuuat fœminas agrè parturientes, si seminis
 drachmæ duæ in puluerem contriti ex humano lacte propinentur.

T t 2

*LITHO-

* LITHOSPERMON sylvestre, aruense, vel nigrum, Græcis, λιθόσπερον
ἀγρίον. Germanis, Wilder Meerhirsen.

LITHOSPERMON SYL-
VESTRE.

F O R M A.

Herba hæc excedit cubi-
tum altitudine, folia habet
quodammodo similia folijs
Milij solis, minora, non ita
quidem dura sed aspera, ni-
gricantia, per ramos sparsa,
quæ quo magis ad superiora
tendunt minora fiunt. In mul-
tos diuiditur ramos tenues a-
speros, in quibus sunt flores
albi, parui, similes floribus
milij solis, ordine per ramos
ascendentes, & ad vnum quæ-
que sunt folia, ijs succedunt
semina nigra, terna vel qua-
terna simul, similia seminibus
Echiorum, Buglossæ vulgaris
vel Borriginis, stipata par-
uis foliolis vt in Borragine, ra-
dice nititur succi plena, an-
nua tamen, superiore parte
subrubente.

L O C V S.

Nascitur in segetibus & in-
ter olera.*



PHALARIS,

NOMINA.

661

PHALARIS, Græcis, Φάλαρις. Italis, Falari.

PHALARIS.

FORMA.



Cauliculos emittit zeæ diosc.
mis similes, à minutis, ac nul-
lius vltus radicibus: multis, du-
um palmorum, geniculatos,
graciliores, validiores, ac dul-
ces, semen candidum, in spi-
catis capitulis, oblongum, mi-
lij magnitudine.

LOCVS.

Seritur in Italia, spectaculi Matth.
gratia.

QUALITATES, ET VIRES.

Tunditur, & in aqua, aut
vino succus, & ad vesicæ cru-
ciatus vtilissimè bibitur: Se-
men cochlearis mensura po-
tum ad eadem efficax est.

Tt ; RVBIA

RVBIA sativa, siue Domestica, Græcis, Ερυθρόδακτυλον. Arabibus, *Paute*, seu *Fur*, *Alfabagin*. Italis, *Robbia*. Germanis, *Ferberrot*. Hispanis, *Ruina*. Gallis, *Garence*.

RVBIA SATIVA.

G E N E R A.

DIOSC. Duo eius sunt genera, una sponte prouenit, altera seritur.

F O R M A S A T I V A E.

Idem. Caules illi sunt asperi, & quadranguli, longi, aparinæ non dissimiles, robustiores, & multo prorsus maiores, folijs per interualla circum articulos stellatim decussatis. semen rotundum, inter initia viride, mox rubrum, postea cum maturuerit nigrum. Radix tenuis, longa, rubra.

L O C V S.

Matth. Seritur quibusdam in locis in campis. in Ethruria tamen domestica etiam sponte nascitur secus itinera, sepes, & fruteta.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Radix acerba gustu est, & *simp. me.* amara. Itaque lecur, & lienem expurgat, vrinam trahit crassam, & sanguinolentam, & menses, ac me-
diocriter abstergit.



V I R E S.

DIOSC. Radix vrinam ciet, qua de causa regio morbo opitulatur, ex aqua multa pota. Item Ischiadicis, & resolutis, crassam, copiosamq; vrinam pellit, nonnunquam & sanguinem. bibentes tamen quotidie lauare oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. Ramuli cum folijs ex vino poti, præstant aduersus serpentium morsus, semen ex aceto potum lienem absumit. Imposita radix trahit menses, & secundas. Illita ex aceto alba vitiligni medetur.

RVBIA

fen Fuc.
Gallis.

NOMINA.

663

RUBIA sylvestris, Græcis, Ερυθρόδαρον άγριον. Italis, Robbia saluatica. Germanis, Wilder Röt.

RUBIA SYLVESTRIS.

FORMA.

Caules, & folia minora Matth.
longè spectantur quàm domesticæ, & minus quoque aspera. Radix etiam illi est non adeo rufa, multifida, tenuisque.

LOCVS.

Prouenit sylvestris locis, Idem.
secus itinera, in frutetis & propter sepes.

Eius vires longè imbecil- Idem.
liores sunt quàm domesticæ.



Tt 4

LONCHI

LONCHITIS aspera, Græcis, Λογχίτις τραχεία. Italis, *Lonchite aspera*. Germanis, *Spicant*.

LONCHITIS ASPERA
MAIOR.

GENERA.

Matth. Duo eius reperiuntur genera, Maius, & minus, quamvis Dioscorides vnus tantum meminerit.

FORMA.

Matth. Folijs est Scolopendrij proximis, longioribus tamen, ac magis diuisis, & ad polypodij faciem potius accedentibus, spitamæ longitudine, vtrunque disparibus incisuris dissectis, tenuibus, aculeatisq; denticulis circumferratis, ac vbique asperis, vnde illi nomen. caulem non profert, nec flores, neq; semen, perinde ac polypodium, & asplenium, quorum imaginem refert. Radice nititur multifida tenui Phyllitis modo.



LOCVS.

Idem. Nascitur in vmbrosis, opacis, & humectis locis.

QUALITATES.

Gale. 7. Folia ad glutinanda vulnera vtilia sunt, cum sunt adhuc viridia, sicca tamen *simp. me.* ex aceto potalienes induratos sanant.

VIREs.

Diosc. Vulneribus mirum in modum prodest, in eisq; inflammationes excitari non patitur, ex aceto potalieniem absumit.

LONCHI-

N O M I N A.

665

LONCHITIS aspera minor. Italis, *Lonchite aspra minore.*

LONCHITIS ASPERA MINOR.

F O R M A.

Mitiora, tenuiora, angustioraq; folia promit, & magis Polypodio similia, hirsuta, & aspera.

L O C U S.

Nascitur in opacis, & frutetis, vlginofo solo.

Q U A L I T A T E S,

E T V I R E S.

Herba est, & ipsa vulneribus glutinandis, lienibusque absumentis idonea, perinde ac altera.



T e s

*LONCHITIS

* LONCHITIS ASPERA
MARANTHÆ.

Folia promit à radice nigra cirroſaque, ſimilia ſcolopendrio, ſed magis diuiſa & minora, pediculis nixa rubentibus vt Trichomanes, attingit nonnunquam dodrantis altitudinem, ſed plerunq; infra ſubſiſtit. Nascitur locis æditis & ſaxoſis, vel in nemoribus aſpero ſolo. *



ALTHEA,

NOMINA.

667

ALTHEA, Græcis, *Αλβία*, & *ῥίσα*. Italis, *Maluauschio*. Mauritanis, *Chitini*, *Chatini*, siue *Chatmia*, siue *Rosa Xaeni*. Germ. *Zbisch* & *Heylwurk*. Hisp. *Hierua Cannamera*, siue *Marmaie*. Gallis, *Guymaue*.

ALTHEA.

FORMA.



Althea, quam alij Ibisum *Diosc.* vocât, in maluarû syluestrium genere est, cui folia vt Cyclamino rotunda sunt, lanugine canescunt, flore rosaceo, caule bicubitali, tricubitalive. Radice lenta, intus alba.

LOCVS.

Nascitur in campestribus; *Matth.* humido solo.

QUALITATES.

Facultatē habet digerendi, *Galen. 6.* laxandi, phlegmone leuandi, *simp. me.* mitigandi, concoquendi. Radix porrò eius, & semē cetera quidē similiter agunt, vt herba viridis, sed tenuiarum partium, magisq; exiccatoria. ad hæc magis absterforiam quā illa facultatem ostendunt.

VIRES.

In vino aut aqua mulsa de- *Diosc.* cocta, & per se cū imponitur tusa efficax est cōtra vulnera. Prestat itē ad strumas, parotidas, abscessus, mammarū inflammationes. Siquidē discutit, excoquit, rūpit, & ad cicatricem perducit.

Cocta (vt dictum est) suillo aut anserino adipē adiecto terebinthina ve, vt malagmatis lentor fiat, facit ad vuluæ inflammationes, præclusionesq; in pectus subdita. Decoctum eodem fungitur munere, onera vuluæ reliqua; à partu extrahit. Decoctæ radices succus ex vino potus succurrit vrinæ difficultati, calculosorū cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulisq; Dentium dolorem mulcet cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen, siccumq; tritum vitilignes, sub Sole perunctum emendat. Eodem cum oleo, & aceto peruncti à venenatis non feriuntur. Valent contra dysenteriam, sanguinis reiectiones, aluiq; profluuium. Bibitur in posca, aut vino contra omnes vesparum, apum, similitumq; aculeatorum ictus.

ALTHEA.

ALTHEA altera, quibusdam Abutilon vocatur. Italis, *Malvauschio bastardo*.

ALTHEA ALTERA, SIVE
ABUTILON.

FORMA.

Matth. Folia habet cucurbitæ, minora, tactu lævia, sed tenuissima obducta lanugine. caulem edit sesquicubitalem, & aliquando maiorem. flores in toto caule aureos, è quibus semen oritur nigrum. Radice nititur longa fibrosa;

LOCVS.

Idem. Nascitur in campestribus, ac etiam sponte in hortis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Semen epotū sesquidrachmæ pondere ex vino, calculos, & arenam pellit, vrinam ciet, & eius cruciatus mitigat.



ALCEA,

ALCÆA, Græcis, ἀλκῆα. Barbaris, *Bismalua*. Italis, *Maluanisco saluatico*. Germanis, *Sigmarskraut*. Hispanis, *Malua montefina*. Gallis, *Bimaue*, vel *Guimauve sauuaige*.

ALCÆA.



FORMA.

Herba est caule, floribus, *Matth.* & semine sylvestri maluæ per quàm similis, sed folijs euidētioribus, incisuris laciniatis, ranunculi modo. caules editres, aut quatuor, canna bino cortice vestitos. flores maluæ, tum facie, tum colore similes, pauloq; maiores, quemadmodum & semē. Radicem longam, latam, albam, ac multifidam maluæ similem, sed lignosā intus matrice.

LOCVS.

Nascitur in incultis, campis, Idem. pestribus, & agrorum, scrobiumq; marginibus, iuxta sepes, vias, ac semitas.

QUALITATES,
ET VIRES.

Alcea sylvestris maluæ generis. *Galen.* nus est, in vino pota dysenteriae, & erosionibus medetur, & potissimum eius *Diosc.* radix.

CANNA-

CANNABIS, Græcis, *Kávvaβis*. Arab. *Scebedenegi*, & *Canab*. Italis, *Canapa*. German. *Zamer Hanff*. Hispan. *Canambo*. Gallis, *Chanave*.


G E N E R A.

C A N N A B I S.

DIOSC. Tria Cannabis numeratur
Matth. genera, Mas, Fœmina, & Syl-
vestris.

F O R M A.

Matth. Mas plures è caule fundit
ramos, arbusculæ speciem re-
ferens. adeo vt ex eius stipite
carbones fiant ad bombardarum
pulverem parandum. Fœ-
mina caules edit lōgē tenuio-
res, nullis ramis brachiatos,
nulloq; semine proliferat. Fo-
lia vtriusq; fraxini, sed mino-
ra, & graciliora, sensimq; ser-
rata, quæ quidē in mari maio-
ra, nigrioraq; spectantur, qui-
na senave ex vno pediculo p-
deuntia. Radice nititur mul-
tifida, fibrosa; Semine tan-
tum in mari gignitur rotun-
dū, cinereo colore, cuius me-
dulla dulcis est, & alba. Syl-
vestris virgas fert altheæ similes,
minores, nigriores, & asperio-
res, cubitalēque, folijs satiæ
nigrioribus, & asperioribus,
flore Lychnidis, subrubro, se-
mine & radice altheæ.



Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. Semen flatus discurtit, adeoque desiccat, vt si plusculum edatur, genituram exiccet. Mul-
simp. me. tum quoque calefacit. Ideoque sumptū paulo largius, caput ferit, vaporem sursum ad ipsum
& li. i. de mittens, calidum simul, ac medicamentosum.

V I R E S.

DIOSC. Semen aduersatur ijs, qui procreandæ soboli dant operam: namq; lōgiore cibo sumptum,
genituram extinguit. foliorum recentium succus conuenienter aurium doloribus instilla-
tur. Sylvestris radix decocta, & illita inflammationes mulcet, tumores discurtit, & tofos arti-
Matth. culorum. Succus satiæ instillatur auribus vtiliter ad vermes necandos: quin etiam inte-
stinorum tineas excutit. Equorum quoque tineas, quæ intro sedem hærent, succus, aut de-
coctum infusum eiicit. Radix recens illinitur vtiliter amibustis, sed sæpius amouenda, & ite-
rum admouenda recens, ne exiccetur.

ANACY-

NOMINA.

674

ANAGYRIS, Græcis, ἀνάγρις. Italis, Anagiri, & fauainuersa. Germ. Stinctbaum.

ANAGYRIS.



GENERA.

Duum est generum, Ma- Matth. ius, & Minus.

FORMA MAIORIS.

Frutex est arboris instar, per DIOSC. quàm graui odore, folijs viticis, virgisque, flore brassica, racemoso, semen in corniculis non breuibz gignit, subrotundum, firmum, versicolori facie, simile renibus, quod durefcit vna maturefcence. VI. Matth. que adeo duro, vt aqua macerato, in sua tamen pertinaci duritie consistat.

QUALITATES.

Frutex est grauiter olens; Galen. 61. & acris, digerentis exalfacientisque facultatis. virentia folia propter humiditatis admissionem, minus sunt acria, sicca verò incidentis. & siccantis sunt facultatis. similem quoque facultatem habet radicis cortex.

VIRES.

Tenera folia trita tumores illita reprimunt. Si partus hæreat, si secundæ, DIOSC. mensesq; morentur, bibuntur drachmæ pōdere in passo. Sic & suspiriosis dantur, & contra capitis dolores in vino. difficulter parientibus adalligantur, ita vt à partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendis, discutiendisq; adhibetur. Semen commanducatum vomitiones vehementer ciēt.

ANAGY-

ANAGYRIS altera, siue minor, Græcis, ἀνάγυρις ἑρέα. Italis, Angiri minore.
Ananienſibus, in agro Tridentino, Eghelo.

ANAGYRIS ALTERA.

FORMA.

Matth.

Folia prodeunt ex vno pediculo terna, oblonga, in acumine mucronata, viridia, læuiaque, trifolij latiora. aureis micat floribus, vt in altero racematim dependētibz, odore tamen ingrato. Hinc cornicula prodeunt Genistæ æmula, in quibus semen continetur eiusdem genistæ magnitudine, sed oblongū, phaselii modo, colore subnigro. Materies ligni durissima, quæ Guaiaci modo exterius lutea est, medullitus verò nigra. Incorrupta diu durat, proinde rura palos ad vires sustinēdas ex ea parant. Quin etiam sagittarij validissimos cōficiunt arcus.

LOCVS.

Idem.

Oritur in syluis montium, & copiosum habetur in Ananienſis vallis syluis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Omnia potest, ac præstat, quæ maius præstare diximus. * Odore dicitur occidere mures: Plantæ cinis ad calculum commendatur. *

APPENDIX.

* Qui putant Anagyrim alteram esse Laburnum (mea quidem sententia) non aberrant, Et fide digni rei; herbariæ peritissimi viri se in monte Iura cubito longiores racemos floribus inuenisse referunt. *

CERÆA,



NOMINA.

673

CEPÆA, Græcis, Κηραία. Italis, Cepera.

CEPÆA.

FORMA.

Cepæa portulacæ similis Diosc.
est, sed nigriora habet folia,
& radicem tenuem.

LOCVS.

Nascitur in incultis locis. *Matth.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Folia in vino pota, urinæ Diosc.
stillicidio, & vesicæ scabie la-
borantibus opitulatur. maxi-
mè id præstat, si cum decocto
radicum asparagi, quem mya-
canthon, hoc est, corrudam
vocant, bibatur.

Vu ALISMA,



ALISMA, seu Damasonium, Græcis, ἀλίσμα. Italis, *Alisma*. German. Engel-
tranch/ & Mutterwurk.

A L I S M A.

FORMA.

DIOCS. Folia insunt ei plantaginis,
sed angustiora, conuexaq; in
terram, caule simplici, tenui,
cubito altiore, capitib. thyrſi,
flore tenui, candido, palleſcē-
te, radicibus tenuibus, vrve-
ratti nigri, acribus, odoratis,
modicè pinguibus.

LOCVS.

Idem. Aquosos amat tractus.

QUALITATES.

Galen. 6. Absterſoria est facultatis.
ſimp. me.

VIREs.

DIOsc. Radicis drachma vna, aut
altera pota his conuenit, qui
leporem marinū, aut opium
hauserunt, aut à rubetis de-
morsi sunt. Datur dysenteri-
cis per se, aut cum dauci semine. conuulsis, & contra vitia vuluæ prodest. Her-
ba ſiſtit aluum, menſtrua pellit, tumores illita mitigat.

APPENDIX.

* Quam pinxit autor hoc in loco pro Alismate, non candidum, sed aureum
gerit florem in hirsuto subrubenteq; cauliculo, pedali, odore sternutamen-
ta cientem, qui tandem in pappos abit.*

HYFF.



NOMINA.

673

HYPERICVM, Græcis, *ἑρπύρινος*. Muritanis, *Reiofricon*, seu *Reiofricon*. Italis, *Hiperico*, *Perforata*, seu *Herba di S. Giouanni*. Germanis, *Sanct Johannekraut*. Hisp. *Coraioncillo*. Gallis, *Mellepertuis*, seu *Trucheran*.

HYPERICVM.



FORMA.

Frutice est lusculeo, do- Diosc.
drantali, rubescente, folioru- Matth.
ta, punctim perforato, flore
luteo, leucoio simili, qui digi-
tis attritus sanguineū succum
remitit, subhirsuta siliqua,
& in rotūdo oblonga hordei
magnitudine, semine intus
nigro, resinosi odoris.

LOCVS.

Gignitur in cultis locis, & Idem.
asperis. Diosc.

QUALITATES.

Calefacit, & desiccatur, te- Gal. lib. 8.
nuisq; substantiæ est, aded vt, simp. me.
& mēles, & vrinas prouocet.
Aperit, resoluit, agglutinat,
atque etiam cohibet.

VIRES.

Vicinam cit, Menstrua pel- Diosc.
It appositū Tertianis, Quar-
tūque liberat. Semen qua-
de ginta dieb. haustum Ichia-
dies medetur. Folia cum se-
mine illita, ambusta sanant. Matth.

Semen ex vino potum calculos eiecit, & venenis aduersatur. Quin etiam vene-
nosorum moribus resistit. tam idem potum, cum herba ipsa deuorata, hausta-
ue; tum vulnere illita. Aqua stillantia florentis herbae bibitur vtiliter comitia-
libus, & resolutis. Datur seminis farina commodè ex polygoni succo sangui-
nem expuentibus. Idem aluum exonerat. Inest floribus, ac semini mira facul-
tas ad vulnera recentia sananda, præter ea quæ capiti infliguntur.

Vu 2 Ascr-

ASCYRVUM, Græcis, ἄσχυρον. Italis, *Asiuro*. Germanis, *Hartheu*.

A S C Y R V M.

F O R M A.

DIOSC. Hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens ramos, furculosiores, rubentesque, folia tenuia, flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non abfimilem, cuius attritu digiti ferè cruentantur.

L O C V S.

Matth. Nascitur in cultis, & quandoque in vliginosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Semen purgatorium est, simp. me. foliorum verò facultas modicè extergens, & desiccans, ut & ambusta sanare credantur. Cæterum in vino austero decocta vinum ipsum magnorū vulnerum glutinatorium efficiunt.

V I R E S.

DIOSC. Vfus seminis ad Ichthyicos valet, potum in hydro-melitis sextario. nam biliosa recrementa detrahit, sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur, illiniuntur & ambustis efficaciter.



ANDRO-

NOMINA.
ANDROSÆMVM; Græcis, Ανδρόσαυρον. Italis, Androsæmo.

677

ANDROSÆMVM.

FORMA.

Androsæmum ab hyperic-
eo, & ascyro differt, quod fru-
ticet, ramulis furculosis, ac te-
nuibus, rubentibus virgis, fo-
lijs rutæ, triplo, quadruplo ve
maioribus, quæ trita vino so-
fucco manant. complures in
cacumine alas habet, vtrinque
expâsas pinnatasque, circa quas
flores pusilli, lutei, & in caly-
culis semen papaveris nigri.

LOCVS.

Prouenit in montosis, & Matth.
collibus.

QUALITATES.

Semen aluum purgat, at- Galen. &
qui folia extergunt, & desic- simp. me.
cant.

VIREs.

Semē tritum duarū drach-
marum pondere potum bi-
liosā alui excrementa pellit.
Herba ambustis illita medetur, & sanguinem cohibet.

Vu 3 CORIS,



CORIS, Græcis, *Kōgis*. Italis, *Cori*. Germanis, *Wanzenkraut*.

C O R I S.

F O R M A.

DIOSC. Frutex est folio *Ericæ*, ru-
 Matth. bro, pinguiore, ac minore, nō
 altior dodrante, suavis, odora-
 tus, acris. Flores habet hy-
 perici æmulos, luteo colore,
 sed minores.

L O C V S.

Idem. Nascitur arido solo in col-
 libus, atque montibus.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Aperit, excalfacit, exte-
 nuat, digerit, expurgat.

V I R E S.

DIOSC. Potum semen menses tra-
 hit, & vrinas. Contra Phalan-
 giorum morsus, Ischiadicos,
 & opisthotonicos ex vino po-
 ta auxilio est. horribus ex
 pipere, sed opisthotonicis ex
 oleo aptissime illinitur.



ΑΙΥΓΑ,

ΑΙΥΓΑ, siue Camæpitys. Græcis, χαμαίπυτος. Mauritanis, Hamestheos, seu Camistibius. Italis, Camepitio, & Iua. Germanis, Zelenget sieber. Hispanis, Pimilho, & Iua arctica. Gallis, Tue muscate, siue arterique.

CAMÆPITYS.

GENERA.

Trium est generum.

FORMA PRIMI.

Prima herba est in terra re-
diosc.
pens, subcurua, folijs mino-
ris sedi multo tenuiorib⁹, cir-
cum ramos, frequentibus, o-
dore pinus. Flore tenui, luteo
vel candido. Radicibus cico-
rij. Alterum exit cubitalibus
ramulis in anchora speciem
incuruatis, prætenubus, co-
ma supradicta, flore candido.
Semine nigro, ac etiã pinum
redolet. Tertia Mas nomina-
tur paruula, folijs exilibus, al-
bis, scabris, caule aspero, can-
dido, luteis flosculis, semine
iuxta alas; resipit & hæc pi-
num.

LOCVS.

Nascuntur in campys tum
cultis, tum etiam incultis, &
præsertim exoluro solo. *Matth.*

QUALITATES.

Camæpitys gustu quidem
amatum saporem, acri validio-
rem obtinet. Effe-ctū verò ex-

purgat, abstergitque viscera, plusquam calefacit. Est enim in desiccando ordi-
nis tertij, in calefaciendo verò secundi.

VIRES.

Primi generis Aiuga septem diebus in vino pora regio morbo medetur, & *Galen. 8.*
quadraginta diebus ex oxymelite Ischiadicos sanat. Datur peculiariter vrinae *simp. me.*
difficultatib. Prodest, & renū vitijs, & torminosi. Bibitur cōuenienter foliorū
decoctum contra aconitū. Trita in farina, & cum fico in pilulis sumpta aluum
emollit. apposita ex melle vulnū vitia extrahit, mammarum duritias discutit.
Vulnera glutinat, & vlcera, quæ serpunt ex melle illita cohibet. Vrinam ciet.

Vu 4 CHAMÆ-

CHAMÆPITYS alia, quam nonnulli ad Anthyllidem referunt.

* Folia profert oblōga hirsuta in tres partes diuisa, cauliculus dodrante altiore striatum, in cuius summitate flores purpureos quinis folijs constantes vt buglossi flores sed oblongioribus, habentes in medio stamina praelonga, Lignosa radice sustentatur, & transversa, superiore parte in ramos diuaticata, quibus se propagat, tota planta odorata est & nonnihil amara.

LOCVS.

Prouenit in montibus prope Castelnou, locis valde petrosis.*



Libri Tertij Finis.

BETO-

BETONICA, Græcis, Κέσπον, & Λυγέσσοπον. Arabibus, Chasra. Italis, Betonica, seu Brettonica. Germanis, Detonien. Hispanis, Bretonica. Gallis, Beto-
cne, seu Botoine.

BETONICA.



FORMA.

Caulē fert tenuē, cubiti Diosc. altitudine, aut maiorem, quadratum, folia quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, propē radicē maiora. Flo. Matth. rē in summis caulibus fert spicatum, & rubrum. Radicē fibrosam, & vt veratri tenuem.

LOCVS.

Nascitur in pratis, & montibus, & in pascuis. Idem.

QUALITATES.

Vim habet incidendi: ipsa Gal. 7. enim herba amarior est, & sub-simp. me. acris, id quod & particulaum edita actio ostendit.

VIREs.

Radix ex aqua mulsā pota, Diosc. pituitā vomitione euocat. Folia dari debent mulieribus vuluæ malo opportunis, & ad arcēdos eiusdē strangulatus, ex eadē mulsā denarij pondere: tres eorundem drachmę bibuntur ex vini sextario cōtra scorpionum morsus, quibus & herba illita medetur: eiusdē drachma bibitur vtiliter cū vino ad eb-

bita venena: quin etiam præsumpta eorundē vires abolet: vrinam ciet, aluum subducit: ex aqua pota medetur comitialibus, & insaniis, & iocinoris, lienisq; vitijs ex oxymelite: propinatur acida ructantibus, stomachicis quoq; proderit, si mansæ succum deglutiuerint, & deinde dilutum vinum hauserint: valet sanguinem reijicientibus ex vino diluto sumpta: datur vtiliter ischiadicis, & in renum, & vesicæ doloribus. regio morbo laborantes recreat, menses pellit, drachmę pondere cum vino pota: aluum purgant quatuor drachmę cum oxymelitis decem cyathis. Consistentes in renibus calculos frangit, & pulmonem, Matth. iecur, & thoracem expurgat.

V u s

SERRA-

SERRATVLA, Italis, *Serratola*. Germanis, *Schartenfraut* / *Gerberscharten*.

SERRATVLA.

FORMA.

Math.

Caule constat purpurascen-
re, tenui, ramosoque : folia
gerit antea quàm caulescat
betonica cognata, toto am-
bitu tenuiter serrata, sed vbi
adoleuerit faciem mutant,
nam exortis profundioribus
incisuris, maioris phu qua-
dantenus similia spectantur.
Flores edit in summis ramu-
sculis purpureos, & radicem
multifidam.

LOCVS.

Idem.

Nascitur syluosis locis.

QUALITATES,
ET VIRES.*Idem.*

Datur vtiliter potanda ex
albo meraco ruptis, & ab al-
to deuolutis : in vino deco-
cta, ac deinde illita, vlcera mi-
rifice mundat, carne replet,
& cicatrice obducit : hæmorrhoidum quoq; dolores mulcet foru adhibita : fo-
lia, & radix simul contusa & imposita, enterocellas sanare creduntur.



BISTOR-

BISTORTA, seu Colubrina, Italis, *Bisforta*. Germanis, *Matterburg*.

B I S T O R T A.



F O R M A.

Folijs erumpit primo statim exortu in acutum desinētibz colore subrufo, quæ ubi adoleuerint, ruficis foliareferunt, lauia tamē sunt, & inferna parte subpurpurea & per ambitum sinuata: caulem edit rotundum, tenuem, cubitalē, in quo folia longē minora spectantur: flos in caulis summitate prodit spicatus, ruber, siue subpurpureus, è quo semen gignitur oxalidis proximū: radice nititur quādamtenus arundinacea, sed succosa, & serpentis modo cōtorta. cortice exterius subnigro, sed rubra intus carne, adstringentis gustus.

L O C V S.

Oritur in altis montibus, & *Idem* pascuis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Refrigerat, exiccat, cohibet, roborat. Bibita radix abortum reprimit: ventri, pubi,

renibzsq; ex aceto illita vrinae incontinentiam supprimit. cum succo plantaginis pota, sanguinem è vulnere manantē cohibet, superasperso tamen eiusdem puluere. Idem ex puticorum malorū vino potus, biliosas vomitiones supprimit. præstat potus contra latalia venena, aduersus pestilentiam, & pestilentes febres, in quibus exanthematum notæ emergunt. valet ad puerorum vermes necandos, tum idem radicū puluis, tum earum decoctum potum: Eadem radix cohibet tum cæteras alui fluxiones, tum dysenteriam. additur commodè in potionibus, quæ ad intrinseca parantur vulnera. datur trita ad cruenta expuentibus. cauis dentium indita, cum aluminis & pyrethri momento, non modo dolorem mulcet, sed fluxiones eo decurrentes sistit. valet item ad omnes venenosorum serpentium ictus, ex vino sumpta.

* B I S T O R -

* BISTORTA minor seu Alpina.

FORMA.

Similis est priori, sed multo minor, folia in marginibus pulcre distincta punctulis quibusdam & veluti serrata apparent.

LOCVS.

Crescit in alpidibus & in monte Iura quoque copiose provenit.*



TORMEN-

TORMENTILLA, Italis, *Tormentilla*. Græcis, Επιδυλλος. Germanis, *Tormentill*. Gallis, *Tormentille*.

TORMENTILLA.



FORMA.

Folia promit pentaphylli Matth. minora, septenis incisuris diuisa, radicem breuem, nodosam, compactam, rubro intus colore, sapore adstringenti: cauliculos tenues, subrubentes: flores melinos pentaphylli æmulos.

LOCVS.

Nascitur in montibus. *Idem.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Viribus omnibus insignitur, quibus Bistorta prædita est.

* APPENDIX.

Magna varietas in radice deprehenditur, minima omnium vulgaris est, quæ passim, etiam in planitie reperitur, ea in

hortum translata tuberculum pusillum genuit, quasi nouellam radiculam, ut liquet ex imagine, qua exhibemus etiam illam montanæ quæ non tantum brevis & nodosa sed nonnunquam etiam prælonga, brachiataque inuenitur.*

LYSIMA-

LYSIMACHIA, Græcis, Λυσιμάχιον. Italis, *Lisimachia*. Germanis, Gell Weiderich.

LYSIMACHIA.

FORMA.

DIOSC. Caules emittit cubitales, altiorésve, hirsutos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus. flore rufo, aut aureo.

LOCVS.

Idem. Gignitur in aquosis.

QUALITATES.

Gale. 7. Superantem habet qualitatem adstrictoriâ, per quam vulnera glatinat.
simp. me.

VIRES.

DIOSC. Foliorum succus, sanguinis reiectiones suppressit, dysentericis auxiliatur, tum potus, tum quoque infusus. mensium abundantiam sistit in pello: vulnerum cruorem cohibet: acerrimum nidorem suffusa redolet. qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit. Vis eius tanta est, ut iumentis discordantibus iugo imposita eorum asperitatem cohibeat.



LYSIMA-

N O M I N A.

687

LYSIMACHIA altera, Italis, *Lisimachia secunda*. Germanis, Braun Weiderich.

LYSIMACHIA ALTERA.

FORMA.

Caule provenit recto, qua- *Matth.*
drangulari, bicubitalique, fo-
lijs salicis, flore spicato rufe-
scente.

LOCVS.

Nascitur prope fluentes a- *Idem.*
quarum riuos, & vliginosis
locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Adstringit, refrigerat, co- *Idem.*
hibet, & omnia potest qua &
altera.



POLYGO-

POLYGONUM, Græcis, Πολύγωνον. Aphris, *Basilragi*. Italis *Polygono*, seu *Correggiola*. Germanis, *Beggras*. Hispanis, *Corriola*. Gallis, *Corregiole*.

POLYGONUM MAS.

GENERA.

Matth. Trium est generum. Mas, Fœmina, Minus.

FORMA MARIS.

Diosc. Caules mittit teneros obsequiosos, rotundos, geniculatos, humi graminis modo repentes: folia oblonga, ligularum modo. femine sub folijs turgescite: Flos verò ei candidus, & exiguus.

LOCVS.

Idem. In campis, ædificiorum a-reis, hortis, publicis vijs, ac ferè ubiq; crescit.

QUALITATES.

Gal. 8. Polygonum vti adstrictio-
simp. me. nem quandam obtinet, ita sa-nè vincit in eo aqueum frigidum, vt videlicet secundi sit ordinis refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij: Est & exiccatorium: Est quoq; mas ad omnia validior, quam fœmina.

VIRES.

Diosc. Succus epotus spissat, ac refrigerat. Prodest cruenta excreantibus, cholera, alui fluxionibus, & vrinæ stillicidio. Auxiliatur ex vino potus, serpentium mor-sibus. Fœminarum profluua in potu sistit. Instillatur vtiliter purulentis, do-lorosisq; auribus. Ex vino, & melle decoctus, facit eximie ad pudendorum vl-cera, illita folia stomachi feruores extinguunt, sanguinis reiectiones sistunt, & vl-cera serpentia, sacros ignes: collectiones, tumores, & recentia vulnera sa-nant.

POLYGO-



NOMINA.

689

POLYGONVM fœmina, Græcis, Πολύγωνον θήλη. Italis, Poligono, & Correggiolo
femina. Germanis, Ranten Kraut. Gallis, Pim aquatic.

POLYGONVM FOEMINA.

FORMA.

Vno tantum caule fruticat, DIOSC.
arundini teneræ simili, densis
geniculis, & in se tubarum
modo factis: articulos in or-
bem cingunt apices, foliolis
piceæ similes: radices nullus
vſus.

LOCVS.

In aquosis, & humentibus Matth.
locis prouenit.

QUALITATES, ET VIRES.

Refrigerat, siccatur, inspissatur, DIOSC.
& ad ea quoq; præstat, ad quæ
mas, sed inefficacior est.



Xx

POLY-

POLYGONVM minus, Græcis, Πολύγωνον μικρόν, & nostro tempore, ἀσπερίδα.
Nonnullis mille grana, quibusdam Herniola, vel Herniaria. Italis, *Corneg-
giola minore.*

POLYGONVM MINVS.

FORMA.


Matth. Ramos edit exiles, humi re-
pentes, geniculatosque: folijs
pusillis, longiusculis, semine
pumilo, rotundo, minuto, al-
bicante, racemoso. adeoque co-
piofo, vt vniuerfa planta semi-
ne prægnare conspiciatur.

LOCVS.

Idem. Nascitur arido solo, & in
siccis torrentium alueis.

QUALITATES ET
VIREs.

Idem. Vis illi est conglutinandi,
siccandi, refrigerandi, proin-
de semen potui datum diebus
pluribus, commodissimè præ-
stat ad enterocellas, vniuersæ
plantæ pulvis ex vino haustus,
non solum vrinam cit, sed cal-
culos frangit, vbi diutius su-
matur. * Iecori obstructo
prodest & ictero, quem aqua
eius sanat pota ad octo dies. *



*POLY

* POLYGONON marinum & * cocciferum, Polonis *Kosmaczek*.

F O R M A.



Marinum prouenit viticulis vulgaris polygoni subrubentibus, quæ internodijs nigris distinguuntur & squamulis tenuissimis exalbidis, folia habet magis alba & densiora, flosculi pulchri rufescent & semen gignunt triangulare nigrum, vt oxalis. Radix excedit palmum, dura, lignosa, contorta, crassa, valde nigra.

Cocciferum tenuissimis prodit folijs & mucronatis, cauliculis nodosis exalbidis, & flosculis in summitate candidis inter squamas virescentes. ad radices ipsius coccum adnascitur elegantissimo rubore commendatum.

L O C V S.

Marinum, vbi nascatur cognomento prodit, cocciferum in arenosis Polonia locis reperitur. *

XX 2

POLY-

POLYGONATVM, Græcis, Πολυγόνατον. Italis, *Frasinella*, seu *Ginocchietto*. Germanis, *Weiß Wurß*. Gallis, *Geniculièrè*.

P O L Y G O N A T V M.

F O R M A.

Matth.

Caule est cubitali, rotundo, ac læui, circa quem folia exeunt lauri effigie, sed latiora, strijs compluribus secundum longitudinem protensis, firma, dispari exortu prodeuntia, sapore quadantenus adstringente. flores edit candidos, à quacunque foliorum cavitare: baccas pisi magnitudine, rubentes, & quandoq; purpureas. Radice nititur candida, arundinacea, tenera, frequenter geniculata, digiti crassitudine, summa tellure vagante, sed odore quadantenus graui.

L O C V S.

Idem.

Nascitur in collibus, & montibus.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 3.
simp. me.

Mistam habet tum facultatem, tum qualitatem, habet enim adstrictionis, pariter & acrimoniæ, & amaritudinis quippiam, & indicibilis cuiusdam insuauitatis.

V I R E S.

Diosc.

Matth.

Radix vulneribus efficaciter illinitur, quin etiam maculas in facie delet. Quæ de re mulieres è radicibus aquam stillatitiam parant, quæ ad faciei nitorem vtuntur. sunt & quæ saccharo radices ipsas condiant, ad sistenda alba vteri profluuia.

C E N S V R A.

Manifesto errore ducuntur, qui polygonatum, Arabum *secacul* esse contendunt.

*POLY.



*POLYGONATVM VVLGATIVS.

F O R M A.



Radice nititur candida, nodosa transuersim sub terra serpente, vt prior, succo viscido turgente, quæ verno tempore suos mittit asparos, molles exalbidos, folia in his initio conuoluta, sed postea vbi teretes coliculi grandescunt, explicantur & figuram referunt foliorum Hippoglossi. Ad horum exortus enascuntur flosculi albi nonnihil herbacei habentes, oblongi, qui deflorescentes vertuntur in baccas nigras, hederæ baccis vel vaccinijs nõ abfimiles. in quibus alba duræq; continentur semina.

L O C V S.

Nascitur locis riguis, etiam in planitie.*

Xx ; CLEMA-

CLEMATIS, Græcis, Κλήμας δαφνοειδής. Nonnullis, vinca peruinca. Italis, Prouenca, & Prouencola. Germanis, Singrün. Hispanis, Peruinqua. Gallis, Lyserum.

CLEMATIS.

FORMA.

Matth. Viticulas spargit tenues, laues, humi iacentes, è quibus folia exeunt per interval-
la, pari vtrinq; exortu, robu-
sta, oliua modo oblonga, lau-
ri minora, virentia, è quorum
origine, primo statim vere
flores emicant cærulei. Radi-
ces fundit numerosas, albi-
cantes, summa tellure repen-
tes. Herba est perpetuo vi-
rens.

LOCVS.

Diosc. Nascitur in terrenis, & pro-
Matth. pe sepes, atque in scrobium
ripis.

QUALITATES.

Matth. Refrigerat, siccatur, robo-
rat, cohibet.

VIRE.

Diosc. Folia cum caulibus ex vi-
no pota, alui profluua, & dy-
senterias sedant. Subdita in pecto, cum lacte, aut rosaceo, cruciatibus vulue me-
duntur: dolores dentium commanducata finiunt: imposita, serpentium morfi-
Matth. bus leuamentum præstant. Fœmoribus adalligata viridia folia, mensium abun-
dantiam cohibent. & conceptus adiuuant. Capiti adalligata, & collo, gulæ ve-
circumducta, sanguinem è naribus manantem sistunt. Adduntur quoque utili-
ter vulnerarijs emplastris, & potionibus.



* CLEM̃A.

NOMINA.

695

*CLEMATIS FLORE MVLTIPlici.



FORMA.

Conuenit cum priore tota effigie, sed flore differt, qui multiplici florum farctu spectatur plenior, & è caeruleo magis ad purpureum vergit colorem, peritq; sine semine.

LOCVS.

Allata ex Austria in hortis nostris virefcit.*

Xx 4

CLEMA-

CLEMATIS altera, Græcis, Κληματις ἑτέρα. Italis, *Vit alba porporea.*

CLEMATIS ALTERA.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum, Alterum flore purpureo, Alterum candido.

F O R M A P R I M Æ.

Diosc. Viticulosos fundit caules, rubescentes, lentos: folia hederæ modo diuisa, gustu admodum acri, ac exulcerantia.

Matth. Flores purpureos crucis in modum diuisos. repitque per arbores, vt smilax.

L O C V S.

Matth. Oritur in syluis, & in frutetis, dumerisq;.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6. Folia acrem, adurentem, siue causticam facultatem habent, aded, vt lepras exco-
simp. me. rient: fuerit itaque hæc planta, in quarti ordinis exsiccantium initio.



V I R E S.

Diosc. Semen tritum, pituitam, bilemque, detrahit, in aqua, aut hydromelite porum folia eius illita lepras purgant: cum lepidio conditur ad cibos.

CLEMA-

CLEMATIS tertia. Italis, *Vitalba*. Germanis, *Synen*/Baldreben.

CLEMATIS TERTIA.

F O R M A .

Viticulis repit prælongis, *Matth.*
obsequiosisq; folijs præscri-
ptæ quadantenus similibus,
acrigustu, ac exulcerandi fa-
cultate præditis: floribus ra-
cemosis, candidis, odoratis,
& myrtiadeo similibus, vt dif-
ferentiæ ferè nihil intersit.
Hos deinde capillacea, inca-
naq; sequitur coma, quæ tan-
dem vento excussa, nudum
relinquit fructum, angulo-
sum, simulque compactum:
subnigro colore, atq; acerrimum.

L O C V S .

Nascitur passim in sepibus, *Idem.*
& in sylvis arboribus se cir-
cumvoluens, & per eas re-
pens.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S .

Viribus iisdem præstat, *Idem.*
quibus & superior.

Xx 5 FLAM-



FLAMMVLA, nonnullis Flammula Iouis. Italis, *Flammola*. Germanis, *Blas-
terjug*.

FLAMMVLA.

FORMA.

Matth. Folijs, floribus, fructuque
adeo tertiam clematidem æ-
mulatur, ut nihil prorsus diffe-
rentiæ intercedat: differt ab ea,
quod caules edat rectos, haud
vnquam repentes, sesquicubi-
tales. Folia, & flores acerrimo
sunt gustu, ac admodum fer-
uenti.

LOCVS.

Idem. Nascitur in campis, collibus,
& frutetis.

QUALITATES.

Idem. Excalfacit, & siccat excessu
quarto.

VIREs.

Idem. Cutem, carnemq; semicon-
tusa illita, exulcerat. Ischiadi-
cos iuuat imposita. Idem præ-
stat oleum, in quo folia sub ca-
lente sole diu fuerint macerata, sed rosaceum oleum ad hoc requiritur. Idem
non modo inunctum, sed etiam infusum, opitulatur articulorum iliorumque
doloribus, ac etiam nephriticis. Stillatitia foliorum, & florum aqua, eadem fe-
re acrimonia pollet. Hanc non desunt, qui propinent quartana febre laboran-
tibus, parum ante accessionem.

SYMPHY-



SYMPHYTUM petraeum, Græcis, Συμφύτον πετρεῖον. Italis, *Simplito petreo.*
 * Monspelientes hanc plantam Corin appellant. *

SYMPHYTUM PETRÆVM.

F O R M A.

Ramis exit tenuibus, par- **Diosc.**
 uis, origano similibus, capitu-
 lis, & folijs thymi: lignosum
 totum, odoratum, gustu dul-
 ce, ac adstringens: radice lon-
 ga, subrufo, seu subpurpurea,
 digitali crassitudine. * Hic ap-
 plicata nō astringit, sed amarum
 & nitrosum saporem habet,
 flosculos cæruleos, semina ni-
 gra angulosa. *

L O C V S.

Nascitur in petris, & petro- **Diosc.**
 sis montibus. * Quæ hic pingi- **Matth.**
 tur in littorib. crescit in arena,
 ita ut ferè lateant ramuli & flo-
 res tantum emineant. *

Q U A L I T A T E S.

Ex contrarijs constat viri- **Gale. 8.**
 bus. Habet enim incidendi **simp. me.**
 vim quampiam, qua colle-
 ctum in pectore, & pulmone
 pus expurgare potest. habet
 etiam quandam contrahendi
 vim, qua reiectionibus sangui-
 nis auxiliatur. & tertia ad eas inest humiditas quædam non immodicè calida,
 per quam gustantibus dulce apparet, & odoratu iucundum.

V I R E S.

Decoctum eius ex aqua mulla paratum, potum, pulmonis vitia purgat: san- **Diosc.**
 guinem reiicientibus, & renum malis ex aqua datur ad dysenteriam, rubraque
 feminarum profluvia, in vino decoctum: vulnera recentia, enterocellamq; glu-
 tinat, & illitu cohibet. carnes cum eo decoctæ coalescunt.

SYMPHY-



SYMPHYTUM maius, Græcis, Συμφυτον ἐρέπον. Italis, *Consolida maggiore*. Germanis, *Walswurz* / seu *Schwarzwurz*. Hispanis, *Suelda maiore*, sine *Consuelda maior*. Gallis, *Oreille de Asne*.

SYMPHYTUM MAIUS.

FORMA.

DIOSC. Caulem emittit cubitalem, aut maiorem, crassum, angulosum, inanem: circa quem breui intervacante spacio, folia exeunt oblonga, lataque, buglosso proxima hirtutaque. Caule secundum angulos quosdam striato, ramis tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei, quandoq; verò purpurei, nonnunquam verò albi, diversis in plantis spectantur. Tam caulis, quam folia aspera lanugine horrent, tactuq; pruritus concitant. Radicem fundit crassam, multifidamq; nigro exterius cortice, interna verò pulpa candicat, glutinosoq; succo mader.

LOCVS.

Matth. Nascitur frequens in pratis.

QUALITATES.

Gal. lib. 3. Similem petræo vim habet, non tamen gustantibus dulce est, nec olfacientibus odoratum. Cæterum quatenus viscositatem quandam, & mordacitatem obtinet scillæ simile est, eoque utuntur ad omnia, ad quæ iam dicto.

VIRES.

DIOSC. Tritæ radices & potæ, cruentis excreationibus, ruptisque proficiunt: recentia vulnera illitæ conglutinant; inflammationibus, præsertim sedis, cum secretionis folijs, vuliter illinuntur. Coaluntur etiam carnes cum ijs coctæ. Ossium fracturas sanant, si contritæ imponantur, & stricta fascia ligentur.

*SYM-



N O M I N A.

701

*SYMPHYTUM radice tuberosa.

F O R M A.

Mense Martio flore luteo
prodit colore tantum à prio-
ris flore differens, folia quoq;
similia sunt maiori Symphito
& cauliculi, sed omnia mino-
ra, radice discrepat, quę protu-
berantibus quibusdam nodu-
lis inæqualis est & quoquo-
versum serpit.

L O C U S.

In hortis sponte nascitur
circa sepes.*



Con-

CONSOLIDA media, Hetruscis, Morandola, seu vt alijs, Consolida Mexicana, sine herba Laurentina. Germanis, Gilden Günsel.

CONSOLIDA MEDIA.

FORMA.

Matth.

Folia profert minoris solidaginis, latiora, mollioraq; aduersa parte subpurpurea, caulem pedali longitudine, pilosum, quadrangulum, inanem: flores caeruleos, qui partim inter folia, quæ caulem ambiant, partim in cacumine spicata congerie prodeunt. Radix illi est multifida, haud altè descendens.



LOCVS.

Idem.

Nascitur in hortis, & vineis, alijsq; locis.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem.

Datur vtiliter foliorū succus ab alto deuolutis, item ruptis contractisque, quin etiam ad intestina vulnera, & illinitur ad externa. sanguinis grumos, vbicunque sint, dissoluit. folia in collutionibus addita faciunt ad oris, & gingiuarum vlcera. Idem quoque præstant ad vlcera pudendorum vtriusq; sexus.

CONSO-

NOMINA.

703

CONSOLIDA minor, Prunella. Italis, *Consolida minore*. Germanis, Brumellen.

CONSOLIDA MINOR.



FORMA.

Caulibus exit quadrangulis hirsutis, spithamæ longitudine, folijs menthe proximis, sed subasperis. flores gerit in ramusculorum fastigijs, spicatos, purpurascens, & quandoq; candidos. Radicem multifidam, ac tenuem.

LOCVS.

Prouenit in montibus, col- *Idem*. libus, & ferè vbique.

QUALITATES, ET VIRES.

Additur in medicamentis, *Idem*. quæ parantur ad linguæ, faucium, & gutturis inflammationes, & vlcera. & in omnium morborum vsum venit, in quorum affectibus præstat solidago media, namque suas vires illi conformes habet.

DENTA-

DENTARIA minor, siue Sannicula quinque folia. Italis, *Dentaria minore*.
Germanis, *San Kraut*.

DENTARIA MINOR.

F O R M A.

Matth. Exit hæc folijs pentaphyl-
li, sed longè maioribus: radi-
ce candida. tam miro naturæ
ordine, nodulis, ac lacinijs
quibusdam elaborata, vt
non parùm admirentur, qui
tantum naturæ opus dili-
genter intuentur atque exa-
minant.

L O C U S.

Idem. Nascitur in montibus, syl-
uosis locis.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Idem. Radix glutinat, cohibet,
roborat. Eadem datur vili-
ter potanda ad enterocellas,
quotidie drachmę pondere,
ex vino austero diebus qua-
draginta continuis. præstat
quoque ad interna vulnera,
cum thoracis, tum etiam in-
testinorum, ex aqua equiseti
eodem pondere sumpta.



NOMINA.

705

DENTARIA maior, Græcis, Ἀφύλλω, quodd sine folijs proueniat. Germanis,
Dnblat/Schupentwurk.

DENTARIA MAIOR.

FORMA.



Germinat primo statim ve- *Matth.*
re: caules profert dodranta-
les, teneros, fragiles, succo-
sos, orobanche quadamtenus
æmulos. In quibus à medio ad
summum flores exeunt sub-
purpurei, hirsutiq; è quibus
calyculi oriuntur, exiguo in-
tus semine. Radice consistit al-
bicante magna, succosa, fragi-
li, compactili squamarum cõ-
gerie, miro sanè naturæ artifi-
cio, acerbò gustu ac subama-
riusculo.

LOCVS.

Prouenit in opacis syluis, *Idem.*
& alijs umbrosis locis.

FACULTATES, ET VIRE.

Adstringit, refrigerat, & *Idem.*
abstergit; deuorata verò sopo-
rem facit.

* Magnus vsus Aquæ destil-
latæ in fluxibus & Epilepsia. *

Yy

AVRI-

AVRICVLAVRSI, siue Sannicula altera. Italis, *Orecchia de Orso*. Germ. *Bergfarnickel*/Subsimlein.

AVRICVLAVRSI.

FORMA.

Matth. Folia fert plantaginis, sed carnosiora, sensim per ambitum sinuata subflauis circumqua; oris: caulem edit, & flores primulae veris vocatae per omnia similes, odoris eximij: Radice nititur multifida, albicante, Ellebori modo fibrata.

LOCVS.

Idem. Nascitur in altis, & saxosis montibus, inter ingētia saxa.

FACULTATES, ET VIRES.

Idem. Refrigerat, siccatur, glutinat, cohibet: Pota herba cum radicibus enterocellis vtiliter medetur: ac etiam intrinsicis quibuscunq; vulneribus tum herba ipsa deuorata, tum in potionibus addita. Folia recentia vnā cum radice tusa, atq; supposita nō solum mensum abundantiam cohibent, sed vuluam mirum in modum concludunt.



HOLOSTI-

NOMINA.

707

HOLOSTIUM quorundam, sine Holestium, Græcis, *Ολίστιον, ὁλίστιον*. Italis, *Holestio*.

HOLOSTIVM.

FORMA.



Folia habet longa duarum vel triumvnciarum digiti, latitudine ferè digiti, incana, pilosa & altringentia. Radix ei longa, crassa nigricans, caules vnius palmi in quo flores & semina similia cornu cerui vel plantagini.

LOCVS.

Nascitur in collibus prope Monspelium, secus vias.

QUALITATES.

Gal. 7. simpl. Suo Holoſteo deſiccâdi vim, cum adſtrictione tribuit.

VIRES.

Vſus eius ad rupta efficaç eſt in vino pota. Nam & carnes coguntur, quæ cum ea cõferbuerint.

APPENDIX.

* Non facimus Holostium hoc genuinum, sed notius pro minus noto autotis substituimus.*

Yy 2 Pilo-

PILOSELLA, Italis, Pelosella. Germanis, Meus. Dhr. Gallis, Piloselle, seu Oreille de Rat.

PILOSELLA.

FORMA.

Matth.

Planta est humi decumbens, radiantibus circumquaq; folijs, oblongis, incanis, euidenter pilosis, cauliculos repentes mittit funiculi faciem referentes, hirsuta canitie obductos: flores aureos stipatos, qui maturescences in papposam lanuginem euolant. Radicibus nititur numerosis tenuibus, humi pertinaciter inhaerentibus. Lactem succum fundit amaro sapore.

LOCVS.

Idem.

Nascitur extenuato, & arido solo, in collibus, & incultis locis.

QUALITATES.

Idem.

Lacteus eius succus amaro est sapore, id quod extenuantis facultatis, atq; etiam abstergentis inditium præbet. Herba gustu est adstringenti, glutinat, cohibet, refrigerat, siccatur.

VIRES.

Idem.

Dysenterias, & vteri profluvia sistit: ex vino austero pota, vulnera tam intrinseca, quam extrinseca sanat: auxiliatur celiacis, & biliosa vomentibus, quin etiam enterocellis, sanguinem reiicientibus, & omnibus in vniuersum fracturis. Additur vtiliter in vulnerarijs emplastris, & vnguentis. Foliorum succus non solum recentia vulnera sanat, sed etiam vulnera quoq; contumacia, & præsertim oris, & pudendorum.

*PILO-



*PILOSELLA maior, Italis *Pelosella maggiore*. Germanis, *Groß Meißboh.*

PILOSELLA MAIOR.

FORMA.

Priori non est absimilis sed multo maior, erectiorq; nec tam canis folijs, quamquam satis hirsuta hæc sint, & pilis obsita. Longitudine digitum superant, cauliculi florem sustinentes vltra dodrantem asurgunt cæteri repunt vt in præcedente.

LOCVS.

Ad riuulos in aggeribus herbosis nasci gaudet.

VIREs.

Valet ad dysenterias, vulnera, sanguinis vomitum, enterocelas, siue pota siue imposita, extrinsecus. Eius aqua etiam vtiliter in doloribus mammillarum adhibetur. Et vt summatim dicam, eadem potest quæ prior.*



Yy 3

SCABIO-

SCABIOSA, Italis, *Scabbiosa*. Germanis, *Apostemen Kraut*. Gallis, *Scabieuse*.

SCABIOSA.

GENERA.

Matth. Duum est generum. Maior
& Minor.

FORMA MAIORIS.

Idem.

Primo statim exortu folia
profert oblonga, minimè la-
ciniata: ceterum, quæ his suc-
cedunt, plu maioris modo in-
cisa spectantur: quæ verò in
caule, & ramis sunt, longè mi-
nora, ac magis dissecta vifun-
tur: capitula summis caulibus
profert in acutum desinen-
tia, compactili squamarum
ordine obducta, Cyani mo-
do, è quibus flores prodeunt
etiam similes, sed ex purpura
subrubentes. Radicem habet
pollicari crassitudine, & sæpe
maioris brachiatamq; saepe
retubulci, pastinacæ proxi-
mo.

Locvs.

Idem.

Nascitur inter fruges, & in
campis non cultis argillaceo solo.

QUALITATES.

Idem.

Excalfacit, extenuat, aperit, digerit, abstergit.

VIREs.

Idem.

Radix valet peculiari quadam dote mirificè ad lichenofos, etiam si morbus
à Gallica lue prouenerit, si eius decoctum morbofi bibant quotidie in quadra-
gesimum diem vsq; sex vnciarum pondere. Idem præstat eiusdem radice pul-
uis quotidie drachmæ pondere ex sero haustus.

SCABIO-



NOMINA.

711

SCABIOSA minor, Græcis, *Ψάρα*. Italis, *Scabiosa minore*. Germanis, *Apostemen Kraut*.

SCABIOSA MINOR.

FORMA.

Folij crescit inferioribus *Mattb.* per ambitum denticulatis, humi accubantibus, subalbican-
tibus, oblongis, & subhirsutis, verum quæ in caule sunt, tenuiora, & magis diuisa spectantur. Caulem mittit
tenuem, teretem, rectum, ramosum: flores caruleos, stipatos, aut pallidos, è quibus
capitula oriuntur colore subviridi, speciosis obducta oculis. Radix est illi palmaris,
multifida, subcandicansq;

LOCVS.

Nascitur in agris non cultis, secus itinera, & in collibus terrenis.

QUALITATES.

Sapore est amaro: quare ex *Idem.* calfacit, extenuat, abstergit, aperit, & crassa, lentaq; expectorat.

VIRE.

Herba ipsa in puluerem pota, aut succus ex melle delinctus, pectus, & pulmones abstergit, crassaq; æ glutinosa per os eijcit. *Idem.* Idem præstat eius decoctum
porum. scabiem sanat. Id quod & succus facit in vnguentis additus. Folia cruda
contusa, & pestiferis carbunculis admoda, mirifice eorum perniciem coercent:
Datur vtiliter earundem succus, quatuor vnciarum pondere, cum theriacæ
drachma pestilentia affectis, prima statim die, verum à potione ægros sudare
oportet: & iterum, atq; iterum medicamentum repetere. Datur item contra
serpentium venenosorum morsus, herba verò exterius imponitur. Illitus scabiosæ
succus, cum chrysocolle, & caphuræ momento, lentigines, alphas, impetigines,
& cæteras cutis infectiones abstergit, oculorumq; per se, & cum succo
fœniculi, albugines delet.

YY 4

CLYME-

CLYMENVM, Græcis, Κλύμενον. Italis, Climeno.

CLYMENVM.

FORMA.

Diosc. Caulem fert fabæ, quadra-
tum, folia plantaginis, follicu-
lis supra caulem in sese infle-
xis, vt in polyporum cirrhis.

LOCVS.

Matth. Nascitur incultis locis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Diosc. Succus è tota planta expres-
sus efficax est ad sanguinis re-
iectiones, & ad caliacos affe-
ctus, fœminarum profluvia
cohibet: sanguinem è naribus
erumpentem sistit: trita folia,
aut filiquæ, recentibus vulne-
ribus illitæ, ea ad cicatricem
perducunt.

CENSURA.

Errant qui saponariam, vul-
go dictam clymenum faciunt.
ceterùm tametsi ego minimè
comptum habeam, quæ nam planta legitimum sit clymenum, volui tamen
hanc imaginem hic ostendere, vt de ea aliorum quoq; sit iudicium.



PERI-

NOMINA.

713

PERICLYMENVM, Græcis, Περικλόμενον. Italis, *Matriſelua*, seu *Vinciboſco*. Germanis, *Geißblatt*. Hiſpanis, *Madreſylua*. Gallis, *Vinciboſſe*.

PERICLYMENVM.

FORMA.



Simplex fruticat, exinter- DIOSC.
uallis parua folia habens, i-
pſum amplectentia, ſubcan-
dida, hederaceaque: inter fo-
lia ſurculi exeunt, in quibus
baccæ hederæ ſimiles: ſlos fa-
bæ candidus, aliquantulū ro-
tundus, & quaſi in folium pro-
cumbens: ſemen durū, quod
nō facile euellatur, radice ro-
tunda, craſſa.

LOCVS.

Nāſcitur in aruiſ ac ſepi- Idem.
bus, conuoluēſ ſe adminicu-
liſ propè emergentibuſ.

QUALITATES.

Tum fructuſ, tum folia v- Gal. li. 8.
tilia ſunt, aded vehemēter in- ſimp. me.
cidentiſ, ſimul & excaſfacien-
tiſ facultatiſ, vt ſi pluſculum
bibantur, vrinā ſanguinolē-
tam cicant: ſemen quoq; de-
ſiccāt.

VIREſ.

Maturum ſemen in vmbra ſiccatur, ſi drachmę pondere detur in vino qua- DIOSC.
drageniſ diebuſ, lienem abſumit, laſſitudinem diſcutit, ſed vrinam ciet ſtatim à
ſexto die cruentam: Orthopneæ, & ſingultui prodeſt, partum accelerat. Folia
ſunt iſdem viribuſ prædita, quæ triceniſ ſepteniſ diebuſ pota, ſterilitatem fa-
cere produntur. Eadem ex oleo peruncta, febrim alгореſ abigunt. Folia & Matth.
earum ſuccuſ, veniunt vtiliter in vnguenta, quæ ad capitiſ vulnera parantur, &
ad vlcera quæ in cruribuſ eueniunt.

Yy 5

TRIBV-

TRIBVLVS, Græcis, Τριβύλλος. Italis, Tribolo. Arabibus, Hafach. Germanis, Erdstetten/Burgelborn. Gallis, Saligotz terrestres.

TRIBVLVS.

G E N E R A.

Diosc. Duum est generum. Terrestris, & aquaticus.

F O R M A T E R R E S T R I S.

Idem. Folij exit portulacæ proximis, tenuioribus tamen: viriculis longis, in terra stratis: spinis secundum folia, rigidis, præduris.

L O C V S.

Idem. Iuxta amnes, & rudera nascitur.


Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. In terrestri superat terreū
simp. me. frigidum, quod & adstringēs fuerit. Fructus tenuiū est partium, quare calculos in renibus comminuit.

V I R E S.

Diosc. Drachma terrestris tribuli pota, illitave ictos à vipera recreat, contra venena, cum vino aptissimè bibitur. Decoctum eius sparsum pulices necat. Cartera cum aquatico communia habet.

TRIBV.



TRIBULVS Aquaticus, Græcis, Τρίβυλος ὕδατος. Italis, *Tribolo aquatico*. Germanis, *Wassernuß*. Hispanis, *Abroyos*, seu *Abrollos*. Gallis, *Castaignes d'Eau*.

TRIBULVS AQUATICVS.

FORMA.



Folijis prouenit latis, subro *Matth.* tundis, crassis, & aduersa parte maculosis, nervosis, & per ambitum serratis, prælongis, & crassis pediculis nitētibus. Caulem edit crassum, pinguē, sed in summitate longè vegetiorem. Fructum profert nigrum, castaneæ magnitudine, triplici armatū mucrone, putamine membranoso, alba intus medulla, castaneæ sapore. Radix illi prælonga, comantibus spicatis capillamentis.

LOCVS.

Nascitur in fluminibus, la- *Idem.* cubus, & in mari.

QUALITATES.

Ex humida essentia modicè *Galen.* 7. frigida, & sicca non mediocriter, & ipsa frigida cōponitur.

VIREs.

Inflammationes omnes cataplasmate iuuat: vlcera oris, gingiuas, tonsillasq; *Diosc.* perlanat. Thraces Strimonæ amnis accolæ, eius pabulo equos sagināt, è fructu verò esculentum faciunt panem.

SAXIFRA-

SAXIFRAGA, Græcis, Σαξίφραγος. Italis, *Saxifragia*. Germanis, *Steinbrech*.
Gallis, *Perce pierre*.

G E N E R A.

Math. Plura, diuerſaſque reperiuntur genera, quorum nos quinque describemus.

F O R M A P R I M Æ.

Diosc. Frutex eſt furculoſus, thymo ſimilis.

L O C V S.

Idem. In petris, & aſperis locis naſcitur.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. In vino coctus, mox potus, febricitantibus opitulatur. Straguriæ prodeſt, ſingultum ſedat, calculos veſicæ frangit, & vrinam ciet.

SAXIFRAGA.



SAXIFRA-

SAXIFRAGA secunda, Italis, *Saxifragia secunda*.

SAXIFRAGA SECVNDA.

FORMA.



Folia in cauliculis per inter-
ualla gerit parua, angusta, ac-
lôgiuicula, cunilæ æmula, con-
comitatibus alijs longè mino-
ribus, in cacumine tamen co-
piofiora sunt: & breuiorib. in-
teruallis distincta, flores edit in
summis caulibus purpureos,
odoris non iniucundi.

LOCVS.

Prouenit in saxis, & saxosis *Idem*.
locis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Cit vrinam, calculos in re- *Idem*.
nibus frangit, & eijs cit, visum a-
cuit, si edatur.

*APPENDIX.

Cùm nondum visâ mihi es-
set eiusmodi Saxifraga, qualem
autor hic depinxerat, malui

substituere hanc plantam, quæ Saturcia durior nonnullis vocatur, quam igno-
tam effingere, præsertim cum deliniationi pulchrè conueniret. Prouenit enim
Monspelij non longè à Castelneuf in montibus inter saxa: Folia habet multò
duriora, & minora, quàm cunila vel saturcia fatiua & à radice plurimos emittit
ramos tenues foliosos, spicam similem ferè hyssopo, in qua sunt flores albi, solo
colore differentes ab Autoris descriptione: tota plâta viridior est Saturcia, nec
ita nigricans. Radix valde lignosa, & hortorum cultui facilè assuescens, ac per
hyemem durans.*

SAXIFRA-

SAXIFRAGIA tertia. Italis, *Saxifragia terza*.

SAXIFRAGIA TERTIA.

FORMA.

Matth. Folia mittit capillacea, fœniculæmula, sed longiora, tenuiora, rarioraq; caulem pariter fœniculaceum, sed tenuè ac pumilum, umbellâ in summitate, semine petrosilini vulgaris simile, sed longiusculo, & odorato. Radicem albicantem, pastinacæ sapore.

LOCVS.

Idem. Nascitur in magnis faxis, & sicco ac extenuato solo.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Excalfacit, attenuat, aperit, prouocat, abstergit. Tota plâta subacris est, & subdulcis. Radix yrinam ciet, & menses quouis modo sumptæ visum acuit, & obstructions iecoris referat.



SAXI.

SAXIFRAGIA quarta. Italis, *Saxifragia quarta*. Germanis, *Weisser Steinbrech*.

SAXIFRAGIA QVARTA.

FORMA.



Folijs est terrestris hædere, *Matth.* minoribus tamen, circumseratis, humi accubantibus. Cauli tenui, rotundo, recto, piloso, dodratali, à quo rari oriuntur ramuli, in quib. flores panduntur candidi, ocimoidis modo, è quibus nullum oritur semen. Radix illi multifida, tenuisque, in cuius fibris grana quædam rotunda, albicantia, ac subpurpurea coriandri seminis magnitudine spectantur, quæ eius esse semen quidam affirmant. Mira sanè plantæ natura, quòd semen in radicibus gerat.

LOCVS.

Nascitur locis non cultis, *Idem.* sterili solo, ac pariter inter saxa.

QUALITATES.

Grana, quæ radicibus hæ- *Idem.* rent, amara sunt. Ideoque excalfaciunt, attenuant, absterunt, aperiunt.

VIRES.

Herbæ & radicis decoctum ex albo meraco paratum, renum calculos frangit & educit: vesicam mundat, & vrinam prouocat, efficacius tamè, si ex eodem decocto granorum radicum farina drachmæ pondere propinetur. Cæterum longè felicius curatio succedit, si bibatur medicamentum, dum affecti balneo se fouent.

SAXIFRA-

SAXIFRAGIA magna, Italis, *Saxifragia maggiore.*

SAXIFRAGIA MAGNA.

F O R M A.

Matib.

Caule est lignoso, contorto, digiti crassitudine, duris, densisque furculis, ipsisq; tenuibus, stipato: folia fert exigua, oblonga, in acutum definentia, flosculos albos, & calyculos exiguos, ocimoidis modo, ore circumquaq; serrato, in coronæ modum, in quibus semen continetur rubrum admodum exiguum. Radix in petris adeo pertinaciter concluditur, ut inde auelli non possit, nisi mucronatis ferramentis.

L O C V S.

Idem.

Prouenit in saxis, & antiquis urbium mœnijs.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.*Idem.*

Mirificè tota plâta calculos comminuit & expellit.




LIMO-

NOMINA.

721

LIMONIVM, Græcis, Αιμωόριον. Italis, Limonio. Officinis, falso Behen rubrum.

LIMONIVM.



FORMA.

Folia habet betæ, tenuiora, Diosc. & longiora, decem, & sæpe plura, caulē tenuem rectum, feminibus rubris scatentem, adstringenti gustu. Radix est Matth. illi vegeta, rubraq;.

LOCVS.

Nascitur in pratis, & palu- Diosc. stribus.

QUALITATES.

Semen utpote austerum au- Galen. 7. xiliatur, ubi adstrictione sit o- simp. me. pus.

VIREs.

Semen tritum, & ex vino a- Diosc. cerabuli mensura potum, dy- sentericos ac cæliacos iuuat: quin etiam rubra foeminarum profluvia sistit, & sanguinem expuentibus subuertit.

CENSURA.

Explodenda est seplatiariorum opinio, qui Limonij radicem, Behen rubri Galen. vice in medicamentis supponunt. Cæterum longè melius facerent, si bistortæ radice vterentur.

Zz

LIMO-

Non defunt rei plantariae
scriptores: qui plantam, cu-
ius hic imago spectatur, limo-
nium faciunt. De qua poterit
esse etiam aliorum iudicium.



PYRO-

NOMINA.

PYROLA, Italis, *Pirola*. Germanis, *Wincergrün*.

PYROLA.

723

FORMA.



Folijs est pyri, minoribus *Matth.* tamen, ac perpetuo virecentib⁹, caule dodrantali, tenui, tereti, in quo per intervalla flores spectantur candidi, stellæ figura, capillamentis è medio emergentibus: Radix & illi subalbicans.

LOCVS.

Nascitur in montibus vni- *Idem.* brosis, & in syluis.

QUALITATES, ET VIRE.

Deficcat, adstringit, glutin- *Idem.* nat: Foliorum succus illitus recentia vulnera sanat. *Idem* præstant & folia. Eorundem quoq; decoctum ex vino paratum, sanat potum intestina vulnera, quare additur commodissime vulnerarijs potio- nibus.

Zz 2

LAGO-

LAGOPVS, siue pes Leporinus, Græcis, Λαγώπους. Italis, Lagopo, seu Pie di Lepo-
pre. Germ. Hasenpfötlin.

LAGOPVS.

FORMA.

Diosc. Herbula est caule tenui,
hirsuto, rotundo, ramoso, fo-
lijs trifolio proximis, sed mi-
noribus. Paniculis in summi-
tate villosis, & tractu mollibus,
perinde ac leporini pedes.

Matth.

LOCVS.

Diosc. Nascitur in campis inter se-
getes.

QUALITATES.

Galen. 7. Qualitatis est, exiccantis,
simp. me. adeo, vt fluxus alui probè ex-
iccet.

VIRE.

Diosc. Adalligatur tota planta in-
guinibus contra eorum in-
flammationes. Folia, & pani-
culæ dantur vtiliter ex vino
austero, aut ex succo punici
mali contra dysenteriam. vni-
uersæ plantæ decoctum, ad-
ditis malæ folijs è dulci vino paratum, datur commodè ad vesicæ morbos, &
vrinæ ardores: semen auxiliatur sanguinem reiicientibus. Peculiariter cinis illi-
tus hæmorrhoidas fluentes sistit. Sunt qui paniculis vtantur ad extergendam
dysentericorum sedem.

Matth.



CARYO-

CARYOPHYLLATA, Italis, *Garofanata*. Germanis, *Benedictenwurk*. Gallis, *Benoyste*, *Galliot*, seu *Resi* 7g.

CARYOPHYLLATA.



GENERA.

Trium est Generum, Campestre, palustre & Montana.

FORMA CAMPESTRIS.

Folia fundit subaspera, hirsuta, tripartita: duobus etiam longè minoribus auricularum instar in posteriori parte adnatis, atq; omnibus per ambitum laciniatis: caule est ramoso, rotundo, haud crasso, sesquicubitali, geniculato, subasperoque: floribus aureis, pentaphyllis æmulis, villosis: succedentibus inde capitulis, in quibus semen continetur. Radicibus nititur copiosis, tenuibus, sub rufis, caryophyllorum odorem spirantibus.

LOCVS.

Nascitur secus vias, propè hortorum, & agrorum septimenta, locis potius opacis, quàm apricis.

QUALITATES.

Radix, cuius est usus, excalfacit, & siccatur, aperit, & roborat.

Idem.

VIRES.

Radices præstant ad sananda vulnera, & vlcera, & præsertim ad intrinseca vulnera, si in potionibus addantur. Earundem succus cum æruginè infusus, præstat ad cuniculosa vlcera. Eadem olfactu vitales spiritus recreant, & frigidum iuvant cerebrum. Earundem pulvis epotus, prodest celiacis, dysentericis, & sanguinem expuentibus.

Zz ;

*CARYO-

*CARYOPHYLLATA aquatica. Germanis, Wild Benedictwurz.

CARYOPHYLLATA AQUATICA.

FORMA.

Folijis caule & nascendi figura similis est hæc plāta præcedenti Cariophyllatæ, ut vix dignosci queat. Verum discretantiam facit radix dodrantalis, digiti crassitudine minus fibrosa, colore purpurascente, & sapore amariuscule sine manifesto odore. Deinde flores pallecentes, nonnihil purpurei habentes, qui nolæ effigiem repræsentant. Tandem semen pilosum grandius capitulum efformans, quam quod campestris Cariophyllata gignit, quod plerumque etiam calyci purpureo à flore decidente relicto insidet. Huius flores aliquando pluribus folijs insignes sunt & rubent magis, ac folijs inferne quinis aut senis herbaceis pulcre coronantur.

LOCVS.

Nascitur in syluis & pratis humectis, alijsque locis palustribus.*



CARYO.

N O M I N A.

727

CARYOPHYLLATA montana. Italis, *Garofanata saluatica*.

CARYOPHYLLATA MONTANA.

FORMA.



Folia gerit alterius crassio- *Matth.*
ra, crispiora, hirsutioraq; plu-
ra ab vna radice prodeuntia,
longisq; pediculis inharren-
tia. tactu subaspera, & circum-
quaque laciniata, humiq;ue
procumbentia. Caules tenu-
es, nullis adnatis ramis, in qui-
bus pusilla, sed rara folia spe-
ctantur. In caulium summita-
tibus vnicus tantum flos emi-
cat aureus, pentaphylli simi-
lis. sed maior paulò, qui flac-
cescens, pinnatum efficit or-
bem, non paruo naturæ opi-
ficio: Radice nititur dodran-
tali, digiti crassitudine, sub-
rufa: caryophyllorum odore.

LOCVS.

Nascitur in Boemia mon- *Idem.*
tibus, è quibus Albis fluius
oritur.

QUALITATES.

Radix non solum exalfacit, & siccat, sed etiam cohibet, ac roborat.

Idem.

VIRES.

Idem cum altera pollet viribus, sed præstantioribus.

Idem.

Zz 4

CORTV-

CORTVSA, Italis, *Cortusa*.

CORTVSA.

F O R M A.

Matth.

Folijs provenit ferè vitigineis, sed longè minoribus, subrotundis, atq; subasperis, adstringenti quadantenus sapore, caules edit tenues, rectos, glabrosq; in quorum cacumine flores exeunt exterius purpurei, interius verò aurei, staminibus pariter aureis referti: Radices fundit numerosas, tenues: ac longas. Est etiam quæ violaceos, & quæ candidos flores gerat. sed prima frequentior habetur.

L O C V S.

Idem.

Nascitur locis umbrosis, cretaceo, & albicante solo.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Tota planta dum recens est, gratissimo fragrat odore, mellei faui ferè simili, sed longè admodum graviori: in sicca verò odor evanescit: subtile est partium, qua re exalfacit magis recens, quàm sicca; primo tantum excessu.

V I R E S.

Idem.

Mulcet nervorum, & articulorum dolores; à quavis causa oriantur. Ad hoc autem macerantur flores recentes in oleo dulcium amygdalarum, & rosaceo, quod completum vocant, diuq; insolantur. Oleum egeli dum deinde illini præstat, repetitijs illitionibus.

M E D I-



MEDIVM, Græcis, *Μήδιον*. Italis, *Medio*, nonnullis *Viola marianna*. German. *Blö-
ckenblum*.

MEDIVM.



FORMA.

Folia habet intubi, caulem *DIOSC.*
tricubitalem, & in eo florem
grandem, purpureum, rotun-
dum, semine Cnici simile, mi-
nuto: Radicem dodrātalem:
crassitudine baculi, gustu a-
cerbo.

LOCVS.

In saxosis & opacis nasci- *Idem.*
tur.

QUALITATES.

Medij radicem contra atq; *Gal. li. 7.*
semen ipsum temperatū esse *simp. me.*
contingit: nam illa quidē au-
stera est, & fluxiones cohibet,
cū alias, tum profluuiū mu-
hebre. At semen tantū abest,
vt tale quid efficiat, vt etiam
mēses cieat, vt pote, quodd te-
nuium partium, & incidentis
est facultatis.

VIREs.

Radici farina, ex melle cocta, rubros fœminarum mēses cohibet, eclegma- *Idem.*
te per aliquot dies sumpto, semen verò in vino potum eisdem pellit.

ANNOTATIO.

Medium folijs iridis prouenire deprauatus Dioscoridis Codex legit: At Ori- *Matth.*
bafius, qui ab eo transcribit, non irides, sed feridis folijs ipsum prouenire ait,
quodd in suo Dioscoridis exemplari legerit, *feridis*, non autem, *iridis*, cui & nos ad-
stipulamur.

Zz 5

GLADIO-

GLADIOLVS, Græcis, *Ξιφίολος*. Italis, *Gladiolo*. Senensibus, *Monacucce*. Mauritanis, *Kassiron*. Germanis, *Schwertel*. Gallis, *Glaius*, sive *Glaiet*.

GLADIOLVS.

FORMA.

Matth.

Folia ei sunt iridis, breuiora tamen & angustiora, striata, & in mucronem desinētia. Caulis cubitalis, leuis, succosus, in quo flores exeunt purpurei paribus spatij vtrinque distantes, Iridis emulsi, sed longè minores: colore vero puniceo diluto, è quibus rotundum prouenit semen: Radicibus cohaeret geminis, bulbosis, rotundis, pressis verticillari specie, altera, alteri insidente. Hæ capillaceo conteguntur inuolucro, subrufoque.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in aruis, & inter segetes.

QUALITATES.

Galen. 8. Radix quæ superior est, attractiua, humentem, digerentem, & exiccantem facultatem habet.

VIRES.

Diosc. Superior radix cum thure illita, admisto vino, spicula, & aculeos è corpore eximit: panos cum Lolij farina, & hydromelite discutit: mēses supposita trahit. Eadem ex vino pota venerem stimulat. Contrà verò inferior, quippe quæ sterilitatem faciat. Datur superior vtiliter cum aqua potanda ad puerorum enterocellam.

ANNOTATIO.

Tametsi scripserit Dioscorides superiorem gladioli radicē inferiorem magnitudine superare, plerumque tamen contrarium visitur.

* GLADIO-



*GLADIOLVS Indicus quibusdam vocata planta, vel Canna Indica.

GLADIOLVS INDICVS.

FORMA.



Folia ei sunt pulcra, lara, venosa, in mucronem collecta, inferna sui parte caulem ambiētia. Caulis in multam altitudinem attollitur, laevis arundinaceus, in quo flores exeunt pulchrè rubentes, Gladioli ferè florib. similes, aut cancrorum forpiculas quodammodo referentes, è quibus rotundum, nigrumque prouenit semen. Radicibus nititur multis, nodosis, in capita rotunda protuberantibus.

LOCVS.

Nascitur in riguis, & apud nos hortulanorum diligentia eget, vt in fictilibus inie-me rectè afferuetur.*

SPARGA-

SPARGANIVM, Græcis, Σπαργάνιον. Italis, Sparganio. Mauritanis, Safarheramon.

F O R M A.

DIOSC. Folia habet gladioli, sed altiora, & in terrâ magis procumbentia, in summo caule veluti pilulæ prominent, in quibus semen.

L O C V S.

Matth. Nascitur ad montium radices, humecto solo, & circa feros.

F A C U L T A T E S.

Gal. li. 3. Et ipsum desiccantis est fassimp. me. cultatis.

V I R E S.

DIOSC. Datur radix ex vino contra serpentium venena.

C E N S V R A.

Quâquam ferè omnes, qui de materia medica scripserunt, hanc plantam sparganium faciunt, nos tamen non parum dubitamus, an rectè senserint, quum hæc folia gladioli latiora gerat, non angustiora, sursum spectantia, non humi procumbentia.

SPARGANIVM.



XYRIS.

XYRIS, Græcis, *Eugis*. Italis, & vulgo, *Spatola fetida*. Germanis, *Wandscuss*.
frant. Hispanis, *Lirio spadanal*. Gallis, *Glaicul*.

XYRIS.

FORMA.



Folia habet Iridis latiora, Diosc.
& in cacumine mucronata, e
quorum medio caulis erum-
pit satis crassus, cubitalis, ex
quo siliquæ triangulares de-
pendēt, in quibus purpureus
flos, & in medio puniceus, se-
mē in folliculis simile fabis,
rotundum, rubrum, acre. Ra-
dix longa, geniculata, rufa.

LOCVS.

Nascitur in aquosis, & hu- Matth.
meis locis.

QUALITATES.

Tenuium est partium, at- Gal. li. 7.
tractorix, digerendi, ac nimi- simp. me.
rum etiā desiccandi est facul-
tatis, cum radix, tum multo
etiam magis eius fructus.

VIREs.

Valer ad capitis vulnera,
fractaq; efficax est: aculeos, &

spicula omnia, citra molestiam extrahit, adiecta floris aeris tertia parte, & radi-
cis centaury, & mellis quinta: tumoribus, & collectionibus illita cum aceto
medetur. Radix bibitur ex passo ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores: stran-
gurias, & alui profluuia: semen tribus obolis potum, vrinam vehementer im-
pellit, & cum aceto lienem absumit.

ANCHV-

ANCHUSA, Græcis, *ἄνθησα*. Italis, *Anchusa*. Germanis, *Rot Ochsenzungen*. Hispanis, *Sigem*. Gallis, *Orchanette*.

ANCHUSA.

GENERA.

DIOSC. Trium est generū, magnitudine, & exilitate foliorum, & caulium differentium.

FORMA PRIMÆ.

Idem. Folia habet lactucæ, in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoque versum humi sparsa, spinis horrida. Radici crassitudo digitalis, quæ estate provenit, & manus inficit sanguineo colore.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur lato solo, & locis
Matth. incultis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Radicem habet admodum
simp. me. refrigerantē, & desiccantem, tum adstringentem, & subamaram, tum quæ sufficiat extenuandis, & extergendis humoribus, corporibusque condensandis. Folia radice quidem sunt imbecilliora, cæterum adstringunt & ipsa, & desiccant.

VIRES.

Diosc. Radix adstringit: ex oleo, & cera, efficax est ad ambusta, & vetera vlcera. Medetur igni sacro, cum polenta illita. Illinitur quoque ex aceto, lepris, & vitiliginibus: partus supposita extrahit. Datur eius decoctum vtiliter potandum calculosis, lienosis, & bile suffusis, & si febris sit ex aqua mulsæ. Folia ex vino pota aluum sistunt.

ANCHV-



NOMINA.

735

ANCHVSA altera, Græcis, ἄλχησα ἡρίχα. Italis, *Anchusa secunda*.

ANCHVSA ALTERA.

FORMA.



Minoribus hæc exit folijs, Diosc.
quàm prima, similiter tamen
asperis: ramulis exilibus, in
quibus flos purpureus in pu-
niceum vergens conspicitur.
Radices habet rubras, præ-
longas, quæ messibus sangui-
neum succum fundunt.

LOCVS.

In sabulosis nascitur.

Idem.

QUALITATES.

Calidior altera est, & ma- Galen. 6.
gis medicata: nam plusculum simp. me.
habet & gustu ipso prodius
acrimoniam.

VIREs.

Vires folijs, radicibusq; in- Diosc.
sunt, quæ, contra virus, cum
reliquorum serpentium, tum
maximè viperarum auxilien-
tur, siue cibo, siue potu, siue

alligatu, illinitive: nam si quispiam mandens, in serpentis os inspuat, eum ne-
cabit.

ANCHV-

ANCHUSA TERTIA, Græcis, ἀγχυσά τριτη. Italis, Anchusa terza.

ANCHUSA TERTIA.

FORMA.

Diosc. Est & hæc alteri non dissimilis, sed puniceo, ac minori femine.

LOCVS.

Matth. Nascitur arido, ac sabuloso solo.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Parua hæc, etiam altera, calidior est, quæ & amarior, & magis etiam medicata.

VIRE.

Diosc. Commanducatum semen, si in serpētis fauces expuatur, eum interficiet. Radix acetabuli mensura, cum hyssopo, & nasturtio pota, latas vētris tinea excutit.



ECHIVM,

NOMINA.

737

ECHIVM, Græcis, *Ἐχίον*. Italis, *Echio*, & *Buglossa saluatica*. Germanis, *Wild Dähsenjung*. Hispanis, *Terna della viuora*. Gallis, *Buglossa sauvage*.

ECHIVM.

FORMA.

Folia habet prælonga, aspe-
ra, aliquantum tenuia, an-
chusæ proxima, minora ta-
men, subrubra, & pingua,
spinulis tenuibus horridula:
cauliculos exiles, numero-
sos, minutaque utroque la-
tere folia, expansa pinnata-
que, nigra, in summo caule
proportione minora. Flores
secundum folia purpureos,
in quibus semina capiti vipe-
rarum similia insunt. Radix
nigricat digito tenuior.

LOCVS.

Nascitur secus itinera, in *Matth.*
agrorum marginibus, & sic-
co, inculco, & exoluto solo.

QUALITATES,
ET VIRES.

Radix non modo percussio-
nis à serpente ex vino pro-
dest, sed eos, qui antea biberint feriri non patitur. Idem præstant munus,
folia, & semen. Lumborum dolores sedat in vino, aut sorbitione sumpta.
Lac extrahit.

A a a

ECHIVM



ECHIVM,

F O R M A.

Echium aliud albis floribus
præcedenti simile, sed multo
maius & asperius fere, rectum
in alas valde devaricatum.

L O C V S.

Hic ipsi cum priori commu-
nis est, sed ob raritatem in
hortos transferi solet. *



O C I M O I -

NOMINA.

739

OCIMOIDES, siue Ocimastrum, Græcis, *Οκίμοις*. Italis, *Basilico saluatico*, siue *Ocimoide*. Hispanis, *Alba haqua montefina*. Gallis, *Basilic sauuage*. Germanis, *Je lenger je freundlicher/Liedweich*.

OCIMOIDES.

FORMA.



Folijs exit ferè satino Oci-
mo similibus, ramulis hirsu-
tis, quadrangulis, cubitali
longitudine, in quorum sum-
mo flores emicant candidi, &
nonnunquam purpurei, è qui-
bus calyces erumpunt hyo-
scyami figura, capaci ventre,
arctis faucibus per ambitum
denticulatis, in quibus semen
includitur nigrum, melanthio
ferè simile.

LOCVS.

Nascitur passim inter sege-
tes, propè septa, & agrorum
marginibus.

QUALITATES.

Radix superuacanea est: at
semen tenuium partium, &
desiccantis citra mordacita-
tem facultatis est.

VIREs.

Semen in vino porum, tum viperarum, tum cæterarum moribus medetur.
Datur Ischiadicis cum vino, melle, myrrha, & pipere.

Aaa z

*OCIMO-

F O R M A.

Habetur quædam varietas in floribus Ocimoidis, qui pulchrè foliorum fœtura insigni exornantur. Herba ipsa nihil differt ab altera, quæ simplici florum natura constat, cuius appinximus ramulum proferentem rubros flores, ut posset animaduerti quid hi ab alijs, qui candidi sunt, differrent. *



• GRAMEN,

NOMINA.

741

GRAMEN, Græcis, *ἄρσος*. Arabibus, *Vagem*, *Negen*, seu *Nagien*. *Thelkel*, & *Negil*. Italis, *Gramigna*. Hispanis, *Grana*. Gallis, *Den de chien*. Germanis, *Graß*.

GRAMEN.



GENERA.

Complura graminis visuntur Genera, de quorum nonnullis dicitur.

FORMA PRIMI.

Geniculatis serpit ramulis, *Diosc.* à quibus radices sparguntur dulces, articulis præcinctas. Folia acuminata, dura, & ut arundinis paræ lata, eaq; iumenta, & boues pascunt.

LOCVS.

Prouenit in campis, & in cultis locis.

QUALITATES.

Radix mediocriter frigida *Gal. 6.* est, & sicca, mordacitatem quandam exiguum, & partium tenuitatem obtinens: herba vero primo quidem excessu refrigerat: in humiditate, & siccitate moderata. Semen

imbecillum est. Radix esculenta est viridis. Dulcis enim est, instar aquæ, sed acre quiddam exiguum, & subacerbum obtinentem.

VIRE.

Trita radix illita vulnera glutinat. Decoctum eius in potu torminibus medetur, atq; vrinæ difficultatibus: calculosa etiam vesicæ excrementa committit. Idem potum interancorum vermes necat.

Diosc.
Matth.

Aaa 3

GRAMEN

GRAMEN mannae, Italis, *Sanguinella*, *sive herba Capriola*. Germanis, *Himmeltau*/Schwaden.

GRAMEN MANNAE.

FORMA.

Matth.

Folijs, ac radicibus exit alterius tenuioribus: caule geniculato, praelongo, spicis numerosis in cacumine reposito, ipsisque sensim aculeatis, adeo ut naribus inditae, manuque agitatae, sanguinem eliciant. Semen ijs inest minutum albicans, panico longè minus, orizae se. è sapore, quod à Germanis estur in pingui iure decoctum, quod per quam bellè placeat. Quade re hoc semen Mannam appellant.



LOCVS.

Idem.

Seritur in Germania, & diligenter colitur in cāpis: quin etiam sponte per se nascitur in incultis locis.

QUALITATES.

Idem.

Semen orizae qualitates habet, quare mediocriter ventrem adstringit.

VIRES.

Semen ex pingui iure decoctum, & illitum mammarum durities resoluit. In cibis mediocriter alit.

CENSURA.

Errant profectò qui hanc plantam coronopum faciunt.

*GRAMEN

N O M I N A.

743

* GRAMEN floridum, Græcè ἀγρὸς λευκάνθηος: Germanis, Augentrost
Graf. *

GRAMEN ALTERVM.

Est & Alterum, quod flo-
ridum appellari potest, folijs
& caulibus cæteris similibus:
floribus in summitatibus stel-
larum instar radiantibus, can-
didisque: Radice tenui mini-
mè geniculata.



Aaa 4 GRAMEN

GRAMEN Parnasi, vulgo vnifolium. Græcis, ἀγρωσις ἢ ἐν παρνασῷ. Italis, Gramigna de Parnaso. Germanis, Einblat.

GRAMEN PARNASI.

FORMA.

DIOSC. Densius hoc fruticat, folijs hæderaceis, flore odorato, candido, semine paruo, non inutilli: radicibus quinis, aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & admodum dulcibus.

LOCVS.

Idem. Prouenit in monte Parnaso.

QUALITATES.

Galen. 8. Semen desiccatorium, tenuium partium, & subacribum est.

VIRES.

DIOSC. Succus cum pari melle, & myrrhæ dimidio decoctum, adiectis piperis, & thuris tertijs portionibus, probatissimum erit oculorum medicamentum: præsertim si in ænea pyxide recondatur. Decoctum radicis idem, quod herba præstat. Semen vehementius vrinam impellit, aluum vomitionesque sistit.



GRAMEN

N O M I N A.

745

GRAMEN aculeatum, Italis, *Gramigna spinosa*. Græcis, ἀγρωσις ἀκυνθιάδης.

GRAMEN ACULEATVM.

F O R M A.

Folia, caules, radices primi *Matth.* graminis modo profert. In caulibus tamen singulis è folijs, aculei peculiariter exeūt, triplici apice constantes, ac suis nixi pediculis, tribulorū terrestrium instar.

L O C V S.

Prouenit inter rudera, & *Idem.* in muris vetustate collapsis.

Q V A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Vires easdem habet, qui- *Idem.* bus pollet primum graminis genus.



Italis,

ASI.

GRAMEN

.OITATONNA Aaa S SIDERI-

SIDER-

SIDERITIS, Græcis, *Sidēfīnē*. Arabibus, *Sidrichis*. Italis, *Siderite*. German.
Wasserandorn.

FORMA.

DIOSC. Folia habet Marrubij, sed longiora, satis ad frondem quercus, aut saluæ accedentia, minora tamen, & aspera. caules edit quadratos, dodrātales, aut etiam maiores, non iniucundi gustus, aliquantum substringentis, in quibus per interstitia orbiculatæ vertebrae, ut in marrubio spectantur, & semen in eis nigrum.

LOCVS.

Idem. Nasctur in petrosis locis.

QUALITATES.

Gal. lib. 8. Habet quidem etiam absimp. me. stergendi quandam facultatem, sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida, paucula verò inest adstringitio, quare phlegmonem sedat, & glutinat.

VIRES.

DIOSC. Illita folia, suapte vi vulnera sine inflammationis periculo iungunt.

SIDERITIS.



ANNOTATIO.

Cum hæc planta humectis, ut plurimum, nascatur locis, non ausim eandem affirmare, legitimam esse primi generis sideritim, & si ceteræ correspondeant notæ. Quo factum est ut sequentem deinde legitimam crediderim, esse primi generis sideritim.

SIDERT-

German.

NOMINA.

747

SIDERITIS vulgaris. Germanis, Zeisigkraut.

SIDERITIS VULGARIS.



FORMA.

Exit hæc caule quadrato, dodrantali, aut maiori, ramo-
loque, folijs marrubio lögio-
ribus, ad saluix faciem acce-
dentibus, crispis, albicanti-
bus, sapore haud ingrato: flo-
ribus verticillatim in caule
summo prodeuntibus colore
palescente.

LOCVS.

Nascitur aridis locis.

QUALITATES,

ET VIRES.

Eadem illi sunt vires, quas
primo sideritis generi tribuit
Dioscorides, & Galenus.

VIRGA.

veandem
ondeant
esse primi

DERI-

VIRGA aurea. Italis, *Virga aurea*, quibusdam herba Iudaica, siue Pagana. Germanis, Heydnisch Wundkraut.

VIRGA AVREA.

F O R M A.

Matth. Caulem edit bicubitalem, subrusum, laeuem: folia oliuæ latiora, circum minutissimè ferrata, flores in caulium fastigijs aureos, ac spicatos, qui flauescences in pappos diffiliunt.

L O C V S.

Idem. Nascitur in collibus, in agrorum marginibus, & vineis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Subamara est, absterforiæ facultatis, ac glutinatoriæ.

V I R E S.

Idem. Additur vtiliter tota planta in vulnerum intrinsecorū potionibus: vulnera quæcunque glutinat: calculos comminuit, & vrinam ciet. Pota aur infusa alui fluxiones cohibet: eius decocto sanantur fotu oris vlcera.



* VIRGA

NOMINA.

749

*VIRGA AVREA folijs non ferratis.

FORMA.

Folia habet minora & sine
crenis vel saltem minus con-
spicuis, reliqua non differunt
à priore.

LOCVS.

Nascitur in opacis & ac-
morosis saltibus.*



ACHIL.

ACHILLEA, Græcis, *Αχιλλειο*. Arabibus, *Sichritis*, seu *Egilos*. Succus verò *Damalo chotten*. Italis, *Achillea*. Germ. *Grosse Garben / Schaffrip*.

ACHILLEA.

FORMA.

DIOSC. Scapos gerit dodrantes, aut maiores, fusorum effigie, minutulis folijs circūdatos, ex obliquo crebras incisuras habentibus, Coriandri similitudine, subflauo colore, lentis, odore non insuauis, verū medicato, umbella in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum æmulantibus.

LOCVS.

Idem. Prouenit lato solo.

QUALITATES.

Galen. 8. Viribus est Sideritis non dissimilibus, ceterū adstrictione exuperat. quare ad sanguinis eruptiones, dysenterias, & muliebri profluuiū conuenit.



VIRES.

DIOSC. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur. Erumpentem sanguinem inhibet, & exvellere subdita, cruenta vuluæ profluuiā: bibitur ad dysenteriam vniuersæ plantæ decoctum, in quo etiam insident fœminæ vteri profluuiū laborantes.

R. B. V. S.

NOMINA.

751

RUBVS, Græcis, *Báros*. Mauritanis, *Buleich*, seu *Haleich*. Italis, *Rouo*. Germ.
Bramen. Hisp. *Carza*. Gallis, *Ronce*. Fructus, Latinis, *Mora Rubi*. Græcis,
Batira n̄ *βατρία*. Italis, *Mora di Rouo*. Germanis, *Brambeer* & *Krasbeer*.

RUBVS.

GENERA.

Plura rubi reperiuntur genere *Theoph.*
ra, aliud. n. exit arboris instar. *lib. 3. de*
 Aliud sepibus frutetisq; im- *plan. hist.*
 plicatur. Aliud humi serpit,
 radicatorq; graminis modo.
 Aliud denique alijs modis in
 montibus, & sylvis vagatur.
 Cæterum nobis duorum tan-
 tum generum meminisse sat
 fuerit, nepe vulgaris, & Idei.

FORMA.

Qui passim in sepib. & fru- *Matth.*
 teris nascitur, virgas edit qua-
 drangulas subrubentes obse-
 quiolas, aduncis ubiq; aculeis
 refertas. E ramulis pediculi ex-
 eunt aculeati, è quibus terna
 prodeunt folia fragariæ herbæ
 æmula, sed aspera, & in acutâ
 definentia, dorso auersa parte
 aculeato. Flores profert race-
 mosos, albicantes, è quibus
 mora oriuntur. Radix illi est
 graminis modo repens.

LOCVS.

Nascitur in sepibus, dume- *Idem.*
 tis, frutetisque.

QUALITATES.

Folia, germina, flos, fructus, & radix qualitate adstringente participant, ea- *Galen. 6.*
 que non obscura. Atqui folia recenter nata plurimum in se habent substantiæ *simp. me.*
 aquæ, parum verò adstrictionis, eadem ratione, & germina. Fructus immatu-
 rus acerbus est, & valde exiccatorius: maturus verò non parum habet calidi
 temperati. Flos viribus est immaturi fructus. Radix cum adstrictione tenuium
 est partium, quare renum calculos comminuit.

VIRES.

Ramorum decoctum potum, aluum stringit, & fœminarum profluvia: capillos *Diosc.*
 tingit, folia comanducata gingiuis, & oris virijs medetur. Serpentiæ vlcera co-
 hibent, & quæ in capite manant. Ulinuntur quoq; condylomatis, & hæmor-
 rhoidibus. Eadem trita cardiacis, & stomachi doloribus vtiliter admoventur.
 Flores ex vino potum aluum sistunt.

RUBVS



RVBVS Idæus, Græcis, *ῥάβος ἰδαία*. Italis, *Roumontano*. German. *Himbeer*
vel *Hoolbeer*/Item, *Bocksbeer*.

RVBVS IDÆVS.

F O R M A.

Matth.

Est altero longè clemen-
tior. Folia p̄fert latiora, mol-
lioraq̃, virgas rotundas, fra-
giles, spinis nullis, aut omni-
no raris. Flores albos, alterius
æmulos. Fructus rubi mora
per omnia referunt: cæterum
differunt quòd hi teneriores,
mollioresq̃; habeantur: sapo-
re, cum dulcedine quadam
insipida, adstringente, non ta-
men iniucundo, rubicundo
colore. * Nonnunquam fla-
uescente vel penitus albo. *
Tridentina rura, hæc mora
vocant Ampomele, & frago-
rum vice ijs vescuntur.

L O C V S.

Idem.

Prouenit copiosus in mon-
tibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.*Diosc.*

Eadem præstat, quæ supra dictus. Illinitur flos cum melle oculorum colle-
ctionibus. Ignem sacrum extinguit: stomachicisq̃, ex aqua bibendus datur.

HELXINE



N O M I N A.

753

HELXINE cissampelos, Græcis, Ελξίνη κισσαμπελος. Italis, *Vilucchio minore*.
Arabibus, *acfin*. Germanis, *Wittel Winde*. Hispanis, *Campanelayerua*.

HELXINE CISSAMPELOS.



FORMA.

Folij est hederæ minori-
bus, ramulis exilibus, longis, *Matth.*
quibus complectitur quod-
cunque contigerit adminicu-
lum. Flores edit albos, læui
tamen purpura perfusos, ca-
lathi figura, è quibus semen
oritur nigrum.

LOCVS.

Nascitur in sepibus, vineis, *Idem.*
ac segetibus.

QUALITATES.

Digerendi facultatem ha-
bet. *Galen. 6.*
simp. me.

VIRE S.

Foliorum succus potus al-
uum deijcit. *Diosc.*

Bbb

ELATINÆ,

ELATINE, Græcis, Ελατίνη. Arabibus, Athin. Italis, Elatina.

E L A T I N E.

F O R M A.

Diosc. Folia habet Helxine similia, minora tamen, rotundiora, pilosa, tenuibus & dodrantalibus ramulis, quinis, senisve, à radice, foliosis, gustu adstringentibus.

L O C V S.

Idem. Nascitur in segetibus, & cultis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Modicè tum refrigerat, tum
simp. me. adstringit.

V I R E S.

Diosc. Oculorum fluxionibus, inflammationibusque auxiliantur folia cum polenta trita. Eadem cocta, sorbitionis usu, dysenteriam sistunt.



N V M V L A.

NOMINA.

755

NVMVLARIA, siue Lunaria minor. Italis, *Lunaria minsre*. Germ. *Egelstraut*
Pfenningkraut.

NVMVLARIA.



FORMA.

Serpit hæc humi, iunceis *Matth.*
cauliculis, cubito longiori-
bus, in quibus à radice ad sum-
mum, breuibus interstitijs v-
trinque folia exeunt, crassius-
cula, rotunda paruum num-
morum instar, vnde illi no-
men: flores fert aureos, ac
speciosos.

LOCVS.

Nascitur in scrobium ri- *Idem.*
pis, & vliginosis aggeribus se-
cus vias.

QUALITATES.

Glutinandi, cohibendi que *Idem.*
facultate prædita est.

VIRES.

Herba ipsa illita, recentia *Idem.*
vulnera glutinat. Idem præstat eorum succus. Præcipua autem vis eius est, ad
puerorum enterocellas, cum illita, tum in puluerem hausta.

Bbb 2

EVFATO-

EVPATORIUM, Græcis, Ευπατόριον. Officinis, & Italis, Agrimonia. Arabib.
Casat, Cifit, seu Gaset. Germ. Odermeng. Hisp. Agramonia. Gallis, Agremoine.

F O R M A.

E V P A T O R I U M.

Diosc. Fruticosa est herba, vnicum
efferens caulem, lignosum, ni-
gricantem, rectum, renuem,
hirsutum, cubitalem, inter-
dum ampliorem, folijs per in-
terualla quinquifolij, aut câ-
nabis similibus, quinque par-
tito, aut amplius diuisis, nigri-
cantibus, & per ambitum ser-
ratis. Semen medio caule e-
rumpit, pilosum, deorsum
spectans, quod siccatum ve-
stibus inhæret. Flores gerit
spicatos, aureos, radicem li-
gnosam, subrubram penta-
phylli modo.

Matth.

L O C V S.

Idem. Nascitur secus sepes, itine-
raque, in agrorum margini-
bus, & incultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Tenuium est partium, in-
simp. me. cidendi, extergendiq; faculta-
tem, citra manifestam calidi-
tatem obtinet, quo circa ob-
structiones hepatis expurgat:
inest ei & adstrictio modica,
propter quam robur visceri additur.



V I R E S.

Diosc. Folia contrita & cum suillo adipe imposita, vlceribus cõrumacibus meden-
tur. Herba, aut semē in vino potum, dysenteria, iecinorijs vitijs, & serpentium
Matth. ictibus liberat. Iocinorosos iuuat decoctum potum. Idem ex vino albo para-
tum, cum saccharo sex vnciarum pondere tribus diebus potum, mirificè stran-
guriā sanat, & vrinas impellit. Additur herba in potionibus, quæ ad intrin-
seca parantur vulnera.

EVPATO-

EUPATORIUM vulgare, Officinis, *Eupatorium Avicenna*. Italis, *Eupatoria*.
Germanis, *Künigunde Kraut*.

EUPATORIUM VVLGARE.



F O R M A.

Caulem edit tricubitalem, *Marth.*
subrubrum, rotundum, folia
cannabis, sed maiora, albi-
cantia, hirsuta, amaro gustu,
odore medicato, non insuavi.
Flores exeunt in summitati-
bus, in umbellis subpurpu-
rascentes, qui flaccescentes
in pappos abeunt. Radix mul-
tifida illi est, sed superuacua.

L O C V S.

Nascitur vliginosis locis, & *Idem.*
in scrobium aggeribus.

Q U A L I T A T E S.

Excalfacit, siccit, abstergit, *Idem.*
incidit, aperit, & subtilium est
partium.

V I R E S.

Præstat foliorum decoctū *Idem.*
iocinoris doloribus, ac cæte-
ris eiusdem affectibus ab ob-
structione prouenientibus:
quin etiam lienis tumoribus,
& obstructionibus. Datur i-
dem diutina febre laboranti-

bus. Vrinæ & menses pellit, scabiem, & pruritum sanat, præsertim cum fuma-
ria, & caprino sero, sed succus fortior est. Is itaque potus incipienti elephan-
tiæ medetur. Flores illiti vulnera recentia, & vlcera sanant: succus drachma-
rum duarum pondere in catapotijs sumptus, intestinorū vermes necat: Dan-
tur folia vtiliter pecoribus tussientibus, & anhelosis equis.

Bbb 3 POTENTIL-

POTENTILLA, quibusdam Anserina. Italis, *Potentilla*. Germanis, *Genseric*
sive Brensing. Gallis, *Agrimoine sauvage*.

P O T E N T I L L A.

F O R M A.

Matth.

Folij exit agrimonie proximis, hirsutioribus, prona parte virentibus, supina verò albicantibus. cauliculos fundit humi repentes, è quibus aurei prodeunt flores: Radice constat exterius subrufa, interius verò candicans, auste ro gustu, & adstringenti.



L O C V S.

Idem.

Nascitur humecto solo.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Refrigerat, siccatur, adstringit, repellit, roborat.

V I R E S.

Idem.

Feminarum profluvia, & dysenterias cohibet, ac cæteras alui fluxiones. Datur utiliter sanguine reiicientibus. Herba decoctum ex vino paratum, præstat potum ad intestinorum tormina, & dorsii dolores. sicca farina ex sua ipsius aqua stillatitia pota, albas vteri fluxiones cohibet, sed valentius, addito corallio, & ebore. Datur ad enterocellulas, & bubonocellulas. vulnera recentia, & oris, pudendorumque vlcera sanat: ex aceto decocta. colluitur utiliter ad commotos dentes: & laxas gingivas, dentiumque dolores mulcet, & prolapsam columnellam restituit, addito aluminis momento.

Q V I N Q V E.

QUINQUEFOLIUM, Græcis, Πεντάφυλλον. Italis, Cinquefoglio. Germanis, Fünffingerkraut. Hispanis, Cinco en rama. Gallis, Quintefeuille.

QUINQUEFOLIUM.

G E N E R A.

Plura quinquefolij extant *Matth.* genera, colore, ac magnitudine differentia.

F O R M A P R I M I.

Ramulos fert festucarum *Diosc.* similitudine, tenues, dodrantales, in quibus semen: folia menthae, quina singulis pediculis, in ambitu serrata: florē ex candido pallescentem, auricululū, subrubram habet radicem, oblongamq; nigro veratro crassiore.

L O C U S.

Nascitur in riguis & aqua-*Idem.* rijs ductibus.

Q U A L I T A T E S.

Radix vehementer desic-*Galen. 8.* cat: nimirum verò acris est, & *simp. me.* cum sit tenuium partium citra morsum desiccatur. Radix enim desiccatur ordine quodammodo tertio, minimum habens evidentis caliditatis.

V I R E S.

Radicum decoctum, collu-*Diosc.*

tionē, dentium dolores sedat, & vlcera putrida sistit, arteriæ scabritias gargari-
zatu læuigat. Dyfenterias, & cæteras alui fluxiones cohibet, quin etiam articu-
lorum coxendicumque cruciatus potu tollit. Coctæ in aceto, & illitæ, serpen-
tia vlcera reprimunt. Strumas, tumores, duritias, abscessus, & collectiones
discutiunt. Ignes sacros, & condylomata sanant. Teneræ radices succus, ioci-
noris, & pulmonum vitij medetur. pollet etiam aduersus venena: folia trice-
nis diebus pota, comitiales iuuant. Eorundem succus tribus cyathis diebus ali-
quot potus, celerrimè regio morbo medetur. Ex melle, saleque illita, vulneri-
bus, & fistulis auxiliatur. Medetur etiam enterocellis. Tota planta, & potu, &
illitu, sanguinem manantem sistit.

Bbb 4

QUINQUE-



iones co-
& bubo-
acero de-
tiumque
inis mo-

N Q V E

F O R M A.

Folia minora profert, angustiora & magis laciniata, incana tota; cauliculos erectos, in quibus flores lutei alterius similes sed minores. Radix rubra nigricat, & alte descendit sapore ceu glandium astringente.

L O C V S.

Nascitur in aggeribus, & secus arua, macro solo.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Eadem illæ quæ priori.*



QVINQVE-

N O M I N A.

761.

QVINQVEFOLIUM album, Græcis, Πεντάφυλλον λευκον. Italis, Cinquefoglia,
bianco. Germanis, Weiß Fünffingerkraut.

QVINQVEFOLIUM ALBUM.

F O R M A.



Folij est incanis, hirsutis, *Matth.*
per ambitum sensim denticulatis, quinis ex vno quoque pediculo, dependentibus cauliculis mollibus, obsequiosisque, flore candido, radice squamosa, agnatis ex obliquo prodeuntibus.

L O C V S.

Nascitur in faxis ingenti- *Idem.*
bus, & saxosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Adstringit, siccatur, roboratur, *Idem.*
repellit: Radix subtilium est partium.

V I R E S.

Ea omnia præstare potest *Idem.*
quæ alterum, quo tamen adstringentior est.

Bbb. s. * QVIN-

* QVINQVEFOLIUM palustre fragiferum, vel Heptaphyllum porphyranthemum. Germanis, *Benßtraut* / *Sibenfingertraut*.

QVINQVEFOLIUM
PALUSTRE.

FORMA.

Oblongis quasi sarmentis se propagat serpitque per vliginem, angulosus nonnihil & striatis nigris, in quibus ramuli nascuntur & folia pentaphylli quina interdum sed ut plurimum septena, subtus cinericia, superiore parte virentia, Floret per æstatem: flosculus cõponitur ex quinque aut sex folijs atrorubentibus, & paruo capitulo medium obtinente, cinctoque staminibus purpureis. Hoc subinde increfcit augeturque donec magnitudinẽ fragi ferre attingat, cui & figura & colore simile fit, nullo intus succo. Radicibus nititur longis, tenuibus, nigricantibus & in geniculis fibratis.



LOCVS.

Nascitur vliginosis, putridis & macris pratis.

QUALITATES.

Astringit tota herba, præsertim fructus. *

DIAPEN-

NOMINA.

763

DIAPENSIA, siue Sannicula. Italis, Cinquefoglio maggiore. Germanis, Sannicel.

DIAPENSIA.



FORMA.

Folia profert quinquefo- *Matth.*
lij maiora, vitiginea specie,
cauliculis rotundis, gracili-
bus, obsequiosis, in quorum
summitate, & adnatorum fa-
stigijs capitula prodeunt sub-
albida, fragorum figura: Ra-
dicibus constat numerosis,
gracilibusque.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & *Idem.*
syluosis collibus.

QUALITATES.

Refrigerat, & siccatur, cohi- *Idem.*
bet, reprimat, glutinat, &
roborat.

VIREs.

Vniuersæ plantæ deco- *Idem.*
ctum, datur potandum ad in-
trinseca vulnera sananda, fistulas, & enterocellæ. *Idem* quoque præstat fo-
liorum, & radicum farina.

*SANICV-

* *SANICVLA alpina*, siue guttata quibusdam. Italis, *Vmbilicus Veneris*. Septentrionalium alijs, *Hepatica montana*. Valeijs, *L'herba Sante Condria*, vel *sans Contura*. Germanis, *Wilde Schelkraut* / oder *weiß Sanickel*.

SANICVLA ALPINA.

FORMA.

Elegans est planta, floribus albis, qui guttulis asperguntur sanguineis, figura quodammodo Hyperici floribus correspondentes; cui & semen simile est, caulis hæc sustinet sesquipedalis, cui folia subsunt hederacea, rotunda, crenato ambitu, prona parte candidiora utraque hirsuta nonnihil exiguis pilis candidis, qui tamen cultura penè evanescent, radix interdum minimi digiti longitudinem æquat, crassiuscula, subruffo colore.

LOCVS.

Crescit copiose in monte Iura & monte Mola, locis umbrosis & humidioribus. Reperitur etiam in montanis Pannoniæ.

QUALITATES,
ET VIRES.

Astringit & ferè insipida est. Ex parte prona folij cutem decorticant, & sic vulneribus illud imponunt. Eliciunt aquam è planta minutim concisa ad glutinanda vulnera, aut in pulueres redigunt flores, itemq; folia & vlcibus vulneribûsq; inspergunt. *

FRAGA-



FRAGARIA, Italis, *Fragolaria*: Fraga verò, Italis, *Fragole*, & *Fraghe*. Germanis, Erdbeer. * *Fragaria sylvestris* vel montana. Germanis, *Bergerdbeer*. *

FRAGARIA.

FORMA.



Planta est humi repens, fo- *Matth.* lijs pentaphylli maioribus, ternis ex vno pediculo prodeuntibus, & per ambitum ferratis: floribus candidis, rubi æmulis, è quibus fraga oriuntur: cauliculos habet tenues, hirsutos, obsequiososque: radices habet numerosas, & tenues adstringentis gustus. * *Sylvestrior* exigua est herbula, & strigiosior tota, fructu minore & minus sapido rubro. *

LOCVS.

Proueniunt in montibus, *Idem.* collibus, syluis, secus itinera, & prope sepes.

QUALITATES.

Refrigerat excessu primo, *Idem.* & siccatur secundo.

VIRES.

Folia, & radix vulnera, & vlcera sanant, muliebres fluxiones, & dysente- *Idem.* rias cohibent. urinam cient, & lieni conferunt. Eorundem decoctum potum præstat ad iocinoris inflammationes, & ad renum vesicæq; sordes. *Idem.* in ore contentum gingiuas roborat, commotos dentes stabilir, & destillationes sistit: At fraga, præter id quod æstate deuorata maximè placent, biliosis, æstuantibusque ventriculis præsent, sticulisq; opem ferunt. Vinum quod ex eis elicetur, vlcusculis faciei mirificè medetur, illitum. quin & varos, & oculorum fluxiones calidas impositum tollit.

* FRAGA

FORMA.

Priori similis herba sed minor & magis cana, hos fructus profert, qui colore solo à præcedentis Fragariæ fructu differunt.

LOCVS.

Rarior est quam superior, & propterea ad hortorum cultus expetitur. Nec dubium est, alicubi sponte nasci & ijsdem locis gaudere quibus vulgarior. *



EVFRA-

NOMINA.

EVFRAGIA, Italis, *Eufragia*. Germanis, *Augentrost*. Gallis, *Eufraise*.

767

EVFRAGIA.

FORMA.

Tenuis est planta ad spithamæ altitudinem assurgens, folijs minutis, crispis, & per ambitum crenatis, gustu adstringentibus, & subamaris. caule tenui, rubentique: flore inter purpuram, & aurum albicante, quem mittit in fine æstatis. *Matth.*

LOCVS.

Nascitur in pratis, & in syluis.

QUALITATES.

Excalfacit parum, siccatur magis, abstergit, & cohibet.

VIRES.

Præstat tam in cibis, quam in medicamentis sumpta, cum recens, tum sicca, ad omnia oculorum impedimenta, & præsertim cum in cibis, aut potu sumitur diutius. Vinum ex ea paratum idem præstat potum. Eius enim usu senum oculi reuiuiscunt. visus mirifice acuitur. & cæcutientes ad lucem redeunt, & præcipue in pinguibus, & pituitosis corporibus, hæc omnia præstat.

PHOENIX,



PHOENIX, Græcis, *Φολιξ*. Quibusdam lolium murinum: Italis, *Gioglio saluatico*. Germanis, *Daubenweiss*/Weusforn. Gallis, *Turaye sauvage*.

P H O E N I X.

F O R M A.

DIOSC. Folia habet hordei sed breviora, & angustiora, spicam lolio similem, calamos seminum digitorum, radici aduolutos, septenas, octonasve spica.

L O C V S.

DIOSC. Nascentur in aruis, tectis, recenter illitis, & secus itinera.
Matth.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Ex vino austero pota alui profluuium, & mensium abundantiam sistit: vrinae impetus cohibet, in puniceo vellere adalligata: collo suspensa (vt aiunt) sanguinem manantem sistit.



RHODIA

RHODIA radix, Græcis, Ροδία ριζα. Italis, Radice rodia. Germanis, Rosen-
wurq.

RHODIA RADIX.



FORMA.

Caules mittit teretes, cu- *Matth.*
bitales, folijs vbiq; stipatos,
longiusculis, in acutum defi-
nentibus, portulacæ, seu mi-
noris seti instar pinguibus,
minutim per ambitum serra-
tis. Umbella in cacumine vi-
ridi tithymali cyparissæ mo-
do. Radix ei inæqualis, stru-
mosa, crassa, lævi cortice ob-
ducta, splendescens. substan-
tia intus subrufa, rosarum o-
dore. Radix est omnium vi-
uacissima. Siccis enim locis
mensibus pluribus asseruata,
& deinde sata, statim repulu-
lat.

LOCVS.

Nascitur in altissimorum *Idem.*
montium rupibus, saxosis, ac
præruptis locis.

QUALITATES.

Tenuium est partium, & *G. le. 8.*
discentientis facultatis, in ca- *simp. me.*
lesaciendo verò, secundi re-
cellus censenda est, aut certè
tertij incipientis.

VIREs.

Vtilissima est, capitis doloribus, si madefacta fronti ac temporibus, cum ro- *Diosc.*
faci momento imponatur. Vbi aut dolor à calida prouenerit causa, tula, & *Matth.*
rosacea aqua madefacta imponi debet. vbi verò à frigida, ex amaraci aqua illini
præstabit.

Ccc

Eqvi-

EQVISETVM, Græcis, *ἵππος ἄγρις*. Arabibus, *Dhenben alcail*, *Dhemb alchi*, *sive Dahn alchail*. Italis, *Coda di Cavallo*. Officinis, *Cauda equina*. Germ. *Rosßchwanz*. Hispanis, *Coda de mula*, *sive Rabo de mula*. Gallis, *Queue de Cheval*, *sive Prele*.

EQVISETVM.

GENERA.

Matib. Aliquot nobis sunt genera.

FORMA PRIMI.

Profert cum primum è terra erumpit quoddam tenerimum germen oblongum, inglandium iulo non abimile, subnigricanti colore. & deinde caules inanes, geniculati, subrubefcentes, leniter scabri. iuncea circa eos coma, aspera, exilis, setarum instar. adeo ut equorum instar caudæ appareat. Radicem lignosam, duram.

LOCVS.

Idem. Nascitur aquosis, & humidis locis, in riguis, & scrobibus.

QUALITATES.

Gale. 6. simp. me. Adstringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde valenter simulq; citra mordacitatem exiccantem. Itaque vulnera maxima imposita conglutinat, etiam si præfectos nervos esse contingat.

VIRE.

Diosc. Herba succus sanguinem è naribus erumpentem sistit: prodest dysentericis ex vino potus: urinam ciet. Trita folia, & illita sanguinolenta vulnera glutinat. Radix cum sua herba tussim, orthopneam, ruptaq; adiuuat. Folij in aqua potus, dissectiones vesicæ, & intestinorum, enterocellæq; in vnum coalescere, cogique ferunt.

EQVISE-



NOMINA.

771

EQUISETVM alterum, Græcis, ἰσσογίς ἐτέρα. Italis, Coda di Cavallo minore.

EQUISETVM SECVNDVM.

FORMA.

Caulis est rectus, cubito DIOSC.
maior, inanis: comis per in-
terualla breuioribus, candi-
dioribus, & mollioribus.

LOCVS.

Prouenit humectis locis, Matth.
& vliginosis pratis.

QUALITATES ET
VIRE.

Valer ad omnia, ad que GE- DIOSC.
nus alterum.



Ccc 2

EQUI-

EQUISETVM tertium, Græcis, *ἰσσοειδὲς τρίτον*. Italis, *Coda di Canallo*.

EQUISETVM TERTIVM.

FORMA.

Matth. Caulem edit geniculatum, striatumque, inanem, fragilen, à quo complures oriuntur rami. Etipi quoque geniculati, ac asperi, nulla circumstante coma.

LOCVS.

Idem. Prouenit & hoc palustri solo.

VIRE.

Idem. Iisdem cum alijs poller viribus.



COCVM

Coccum infectorium, Græcis, Κόκκος βαφικὸς. Arabibus, Charmens, seu Kermes. Italis, Grana da tingere. Germanis, Scharlachbeer. Hispanis, Grana per atennir, seu grana in grano. Gallis, Vermillon.

C O C C U M I N F E C T O R I U M.



F O R M A

Frutex est surculosus, folijs Matth. oblongis per ambitum aculeatis aquilfolij modo, sed longè minoribus, baccis rotundis, inanibus, puniceo colore.

L O C U S.

Gignitur in Galatia, Armenia, Asia, Cilicia, Hispania. Matth. Nascitur etiam in Cilicia è quercu. Quin etiam in Polonia, & Boemia, è quercubus legitur.

F A C U L T A T E S.

Adstringentem, simulque Gale. 7. amaram facultatem possidet: simp. me. vtraq; sine morfu deficcet.

V I R E S.

Vulneribus neruisq; præ-diosc. cisis conuenienter ex aceto Matth. tritum illinitur. Baccharum puluere feliciter vtuntur Itale mulieres ad forum roborandum, & abortum prohibendum ipsum ex ouo sorbilibus prægnantibus propinantes, addito thuris, aut masticeis momento.

C E N S U R A.

Non rectè sentiunt, qui Coccum infectorium, & Chermesinum idem faciunt.

Ccc 3

* Cocci-

* COCCIFERA ILEX, a. flos separatus, b. ramus cum coccis.

COCCIFERA ILEX.

F O R M A.

Præterea habentur nonnulla in ea notatu digna. Primum maximæ glandes, maiores quam aliarum Ilicum, cuius cupulæ etiam asperiores, proueniunt in autumno. Postremo quædam genera excrementorum, si ita liceat vocare. Vnum quod ante alia prouenit, Mense Aprili & Maio, grana sunt in folijs rubra, partim rotunda, partim oblonga, ex ipsa ferè substantia foliorum facta, pilorum paruorum magnitudine, quarum substantia intus alba est, non dissimilis multum à substantia fructuum oxyacanthæ, gratè gustu, non nihil velut acidi habentes, in quibus tandem nascitur vermiculus, suntque talia excrementa huius arboris parua, vt Gallæ in Quercu. Est secundum excrementum, rotundum, nigrum, exterius pellucens, satis durum, intus liquorem album habens cum vermibus, quod tandem inarescit, vt plurimum, sic ramis copiosè adhærescit satis leuiter. Circa eas baccas, vt sic dixerim, sæpe formicæ copiosè conglomèrantur. Hoc etiam excrementum reperitur in maiore ilice, prouenit mense Maio. Huic simile in omnibus coccum tinctorium quod eodem tempore prouenit. In hoc differt, quod grana siue bacca sint rubra, si saltem abstergatur puluis albus, quo asperguntur, liquore item rubeo, scatentq; vermibus rubris, vnde Gallice Vermillon. Præterea non solet prouenire nisi in minore ilice, nec tanta copia, vt alia excrementa.*



PIMPL.

PIMPINELLA, seu saxifraga hircina, Italis, *Saxifraga di becco*. Germanis, *Dibernel*.

PIMPINELLA SAXIFRAGIA.



G E N E R A.

Duo eius habentur genera, *Matth.*
Maius & minus.

F O R M A.

Maior radice nititur longa, *Idem.*
folijs, quæ ad radicem sunt,
humi accubantibus, pluribus
ex vno pediculo vtrinque emer-
gentibus, & per ambitum ser-
ratis: caule quadrangulo, flo-
ribus in umbella candidis. Ra-
dix illi longa digitali crassitu-
dine, hircum quadatenus re-
dolens, acri sapore.

L O C V S.

Nascitur in montibus, col. *Idem.*
libus, & pratis non viginosis.

Q U A L I T A T E S.

Radix, in qua vis tota con- *Idem.*
sistit, exalfacit, siccaturque ordi-
dine secundo completo, aut
tertio incipiente, aperit, pro-
uocat, attenuat, digerit, in-
cidit.

V I R E S.

Vtriusque radix præstat ad renum, & vesicæ incommoda: calculos enim in *Idem.*
renibus genitos frangit, & eicit: vrinas pellit, succus radice ex meraco hau-
stus, præstat contra deleteria medicamenta, & virulentorum animalium ictus.
Quare non desunt, qui radices etiam contra pestilentiam miris laudibus effe-
rant.

F O R M A.

Minor cognomento facile suam à maiore differenti-
am ostendit, radice tenuiore
simplici prolixaque vermem
imitatur. Folijs caule floribus
& colore præcedenti similis
est, & magnitudine tantum
ab illa vincitur, interdum et-
iam costæ rubescunt & cauli-
culi. semen paruum Ammi
refert. Huius varietas obser-
uatur alicubi in folijs quæ mi-
nutissime laciniantur, vt Ca-
ri folia, vt rudioribus facile
imponant, ne pro pimpinel-
la hanc agnoscere possint,
Flosculi quoque nonnunquam
prorsus rubescunt.

L O C U S.

Locis arenosis exit, & mon-
tosis, ac rimis petrarum in-
nasci gaudet.



Q U A L I T A T E S.

Acrior est & valentior maiore, id quod sapor manifestus arguit. *

PIMPI-

PIMPINELLA Sauguisforba. Italis, *Pimpinella*, seu *Sorbastrella*. Germanis, *Hergotts Wärtlin*. Gallis, *Pimpinelle*.

PIMPINELLA SANGVISORBA.

G E N E R A.

Duum est generum: Maius, *Marth.* & minus.

F O R M A M I N O R I S.

Folijs prouenit ab vna ra- *Idem.*
dice numerosis, compluribus
ab vno tenui pediculo vtrin-
que prodeuntibus, subrotun-
dis, pusillis, vbique in ambitu
crenatis, firmis, humi in or-
bem accubantibus, adstrin-
genti gustu: cauliculus edit
plures, tenues, subrubentes,
rotundos dodrantes, atque
maiores, in quorum summi-
tatibus capitula exeunt squa-
rosa, subpuniceo colore. in
quibus semen. Radice nititur
lignosa subrufescente, adstrin-
gentis gustus.

L O C V S.

Nascitur in agris non cul- *Idem.*
tis, in collibus, & feritur in
hortis.

Q U A L I T A T E S.

Degustata adstringit, sed mansa lentoris copiam fundit, glutinat, siccatur, re- *Idem.*
soluit & cohibet.

V I R E S.

Sistit pota rubra, albaq; sceminarum profluvia, dysenteriam, & ceteras alui *Idem.*
fluxiones: biliosas vomitiones cohibet, sanguinis reiectiones sistit: vulnera, &
vlcera sanat: vnguentis quoque vtiliter miscetur, quae tum ad capitis vulnera,
tum ad carcinomata parantur. Natat saepe in poculis vino repletis, quod gra-
tiam quandam, iucunditatemq; potantibus afferat.

Ccc 5

PIMPI-



Matth. PIMPINELLA, seu Sanguisorba maior. Italis, *Pimpinella*, seu *Sorbasella* maggiore.

SANGVISORBA, SEV PIMPINELLA MAIOR.

FORMA.

Idem. Facie ab altera non differt, nisi quod maior sit omnibus suis partibus, & folia longiora, latioraque proferat: caules prociores, & capitula crassiora, oblongioraque.

LOCVS.

Idem. Prouenit in pratis, pascuis, & inculto solo.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem. Viribus iisdem prædita est, quibus & minor.



TRAGVM,

TRAGVM, Græcis, Τράγος ἢ σούδαρος. Italis, Trago.

TRAGVM.

FORMA.

Planta est dodrantalis, aut *DIOSC.*
amplior, fruticosa, humilis,
oblonga sine folijs, pusillis
circa ramos acinis, rufis, mul-
tis, tritici magnitudine, acuto
cacumine, gustu admodum
adstringente.

LOCVS.

Nascitur maximè in mari- *Idem.*
timis.

FACULTATES, ET
VIRES.

Baccæ gustu sunt admodum *Idem.*
adstringenti. Racemorū bac-
cæ decem, ex vino potæ, cæ-
liacis, & fæminis fluxione
vulvæ laborantibus auxilian-
tur.

LYNCVS,



IUNCVS, Græcis, Ξυρίνος. Italis, Giunco. Germanis, Vingen/Schmelen. Hispanis, Iunco. Gallis, Iunc.

IUNCVS.

GENERA.

DIOSC. Duum est generum, Alterum læue, Alterum acutum; cuius etiam duo extant genera, vnum sterile, alterum fertile: Est & alterum ὀλόχοινος vocatum, seu Æthiopicum.

FORMA.

DIOSC. Caulis est læuis, viridis, in cacumine aculeatus, alba intus medulla: Semen gerit in superiore caulis parte, elatere prodiens racemosum, subrubrum, adstringentis gustus. Alter consimilis est, sed sine semine prouenit. & tenuioribus calamis.

LOCVS.

Matth. Nascuntur omnia genera cum in mari, tum in fluminibus, lacubus, paludibus, ac ceteris aquosis locis.

QUALITATES.

Gal. lib. 8. Composita eorum temperies est, ex terrena videlicet essentia, leuiter frigida, & aquea, leuiter calida, vt & inferna desiccare possint, & sensum frigidus ad caput vapores submittere, quibus somnolentos efficiant.

VIRES.


DIOSC. Semen tostum ex vino potum, aluum sistit, & rubra feminarum profluvia: vrinam ciet, capitis dolores facit: Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur aduersus Phalangiorum morsus. Semen potum somnum conciliat.

IUNCVS



IUNCVS floridus. Italis, Giunco florido.

IUNCVS FLORIDVS.



FORMA.

Folijs exit ab vno cespite *Matth.*
 numerosis cyperi similibus,
 sursum spectantibus, cauli-
 bus pluribus, læuibus, iunci
 modo glabris, in quorum ca-
 cumine flores emicant spe-
 ciosi, subpurpurei, è quibus
 semen gignitur.

LOCVS.

Pronenit in fluuiorum li- *Idem.*
 toribus.

QUALITATES, ET
VIRE.

Creditur ea omnia præsta- *Idem.*
 re posse, quæ cætera præstant
 genera.

LICHEN,

LICHEN, Gæcis, Λειχην. Officinis, Epatica. Arabibus, Arʒeʒallachey. Italis, Lichene, seu Epatica. Germanis, Stein Lebertraut. Hispanis, Epatica, seu Figadella. Gallis, Epatique, seu Porcorau.

LICHEN.

FORMA.

Matth. Folijs est latis, robustis, asperis, nullis adnexis pediculis in cacumine tripartitis, asperginosis lapidibus pertinaciter inhaerentibus, radicibus numerosis perquam exiguis aduersa foliorum parte emergentibus: floribus parvis, stellarum figura.

LOCVS.

Idem. Prouenit in asperginosis saxis.

QUALITATES, ET VIRES.

Diosc. Adstringit, refrigerat, abstergit: illita folia sanguinis profuua sistunt: inflammationes arcent. Impetigini medetur, Iuuant regio morbo laborantes, cum melle

Matth. illita oris, & linguæ defluxiones inhihent. Præfertur maximè hæc planta ad iocinorosos affectus.



PVLMONA-

PULMONARIA, Italis, *Pulmonaria*. Germanis, *Lungenkraut*. Gallis, *Herbe aux
pulmons*.

PULMONARIA.

GENERA.

Duo eius habentur genera, *Marth.*
Arboreum alterum, Alterum
terrestre.

FORMA ARBOREÆ.

Similis est Licheni, sed ma- *Idem.*
iora, latioraque fundit folia,
varijs modis per ambitum la-
ciniata, ac si à vermibus erosa
fuerint, arefcentia, prona par-
te viridia, supina verò palle-
fcentia, ac subalbicantibus
maculis respersa.

LOCVS.

Prouenit in densis, opacisq; *Idem.*
syluis, in annosarum arborum
caudicibus.

QUALITATES.

Adstringit, siccatur, abstergit: *Idem.*
vulnera glutinat.

VIRES.

Præstat, (vt scribunt) ad tabem, pectoris, & pulmonis vlcera, & cruenta spu- *Idem.*
ta, quin etiam ad vulnera, & pudendorum vlcera, & ad vtrunq; muliebri pro-
fluuium, dysenteriam, & biliosos vomitus: Sunt qui ea vtantur ad suspiciosos,
& asthmaticos, cum dulcis radice succo, hyslopo, helenio, & scillino oxymeli-
te: Datur quoq; vtiliter à pastoribus tussientibus pecudibus, cum sale.

PVLMO-

Italis,
igadella.

anta ad

ONA-

PVLMONARIA altera, Italis, *Polmonaria*. Germanis, *Einigenkraut* / *Fleckenkraut* /
klein Walsurtz. Gallis, *Herne aux pulmons*.

PVLMONARIA ALTERA.

FORMA.

Matth.

Folijs assurgit borraginis
quadantenus æmulis, non
tamen crispis, nec hispidis,
oblongis, asperis, hirsutis,
albis maculis superna parte
respersis, * aut non maculo-
sis, * borraginis sapore: cau-
lem gerit angulosum, atque
tenerum: in cuius adnato-
rum cacuminibus flores e-
rumpunt, * quandoq; pur-
purei, quandoque cærulei *
cynoglossi vulgaris modo.
* Semen in folliculis plerun-
que vnum aut alterum inue-
nitur, maturitate nigrescēs,
Echij semini pene simile &
æquale. Radice nititur fusca
multis fibris terræ inhæren-
te. *



Locvs.

Idem.

Nascitur opacis locis, pro-
pe vlginosas sepes.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem.

Cohibet, consolidat, siccat, abstergit: Praefertur ad pulmonis cū vlcera,
tum cæteras infectiones, & ad sanguinis reiectiones: Datur totius plantæ de-
coctum ad suprascripta, magno auxilio, cum saccharo pluribus diebus: Idem
cum maiori quoque successu præstat foliorum succus potus.

PARO-

NOMINA.

785

PARONYCHIA, Ruta muraria. Græcis, Παρωνύχια. Italis, Paronicchia. Germanis, Maiverrauten.

PARONYCHIA.

FORMA.

Exiguus est frutex, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, sed maioribus folijs. **Diosc.**

LOCVS.

Nascitur in petris.

Idem.

QUALITATES.

Vis eius est tenuium partium, & exiccatoria, morlu vacans. Talia enim sint oportet, quæ paronychia sanant: exalfacit ordine tertio. & siccat pariter. **Galen. s. simp. me.**

VIRES.

Illita paronychijs, atque fauis, remedio est. **Diosc.**

APPENDIX.

Quoniam non desint, qui hanc plantam vnâ mecum paronychiam faciunt, quum tamen sint, qui reclament, ne diffensio vterius protrahatur, non Dioscoridis, sed nostram paronychiam eam esse volumus. Scimus enim non solum paronychijs ipsam mederi, sed ad ciendas vrinas, & renum calculos frangendos pellendosq; præstantissimam esse. **Matth.**

Ddd

PARO-



PARONYCHIA altera.

PARONYCHIA ALTERA.

F O R M A.

Matth.

Folia profert pepi, longiora, flores paruos, copiosos, racematim coherentes. albo colore. sed qui paronychiam florere scribat haecenus non legimus: quin etiã mihi incompertum est, an in faxis oriatur. Quo fit vt ne hanc quoq; legitimam paronychiam facere aulam.



HELI-

HELICHRYSVM, Græcis, Ελχρυσον. Italis, Helichriso.

HELICHRYSVM.

FORMA.

Ramulum habet candi. Diosc.
dum, virentem, rectum, fir-
mum, folia, intercedentibus
spatijs, angusta, abrotano si-
milia, comam aureæ lucis in
orbem: umbella rotunda ve-
luti sicis corymbis depen-
dentibus: radice tenui.

LOCVS.

Nascitur in asperis, & tor- Idem.
rentium locis.

QUALITATES.

Facultatis est incidentis, & Gal. 6.
extenuantis. simp. me.

V I R E S.

Coma ex vino pota, men- Diosc.
ses ciet: auxiliatur quoq; ser-
pentium ictibus, coxendi-
cum doloribus, & vrinæ stil-
licidijs. sanguinem in ventri-
culo, aut vesica concretum

absumit, destillationes sistit, cum mulso à ieiunis pota tribolari pondere: ve-
stibus interposita, eas à tinea tuetur.

Ddd 2

HELI-



Helichrysum Italicū hanc
plantā appellare libuit, quod
plurimum in Italia proueni-
at, & ijsdem sit facultatibus
præditum, quibus & præce-
dens.



HELI-

NOMINA.

789

HELICHRYSUM creticum. Italis, Helichriso di Candia.

HELICHRYSUM CRETICVM.

FORMA.

Planta est exilis, folijs longis, angustis, hirsutis, striatisq; caulibus angulosis, umbella in summitate aurea, diuulsaq; radice tenui, ac superuacua.

LOCVS.

Nascitur in Creta Insula. *Idem.*

FACULTATES, ET
VIRES.

Ea omnia hoc quoque, quæ *Idem.* supra scripta præstare posse creditur.

*APPENDIX.

Hæc planta melius quadrat ad Dioscoridis descriptionem quam prior, nec in Creta solum sed etiam in Hispania & alibi nascitur.*

Ddd 3

STOE-



HELI-

STOECHAS citrina. Italis, *Amaranto giallo*. Germanis, *Reinblumen*/ *Jüngling*/ *Mattenkraut*.

STOECHAS CITRINA.

FORMA.

Matth.

Folia profert albicantia, hirsuta, longa, caules quadrantales, aut maiores, lanuginosos, incanos, in quorum summitatibus flores sunt aurei, globosissimi, odorati, in umbellæ diuisæ modum se se pendentes. Radice breui subnigricante.



LOCVS.

Idem.

Nascitur locis incultis, & in pascuis.

QUALITATES.

Idem.

Excalfacit, siccatur, aperit, & abstergit, vt amarisculus indicat sapor, nec adstringenti facultate vacat.

VIRES.

Idem.

Decocta coma, aut ex vino macerata, iocinoris obstructions aperit, proinde datur commodè eius decoctum, dilutùmve, regio morbo affectis. Idem potum interaneorum vermes necat.

* Comas grandiores habentem breuiusculam plantam ex Creta missam accepi, cuius hic appinxi particulam.*

AMA.

NOMINA.

791

AMARANTHVS. Græcis, *Αμάρανθος*. Italis, *Amaranto*, seu *for velluto*. Germanis, *Sammat Blum*. Gallis, *Passe velours*.

AMARANTHVS.

FORMA.

Folia profert ocimi, maio- *Matth.*
ra, caulem crassum, pinguem
subrubentem, striatum: flo-
rem spicatum, admodum pur-
pureum; qui etsi quàm diu sic-
catum asseruetur, haud qua-
quam tamen colorem deper-
dit.

*LOCVS.

Elegantia studio in hortis
seritur.*

QUALITATES.

Refrigerat, siccatur, repellit, *Idem.*
cohibet.

VIRES.

Flospotus cæliacos, & dy- *Idem.*
sentericos iuuat, mensum a-
bundantiam sistit, & albos vte-
ri fluxiones. prodest quoque
sanguinem excreantibus.

*Commendatur etiam ad
vlcera sanie manantia.*

Ddd 4

*AMA-



*AMARANTVS cristatus, Germanis, *Hanen Rauh.*

AMARANTVS CRISTATVS.

FORMA.

Venustior est hæc amaranthi varietas, vt separatim pingi mereatur. Panniculas habet in fastigio latiores & quasi compressas hilari florum purpuranitidas, vegetas, vt cristas imitentur, iucundissimo spectaculo. Folia, vt in priore, ocymo non absimilia sunt, aut solano, longiora tamen, & maculis plerumque rubris variegata. Semen atrorubens pusillum splendidum in nostris regionibus maturescit nisi pluviosa cōstitutione anni corrumpatur.

LOCVS.

Rarior est & maiorem ob id gratiam in hortis consequitur.*



CHRY-

N O M I N A.

793

CHRYSANthemVM, Græcis, Κρισάνθεμον. Italis, *Chrysanthemo*. Germanis, Goldblum.

CHRYSANthemVM.

FORMA.

Herba est tenera, fruticosa, Diosc. lanæ proferens caules, & multifida folia: flores luteos admodum splendentes.

LOCVS.

Propter oppida nascitur. *Idem.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Flores cū cerato triti, steatomata discutere produntur. *Idem.* Ictericos breui ad bonum colorem restituunt, si sequente longo balnei vsu, post exitum ebibantur, caules manduntur olerum modo.



Ddd 5

*CHRY-

*CHRYSANTHEMONMINUS. Germanis, Klein Goldblum.

CHRYSANTHEMON MINVS.

FORMA.

Minutioribus prouenit folijs, nec tam altè attollitur vt præcedens, quæ humanam altitudinem nonnunquam adæquat, vel etiam superat. Semē est amarissimum, in flore & folijs nulla est aut minima amaritudo.

LOCVS.

In hortis satum facilè prouenit, forte etiam sponte aliubi nascitur.*



AGERA-

AGERATVM, Græcis, ἀγέρων. Officinis, *Eupatorium Mesue*. Italis, *herba Giulia*.
Germanis, *Greimbd eberkraut*.

AGERATVM.



FORMA.

Fruticosa est herba, binū Diosc.
dodrantū longitudine assur-
gens, simplex, humilis, origa-
no maximè similis: umbellā
gerit, in qua flos bullis aureis
similis, helichryso minor: no-
men ei inditum est, quoniam
diutissimè flos in sua coloris
specie conseruetur.

LOCVS.

Nascitur in inculto solo, *Matth.*
& in pascuis,* & in hortis plā-
tata viget.*

QUALITATES.

Digerit, & inflāationes *Galen. 6.*
quodammodo resoluit. *simp. me.*

VIRES.

Vis decocti feruēs, herbae *Diose.*
vltæ nidor vrinam ciet, & vul *Matth.*
uæ duritias emollit. Florum *Mesue.*
dilutū ex albo meraco para-

rum, puerorum vermes necat duarum vnciarum pondere potum. Excalfacit
ordine primo, & siccatur secundo. Bilem, & pituitam faciliè purgat, tenuat, inci-
dit, terget, expurgat, putredinem prohibet: resoluit sine attractione, obstru-
ctiones reserat, & earum affectus sanat, diuturnis febribus mirificè medetur.
Adstringit, quare ventriculum, iecur, & cætera viscera roborat: cum sero la-
ctis efficacius purgat.

CENSURA.

Medicam materiam non assequuntur, qui negant Eupatorium Mesuis non
esse Dioscoridis Ageratum.

*AGERA-

Varietas deprehenditur in Agerato. Nam quod sponte nascitur in Hetruria, multò minus est, nec adolescit tantopere, vt hortense nostrum, quod & surgit altius & folia habet magis crenata, vt Cristagalli. Obseruatur etiã quẽdam Agerati species, quæ candidas prorsus umbellas gerit, sed rarior est cæteris.*



VERBE-

NOMINA.

797

VERBENACA, Græcis, Περσέων, ἢ ἰσὰ βοτάνη. Latinis, *Verbenaca supina*. Italis, *Verminacola, Berbena, & Berbenaca*. Germanis, *Eisenkraut*. Gal. *Vernaine masse*.

VERBENACA.



FORMA.

Ramulos emittit cubitales DIOSC.
aut maiusculos, angulosos, in
quibus ex interuallis folia ex-
eunt quercus, sed minora, &
angustiora, eiusdem in ambi-
tu diuisuris, colore aliquate-
nus cæsius. Radix lōga, tenuis.
Flores purpurei, graciles.

LOCVS.

Nascitur secus vias in ciui-
tatibus, & oppidis, & in pla-
teis. *Matth.*

QUALITATES.

Vim habet aded desiccantem, Gal. li. 8.
ut vulnera glutinet. In-
signiter est amara: quare excal-
facit, & siccatur, abstergit, ape-
rit. *simp. me. Matth.*

VIREs.

Folia cū radice in vino po- DIOSC.
ta, illitæ, serpentium ictibus
auxillantur. Folia bibuntur cōmodè ex vino vetere quadragenis diebus ad icte-
ritiam: veteres tumores & inflammationes mitigant: sordida vlcera purgāt: to-
ta in vino decocta, tonsillarum crustas abrumpit: oris nomas gargarizatu cohi-
bet: Datur potandum in tertianis febribus, tertium à terra geniculum, cum fo-
lijs circundantibus: quartanis quartum. Sacram vocāt herbam, quoniam mul-
tum ad amuleta, expiationesque commendetur.

HYACIN-

HYACINTHVS, Græcis, *Ἰακινθός*. Italis, *Hiacinto*. Germanis, *Mergenblumen*. Hispanis, *Maos flores*. Gallis, *Vaccet*.

HYACINTHVS.

GENERA.

* Aliquot genera habentur, è quibus sequentia depingi curauimus, nimirum vulgare hyacinthum, & peregrinos tres.*

FORMA VULGARIS.

Diosc. Folia habet bulbi: caule dracontalem, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris: comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruamque: radicem quoque bulbaceam.

LOCVS.

Matth. Nascitur in campestribus, ferè vbique inter segetes.

QUALITATES.

Gal. li. 8. Bulbosa radix exiccat ordine primo, & refrigerat secundo completo, aut tertio incipiente: semen leuiter extergit, & adstringit. Exiccat autem quadantenus ordine tertio. Cæterum in medio consistens caliditatis & frigiditatis.

VIRE.


Diosc. Pota radix aluum sistit, & vrinas propellit: phalagiorum moribus medetur. Semè adstringentius est, theriacis expetitum, cum vino potum ictericos iuuat.

*HYACIN-



[*HYACINTHVS TRIPOLITANVS.

Flore pulcherrimo, phalan-
gij florem representante, cę-
rulei coloris prouenit, caule
gracili, folijs admodum an-
gustis. Radix illi bulbosa non
magna.*



HYACIN-

HYACINTHVS orientalis, Italis, *Hiacinto orientale*.

F O R M A.

Matth.

Folijs exit lilij, minoribus, angustiorib⁹, sursum spectantibus, pinguioribus, & in acutum desinentibus: caule crasso, in quo flores exeunt cærulei, lilij figura, sed parui. Radix illi bulbosa, squamosa que.

L O C V S.

Idem.

Seritur in hortis, & colitur in fictilibus vasis, * imo nō opus est, vt in fictilibus asseruetur, cum nihil periculi ipsi à frigore immineat.*

HYACINTHVS ORIENTALIS.



HYACIN-

NOMINA.
HYACINTHVS ORIENTALIS ALTER.

301

FORMA.

Folij est alterius latioribus,
pinguioribus, & in summitate
retulis. cetera ceteris per-
quam similia sunt.



Ecc

РАРА-

PAPAVER erraticum, Græcis, *Μήκον ποικίλον*. Ital. *Papavero saluatico*. Germ. *Flap-
per Rosen*. Hispan. *Amapollis*, seu *Papoulla*. Gallis, *Pauot sauvage*, sine consensu.

PAPAVER ERRATICVM.

FORMA.

Diosc. Folia habet erucæ, diuisa,
scabra: caulem iuncum, re-
ctum, cubitalem, asperum.
Florem sylvestris anemones
puniceum, interdum album:
capite oblongo. sed anemo-
nes minori, in quo rufum se-
men. Radix est longa, subal-
bida, minoris digiti crassitu-
dine, gustu amara.

LOCVS.

Matth. Nascitur plurimum in ar-
uis inter segetes.

QUALITATES.

Gal. 6. Refrigerandi, ac soporem
simp. me. inducendi illi potestas est.

VIRES.

Diosc. Capita quinq; aut sex invi-
ni cyathis tribus ad dimidias
decocta, potuiq; data, sopo-
rem faciunt: semen acetabuli
mensura ex aqua multa pota, aluum leniter emollit: folia cum calycibus illita

Matth.

Flores in puluerem triti, & ex aqua dulci pori, pleuritidi commodè medentur.
* Aqua florum commendatur ad Erysipelata, & oculorum inflammationes.
Hac imbuta stuppa cannabina, vtiliter imponitur iccoris regioni ad compe-
scendum sanguinis fluxum è naribus.*

PAPA-



PAPAVER sativum, Græcis, *Μήλον ῥόδον*. Arabibus, *Thaythay*, seu *Caschas*.
Italīs, *Papauero domestico*. Germanis, *Magsamen*. Hispanis, *Dormidera*. Gal-
lis, *Pauot blanc*, seu *Pauot priue*.

PAPAVER SATIVUM.



GENERA.

Tria eius habentur genera. Diosc.
Hortense, cui candidum inest
semen: & sylvestre, cuius duo
sunt genera, quæ etiam serun-
tur: His accedunt cornicula-
tum, & spumeum.

FORMA.

Hortense capitulum habet *Idem*.
oblongum, & semen candi-
dum, sylvestre verò caput ha-
bet infidens, demissumq; &
semen nigrum. Tertium ma-
gis sylvestre, multò his longi-
us est, & productiore capitu-
lo.

LOCVS.

Hortense in hortis, cætera Matth.
in campis feruntur.

QUALITATES.

Omnium facultas refrige- *Galen. 6.*
ratoria est, sativi autè semen *simp. me.*
mediocriter somnum conci-
liat, visu candidum. Cætera ge-
nera longe magis soporifera
sunt.

VIRES.

Omnium in commune na- Diosc.
tura refrigeratrix: foliorum,

capitumq; decoctum ex aqua paratum, somnum conciliat: calyces cum farina
hordeacea triti, & cataplasmati admisti, ignibus sacris, & inflammationibus
medentur. coquantur quoque capita per se ad dimidias. coquiturque deco-
ctum cum melle, quousq; eclegmatis modo crassescant. Hoc itaq; modo para-
tur medicamentum ad tussim, arteriæ fluxiones, & cæliacos affectus, efficacius
tamen redditur, addito hypocistidis succo, & acacia: Cæterum nigri papaveris
semen tritum cum vino bibitur contra citam aluum, & foeminarum profluvia,
& fronti quoq; in peruigilijs illinitur ex aqua. Opium autem, quod è papave-
rum nigrorum capitibus paratur, magis refrigerat, inspissat, siccaturq;.

Ecc 2

*PAPA-

In hortis cultioribus passim habetur hoc papauer, elegantiae gratia solummodo, nam densis foliorum lacinijs cirrisque luxurians aspectui mirè blanditur, sed capitula ferè inania, nec tanta seminum copia distenta exiguum fœnus reddunt, ideoq; ijs qui delectationi vtilitatem præferunt hoc papaveris genus non vsq; adeo expetitur.*



PAPA-

PAPAVER corniculatum, Græcis, Μήλον Κεράτιν. Arabibus, Almacharam. Italis, Papauero cornuto. Germanis, Gelböl Wagen. Hispanis, Dormidera marina. Gallis, Pauot Cornu.

PAPAVER CORNICVLATVM.

FORMA.

Folia habet candida, hirsuta, verbasco similia. in ambitu sylvestris papaueris modo ferrata: caule non dissimili: flore pallido (quandoq; puniceo) calyculo in corniculorum modum inflexo: semine papaueris, pusillo, nigroque: Radice per summa cespitum nigra, crassaq;.

LOCVS.

Nascitur in maritimis, & Idem. asperis. Cæterum quod flo Matth. re est puniceo nascitur copiosum in campis, in Moravia, & Boemia.

QUALITATES.

Vim habet incidendi, & abstergendi. Galen. 7. simp. me.

VIRE.

Radicis decoctum, ad diem paratum, coxendicum & iocinoris affectus potu sanat: prodest his, qui crassa quædam, & arenosa cum lotio reddunt. Semen in aqua potum acetabuli mensura aluum leniter purgat Illita folia, & flores, crustas emarginant, & iumentorum argemas, & nubeculas abstergunt.

Ecc 3

HYPE-



HYPECOVM, Græcis, ὑπεκοῦν. Italis, Hippocoo. Germanis, Benediger Pappel/
Wetter Nößlin.

HYPECOVM.

FORMA.

Matth.

Folijs prouenit rutæ paulò
maioribus, si singulatim ex-
pendantur, caulibus exilibus,
mollibus, hirsutis, in quibus
flores sunt pallidi, & propè
calycem subpurpurei: flori-
bus succedunt capitula, tenui
inuolucro contecta, in qui-
bus semen recòditur nigrum,
tactu asperum, pseudomelan-
thio proximum.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in agris inter sege-
tes, & legumina.

QUALITATES.

Galen. 8. Refrigerandi vim habet, ex
simp. me. tertio ferè refrigerantium ordine, aded, vt parum absit à papauere.
Diosc.

VIRES.

Natura eadem, quæ papaueris succo.

APPENDIX.

Nullam hæcenus plantam mihi videre licuit, quæ magis hypecoun referat:
tamen si etiam mihi per omnia non satisfacit.



HYOSCY-

HYOSCYAMVS, siue Apollinaris herba, Græcis, *τοκνιάου*. Arabibus, *Bengi*.
Italis, *Iusquiamo*. Germanis, *Bissam*. Hispanis, *Velenho*. Gallis, *Iusquame*, seu
Hanabene.

HYOSCYAMVS.

GENERA.

Tria sunt eius genera. Ni- Diosc.
grum, Album, & Flauum.

FORMA.

Flauifolia lata sunt, & ob- Diosc.
longa, diuisa, nigra, hirsuta.
Flores è latere caulis ordine
prodeunt, tanquam punico-
rum cytini, scutulis septi, se-
minum plenis, vt papaueris.
Flores ei sunt lutei, & semen
subflauum, & siliquæ mino-
res. In nigro autem flores spe-
ctantur purpurei, & cytini præ-
duri ac spinosi: radice alba di-
gitali crassitudine.

LOCVS.

Proueniunt secus itinera, Matth.
& in agrorum marginibus.

QUALITATES.

Cui semen atrum est, insa- Galen. 8.
niam, ac soporem affert. Huic simp. me.

propinquam habet facultatem, cui semen mediocriter est flauum. verum vtri-
que fugiendi sunt, vt inutiles, & venenosi.

VIRES.

Flauifolium, vbi album non addit, eius loco supponi potest, sed maiori cum Diosc.
cautela vti eo præstat.

Ecc 4

HYOSCY-



HYOSCYAMVS albus, Græcis, *ῥοσκάμω λευκός*. Italis, *Iusquiamo bianco*.

HYOSCYAMVS ALBVS.

FORMA.

Matth.

Folij crescit alterius non dissimilibus, sed subrotundis, pinguioribus, mollioribus, hirsutioribus, rarioribus, albicantibus. Flores illi candidi, aut subpallidi, è quibus eodem ordine, quo in cæteris, cytini oriuntur, sed rariores, & clementiores, in quibus album concluditur semen.

LOCVS.

Idem.

Nascitur sponte, & feritur in hortis.

QUALITATES.

Galen. 8.

Ad sanationes is vel maxime idoneus est, ex tertio quodammodo ordine refrigerantium.

VIRE S.

Diosc.

Semen collyrijs, quæ dolorum sensum auferunt, commodissime inseritur: contra acutas, calidasque fluxiones, aurium dolores, atque vuluæ mala profunt: cum farina autem hordeacea oculorum, pedumque, ac cæterarum partium inflammationes placat. Idem tussis, deffillationibus, & oculorum doloribus efficax est. Contra mensium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem oboli pondere, cum papaueris semine, & aqua mulsa bibitur. Podagris subuenit, testibus inflatis, mammis que à parturientibus, tritum ex vino illinitur. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, tum per se, tum cum hordeacea farina vtiliter imponuntur: recentia ad mitigandos omne genus dolores oblinuntur. Radix in aceto decocta dentium dolores mulcet.

HYOSCY-



HYOSCYAMVS tertius, seu potius quartus. Italis, *Iusquiamo nuouo, seu Iusquiamo maggiore*. Germanis, *Bundt Bilsam, gelb Bundttraut*.

HYOSCYAMVS TERTIVS.

F O R M A.



Planta est insignis, caules edit sesquicubitales, rotundos, tenui obductos lanugine, ramososq; folijs amplis, pinguibus, tenui pilo pubescētibus, mollib⁹, solani soporiferi speciem quadantenus referentibus, graui etiam odore. Flores edit pallidos, hyoscyami emulos, è quibus capitula subrotunda oriuntur, quæ nonnullâ hyoscyami cognationem præferunt: similibus enim ferè scutulis concluduntur, coronato circumquaq; cacumine, & semine intus subflauo: Radice est alba spithamæ longitudine.

L O C V S.

Seritur in hortis.

Idem.

F A C V L T A T E S,
E T V I R E S.

Refrigerat ordine tertio *Idem.*
completo: soporem inducit, adeò vt ea sit ei natura, quæ cæteris Hyoscyamis.

Ecc 5 *HYOSCYA-

*HYOSCYAMVS Peruvianus vulgo dictus, quondam Pontiana & Nicotiana. Hispanis, *Petun*, & *Tabaco*. Gall, *Herba de la Roine Mere*. Germanis, *Indianisch Windkraut*. Indis, *Picielt*.

FORMA.

Ampla, pmit folia, sinuata per ambitū & in mucrone sem se colligētia, molli lanugine pubescētia, pingua & mordicantia linguā, si gustetur: flores pētagonos in summo caulis insidentes, ramulis cōpluribus dilutiorē purpura rubescentes, quib. oblongæ, teretes acuminatæq; succedūt capsula, in medio habētes interstitiū quoddā, paruo semine pulloq; refertæ. Caules humanā altitudinē vincunt, & radicib. diuaticatis albisq; terraherēt.

LOCVS.

Nascit in India locis humidis & umbrosis, & exulto leuiq; solo. In hortis nostris semel plātata, postea seipsā ferit hęc herba, decidentibus ē vasculis seminibus, sed nisi perhiemē in fictilib. asseruetur, eius iniurias ferre nequit.

QUALITATES.

Adeo diuersis facultatibus præditā ex varijs partib. cōponi apparet. Recēs enim non nihil frigidi possidet, & nimio humore obtūdit latitantem calorem, qui tamen in arida egregie se profert, adiunctam siccitatem habet.

VIRE.

Ad varios morbos, eosque diuersos celebratissima est. Folia Cephalgiam ex frigore ortam sedant, si imponantur, & ventriculi dolores compescunt. Sed & soporem inducunt, podagricis cruciatibus medentur, vermes intestinorum necant, matricis tormina discutiunt, impetigines emendant, vulnera & vlcera sanant, caneros item & carbones. Aqua elicitur ex herba, quæ eadem potest: colluuntur succo dentes, si dolent, syrupus ex hoc conficitur, tussientibus, asthmaticis, & alijs eiusmodi morbis pituitosis conueniens. Nec non epilepticis & hydropicis succus propinatur in Hispania, sed caute est agendum, nam robustissimis quoque validum purgans fuisse obseruatum est. Vnguentum ex Nicotiana paratum apud alios autores videatur. Indi fumum foliorum hauriunt ad recreandas vires.*

PSYLLIVM,



NOMINA.

311

PSYLLIVM, Græcis, ΨΥΛΛΙΩΝ. Arabibus, Bazarachat bona, seu Bezer corhume. Italis, Psillio. Germanis, Psyllienkraut. Hispanis, Zargatona. Gallis, Herbe à puce.

PSYLLIVM.

FORMA.



Folij est incanis, longis, Matib. hirsutis, coronopo æmulis, non tamen corniculatis. Ramis numerosis, dodrantalibus, rotundis, gracilibus, & foliosis, humi potius, quàm in altum sese diffundētib, in quorum cacuminibus capitula oriuntur, scabiosæ vocatæ modo: flosculos edit pusillos, prætenues, lanuginosos, pilorum specie referentes, albo colore, plantaginis angustifoliæ modo, semē pusillum nigrum, pellucidum, pulicum effigie.

LOCVS.

In arvis & incultis nasci. Diosc. tur.

QUALITATES.

Semē admodum vtile est, Gal. li. 8. ex secundo refrigerantiū or- simp. me. dine, in desiccando verò &

humectando, medium quodammodo est, & symmetrum.

VIRE.

Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & emolliendum conueniens: articu- Diosc. lorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, luxatis, illitum auxiliatur. Imponitur in dolore capitis cum rosaceo, aqua, aut aceto. Enterocellis infantium, & prominenti vmbilico, illitum ex aceto medetur. Seminis mucago ex aqua parata, vehementer refrigerat: cōtra sacros ignes efficax est: cum adipe tutum sordida vlcera, & quæ cacoethe vocantur, expurgat: succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle infusus prodest.

SOLA-

SOLANVM hortense, Græcis, Στεφύλιον καπνικόν. Arabibus, Hamebathanaieb, seu Hameb alcha chaich, seu Hanabalt haleb. Italis, Solatro, seu Herba morella. Germanis, Nachtschatt. Hispanis, Xerua mora. Gallis, Morelle.

SOLANVM HORTENSE.

F O R M A.

Matth. Folijs exit ocimo maiorib. sed amplioribus, nigriorib⁹, mollioribus. Plures circūque fundit ramos, non sine alarum cavitatibus, florib. albis, & in medio luteis, stellæ figura, baccas edit rotundas, racematim dependentes, vinoso succo prægnantes, orobi quantitate, in quibus semē continetur albū, minutumque: variat in baccis color: namque in hac planta nigra, in illa lutea, in altera subuirdes spectantur.

L O C V S.

Idem. Nascitur in hortis, plateis, secus itinera, & ferè vbique.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 8. Vfus eius est ad omnia ea, quæ refrigerari & adstringi possunt, potest enim hæc duo ordine secundo.

V I R E S.

Diosc. Folia conuenienter illinuntur, cum hordeaceæ farinæ polline ignibus sacris, & vlceribus, quæ serpunt: agilopia, capitisque dolores, trita, & imposita per se sanant: a stuant stomacho auxiliantur: parotidas cum sale detrita, illita discutiunt, foliorum succus, cum rosaceo perfusus, valet contra infantium syriasim: instillatur vtiliter aurium doloribus: in vellere subditus, mensum abundantiam sistit. Fuluo gallinarum fimo subactus & appositus, agilopis præsentaneo est remedio. Phreniticos inuat ex aceto, & rosaceo sincipiti illitus. Illinitur fronti contra calidas oculorum fluxiones. Gargarizatur quoque cum aceto, ad faucium, & columnellæ inflammationes, & additur cōuenienter in vnguentis, & emplastris, quorum ad vlcera contumacia est vsus: cibus idoneus est.

Matth.



SOLA-

N O M I N A.

813

SOLANVM Halicacabum, Græcis, *ἡλικακάβου*. Mauritanis, *Kekengi*, seu *Alkekengi*. Italis, *Alcachengi*, & *Halicacabo*. Germanis, *Judenbœcklin*, *Schlutten*, *Judenfirschen*. Hispanis, *Besiga de perro*. Gallis, *Buguenandes*.

SOLANVM HALICACABVM.

F O R M A.



Folia mittit hortensis simi *Matth.* lia, sed latiora, firmiora, & sub aspera, nec adeò, vt in illo nigricantia: caulibus lentis: floribus cædidis, è quibus vesicæ oriuntur turbinatæ, iuglandiū magnitudine, angulosæque, quæ per maturitatē rufescunt, in quibus singulis singule concluduntur bacce, vinoso succo refertæ, ipsæq; rubentes rusci baccis persimiles, sapore austero, simul & amaro: numero minutoq; intus lemine.

L O C V S.

Nascitur propter vligino. *Idem.* sas sepes, & locis vmbrosis.

Q U A L I T A T E S.

In foliorū facultate hortēsi *Gal. li. 3.* solano simile est, multis admi *simp. me.* scet compositis, q̄ ad iecur, vesicā, & renes accommodantur.

V I R E S.

Vim, vsusque hortensis solani habet: verum in cibis nunquam expetitur, re- *DIOSC.* gium morbum purgat: semen potum vrinam pellit. Baccarum vis habetur *Matth.* non solum præstantissima ad renum vitia, & ciendam vrinam, sed ad eius quoque acridinem retundendam: bibitur namque earum succus ad ea omnia vtiliter cum papaveris albi cremore, aut seminum melopeponum, aut cucurbitæ, cucumerisve. Aspidibus autem adeò aduersissimū est Halicacabum, vt admota propius eius radice, sopore inexpugnabili necentur.

V E S I C A.

VESICARIA, siue Halicacabum repens. Italis, *Vilucchio forestiero*. Germanis, *Hersamen/Hersförner*.

VESICARIA, SIVE HALICACABUM REPENS.

F O R M A.

Matth.

Folijs cōstat oblongis, per ambitum laciniatis, floribus pallidis, aut candidis, è quibus vesicæ prodeunt virides, subrotundæ, senis secundum longitudinem suturis: semine intus pullo, erui magnitudine, aut paulò maiore, in cuius latere humani cordis nota visitur albo colore.

L O C U S.

I dem.

Seritur in hortis, & fictilibus, ad topiaria.

Q U A L I T A T E S.

I dem.

Creditur valere semen ad omnes cordis affectus, ob notam quaidem insignitur.



SOLANVM

NOMINA.

315

SOLANVM somniferum, Græcis, *Σνβλνθ & πνρνδς*. Italis, *solatro somnifero*.

SOLANVM SOMNIFERVVM.

FORMA.



Numerosis fruticat ramis, DIOSC.
densis, caudicosis, fractu con-
tumacibus: folijs multis, pin-
guibus, cotoneæ mali haud
abfimilib⁹. plenis, flore gran-
di, rubro: fructu in folliculis
croato: radice grandi, subru-
bro cortice vestita.

LOCVS.

Nascitur in saxosis, non *Idem*.
procul à mari.

QUALITATES.

Radici cortex opio qui- *Gal. li. 8.*
dem perfimilis est, sed imbe- *simp. me.*
cillior, aded vt tertium refri-
gerantium ordinem non ex-
cedat: cum opium sit quarti.
Idem desiccat secundo ordi-
ne completo, ac tertio inci-
piente.

VIREs.

Radici cortex ex vino drachmæ pondere potus, somnificam vim habet, o- DIOSC.
pio tamen mitiorem: Semen vehementer urinã cit, corymbi duodecim hydro-
pici dantur: plures verò mentis alienationem faciunt. Remedio est aqua co-
piofa potui data: inferitur pastillis, & medicamentis, quæ doloris leuamentum
prestant. Vinum in quo idem decoctum fuerit in ore contentum, dentium do-
lorem mulcet. Radici succus ex melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

SOLANVM

SOLANVM somniferum alterum. Italis, *Solatro Somnifero minore.*

SOLANVM SOMNIFERVM ALTERVM.

FORMA.

Matth.

Folij est angustioribus, venosis, in humum spectantibus: caule anguloso: Floribus tinnabuli figura, subpurpureis, per ambitum crenatis, ex quibus baccae proueniunt nigrae, vinosae, minuto intus semine, viridi quodam calyculo ad medium usque contractae, in coronae modum denticulato. Radicem habet gradem, strumosam, albicantem.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in montibus inter saxa.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Vires alteri similes habet, sed proculdubio imbecilliores.



SOLANVM

SOLANVM maius. Italis, *Solatro maggiore*, *sive Herba bella donna*. Germanis, *Dolkswur* / *Schlaffbeer*.

SOLANVM MAIUS.

F O R M A.



Folijs prouenit hortensis *Matth.* solani maioribus. caule bicubitali, tricubitalique, atque maiore, ramis numerosis, alis multis, floribus oblongis, tintinnabuli instar concavis, subpurpureis, capillaceis intus staminibus. His bacca suboriuntur singulatim dependentes, & breui calyculo superiori parte comprehensa, quæ maturescen-tes nigricant, acini uæ magnitudine, pellucida exterius cute, vinoso succo prægnantes, ac minuto numerosoque semine. Radicem fundit longam, crassam, albicantem, & succi plenam.

L O C V S.

Nascitur in montibus *Idem.* xosis, & feritur in hortis.

F A C U L T A T E S.

Refrigerat ordine tertio, *Idem.* & siccatur secundo, estque

somnifico solano viribus simile.

V I R E S.

Bacca quatuor, aut sex deuorata, fumentes deliros faciunt, atq; furentes, plures verò veternosos efficiunt. Aqua è tota planta distillata, (ut quidam fatentur) duorum, aut ad summum trium cochleariorum mensura, internas viscerum inflammationes extinguit, nullo omnino incommodo: sed à copiosiore potu abstinendum. Eadem exterius admota, erysipelas, sacros ignes, & alios calidos affectus inuat: contusa folia, & illita oculorum, palpebrarumque flegmonas mitigant.

F f f

M A N D R A -

MANDRAGORAS, Græcis, *Mandragoras*. Arabibus, *Labora*, seu *Labrolac*. Italis, *Mandragola*. Germanis, *Araun*. Hispanis, *Mandracola*. Gallis, *Mandragore*, siue *Mandegloire*.

MANDRAGORAS.

GENERA.

Diosc. Duum est generum nigra, quæ femina, & Alba, quæ mas dicitur.

FORMA FEMINÆ.

Idem. Folijs prouenit lactuæ minoribus, angustioribusque, virosis, ac grauculentibus, humi sparsis. Mala gerit forbis similia, pallida, odorata. in quibus semen veluti pirorum: Radicibus cohaeret magnis, binis ternisve inter se conuolutis, nigris foris intus albis, crasso cortice vestitis: caulem nullum fert.

LOCVS.

Matth. Nasceitur copiosa in Gargano Apuliæ, & alijs in montibus quæque habetur.

QUALITATES.

Gale. 7. simp. me. Vincentem habet facultatem refrigerantiam, adeo, vt tertij sit ordinis refrigerantium, verum, & caliditatis cuiusdam particeps est, & in primis humiditatis, proinde soporis conciliandi vim habet. Radicis cortex cum sit valentissimus, non tantum refrigerat, sed etiam desiccet: reliquum, quod intus est, imbecillum existit.

VIRES.

Diosc. Succus è radicibus corticibus duobus obolis ex mulso potus, vomitione bilem atram, pituitamque extrahit: potu verò largiore interimit. Admiscetur medicamentis ocularibus, & his, quæ dolores finiunt, semioboli pondere inditus. partus per se, & menses expellit. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus, quas vlcera excitant, cum farina hordeacea imponuntur: suppurationes, Strumas, & tubercula discutunt: stigmata delent, si quinis, senisve diebus sensim perfricentur. trita radix ex melle, aut oleo illita, serpentium moribus medetur. Mala olfactu soporem afferunt. ac etiam si mandantur: Semen eorundem potum vulvas purgat. Radix ebur emollire fertur, quæ senis hioris, cum decocta sit & ad accipiendam, quam ctingere optaueris formam, ipsum facile præstat.

MANDRA-



NOMINA.

819

MANDRAGORAS mas, Græcis, *Mandragoras asplou*. Italis, *Mandragola maschio*.

MANDRAGORAS MAS.

FORMA.

Folia habet magna, alba, Diosc.
lata, lævia, ut betæ: mala-
que alterius duplo maiora,
colore in crocum inclinante,
iucundè, cum gravitate
quadam olentia, quorum
pomorum cibo aliquan-
tùm opiliones soporantur.
Radix alterius est similis,
maior tamen, & candidior,
orbata & hæc caule.

LOCVS.

Nascitur & hæc in mon- Matth.
tibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Isdem est insignita facul- Diosc.
tatibus, quibus & fœmina.

CENSURA.

Qui credunt, mandrago-
ras, quæ ab impostoribus circumferuntur, humana forma, esse legitimas,
manifesto hallucinantur. Factitiæ enim sunt.

Fff 2

MELON-



MELONGENA, seu mala insana, Italis, Petranciani, seu Melanzane. Germanis, Dölsöpfel.

M E L O N G E N A.

F O R M A.

Matth.

Folia gerit stramonix cognata, aut maioris solani subaspera tamen, & subhirsuta, & per ambitum sinuata, caulivnico, dodrantali, aut maiore, tereti, firmo, subpurpureo, & hirsuto: flores edit albicantes, aut subpurpureos in stellæ modum, è quibus oblongi oriuntur fructus, cucumeris magnitudine, purpurascens, virentesve, lævi cortice, succola albicanteque intus pulpa: semine numeroso, paruo, siliquastris æmulo: radice nititur multifida.

L O C V S.

Idem.

Seritur in hortis, & vasis fistilibus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem.

Manduntur in cibis fructus.

Alicen.

Sunt è nostratibus, qui horum esu venerem concitari putent: quod forsitan ideo præstant, quod flatus gignant. Caterum, frequenter manducati, cum biliosos, tum atrabiliarios generant humores, viscerum obstructions, carcinomata, elephantiasim, tristitiam, capitis dolores, & iocinoris, & lienis obstructions. Quo fit vt postea diuturnæ oriantur febres, & habitus malus.

* P O M A



* POMA AMORIS. Poma aurea. Italis, *Pomo d'oro. vel Pomi del Peru.* Gal-
lis, *Pommes d'amours.* Germanis, *Goldsäffel.*

POMA AMORIS.



F O R M A.

Herba late ramos spargit,
grauiter olentes, fere vt Ga-
riophyllorū Indicorum plan-
ta, crescit ad altitudinem hu-
mani corporis. fert poma ma-
gnitudine oui, primo viridia,
vbi maturuerint, crocea, vel
rubra.

L O C V S.

Habetur in hortis, locisque
gaudet humidis.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Frigida est, & forte nō absq;
maligna qualitate, Poma vero
innoxie in Italia eduntur. Ea-
dem oleo macerantur & inso-
lantur, vel in fimum equinum
infoduntur, ad scabiem inun-
gendam, idque mirifice à qui-
busdam commendatur.*

Fff 3 ACONI-

ACONITVM Pardalianches, Græcis, ἀκόνιτον παρδαλιανχες, ἢ Θηλυφόρον. Ital.
lis, Aconito pardalianche.

ACONITVM PARDA-
LIANCHES.

GENERA.

Matth. Quatuor nos obseruauimus genera. Primum, quod Diolcoridis, secundum, quod Plinij, tertium quod Theophrasti esse censemus, & quartum, quod Doronicum errore magno vocatur.

FORMA PRIMI.

Matth. Planta est admodum rara, folijs cucumeri proximis, sed maioribus, ad summum quatuor, subhirsutis. caulem edit dodrantalem, floribus chrysanthemi similibus, sed minoribus. Radicem alabastriformi modo splendentem, digitali crassitudine, in acutum desinentem, incuruam, geniculatam, & tota facie scorpj caudam æmulantem.



LOCVS.

Diosc. In nudis, & arduis montium summitatibus, cauitibꝫ; prouenit, vmbrosistantum locis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. simp. me. Putrefaciendi facultatem obtinet, & lethale est, itaq; cibo, potuq; fugiendum: attamen ad putrefaciendum extremas corporis partes, aut circa sedem, idoneum est: Herbæ verò radix ad hæc utilis est.

VIRES.

Oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adijcitur: Enecat pantheras, lupos, & feras omnes in carnibus obiectum: torpescunt, (vt fama est) scorpiones, admota radice, stupentq; sed statim ellebori contactu excitantur.

* APPENDIX.

Planta hæc tam rara est, vt non dum etiam diligentissimis Rei herbariæ studiosis sese vspiciam offerre voluerit. De ea itaq; nihil adhuc certi indicare possumus: alij plane negant extare. *

ACONI-

Ita- ACONITVM Pardalianches Theophrasti. Italis, *Aconito Pardalianche terzo.*

ACONITVM PARDALIANCHES
THEOPHRASTI.

FORMA.

Folia profert cyclamini *Matth.*
haud dissimilia, radicem scor-
pionem integrum præsefe-
rentem. cui fibræ insunt ge-
niculatae, graminis modo, &
eiusdem quoque modo se se
propaginant, & alios quo-
que scorpiones effingentes,
e quibus germina, & folia e-
rumpunt. Atqui caules, &
flores à cæteris minimè diffe-
runt. * Est vero hæc planta
sequenti Doronico conge-
ner. *

LOCVS.

Nascitur in altissimis mon- *Idem.*
tibus, præscriptis locis.



Fff 4

ACONT-

ACONITVM pardalianches minus, Officinis, *Doronicum*. Italis, *Doronico*. Germanis, *Gemsentwurz*.

ACONITVM PARDALIAN-
CHES MINVS.

FORMA.

Matth.

Folia, caules, & flores gerit cæterorum generum similes, radicem quæ graminis modo serpit, & quæ hinc inde numerosa edit tubercula scorpionum effigiem præferentia, candida, tenera ac dulcia.

LOCVS.

Idem.

Nascitur & hoc in altissimis montibus, vbi syluestres capreæ inhabitant.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Radix canes, vulpes, & lupos necat cum carnibus duarum drachmarum pondere propinata: Est enim lethalis, & deleteriæ facultatis.

* CENSURA.

Arabum *Doronicum* non esse hoc nostrarum officinarum *Doronicum* facile assentior Autori, pro quo radicem *Galangæ* vel *Zedoariæ* cum pauco cortice *Citri* substituendam esse cum alijs peritis medicis cenfeo. Sed venenum esse illud & hominibus lethale, nondum comprobauit experientia, licet canes interimat. Venatores certe multis in locis apud nos, præsertim vbi sunt venationes *Rupicaprarû*, comedunt contra vertiginem & vocant, *Schwindelkraut*. *

* TORA



NOMINA.

325

*TORA maior, Toxicum Valdensium. Italis, *Thora Gualdesē*.

TORA MAIOR.

FORMA.



Folia habet Cyclamino similia, circinata & aspera, non hirsuta, per ambitum crenata, duo, tria, quatuor, aut etiam quinque ab vna radice, magnitudine & figura ferè foliorū Cucumeris. Flores profert æstatis principio, Ranunculo colore & specie similes, & semen etiam simile. Radices plures, coniunctæ vt aphodeli ex vno capite producentes, cum recentes sunt omnium candidissimæ sunt, non tamen alabastri modo splendentes, sicciscentes vero ad rufum colorem abeunt.

QUALITATES,
ET VIRES.

Caustica vis ipsi inest & veneno Napellum superat. Eius succo venatores sagittas inficiunt.*

Fff 5

*TORA

Minoribus folijs constar,
ad plurimum tribus ab vna
radice, sæpius verò singulari
tantum folio prædita est. Flo-
res quòque minores sunt, fi-
miles tamen, vti & semen. ra-
dices lōgiusculam habent ap-
pendicem scorpij caudæ æ-
mulam, qua se propagare vi-
detur.*



ACONT-

NOMINA.

827

ACONITVM II. Luparia nostra. German. Woffenurg.

ACONITVM II.

Flores habet luridos aut
luteos pallescentes.

LOCVS.

Nascitur hoc, cum ceteris *Matth.*
infra scriptis generibus, in al-
tis montibus, & praesertim in
monte Baldo in Veronensi a-
gro.



ACONI-

ACONITVM III.

Folia explicat rotunda in
rotæ modum, per ambitum
incisa, innitentia oblongo pe-
diculo, flosculus hyeme nasci-
tur aureus, Ranunculi æmu-
lus, qui si minor fuerit flauior
est, si maior aut longiusculus
obscurioris est flauedinis,
quem subsequuntur siliquæ
omnino similes ellebori nigri
siliquis, sed in diuersum ma-
gis tendunt. Radix ex pluri-
bus tuberculis aut granis cõ-
ponitur, acris sapore & fer-
uenti.*



ACONT-

ACONITVM IIII.

*Flores. promit caruleos.
caudatos.*



ACONIT-

ACONITVM V.

Flores illi insunt * crocei,
folia vitigineis aut ficulneis ac-
cedunt magnitudine ac figu-
ra seu diuisione, maculis verò
albis & liuescentibus venis
deformantur, radix nigricat.
Sic enim pinxit peritiss. phar-
macopola Veronensis Fran-
ciscus Calceolarius, cui etiam
sequētes picturæ acceptæ re-
ferendæ sunt.

L O C V S.

Magna eius copia inueni-
tur in monte Baldo.*



ACONI-

ACONITUM VI.



* Napello simili folio sed
multo maiore conspicitur
& albis quibusdam seu pal-
lidis liuescente venulis, flo-
ris figura ad lupariam no-
stram accedit, colore pal-
lescente luteoue.*

ACONIT.

Flores mittit purpureos.



ACONI-

ACONITVM VIII.

* Floribus prouenit rube-
scentib⁹, folio ferè vitigineo,
radice quadruplici ab vno ca-
pite crasso.*



Ggg

ACONI-

Luteos gerit flores, * radi-
ce duplici, diuaticata sustine-
tur, minora & graciliora
quam alij napelli folia & ma-
gis dissecta promit. Antoram
forte aliquis non male existi-
maret nisi maior & longior,
vt mihi videtur, hæc esset. *



HERBA


NOMINA.

335

HERBA paris, quibusdam vva versa, siue vva lupina. Italis, *Herba Paris*. Germanis, *Wolfsbeer*/ seu *Sternfraut*. Gallis, *Raisin de Renard*.

HERBA PARIS.

FORMA.



Vno tantum constat caule, *Matth.* rotundo duorum dodrantum longitudine, è cuius medio quatuor erumpunt folia, eodem ambitu crucis instar patentia: sanguinea virga similis: vnicam in summitate baccam gerit, purpuream, acinovae similem, atq; vinoso succo pregnantem: numero in tus semine, albo, minutoque halicacabi modo: radiantibus quatuor subus foliolis, oblongis, & acutis: Radix illi subest tenuis, ac multifida.

LOCVS.

Prouenit in montibus: in *Idem*. conuallibus, & frutetis.

QUALITATES.

Herbavna cum baccis re- *Idem*. frigerat, & siccatur.

VIRE.

Semen quod è baccis eximitur (vt quidam asserunt) semidrachmæ pondere *Idem*. potum, eos maximè iuuat, qui aut ex morborum diuturnitate, aut veneficijs, amentia tenentur. Baccæ antidotis admiscuntur, quæ contra deleteria pharmaca parantur: Herba recens tassa, & illita, genitalium tumores, & inflammationes sanat, ac pariter oculorum phlegmonas: paronychijs quoq; medetur.

CENSURA.

Errant, atque maximè hallucinantur, qui hanc plantam Aconitum pardiachem faciunt.

Ggg 2

NAPEL-

NAPELLVS. Italis, *Napello*. Chymistis, *Herbatorum*. Germanis, *Blaw Eysenhitlin*, *Barrenkappen*.

NAPELLVS.

FORMA.

Matth.

Folij exit quinis ex vno pediculo prodeuntibus, circum quaq; diuisis, supina parte albicantibus; caulem edit bicubitalem, subrufescētem, striatumq;: in cuius fastigio flores exeunt, purpureo colore, horum syluestris modo: Hos sequuntur corniculatæ siliquæ, sursum spectantes, ternæ ex vno quoq; pediculo prodeuntes, in quibus semen concluditur nigrum, ac minutum. Radice nititur turbinata, subnigricante, à qua numerosæ oriuntur fibræ, in retis modum complicatæ. * Appinxi radicem aliam eiusdem plantæ, quæ cum illa effosa ex eodem serobe extracta fuit. nullus ei caulis apparuit, sed germen tantum albicans quasi nunquam germinasset. Fibris aliquot quibus abundauit, resectis, quædam relictæ sunt. *



LOCVS.

Idem.

Nascitur in montibus, & in conuallibus.

QUALITATES.

Auicē.

Excalfacit, & siccatur ordine quarto.

VIRE.

Idem.

Venenum est perniciosum. Linitum tamen vitilignes tollit, eius antidotum est Diamoschos.

ANTO-

ANTORA, siue Antitora. Italis, *Antora*. Germanis, *Gifftheil*.

ANTORA.

FORMA.



Caulem edit sesquidodran- *Matth.* talem, rotundum, firmum, in quo multifida, ac tenuia, disparibus interuallis oriuntur folia, numerosa, in latus, sese diffundentia. Flores edit summo caule numerosos, *In luteo pallescentes (purpurei nodum a nobis visi *) Napelli emulos, sed minores: radices duas foli- das, oblongas, turbinatas, oli- uae crassitudine, subnigrican- tes, sed alba intus carne, nardi montanae modo.

LOCVS.

Prouenit in Gallia Cispal- *Idem.* na, & Liguria montibus.

QUALITATES, ET
VIREs.

Præstant radices ad epotum napellum, & ad cætera quæ- cunq; venena: quin etiam ad vi- perarum & cæterorum serpentium ictus. Vermes intestinorum necant. Propi- nantur quoq; commodissime ad tormina, & cæteros intestinorum cruciatus: & contra pestilentiam: auxiliantur omnibus cordis affectibus. Dantur magno auxilio pestilenti febre: cum exanthematibus laborantibus: & cum legitimo Doronico careamus, eius loco per quàm bellè supponi possunt.

APPENDIX.

Antoræ radices, ego quidem Auicennæ Zedoariam esse cenfeo, quòd vnà cum napello proueniant.

Ggg 3

*ANTO-

Et hoc obseruauī, non v-
niusmodi figurā representa-
re radices Antoræ, aliæ enim
singulare tuber habent, aliæ
geminæ coherent, suntq; vel
turbinata, vel oblonga, non-
nunquā triplices inueniūtur,
nonnunquā quæ Scorpionum
imaginem imitantur. Hanc
itaq; varietatem icone adie-
cto rei herbariæ studiosis in-
dicare volui.*



Cicv-

NOMINA.

839

CICUTA, Græcis, Κάριον. Arabibus, *Sucarani*. Germanis, *Schirling*/seu *Wirt-
rich*. Hispanis, *Ceguda*. Gallis, *Cigue*, *Segue*, sine *Cocue*.

CICUTA.

FORMA.

Caulem edit geniculatum, Diosc.
ut feniculi, grandem, folia fe-
rulae, angustiora tamen, odo-
re graui: Rami, mox umbellæ
in summo prodeunt, flores
quoque albicantes, & semen
aniso candidius: radice non al-
ta, concaua.

LOCVS.

Nascitur passim propè vr- *Matth.*
bium, & oppidorum mania,
& secus itinera.

QUALITATES.

Facultatis est extremè refri- *Galen. 8.*
gerantis. *simp. me.*

VIRES.

Lethale venenum est: suae. Diosc.
nim vi refrigeratoria necat:
Herba cum comatrita, & te-
stibus circumlita, libidinum
imaginationes, in fomno compescit, sed genitale resoluit. Lac puerperarum
extinguit mammis apposita: In virginibus mammas coerctet, & crescere non
patitur. Ab Alinis deuorata, tam improbum ijs soporem inducit, ut mortui *Matth.*
videantur.

Ggg 4

Taxvs,



Taxus, Græcis, Σμίλαξ. Italis, Tasso, seu Nasso. Germanis, Eibenbaum. Hispanis, Teno. Gallis, Tf.

T A X U S.

F O R M A.

Diosc. Arbor est Abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura. Baccas fert rubentes, atq; vinosas, glutinosasque: Ligni materies rufa, venosa, robusta, ac ferè incorrupta: e qua hastæ, arcus, & tela fiunt.

Matth.

L O C U S.

Matth. Provenit in montibus saxosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 8. Facultatis est venenosæ.
simp. me.

V I R E S.

Diosc. Baccæ ab hominibus de-
uoratae, alui profluuium ex-
citant: Læduntur maximè,
qui in Narbonensi agro sub
taxi umbra obdormierint: i-
mo sæpius moriuntur. Bo-
ues foliorum pastu necan-
tur. Quare de taxo hæc tra-
duntur, ut ab ea caueamus.

Matth.

Diosc.



A P O C Y.

N O M I N A.

541

APOCYNVM, Græcis, *Αποκύνον*. Italis, *Apocimo*, *sive periploca*.

APOCYNVM.

FORMA.



Frutex est longis viticulis **DIOSC.** constans, malè olentibus, lentis, vitiliumque modo obsequiosis, fractu ferè inuictis: folio haderæ, molliore tamen, & per extremum acutiore, odore graui. Id luteo succo turget: siliquæ ceu fabarum: folliculari specie; digiti longitudine protenduntur: semine intrus duro, paruo, nigro.

LOCVS.

Prouenit in Syria & Apulia. *Matth.*

QUALITATES.

Est autè hominibus venum. *Galen. 6. num.* Herba multum grauius *simp. me.* olens: proinde omnino calida est non instrenue: non tamè proportionè desiccatur. Itaque illita, admodum digerentis est facultatis.

VIRES.

Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant **DIOSC.** in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

Ggg 5

Apocyn-

Apocynvm repens. Italis, *Apocino serpeggiante.*

Apocynvm repens.

FORMA.

Matth. Folia promit alterius longiora, caules, seu potius viticulas obsequiosas, & fractu contumaces, lentasque: quibus non solum humi repit, sed arbores quantumvis proceras scandit, tota planta lacteo succo tithymali modo scatet: sed non ut in altera luteo. Est & in siliquis differentia: namque in hac planta binæ ex uno pediculo in origine coniunctæ prodeunt, & in sese innicem inflexæ, nerij siliquis perquam similes.

LOCVS.

Idem. Prouenit hæc planta copiosa in Apulia, & Calabria.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Creditur ijsdem pollere viribus, quibus & alterum.



NERIVM.

NOMINA.

345

NERIVM, seu Rhododendrum, Græcis, *Nigiov, ῥόδονδρον*. Italis, *Oleandro*. Germanis, *Oleander*. Hispanis, *Adelfa, sine Oleandro*. Gallis, *Oleandre, Rosage, seu Rosagine*.

NERIVM SEV RHODODENDRVM.

FORMA.

Arbor est vulgaris notitiæ, **DIOSC.** longioribus, quàm amygdala folijs, crassioribusque: flore in rosam cōformato: fructum fert cornu similem, qui patefactus, quandam lanosam naturam ostēdit: spinosarū plantarum pappis similem: Radice longa, acuta, lignosa: gustanti salia.

LOCVS.

Nascitur in amœnis, mari- **Idem.** timis, & secus amnes.

QUALITATES.

Foris quidem corpori illi- **Gal. li. 8.** tum, discutiendi vim obtinet, **simp. me.** intra verò in corpus assumptum, perniciosum non tantum hominibus, sed plerisque etiam pecudibus.

VIRES.

Flores & folia, mulis, asinis, canibus, & quadrupedum plurimis venena sunt: **DIOSC.** hominibus verò contra serpentium morsus præsidia è vino pota, & eo magis addita ruta. Imbecillæ etiam animantes, vt oues, & capræ, si aquam bibant, in qua folia maduerint, moriuntur.

FVNGI.



FVNGI, Græcis, Μυκήτες. Arabibus, Hatar, seu Fater. Italis, Fonghi. Germanis, Schwemmi/Pfifferling/Reisfen. Hispan. Hongos, Cogomelos, seu Cylerques. Gal-
lis, Capignon, seu Potyron.

GENERA.

DIOSC. Fungorū genera, numero-
sa quidem sunt, verū quædā
esculenta sunt, quædam verò
perniciosa.

FORMA.

Matth. Vt quidem varia spectatur
facie, ac colore, ita hominib.
maximè noti sunt fungi: pluri-
mi tamē galeri modo forman-
tur palmari: ac etiā minori pe-
diculo nitētes, vario superius
inferiusque colore.

LOCVS.

Matth. Nascuntur quidam in pra-
tis, pleriq; in pascuis, nonnul-
li in syluis, quidam in frutetis,
& aliqui in arborum caudici-
bus.

QUALITATES.

Gal. li. 3. Fungus, frigida, humidaq;
simp. me. planta est: quam obrem etiam proximè ad deleteriam, enecantemque faculta-
tem accedit, & sanè inter eos sunt, qui interficiant, præsertim, qui ex natura mi-
stam habent qualitatem putredinosam.

VIREs.

DIOSC. Multis de causis venenosi gignuntur: vbi videlicet clauus ferreus rubigino-
sus, aut panni marcor affuerit, aut si iuxta serpentis cauernam, arboresque, qui
priuatim noxios pariunt fructus. Qui verò esculenti sunt, suauē in iuribus gra-
tiam habent: largius tamen deuorati, nocent, & ægius concocti strangulant,
aut choleram morbum gignunt.

COLCHI-

FVNGI.



COLCHICVM, sine Ephemerum, Græcis, Κολχικόν. Offic. falso *Hermodactylus*. Arabibus, *Surugen*. Italis, *Colchico*, & *Zaffarano saluatico*. Germanis, *Zeitloß* aut *wild Safran*. Gal. *Mort au chien*, seu *chiennée*. *A. Colchicum polyanthon flores albos profert. B. vulgare purpurascens. C. apices intus albos habet, reliqua luteos.*

COLCHICVM.

FORMA.



Autumni exitu florem ge- Diosc.
rit croci, subalbicans, postea
verò folia bulbi, sed pingui-
ora, caulē palmo altum, feren-
tem rufum semen: radicem
foris è nigro rufescentē, quæ
delibrata candida, & mollis
spectatur: lacteo succo ma-
det, gustu dulci: bulbus eius
mediam habet rimam, fissu-
ramque qua flos erumpit.

LOCVS.

* Nascitur in pratis, & pa- Matth.
scuis.

QUALITATES.

Strangulando necat: este- Gal. li. 6.
nim deleteriæ facultatis, simp. me.

VIRE.

Deuorata radix, fungorum Diosc.
more strangulando necat.

* I. FLOS

*I. Flos Colchici Vere prodiens. II. Folia & folliculi seminum. III. Folliculus & semina separatim picta.

Mense Aprili nonnunquā Colchici florem inueni prodeuntem ex folijs breuiusculis ternis, herbaceis, quibus antequam emergat, inuoluitur. Flos ipse obsoletiore colore purpurascit, quā qui autumnō prodit, apices paruos luteos habet, & totus etiam minor strigosiorque apparet.*



HERMO-

HERMODACTYLVS, Græcis, *ἑρμόδακτυλος*. Arabibus, *Sarugen*. Italis, *Hermodactilo*.

HERM O D A C T Y L V S.

FORMA.



Folia mittit prælonga, binū *Matth.* dodrantum, ac etiam longiora, porri, aut asphodeli quadante nus similia, longè tamē angustiora, breuiora verò sunt, quæ circa radicem exeunt. Radices habet quatuor ex vna eademque basi prodeuntes, digitorū figura, colore subrufescente, albis in summitate ungibus: caulis è medio proflit tenuis, in cuius summitate oblongum prominet capitulum pyri figura, ephemeræ colchici modo.

LOCVS.

Oritur in Orientalibus re- *Matth.* gionibus, & in Arabia.

QUALITATES.

Excalfacit & siccit ordine *Mesue.* secundo. Cum humiditate ex- *Serap.* crementosa, flatulenta.

VIREs.

Pituitā crassam, & præsertim ab articulis trahit: ac proinde podagris, ac cæ- *Mesue.* teris articulorum morbis confert. Impinguat, genitale semen auget, & vlcera purgat, & carnem in his putrem consumit.

CENSURA.

Errore magno ducuntur, qui Colchico nostrate, Hermodactyli loco vtuntur.

PSEUDO-

PSEUDOHERMODACTYLVS, * Dens caninus vulgo. * Italis, Hermodattilo bafardo.

PSEUDOKERACYLVS.

FORMA.

Matth.

Folia habet aquaticæ plantaginis, minora tamen, infirmioraque, longo pediculo nientia: caulem tenuem, lingu-
larem, in cuius summo flos emicat albus, * nonnihil purpurascēs, * stellæ figura. Radices habet binas, * plures vel pauciores, * bulbosas, candidas, teneras.

LOCVS.

Idem.

Prouenit in frutetis, & propter semitas, & sepes.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem.

Sunt qui radices probent ad ea omnia, ad quæ legitimus hermodactylus conferre potest. Nos verò horum sententiam nec probamus, nec improbamus, cum nullam certâ de eo habeamus experienciâ.



HELXI-

HELXINE, Græcis, ἐλξίνη ἢ περδίκιον. Officinis, *Panetaria*. Italis, *Vetriola*. Germanis, *Egvynd Nacht*. Hispanis, *Terua del muro*. Gallis, *Paritoire*.

HELXINE.

FORMA.

Folia profert mercurialis, *Diosc.* hirsuta, cauliculos subrubentes, & circa eos veluti femina aspera, adhaerentia vestibus.

LOCVS.

Nascitur in domorum parietibus, sepibus, & macerijs, arido solo.

QUALITATES.

Vis ei inest abstergendi, & *Gale. 6.* leniter constringendi, cum *simp. me.* humiditate subfrigida.

VIREs.

Folia illita, sacrosignes, ad-*Diosc.* usta, condylomata, incipientes panos; tumores, inflammationesq; sanant. Succus eius, cum cerussavlceribus, quæ serpunt commodè illinitur: imponiturque podagris cum hircino adipe, veterem tussim

emendat, instar cyathi haustus: Gargarizatur, ac illinitur vtiliter tonsillarum inflammationibus: aurium dolorem mulcet, cum rosaceo instillatus. Vis her-*Matth.* bæ quoq; magna ad vulnera recentia sananda: Si enim recens semicõtusa vulneri adalligetur, & tertia die solvatur, non erit opus alio medicamento: foliorum succus defecatus, potus trium vnciarum pondere: cum saccharo, urinâ mirificè propellit: & renes abstergit: Folia super regula ignita calefacta, & albo meraco aspersa: pubiq; illico imposita, calculosis, & urinæ malo affectis mirificè auxiliatur. Additur commodè in clysterijs, qui ad ventris, & vteri dolores parantur. Stillatitia eorum aqua faciem abstergit, & eius nitorem conciliat.

Hhh

ALSINE,



latiloba

s.

HELXI-

ALSINE, Græcis, *ἀλσιν*. Italis, *Centone*, *Paparina*, *Budello di Galline*, & *Centouice*. Germanis, *Hünerdarm* seu *Vogelkraut*. Gallis, *Mouron*.

ALSINE.

G E N E R A.

Matth. Plura eius sunt genera, quæ in maiora, & minora diuidi possunt.

F O R M A.

Diosc. Minus folia habet ad similia helxinæ, sed humiliora, minimeque hirsuta, adeo ut muscutorum auribus similia videantur: cum teruntur cucumerem resipiunt.

L O C V S.

Idem. Locis opacis gaudet.

Q U A L I T A T E S.

Gal. lib. 6. Facultatem habet refrigerantem, & humectantem: est enim essentia aquæ frigida: quare, & citra adstrictionem refrigerat.



V I R E S.

Diosc. Vim refrigerandi, adstringendi quæ obtinet: oculorum inflammationibus cum polenta illinitur, succus aurium doloribus infunditur. Ex oleo chamæmelino seruefacta illinitur vtiliter ventri contra tormina, & vteri dolores.

*ALSI-

* ALSINE MAIOR.

FORMA.

Maior alsine cognomento arguit, quid à minore discrepet. Longè altius enim surgit & si sustentacula consequitur, quibus niti queat, humanam altitudinem superat, folia & cauliculi respondent minori sed hi grandiores illa ampliora spectantur. Flosculi candidi stellati pulcre staminibus ruffis in medio exornantur. Semen minutum luteum in vasculis oblongis clausum latitat.

LOCVS.

Nascitur in frutetis & humido solo gaudet.

QUALITATES ET
VIRE.

Hæc cum prioris qualitatibus viribusque conueniunt.



Hhh 2

LENS

LENS palustris, Græcis, φακὸς ὁ ἐν τῶν τελευμάτων. Arabibus, Tahaleb, seu Taleb. Italis, Lente aquatica, & lenticulana. Germanis, Wasser-Hirsen / vel Wasser-Linsen. Hispanis, Lenteyá della goa. Gallis, Lentille de mer.

LENS PALVSTRIS.

FORMA.

DIOSC. Muscus est aquæ innatans, folijs lenticulæ similibus.

LOCVS.

Idem. Inuenitur in aquis non fluentibus.

QUALITATES.

Galen. 8. Humidæ, frigidæque temperaturæ est, utrinque ex secundo quodammodo ordine.

VIRE.

DIOSC. Illinitur convenienter collectionibus, igni sacro, & podagris, tum per se, tum cum farina hordeacea. Glutinat & puerorum interanea.

Matth. Stillitia eius aqua (quorundam testimonio) datur commodissime ad internas viscerum inflammationes, & ad pestilentes febres: præstat quoque ad oculorum ruborem, & palpebrarum phlegmonas, & ad mammarum, testiculorumque collectiones, antequam augeantur. Herba ipsa recens fronti adhibita, capitis dolores mulcet, ubi a calore prouenerint.



LENS

NOMINA.

853

LENS palustris altera. Italis, *Lente palustre del seme.*

LENS PALVSTRIS ALTERA.

FORMA.

Caulem gerit repentem, *Matth.* angulosum, à quo plura, per intervalla catervatim oriuntur folia, prælongis, ac tenuibus pediculis nitentia, quæ quaterna, crucis in modum sese pandunt, subrotunda. semen profert racemosum, in ipso caule, lentium ferè effigie, subnigrum, densum, durumque.

LOCVS.

Nascitur in paludibus, lacubus, & cæteris stagnantibus aquis. *Idem.*

QUALITATES, ET VIRES.

Nihil habeo, de qualitatibus, & viribus, quod probare possim, non tamen ambigo, quin sit frigida humidæque temperaturæ. *Idem.*

Hhh 3 SEMPER-



sen Taleb.
Basser Ein



um, testi-
onti adhi-

LENS

SEMPERVIVVM, siue sedum maius, Græcis, *Αἰζον μέγα*. Arabibus, *Beia balalen*, seu *Hai albale*?, Italis, *Semprevivo maggiore*. Germanis, *Groß-Hauswurk*. Hispanis, *Semperuiva*, seu *Xerua puntera*. Gallis, *Iou barbe*.

SEMPERVIVVM MAIVS.

GENERA.

Matth. Plura sunt semperuiui genera, Maius, Minimum, & arborefcens.

FORMA MAIORIS.

Diosc. Caules cubiti altitudinem implent: interdum excedunt, pingues, pollicari crassitudine, in cacumine linguæ similis: alia in terram conuexa, alia inuicem in capite stantia, ita, ut in ambitu effigiem imitentur oculi.

LOCVS.

Idem. Nascitur in montibus, faxis, testaceis, & supra domicilia etiam seritur.

QUALITATES

Gale. 6. Leniter quidem desiccat, *simp. me.* quandoquidem & mediocriter adstringit, omnis alterius vehementis qualitatis expers; quare in eo plus ceteris abundat essentia aquea: Cæterum non mediocriter refrigerat. est enim ex tertio ordine, & recessu refrigerantium.



VIRES.

Diosc. Medetur igni sacro, nomis, vlceribus, quæ serpunt, oculorum inflammacionibus, ambustis igni: folia per se, & cum hordeacea farina illita, podagris auxiliantur: succus illitus, capitis dolores mulcet: & præsertim si cum rosaceo infundatur: Datur potandum ad phalangiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profluvia: teretes tineas potus in vino excutit. subditus in vellere, mulierum abundantiam sistit: Idem oculorum lippitudinibus inungitur.

SEMPER-

NOMINA.

855

SEMPERVIVVM, seu Sedum minus, Græcis, *Αἰζωνία*. Italis, *Sempreviva minore*. Germanis, *Klein-Haustwurz*. Gallis, *lou barbe petit*.

SEMPERVIVVM MINVS.

FORMA.

Caulibus provenit ab vna *Diosc.* radice multis, tenuibus, crebro foliatis: exilibus folijs, rotundis, pinguibus mucronatis: caule à medio emicante palmum alto. umbellam, herbidosque flores, & tenues gerente.

LOCVS.

In petris, parietinis, & macerijs, nec non in scrobibus opacis nascitur.

QUALITATES, ET VIRES.

Folia eisdem cum priori, *Idem*. viribus prædita sunt.



Hhh 4

SEMPER-

SEMPERVIVVM minimum, siue tertium, Græcis, Αειζών τῆς τρίτης. Arabib.
Halsebram, Handrachabara, seu Tilafon. Italis, Herba grassella, siue Sempreviuo mi-
nuto. Germanis, Wauer Pfeffer.

SEMPERVIVVM MINIMUM.

FORMA.

DIOSC. Folij provenit pusillis,
crassioribus, hirsutis, portu-
lacæ proximis.

LOCVS.

DIOSC. Nascitur in muris, locis
Matth. saxosis, & secus itinera.

QUALITATES, ET
VIRE.

DIOSC. Visei excafactoria, acris,
exulcerans. Illita folia cum
axungia, strumas discutiunt.



SEMPER-

NOMINA.

837

SEMPERVIVVM Arborefcens, primum: Italis, *Sempreviuo Arborea.*

SEMPERVIVVM ARBORESCENS.

FORMA.

* Caulem profert fefqui-
cubitalem, vel interdum al-
tiorcm, craffum & frangi con-
tumacem, carnofo obductū
cortice, in quo folia carnofa
fucculenta circundant ena-
tos cauliculos in multos te-
nues pediculos diuifos fufli-
nentes luteos ftellatosq; flo-
res, radice nititur in multas
propagines diuaticata.

LOCVS.

In Orientis ac Græciæ pro-
uincijs, marisq; Mediterra-
nei Infulis, Creta fiue Can-
dia, Rhodo, Zacintho, & alijs
fpōte rectis innafcitur. Apud
nos, imo etiam in Italia non
nifi in hortis cultioribus in-
uenitur.

QUALITATES, ET VIRE.

Huc refer quæ de maiore
fedo dicta funt.*

Hhh 5

VMBI-



UMBILICVS Veneris, siue Acetabulum. Græcis, κοτυληδών ἢ δὲ κυμβάλιον. Italis, *Bellico di Venere*. Hetrulcis, *Copertoiole*. Hispanis, *Scudettes*. Gallis, *Escudes*. Germanis, *Graven Nabel*, *Nabel Kraut*.

UMBILICVS VENERIS.

GENERA.

DIOSC. Duum est generum. Alterum acetabuli, alterum maioris sedis figura.

FORMA PRIMI.

Idem. Folio est in acetabuli formam tornato, latenter concauo, breui cauliculo, in quo semen inest, radice oliuæ modo torunda.

LOCVS.

Gale. 7. Nascitur frequens in saxis, limp. me. & vetustis ædificiorum parietibus, & in oppidorum mœnijs.

QUALITATES.

Mixta est qualitas, nempe humida & subfrigida, & cuiusdam obscure adstringentis, & cum ea leuiter amara. vnde refrigerat, repercutit, abstergit, & discutit.

VIRES.

DIOSC. Foliorum & radicum succus, cum vino circumlitus, instillatúsve, contacta genitalia nudat: inflammationibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus illitu auxiliatur. Stomachi ardorem refrigerat: folia cum radice comesta calculos frangunt, vrinam cient, hydropicis ex melle dantur. Phlegmonas Erysipelatodeis: Erysipelata phlegmonodeis curant.

UMBILI-



UMBILICVS Veneris alter. Græcis, Κοτυληδών ἑταῖρος. Italis, *Bellico di Venere* secondo.

UMBILICVS VENERIS ALTER.

FORMA.

Pinguibus exit folijs, latioribus, ligularum modo densis, circa radicem, medium oculi ambitum describentibus, vt in maiore semperviuo: adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores, & semina hyperici: radice maiuscula.

LOCVS.

Nascitur in saxosis monti. Matth. bus, & petris.

QUALITATES ET VIRE.

Facit eadem, quæ semper- uiuum.

CYMBE-



Gallis,



ontecta
as illitu
alculos
pelato-

MBILI-

F O R M A.

Matth.

Emuris comæ modo dependet, cauliculis numerosis, tenuibus, funiculi instar prælongis, lentisq; è quibus folia prodeunt hederacea, pingua, longis pediculis adnexa: flosculis parvis lutescentibus, qui è tenuissimis quoq; pediculis exeuntes, clauicularum modo sese implicant.

L O C V S.

Matth.

Nascitur in antiquis, vliginosisq; ædificiorum parietibus, macerijs, & saxis.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Facultatis est humidæ frigidæque, cum adstrictione quadam.

V I R E S.

Idem.

Iis profectò hanc plantam pollere facultatibus, factò periculo constat, quibus primi generis coryledonem. sunt qui eavtantur ad alba vteri profluia, eandem recentem in acetarijs propinantes.

C E N S V R A.

Tametsi hæc planta Veneris ymbilici viribus prædita sit, errant tamen, qui putant hanc ipsam herbam Veneris ymbilicum.

V R T I C A,



VRTICA. Græcis, *Ἀκκρόφι*. Arabibus, *Huniure*, seu *Angiava*. Italis, *Ortica*. Germanis, *Welsch* oder *Nörmisch* Dessel. Hispanis *Ortiga*. Gallis, *Ortie*.

VRTICA.

GENERA.

Trium est generum. Prima asperior. Altera non æquè aspera, & tertia omnium minima.

FORMA PRIMÆ.

Sylvestrior hæc est, asperior, latioribus, nigrioribus, *Matth.* que folijs. semine lini, sed minore. Caule rotundo, aspero, hispidoque, ac pungenti: pilulas in caule gerit hirsutas, ac vrentes, in quibus semen gignitur.

LOCVS.

Prouenit calidis tractibus, *Matth.* aridis, & incultis locis.

QUALITATES.

Semen, ac folia digerentis *Gale. 6.* sunt facultatis, sed & quidam flatuosum obtinent; quo venerem extimulant: porro non vehementer calefacit, sed admodum tenuium est partium.

VIRE.

Folia cum sale illita, canum moribus medentur, gangrenas, carcinomata, *Diosc.* sordida vlcera, & quæ cacoethe vocantur, stem luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesque sanant: lienosis cum cerato imponuntur: cum succo trita, & naribus indita, sanguinem fluentem cohibent. Ciunt menses trita, & cum myrrha supposita: procidentes vuluas restitunt, suo contactu: semen ex passo potum venerem stimulat, & vuluæ era patefacit, cum melle delinctum, orthopnæ, lateris, & pulmonum inflammationibus prodest: toracem expurgat. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt, yrinas mouent, inflationes discutiant.

VRTICA



VRTICA altera, Græcis, *Αχράντις*. Italis, *Ortica volgare*. Germanis, *Gras* mein Brennessel.

VRTICA SECVNDA.

FORMA.

Matth. Folij provenit alterius similibus, verum non æque asperis: semen profert racemosum, ac minutum: caulem quadrangulum, asperumq; tactu acuto, ac pungente.

LOCVS.

Idem. Nasctur vbicunque.

QUALITATES, ET VIRE.

Idem. Iisdem cum altera est facultatibus: atqui peculiariter seminis pulvis, sanguinem è cerebri membranis manantem supprimit.

* Seminis huius in Officinis Septentrionalium, cum destituuntur Romanæ vrticæ semine, plurimus est vsus, Folia vino incocta & pota ventrem molliunt, flatus discutunt, cholicos dolores sedant, (nisi obstructio illos genuerit) vrinam cient, & renes purgant. Idem præstat & quidem efficacius in vino dulci coctum semen, vel ex melle sumptum. Aqua destillata ex vrticis vulnera mundificat si ea lauentur. Radices in vino decoctæ, addito parum mellis tussientibus & asthmaticis profunt, & pleuriticis, morbisq; ex viscosa pituita ortum habentibus.*



VRTI-

VRTICA tertia, Græcis, *Αγγλίφη τριτή*. Italis, *Ortica minore*. Germanis, *Hei-
ter Nessel*.

VRTICA TERTIA.



FORMA.

Folia profert cæteris simi- *Marth.*
lia, sed longè minora, acutio-
ra, vrentioraque: caule do-
drantali, hispidiore, ac vren-
te, deffioribus folijs, & in am-
bitu ferratis.

LOCVS.

Nascitur secus ædificio- *Idem.*
rum muros, in hortis, & fere
vbique.

FACULTATES ET
VIREs.

Non minus valet, quàm *Idem.*
cætera genera.

CARDIA-

nis, Ge

m ciant,
ctum se-
ficat si ea
asthma-
bus.*

VRTI-

CARDIACA, Italis, *Cardiaca*. Germanis, *Herzgespannsue Herzgesperr*. Gallis, *Gripaume*, seu *Cheneuse*.

CARDIACA.

FORMA.

Matth.

Facie viticam quadantenus referre videtur, folijs tamen, quæ prope terram sunt, rotundioribus constat, & ramunculi ferè modo per ambitum laciniatis: caulem habet quadrangulum, ramis copiosis pariter quadratis, in quibus bina utrinque folia, paribus intervallis ab imo, ad summum exeunt, sed minora, & per ambitum magis diuisa: flores in purpura albicant & verticillato ambitu, marrubij modo, caulem ambiunt. Radix in rubro pallescit.

LOCVS.

Idem.

Prouenit in ruderibus: iuxta semitas, & prope urbium mœnia.

QUALITATES

Gustu vsq; adeo amarescit, vt faciliè existimari possit ad secundum excalfacientium ordinem, & ad tertium siccantium accedere.



VIRE.

Præstat (quorundam testimonio) ad omnes cordis affectus, ad conuulsos, ac resolutos: obstructions referat, urinam ciat, & menses, pectus à pituita detergit. Lumbricos necat. foliorum farina, domestici cochlearis mensura in vino hausta, ægrè parturientibus mirificè opitulatur.

GALIO-

GALIOPSIS, Græcis, *Talio*. *Lis*. Italis, *Ortica fetida*, seu *Ortica morta*. Germanis, *Daubnessel*. Hispanis, *Ortica muerta*. Gallis, *Ortie*.

GALIOPSIS.



FORMA.

Folij, & caule constat vr- Diosc.
tica similibus. tactu tamen *Math.*
non mordentibus, floribus
purpureis, tenuibusq; odo-
re fatido, ac graui.

LOCVS.

Prouenit in ædificiorum Diosc.
areis. in plateis, iuxta semitas,
& circa hortorum sepes.

QUALITATES, ET
VIRE S.

Folia, caules, semen, suc- *Idem.*
cusq; duricias, & carcinoma-
ta dissipant: strumas, panos,
& parotidas discutunt: opor-
tet bis in die tepidum ex ace-
to cataplasma imponere, &
eius decocto fouere: ad pu-
trescentia, gangrenas, & no-
mas, cum sale efficaciter illi-
nuntur.

r. Gallis

nuillos, ac
uita deter-
ura in vino

GALIO-

SCROFULARIA, Mille morbia, Ferrara, siue Castrangula. Italis, *Scrofularia*. Germanis, *Braunwurk*. *alijs, nescio quam ob causam, *Schwarz Nachschwand* *Burmtraut*. * Gallis, *Grande Scroulaire*.

F O R M A.

Matth. Caules ab una radice mittit plures, sesquicubitalis, angulosos, subrescentes, in quibus folia insunt nigricantia, robusta, ad verticem faciem accedentia, per ambitum leuiter denticulata, Flores mittit in caulium ramorumque summitatibus pusillos: purpureosque, galeæ faciem referentes, & semen in capitulo, ut in lino, & blactaria herba, rotundo, acuto summa parte apice. Radice habet magnam, albicantem, strumolam.

L O C Y S.

* Prouenit in humidioribus locis & interdum siccis etiam ad sepes & vetustas maceries. *

Q U A L I T A T E S.

Matth. Desiccatur, extenuatur, discutitur, abstergit: est enim gustu amara, & subtilium est partium.

V I R E S.

Radix præstat recens ad strumas, & hæmorrhoidas sanandas, in quem usum effoditur autumno, & repurgata tunditur cum recenti butyro. & operculato fictili, vliginoso loco reponitur, bis quinq; aut pluribus diebus. mox lento igne colliquatur butyrum, & percolatum asseruatur: quo postmodum præscripti morbi illinuntur. Idem illitum scabiem sanat: Aqua è radicibus distillata, faciei ruborem illita tollit. Siccæ radicis puluis impositus hæmorrhoidas siccatur. Idem drachmæ pondere potus, lumbricos ventris pellit.

C E N S V R A.

Cæcutiunt ad summum usque, qui Scrofulariam Dioscoridis ocimastrum faciunt, nec minus aberrant, qui eandem Galiospermum esse contendunt.

* SCROFUL-



NOMINA.

367

*SCROFVLARIA fœmina, Vulgo Germanis, Weiße Nachschare.

SCROFVLARIA FOEMINA.



FORMA.

Similis est mari floribus, femine, folijs, caulibus, & odore. Sed magnitudine discrepat & colore, qui cauli folijsq; prorsus viridis est. Tota planta viriditudinem attingit, Radix paucioribus & interdum nullis ferè tuberculis prædita visitur.

LOCVS.

Ad fossas aquarum nascitur.

VIREs.

Curat vlcera & contusa si mane & sero continuis diebus in foco calefacta & contrita imponatur. idem præstat melius succus eorum cum melle decoctus.*

lii 2

GALL-

GALIVM, Græcis, Τάλλιον, Italis, Galio. Germanis, Meger Kraut, Hispanis, Co-
ia lecheyerna. Gallis, petir Muguet.

GALIVM.

F O R M A.

Diosc. Ramulum, foliumque ha-
bet aparine simillimum, re-
ctum, florem luteum, tenu-
em, densum, copiosum, odo-
ratum.

L O C V S.

Matth. Nasctur ferè ubiq; copio-
sum, ppe sepes, & secus vias.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Facultatem obtinet defic-
simp. me. catoriam, & subacrem. est au-
tem flos boni odoris, & colo-
ris lutei, vel albi.

V I R E S.

Diosc. Flos igni ambustis illinitur,
& sanguinis profluvia sistit:
radix venerem concitat: co-
ma in lacte macerata, illud
coaguli modo condensat, vn-
de illi nomen.



SENECIO,

NOMINA.

369

SENECIO, Græcis, *ἡνερῖος*. Italis, *Cardoncello*, seu *Spellicciosus*. Germanis, *Creus-
wurk*. Hispanis, *Bonvaron*. Gallis, *Senesson*.

SENECIO.

GENERA.

Duum est generum: Maius, *Matth.*
& minus.

FORMA MINORIS.

Cauleculo est cubitali, sub *Diosc.*
rubro, folijs sensim per extre-
mitates crucæ modo diuisis,
sed minoribus multò, luteis
floribus, qui celeriter disse-
cti, euanciscunt in pappos, ra-
dice superuacua.

LOCVS.

Nascitur maximè in mace- *Idem.*
rijs, parietibus, & circum op-
pida.

QUALITATES.

Facultatem mistam obti- *Gal. 6.*
net, simul refrigerantem, & *simp. me.*
modicè digerentem.

VIRES.

Folia illita cum vini modico, vel per sese, testium & sedis inflammationes sa- *Diosc.*
nant. Quin etiam cum manna thuris medentur, cum reliquis vulneribus, tum
ijs, quæ nerui acceperunt. Illiti per se, aut cum aceto pappi, idem munus præ-
stant. verùm recentes epoti, strangulant. totus caulis si coctus ex passo potui
detur, stomachi dolores à bile contractos, per sanat.

APPENDIX.

Cum autem herba euidenter sit amara, vt siccet, abstergat, aperiatq; neces-
se est, quare nil mirum fuerit, si fœmina Epoto foliorum succo, aut totius plan-
tæ decocto, remorantes menses sibi prouocent, ab anis edoctæ.

lii 3

SENETIO



SENETIO maior, Italis, Cardoncello, seu Spellicciosa maggiore. Germanorum offic. Flos S. Iacobi: vulgari verò sermone S. Jacobs Blum.

SENETIO MAIOR, SIVE FLOS
S. IACOBI.

F O R M A.

Matth.

Folia mittit crucæ sylue-
stris æmula, per ambitum la-
ciniata, nigricantia, amaro gu-
stu, caulis illi est sesquicubi-
talis, artemisiæ similis, a me-
dio ramosus, furculosusque.
Flos in summitate aureus,
qui flaccescens, in pappo sam
euolat lanuginem, Radice
est multifida ac breui.

L O C V S.

Idem.

Nascitur in campestribus
inculto solo.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem.

Excalfacit, ficit, aperit,
abstergit, digerit, & reliquas
minoris Senetionis vires ob-
tinet.



Myscvs

NOMINA.

871

Muscus marinus, Græcis, Βρύον θαλάσσιον. Arabibus, Thaleb, siue Thabel. Italis, Corallina. Germanis, Meer Wietz, seu Meer Wietz. Hispanis, Malhor quiana. Gallis, Coralline.

MUSCVS MARINVS.

GENERA.

Dum est generum: Dio- Matth. scoridis alterum, alterum vero Plinij.

FORMA PRIMI.

Gracilis, capillaceusq; pro- Idem. uenit caulis expers, colore cum siccat subrufescente, falso sapore, odore concharum marinarum simili.

* Varia effigie hic nascitur ut ex pictura patet, colore quoq; discrepat, qui in alio ruber, in alio candidus in nonnullo etiam subluteus esse obseruatur.*

LOCVS.

Nascitur in scopulis testaceisq; Diosc.

QUALITATES.

Compositus est ex terrena, Gal. 6. & aquea essentia, utraq; frigida, siquidem gustum adstringit, & calidis quibusdam illitus, ea euidenter refrigerat, & adiunat. simp. me.

VIRES.

Præcipua ei spissandi vis, & collectiones cohibendi: podagras iuuat, quas refrigerare opus sit. Peculiari autem sicci dote, admirabilis est facultatis, ad teretes intestinorum vermes pellendos, potui datus drachmæ pondere ex passio, aut cum Egyptiæ filiquæ pulpa.

APPENDIX.

Posse quidem marinum muscum, qui recens fuerit, refrigerare, facile cum Galeno, & Dioscoride concedam: quod verò siccum id efficere possit, quod gustu falso sentiatur, non ita facile mihi concedendum videtur.

lii 4

MUSCVS



Muscus marinus alter, Italis, Mosco marino di Plinio.

MUSCVS MARINVS ALTER PLINII.

F O R M A.

Pli. li. 27. Bryon marina herba, sine
cap. 8. dubitatione lactuæ folijs si-
milis, rugosa, veluti contra-
cta, sine caule, ab ima radice
exeuntibus folijs.

L O C V S.

Idem. Nascitur in scopulis, maxi-
mè testis terra comprehensus.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem. Præcipua ei spissandi, sic-
candi; vis, & collectiones o-
mnes, inflammationesq; co-
hibendi, præcipuè podagræ,
& quicquid refrigerare opus
sit.



POTA-

NOMINA.

873

POTAMOGETON, Græcis, Πόταμωζεντον. Italis, Potamogeto. Germanis, See-
hasden kraut. Gallis, Herbe des estagnes, vel Esphy deaue.

POTAMOGETON.



FORMA.

Foliū fert betæ simile, hir- DIOSC.
sutum, paululum superemi-
nens extra aquam.

LOCVS.

Nascitur in palustribus, & Idem.
aquosis.

QUALITATES.

Adstringit, & refrigerat si- Gal. li. 8.
militer polygono, sed essen- simp. me.
tia eius crassior polygono est.

VIRES.

Refrigerat & inspissat, pru DIOSC.
riginibus vtile, & contra ve-
terum vlcera non mas.

lii 5

SAGITTA.

SAGITTA, Græcis, *Πισάδα*. Italis, *Saetta*. Germanis, *Pfeilkraut*.

SAGITTA.

GENERA.

Matth. Duum est generum. Maius, & minus.

FORMA MINORIS.

Folia habet robusta, sagittæ auriculatæ figura; pediculo triquetro, spongioso, sesquicubitali, maiori, aut minori pro aquarum profunditate, in quibus vivit: caulem habet rectum, laevem, rotundum, spongiosum: ramulos hic superius mittit, è quibus flores exeunt albi, tribus tantum foliis circumscripti, è quibus capitula producuntur subpurpurea, hirsuta, nucis Ponticæ magnitudine, in quibus minutum gignitur semen, rotundo intus globulo inherens. Radice nititur alba, multifida, fibrosa, plantaginis aquaticæ modo, cuius cognitionis sagitta esse videtur.

LOCVS.

Idem. Nascitur in aquis, cum stagnantibus, tum decurrentibus.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem. Temperamento est frigido, humidoque, & ipsæ cum plantagine aquaticæ viribus pollet.

SAGITTA



NOMINA.

375

SAGITTA maior, Græcis, Πισάρα μέγα. Italis, Saetta maggiore. Germanis, Groß Pfeilkraut.

SAGITTA MAIOR.

FORMA.

Minori est per omnia simi-
lis, sed omnia quoque maio-
ra spectantur: verum folia nō
usq; ad eū acuminata habentur.

LOCVS.

Nascitur, vt altera stagnan-
tibus, & decurrētibus aquis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Paribus alteri viribus præ-
stat.



STRATIO.

aquati-
GITTA

STRATIOTES millefolium, Græcis, Στατίωτος χιλιόφυλλος. Italis, Millefoglio.
Germanis, Garben. Hispanis, Millboyas yerua. Gallis, Millefeuille.

STRATIOTES MILLEFOLIUM.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum, Maius,
& minus.

F O R M A M I N O R I S.

Diosc. Exiguus est frutex, palmi al-
titudine, aut amplius assurgit:
folijs auicularum pennas imi-
tantibus: breui admodum dis-
sectoque foliorum exortu: fo-
lia sylvestre cuminū simulant,
præsertim breuitate, breuio-
ra paulò, densiore umbella, &
pleniora: Surculos in cacumi-
ne gerit exiguos, & capitula in
modum anethi: flores paruos,
& candidos.

L O C V S.

Idem. Nasctur in asperis agris,
præcipueque circa semitas.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 7. Nonnihil habet adstrictio-
simp. me. nis, proinde & vulnera gluti-
nare potest, & vlceribus esse
vtile.

V I R E S.

Diosc. Eximij est vsus ad vlcera ve-
tera, recentiaq; profluentem
Matth. sanguinem, & fistulas. Datur

utiliter foliorum succus ad sanguinis reiectiones. Idem præstat sicci farina ex
symphiti maioris, aut plantaginis aqua pota, eadem naribus indita, fluentem
indè sanguinem compescit: dysentericis commodè infunditur, vnà cum sui-
ipsius succo. Herba recens rufa, pubique illita, mensium abundantiam compe-
scit: Candida millefolij umbella, rufa, & cum sua ipsius aqua pota, aut caprino
lacte, gonorrhæam in viris, in sceminis alba vteri excremeta cohibet. Atqui scæ-
licius auxiliatur, si cum corallio, succino albo, & ebore propinetur: foliorum,
& florum farina vnciæ pondere, vnà cum Armeniæ terræ drachma, ex vaccino
lacte pota, præstat mirum in modum ad sanguinis mictum: commanducata ra-
dix, diuque sub dente retenta, dolorem mulcet.

MILLEFO-



NOMINA.

877

MILLEFOLIUM maius, Græcis, Στραπότης χιλιόφυλλο μέγας. Italis, Mille foglio maggiore.

MILLEFOLIUM MAIUS.



FORMA.

Folia profert minoris simi- *Matth.*
lia, sed maiora, Tanaceto qua-
dātenus proxima, caules quo-
que maiores, subhirsutos, at-
que grandiores umbellas: flo-
ribus in purpura albicātibus,
odore medicato.

LOCVS.

Prouenit in montibus, & *Idem.*
collibus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Præstat eadem, quæ minus. *Idem.*

VERBA-

VERBASCUM, Græcis, Φλόμ. Officinis, *Tassus barbassus*. Hetruscis, *Barbaraschio*. Cæteris Italis, *Tasso barbasso*. Germanis, *Weiß Wulffraut*. Hispanis, *Verbasco*. Gallis, *Bouillon*.

VERBASCUM.

GENERA.

Matth. Plura Verbasci numerantur genera, ut ex appictis iconibus palam fiet.

FORMA PRIMI.

Diosc. Primum, quod fœmina vocatur, folia habet brassicæ, pilosiora multò, & latiora, candidioraque: caulis illi albus; cubitalis aut amplior, subhirsutus: flores ex luteo pallescentes, semen nigrum, radix lōga, gustu acerba, crassitudine digiti.

LOCVS.

Idem. Nascitur in campestribus.

QUALITATES.

Gal. li. 8. Radix gustu acerba est, & *simp. me.* fluxionis affectib. prodest, at tamen folia digerēdi vim habet: omniū. n. folia desiccandi, & digerendi vim habent.

VIREs.

Diosc. Radix datur ludicri tali magnitudine cōuenienter ex vino, in alui profluuiio. Decoctum dentium dolorem collutione mitigat. Omnia genera, sed fœmina magis, sedis

Matth. ferè morbis omnibus subuenit: fœminis & florum farina, larigna resina excepta, cum anthemidis floribus, procidentem sedem suffitu cohibet, & tenasum in dysentericis sanat, formine radice succus, anteaquam caulescat, duarum drachmarum pondere ex vino Cretico haustus, in ipsa accessionis hora, quartanam fugat, sed ter, quaterve id repetendum est. Succus tam foliorum, quam florum asperis verrucis illitus, eas delet. Folia tusa, cineribusque calefacta, sanant panos, quos bubones vocat: stillatitia florum aqua, oculis instillata, fluxiones cohibet, & illita faciei ruborem tollit: eoque magis si caphuræ tantillum adjiciatur. Flores unā cum oui vitello, & mica panis, ac porri folijs illiti, perbellè præstant ad cohibendas tumentes, dolorificasque hæmorrhoidas.

VERBA-



NOMINA.

879

VERBASCUM mas, siue secundum, Græcis, *ἐλάμω* ἄππλω λένος. Italis, *Tasso barbasso mafchio*.

VERBASCUM II.

FORMA.

Oblongius est, albis folijs, *DIOSC.* angustioribusque : tenuiore *Matth.* caule. Floribus in cacumine minoribus, pallido colore. Radice minori, minusq; carnosâ.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, *Matth.* exoluto solo.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem præditum est viribus, quibus & fœmina.



VERBA-

VERBASCVM tertium, Græcis, Φλόμω ἄρβιου μέλας. Italis, Taffo barbasso minore.

VERBASCVM III.

FORMA.

Matth. Folia profert nigriora, oblongiora, saluix ferè modo aspera, sed latiora: caulibus rotundis, robustis, tenuioribus; floribus in cacumine spicatis, aureo colore.

LOCVS.

Idem. Prouenit & hoc quoq; in campestribus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Eadem cum alijs habet vires.



VERBA-

NOMINA.

831

VERBASCUM sylvestre, Græcis, *αλβου αγγελια*. Italis, *Tasso barbasso saluatico*.

VERBASCUM SYLVESTRE.

FORMA.

Folia fert Saluix, altas vir- Diosc.
gas, & lignosas, & circa eas ra-
mulus, quales marrubium, flo-
res luteos, auri æmulus.

LOCVS.

Nascitur in campestribus, Matth.
& apricis montibus.



Kkk

VERBA-

Verbascum aliud est, cuius
folia corniculati papaveris
modo prodeunt per ambi-
tum sinuata: Ideoq, recte Di-
oscorides huiusce papaveris
folia, verbasco similia fecit.



PRIMV.

PRIMVLA VERIS, nonnullis, Brache Cuculi: Quibusdam Herba paralytis.
 Italis, Fiore di Primavera. Germanis, Schlüsselblumen. Gallis, Primevere, seu
 Brayes de Cocu.

PRIMVLA VERIS.



GENERA.

Dum est generum, alce. Matth.
 rum odoratum, alterum ino-
 dorum.

FORMA PRIMÆ.

Folia profert lactuca qua- Idem.
 dantenus similia, oblonga, ru-
 gosa: Labri veneris ferè mo-
 do, humi iacentia, è quorum
 medio cauliculus exit dodran-
 talis, atq; incanus, è cuius fa-
 stigij, flores exeunt complu-
 res lutei, per ambitum fim-
 briati odoratiq; , vt in vrsi
 auricula, quam & radice quo-
 que imitatur.

LOCVS.

Prouenit secus vias, pro- Idem.
 pter sepes, & in pratis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Tota planta articularibus Idem.

morbis auxiliatur. Radicum decoctum renum calculos eijcit: præstat idem
 additis saluia, & amaraco ad frigidos neruorum, & cerebri morbos: quare re-
 solutis ac tremore affectis potum confert: epotus foliorum succus, ac etiam il-
 litus fractis, luxatisq; ossibus confert. Stillatitia florentis plantæ aqua commen-
 datur ad animi deliquium. flores illinuntur aduersus scorpionum ictus. Herba
 ipsa, aut flores, aut radices, trita, & illitæ vulnera glutinant. Mulieres è floribus,
 & polygonati radicibus in albo meraco maceratis, stillatitiam aquam faciunt
 ad faciei nitorem conciliandum.

Kkk 2

Ijsdem

Iisdem nominibus appellatur, quibus, & altera.

PRIMVLA VERIS ALTERA.

FORMA.

Matth.

Folia profert latiora, & in
cacumine rotundiora, humi
pariter accubantia, crispa,
rugosaque, ac magis tenera:
caule verò, floribus, ac radi-
cibus, ab altera non differt.

LOCVS.

Idem.

Nascitur iisdem in locis, &
frequenter in sylvis herbo-
sis.

QUALITATES, ET
VIRE.

Idem.

Easdem, quas altera possi-
det vires, imbecilliores ta-
men.



BLATT-

N O M I N A.

885

BLATTARIA, Dioscoridi verbasum aurei floris. Italis, *Blattaria*. Germ. Mat-
ten oder Schabenkraut, Goldt Knöpflein.

BLATTARIA.

FORMA.

Herba est similis verbasco, *Plinius*,
folijs minus candidis: caulicu- *Matth.*
lis pluribus, flore luteo. Se-
mine capitulis concluso lini
modo, sed durioribus.

L O C V S.

Nascitur in campestribus. *Matth.*

Q U A L I T A T E S.

Sapore est amaro, excalfa- *Idem*,
ciens, & siccans.

V I R E S.

Herba prostrata blattas in *Plin.*
se contrahit.

* Fartus quoq; viscerum,
mesaraicarumq; expedit. *



Kkk 3

ÆTHIO-

ÆTHIOPS, Græcis, αἰθίοψ. Italis, Eriope, & Etiopide.

ÆTHIOPS.

FORMA.

Diosc. Folia habet verbasco similia, per quam hirsuta, densaq; in orbē circa radicem imā redacta: caulem quadrangulum, scabrum similem apiastro, aut arctio, multis concauum alis. semen exui magnitudine: geminum in vno conceptaculo: Radices ab eodem cespite numerosas, longas; crassas, gustu glutinosas, quæ sicæ nigrescunt, duranturq; ut cornua imitari videantur.

LOCVS.

Idem. Plurima nascitur in Ida, & in Messenia.

QUALITATES, ET VIRE.

Idem. Auxiliatur purulentis excreationib⁹, Ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabritijs decocta radix, & pota, quin etiam cum melle Eclegmatis vicem præbet.



PERSO-

NOMINA.

387

PERSONATA, Græcis, *Agæion*. Officinis, *Bardana*, Italis, *Lappola maggiore*. Germanis, *Groß Kletten*. Hispanis, *Bardana*, seu *Pagumacera mayor*. Gallis, *Glozeron*, seu *Bardana*.

PERSONATA.

FORMA.



Folia habet cucurbitæ ma- Matth.
iora, nigriora, hirsutiora, cras-
sioraq; caulem crassum, angu-
losum, albicantem, sesquicubi-
talem, atq; ramosum, fructu co-
piofo, echinato, non magno, a-
culeis repandis, vestibus perti-
naciter inhaerentibus. Floribus
purpureis, semine cnici mino-
re. Radice longa, vegeta, intus
candida, foris nigra.

LOCVS.

Nascitur passim in agrorum
marginibus, secus itinera, & fe-
rè vbiq;

QUALITATES.

Discutit simul, & desiccatur, & mediocriter adstringit.

VIRES.

Radix drachmæ pondere, cum pineis nucibus pota, purulenta, & cruenta Diosc.
extussientibus auxiliatur: trita dolores à contritione arctum contractos, illitu
sedat. Folia vtiliter antiquis vlcibus illinuntur. Semen porum calculosis au- Matth.
xiliatur. Idem facit radicis decoctum infusum.

Gal. 6.

simp. me.

Kkk 4

PERFO-

PERFOLIATA: *Italica, Perfogliata.* Germanis, *Durchwach.*

PERFOLIATA.

FORMA.

Matth.

Folia profert subrotunda, pingua, sed in acutum desinentia, pisi ferè modo: venis compluribus secundum longitudinem protensis. caulis illi est gracilis, glaber, rotundus atq; etiam ramosus: folia, quæ in caule, & ramis sunt ab ijs umbilicatenus transguntur, magno naturæ artificio: quare putarem ego, vt perforata magis, quàm perfoliata dici deberet: flores gerit aureos, è capitib⁹ quibusdam prodeuntes in stellæ modum: semen nigrum, paruum psyllij modo pellucidum.

LOCVS.

Idem.

Nascitur in vineis, campis, & alijs quoq; locis, & in agrorum limitibus.

QUALITATES, ET
VIRE S.*Idem.*

Gustu est subamaro, & adstringenti. Datur herbæ decoctum ex vino paratum, aut folia in puluerem trita, ad internas affectiones, & ad rupta: quare bibuntur commode ad umbilici eminentias, & enterocellas. illita strumas quoq; resoluunt.



ELLEBO-

ELLEBORINE, Græcis, *Επιπάκτις*. Italis, *Elleborina*.

EPIPACTIS SIVE ELLEBORINE.

FORMA.

Parua est herba, & exiguis folijs.

LOCVS.

In Asia, & Græcia nascitur. *Idem*.QUALITATES,
ET VIRES.

Iocinoris vitij vtilis, & contra venena pota.

APPENDIX.

*Difficile est coniectu, quænam sit Helleborine Dioscoridis, cum tantilla vel nulla ferè ipsius descriptio habeatur. Itaq; substituta fuerat ab autore, eius loco Herba quædam hoc nomine insignita, quod nigri veratri quadantenus effigiem referret, & similes quoque radices haberet. Eacùm viua nobis nondum cõspecta sit, ideoq; exactior depingi haud potuerit, maluimus

elegantem hanc plantam hic apponere, congenerem ei quam plures alij sub Helleborines appellatione exhibuere, quæque nusquam non reperiri potest in locis humidis. Hæc verò, cuius imago hic vultur, etiam palustria & lacus amat, & pratis irriguis familiaris est, flore Orchidũ, sed ternis foliolis ad seminis conceptaculum annexo, suppurpureo, interdum pulcre rubẽte, aut etiam penitus albo, huic semina subnascuntur planè vt in orchidibus: folijs & pene etiam radicum fibris Helleborum album imitatur, vnde vulgaris ei notio tributa fuit.*

Kkk 5

FVMA-

FUMARIA, Græcis, Καρύδς. Officinis, Fumus terræ. Arabibus, Scebiterig, siue Sabeteregi. Italis, Fumofterno. Germanis, Erdrauch/Ragentörbel. Hispanis, Palomelha. Gallis, Fumeterre.

FUMARIA.

GENERA.

Matth. Duum est generum. Maius, & minus.

FORMA MINORIS.

Diosc. Fruticosa herbula est, prætenera, coriandro similis, folijs candidioribus, vndiq; numerosis, cineracei coloris, flore purpureo.

LOCVS.

Matth. Nascitur in hortis, vineis, & campis.

QUALITATES.

Galen. 7. Acris simul, & amaræ quasi simp. me. litatis est: nec tamè planè expers est acerbæ: quam obrem vrinam biliosam multam trahit.

VIREs.

Diosc. Oculis claritatem facit, de lachrymationemq; succus instillatus. Manducata Matth. herba biliosam vrinam trahit. Attenuat, penetrat, obstructions aperit, ac deiectionis est facultatis, cohibet, aggregat, & roborat. Aluum facile ducit, bilem trahit, & adustos humores: vis eius non modo ad iecur, sed ad venas permeat, quare sanguinem expurgat: medetur elephantiasi, carcinomatibus, lichenis, & cæteris cutis infectionibus: quin etiam omnib. ferè morbis ex viscerum infarctu prouenientibus: ventriculum, iecur, lienem, & cætera interna viscera roborat, biliosasq; finit febres: & quæ à vasorum obstructione excitantur.

FUMA-



NOMINA.

891

FUMARIA altera, Græcis, Καπνὸς ἁγέλα. Italis, Fumofterno maggiore. Germanis, Holswurz.

FUMARIA ALTERA.

FORMA.

Planta est fruticosa, prætera, folijs coriâdri, cineracei coloris: flore purpureo. Radice tuberosa, inani, buxco intus colore: odore aristolochia. Matth.

LOCVS.

Prouenit in hortis, & segetibus hordeaceis, & propter sepes. Idem.

QUALITATES, ET VIRES.

Radix amara est, & ea omnia potest vnâ cum herba, quæ altera Fumaria. Radix ex vino pota, venenis, & pestilentiæ medetur: sudorem, & vrinâ ciet, & ictericos iuuat: semen bibitur ad diuturna alui profluuia. Radicis farina, manantia quolibet vlcera exiccat, & mûdat.

CENSURA.

Non recte sentiunt Germani medici, ac pharmacopæi, qui hæc plantam rotundam esse Aristolochiam putant. Alij verò pistolochiam.

CORYDA.



CORYDALIS, Græcis, Κορύδαλις. Quibusdam split. Italis, Coridala.

FVMARIA CORYDALIS.

F O R M A.

Matth. Foliagerit coriãdri, sed minora, tenuioraque: caules exiles, compluribus ramusculis: floribus in summitate auicularum speciem referentibus: radicibus numerosis, tenuibus, prælongis, ac subalbican-
tibus.

L O C V S.

Idem. Prouenit in collibus cultis, & agris, * præsertim in Illyria.*

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem. Præstat vniuersa planta ad colicos dolores, siue recens manducetur, siue sicca in puluerem sumatur ex vino pluribus diebus.



L O T V S

Lotvs vrbana, Græcis, Λοτὸς ἡμεῶν. Italis, Tribolo, seu Trifoglio Canallino. Germanis, Scintillee.

LOTVS VRBANA.

FORMA.

Caules edit bicubitales, ac Diosc. etiam maiores, rectos, firmos, Matth. ramosos, & in his folia trifolij pratensis amula, leuiter per ambitum denticulata, beneq; olentia: flores edit racemosos, tenues, paruosq; luteo colore, aut albo, odoratosque.

LOCVS.

Nascitur in hortis, pratis, Idem. agris, & vbique ferè locorum.

QUALITATES.

Vt medioeriter cōcoquen- Galen. 7. di vim possidet, sic etiam exic- simp. me. candi in caliditatis, frigiditatisque coniugatione, media quodammodo est, & temperata.

VIRES.

Extractus succus, addito Diosc. melle, oculorum argemas, nubeculasque, ac cæteras caligines discutit. Vsur- Matth. patur tota planta vnguentarijs, quod odoratam ex ea faciât aquam, in qua chirothecas macerant, ac lauant.

LOTVS



LOTVS sylvestris, Græcis, λωτὸς ἀγρίος. Italis, *Lotosaluatico*. Arabibus, *Handa choca*. Germanis, *Sibengezeit*.

LOTVS SYLVESTRIS.

F O R M A.

Diosc. Folij prouenit trifolij pratensis, caule cubitali, & sæpe maior, alis multis (floribus in capitulis cæruleis) semine fæ-nogræci, sed longè minore, odore medicato.

L O C V S.


Diosc. Plurimum in Lybia nascitur. Nascitur copiosum etiam in Boemia.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 7. Semen secundi est ordinis simp. me. excalfaciētium, habetq; non-nihil absterforium.

V I R E S.

Diosc. Vitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat: trita per sese, aut cum maluæ semine, bibitur aptissimè cum vino, aut passo contra dolores, qui vesicam malè habent.



CYTISVS:

NOMINA.

395

CYTISVS: Græcis, Κύνος. Italis, *Ciriso*. Germanis, *Geißflœ*.

CYTISVS.

FORMA.

Frutex est albus, in totum vt *Diosc.*
Rhamnus, ramos spargens cubi-
tales, & maiores, in quibus folia
fœnogreci, minora, dorso medio
prominente: Ea digitis trita, eru-
cam olent, gustatuque cicer re-
cens sapiunt.

LOCVS.

Nascitur sponte in Campania *Matth.*
propè Neapolim.

FACULTATES.

Folia digerēdi facultatem ob- *Gal. li. 7.*
tinent, aqua temperata mistam, *simp. me.*
sicut & malua folia.

VIRES.

Folia refrigerant, tumores in- *Diosc.*
ter initia discutunt, si cum pane
trita illinantur. Decoctum po-
tum, urinam ciet: nonnulli, quod
apes alliciat, prope aluearia fe-
runt.

MYRIO-



MYRIOPHYLLVM, Græcis, *Μυριοφύλλον*. Italis, *Miriofillo*. Germa. *Fenchelgarb*.

MYRIOPHYLLVM.

F O R M A.

Matth. Myriophyllum, siue millefoliū, cauliculus est tener, singularis, vnica nixus radice, plurimis folijs, læuibus, fœniculo similibus, caulis flauescit, varius, ac veluti ex industria deliniatus.

L O C V S.

Idem. Nascitur in palustribus.

Q U A L I T A T E S.

Vsq; adeo deficcatoriæ est facultatis, vt vulnera glutinet.

V I R E S.

Vulnera recentia ab inflammatione vindicat, si vel viride, vel siccum; ex aceto oblinatur, præcipitatis in potu cum aqua & sale datur.



MYRIO-

MYRIOPHYLLVM ALTERVM.

Si quis hanc Myriophylli
plantam nouerit. cuius hic
imago uisitur, is facile Myrio-
phyllum Dioscoridis esse con-
sentiet. & praesertim cum in
palustribus nascatur.



LII

MYRRHIS,

MYRRHIS, Græcis, Μύρρις. Italis, Mirrade. Germanis, Welscher Körbel.
MYRRHIS.

F O R M A.

DIOSC. Simillima est cicuta, caule, folijsq;: radix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo non insuavis.

L O C U S.

Idem. Nascitur in hortis, & alijs cultis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Radicem habet odoris in-
simp. m. cundi, & dulcis: exalfacit ordine secundo, adiuncta quadam partium tenuitate.

V I R E S.

DIOSC. Radix in vino pota, phalangiorum moribus auxiliatur: cit menses, partus, & secundas, purgatque à puerperio feminas: subuenit & tabidis cocta in sorbitione. Adiunt quoq; eandem bis die, teruè potam ex vino, in pestilentia salutarem esse. & ne morbi contagia sentiantur obitare.

C E N S U R A.

Non desunt, qui vulgare Cerofolium Myrrhim faciant. verum eum cauliscicuta non sit, nec radice vsus, sed foliorum: ijs profectò subscribere nequeo.

ANGE-



ANGELICA, Italis, *Angelica*. Germanis, *Angelick*. Gallis, *Angelique*.

ANGELICA.

GENERA.

Duum est generum, sativæ, *Matth.* & sylvestris.

FORMA SATIVÆ.

Caulem edit geniculatum, *Idem*. cubitalem altitudinem excedens, inanem: multis alarum cauis: folia oblonga per ambitum serrata, umbellam magnam, albis floribus referat: semine tenui, lentis modo compresso: Radice crassa, complurimis adnatis fibris longis, nigricanti colore, eximio odore præditis, sapore acris ac subamaro.

LOCVS.

Seritur, coliturque in Ger. *Idem*. mania in campis, præsertimque in Misnia, & Saxonia.

QUALITATES.

Radix cuius est usus, acris *Idem*. est, atq; amariuscule. Quare manifestè excalfacit, & siccatur, ordine secundo completo, aut tertio incipiente: proinde aperit, attenuat, discutit, penetrat, incidit, & flatus pellit.



VIRE.

Radix venenis mirificè aduersatur, manditur aduersus pestilentia contagia: *Idem*. per se sumpta, pituitosos, lentosq; humores digerit, & cruditates concoquit: *Idem* præstat radicis decoctum, & tussientibus ex frigore, celeriter auxiliatur. Eodem epoto dissoluntur sanguinis grumi: Radicis farina datur vtiliter in omnibus frigidis affectibus. valet ad rabioforum; & venenatorum morsus; tam intus sumpta, quàm exterius cum ruta imposita. mansa, & dentium cauis indita, dolores sedat. Anhelitum aded commendat, vt præsumpti alij odorem facile occultare valeat.

ANGELICA sylvestris: Italis, *Angelica saluatica*. Germanis, *Wilde Angelick*.
Gallis, *Angelique sauvage*.

ANGELICA SYLVESTRIS.

F O R M A.

Matth. Pumilior est omnibus suis
partibus, sed viribus longè
præstantior: Radicem pro-
fert minorem, paucis fibris,
quæ secta liquorem suburen-
tem mittit, acerrimi gustus,
& qui lachrymas cient.

L O C U S.

Idem. Nascitur plurima in alris-
simis montibus, in pratis, &
pascuis amœnis locis.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Cum acerrimi sit gustus,
longè valentius, quàm dome-
stica exalfacit, & siccat.
Quare ad quarti ordinis prin-
cipium accedit

V I R E S.

Omnia præstare potest,
quæ domestica, sed longè va-
lentius. cæterum non adeo copiosius ea uti præstabit, quod nimis corpus ac-
cendat. mansa enim os, linguam, & fauces maximè urit, atq; inflammat.

PSEUDO-



NOMINA.

901

PSEUDOMYAGRUM, Italis, *Miagro falso*. Germanis, *Lein Dotter / Fincken Samen*.

PSEUDOMYAGRUM.



FORMA.

Caulem edit cubitalem, *Matth.* ramosum: & folia, quæ in eis sunt, glasti, aut thlaspi quadrantenus similia: floribus in summitate albis, tenuibusq; semine paruo, dulci.

LOCVS.

Nascitur in campis inter *Idem*. linum, & frumenta.

QUALITATES

Modicè excalfacit: atque *Idem*. humectat.

VIRES.

Accedit omnino ad sesami vires semen: paratur pariter ex eo oleum, ad similes facultatis. Semen quoque est auiculis gratissimum.

LII 3

*PSEUDO-

Plures species Myagri putati notari possunt è quibus duæ hæ notiores. Vna longe tenerioribus virgulis, quam vulgaris, nascitur, sed cultura fruticosior fit, & semen minus in vasculis vegetioribus ni profert, & quia rarior est, Myagri Turcici nomen fortitur ab hortulanis. Hacinuetur alia quædam exilior, vasculis rotundioribus, quæ alicubi in aruis sponte nascitur.*



CIRSIVM.

CIRSIVM, Græcis, Κίρσιον. Italis, Cirsio.

CIRSIVM.



F O R M A.

Caulis est tener, triangula- **Diosc.**
ris, bicubitalisq; ab imò folijs
rosæ speciem referentibus,
angulis spinosis, per interual-
la mollibus. Folia ei buglossò
similia, longiora, subcandida,
modicè hirtuta, per extremi-
tates aculeata: cacumen cau-
lis orbiculatum, hispidum, in
quo capitula in summo pur-
purea, quæ in lanugines sol-
uuntur.

L O C V S.

Nascitur vlginosis locis.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Radix laboranti loco adal- **Matth.**
ligata, dolores varicum fa-
nat.

LII 4

ASTER

ASTER Atticus, siue Bubonium. Græcis, Ἀστὴρ ἄττικός. Arabibus, *Astaraticon*. Italis, *Asteratico*. Germanis, *Stern Kraut*. Gallis, *Petite espargoutte*, seu *petit Mugue*. Vergilio, *Amellus*.

ASTER ATTICVS.

F O R M A.

Matth.

Caules ab radice mittit rectos, solidos, ac lignosos, colore fusco lutescente; è quibus circa cacumen ramuli oriuntur tenues, in quorū summitate flores spectantur, vt in Anthemide, & Belli: sed in medio lutei, & per ambitū purpurei. Folia profert oblonga, oliuæ figura, minora tamen, aspera, hirsuta, nigricantia, aspero sapore, ac subamaro, radicem habet multifidam, odore non ingrato.

L O C V S.

Idem.

Nascitur in asperis, incultis, collibus, & conuallibus.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 6.

Mistæ est facultatis, vt irosimp. me. sa, verū id non adstringit.

V I R E S.

DIOSC. Feruenti stomacho, oculorum inflammationibus, proci dux sedi, ac inguinibus illita auxiliatur: tradunt quoque purpureum in flore, si ex aqua bibatur, anginis, & pueris comitialibus, opitulari. Herba ipsa recens illita, inguinum bubones, inflammationesq; curat. Cum veteri axungia tusa, imponitur vtiliter rabioforum canum moribus: & incensa serpentes fugat.

*ASTER



*ASTER Atticus cæruleus alpinus.

F O R M A.

Flores promit cæruleos ut
prior, folia quoque priori non
dissimilia, radice se propagat,
sed tamen pappo quoque se-
minagignit, & interdum glo-
buli tumentes villosi prope
radicem adnascuntur foliolis,
estque omnino minor vulgari
Aster.



LII 5

ASTER

F O R M A.

Visitur facies, ex icone suæ
 ipsius plantæ: nos tamen eam de-
 lineandam duximus, vt etiam a-
 liorum possit esse iudicium: cæ-
 terum nos priorem omnino pro-
 bamus. Et præfertim cum in hu-
 ius flore nihil purpurei habea-
 tur.



*ASTER

*ASTER Luteo flore, alijs Conyzæ species.



FORMA.

Caules profert mediocres per quædam intervalla radicis repentis & se propagantis ab inferiore parte demissis fibris rectis, quæ aliquantulum odoratæ sunt, sapore aromatico modice ad cinamomi saporem accedente, subacri. In summis caulibus duos vel tres ramulos habet, quibus flores lutei disco in medio apicibus conferto insident, qui tandem in pappos abeunt. Folia per caules alterna hirsuta nullo pediculo duabus quasi alis eisdem amplectuntur.

Locvs.

Nascitur in saltibus.*

STELLA-

STELLARIA, siue pes Leonis, siue Alchimilla. Italis, *Stellaria*. Germanis, *Synnaw*. Gallis, *Pie de Lyon*.

STELLARIA.

FORMA.

Matth. Folijs prouenit maluæ similibus, robustioribus tamen, ac magis carinatis, octonis circumquaque angulis. Et per ambitum denticulatis adeo, vt patefacta, stellæ imaginem referant: caulis ei tenuis, semicubitalis, lanuginosus, à quo còplures exeunt rami, in quorum summo flores emergunt subpallidi, tennes, stellarum effigie. Radice cohæret digitali crassitudine, sapore adstringenti.

LOCVS.

Idem. Prouenit in montibus, in pratis, & pascuis.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem. Exiccat, cohibet, atq; conglutinat: pota efficax est ad interna vulnera. quin etiam externa illita glutinat. Aridæ farina in sui ipsius decocto hausta, enterocellis medetur. Conceptum adiuuat, & steriles fecundas reddit hausta continuis viginti diebus cochlearis mensura ex vino, vbi præsertim sterilitas ab vteri humiditate prouenerit. quare datur quoq; vtiliter ad alba vteri profluvia.



* STELLA-

*STELLARIA argentea, vel Argentaria petraea, vel Alchimilla minor, Heparaphyllum montanum. Germanis, Bergshinnaw, Steinsynnaw.

STELLARIA ARGENTEA.

FORMA.

* Folia habet stellata radiataq; inferna parte argenteis pilis nitentia, ut plurimum septena in unius pediculi summitate coherentia, flores in corymbis pallidos, ut vulgaris Alchimilla.

LOCVS.

Elocis saxosis montium in hortum translata, quouis loco facillime diutissimeque viret.

QUALITATES.

Incompertae facultatis est, nisi sit exiccantis & astringentis, atq; adeo ad vulnera conglutinanda efficax, ut prior.*



VIOLA

VIOLA purpurea, Græcis, *ἰορροφυόν*. Arabibus, *Senesfige*, *Sonosfig*, seu *Benefesgi*. Italis, *Viola*, & *Viola Mammola*. Germanis, *Merken Bielen*. Hispanis, *Violetta*. Gallis, *Violette*.

VIOLA PURPUREA.

FORMA.

DIOSC. *Viola* purpurea folium habet hedera maius, tenuius, ac nigrius, nec multo dissimile, cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus suavisimè olens purpureus.

LOCVS.

DIOSC. Opacis, & asperis nascitur
Matth. propter sepes, & sec^o itinera.

QUALITATES.

Galen. 6. Folia aqueam, & subfrigidam substantiam superantem possident.
sim. me.

VIRES.

DIOSC. Refrigerandi naturam habet. Illinuntur folia per se, aut cum hordeacea farina aptissimè stomacho æstuanti, & oculorum inflammationibus, sediq; præcidenti. Refrigerant, & humectant ordine primo, sed siccæ minus. Humiditas, quæ superflua recentibus inest aluum emolliendo ciet, siccæ verò deiectionis sunt facultatis, non quodd emolliant, sed quodd dissoluant. In summa toporifera sunt, calidos dolores mulcent, inflammationes extinguunt, leniunt, & solvunt. Bilem educunt, eiusq; feruorem mitigant, conferunt capitis doloribus, quos caliditas excitauit, somnum conciliant. Pectoris, & tracheæ arteriæ scabriciem leniunt. Medenturq; anginis, & columnellæ vitijis. Præcipuo autem auxilio sunt pectoris, & lateris inflammationibus, sitimq; arcent.

Mesue.



VIOLA

NOMINA.

911

VIOLA arborescens, * vel potius erecta. * Italis, *Viola arborea*.

VIOLA ARBORESCENS.

FORMA.

Crescit hæc duorum cubi-^{Matth.}
torum altitudine, pluribus
ab vna radice sublatis cauli-
bus, in quibus folia violæ pur-
pureæ angustiora, per ambi-
tum denticulata, atque pari-
bus interuallis distincta, flo-
res edit purpureos, consoli-
dæ regalis vocatæ haud abfi-
miles, odore purpureæ violæ.

LOCVS.

Nascitur in Baldo monte *Idem*.
in agro Veronensi.



IACCEA,

u Bene-
lispanis,

na super-
ant facul-
lunt, cali-
t. Bileme-
s caliditas
n leniunt.
int pecto-

VIOLA

IACCEA, seu herba Trinitatis. Græcis, *ἰὺ ἐν τῷ ἁγίῳ*. Italis, *Iaccea*, seu *Minuti pensieri*. Germanis, *Greysamkraut*/ *Sibenfarben Blümlein*. Gallis, *Pensées*, aut *Mennes pensées*.

IACCEA, SIVE FLOS TRINITATIS.

G E N E R A.

Matth. Duum est generum, Maior, & Minor.

F O R M A M A I O R I S.

Idem. Folijs exit primo exortu rotundis, per ambitum serratis, quæ tamen per incrementum in longitudinem protenduntur. caulibus constat triangularibus, quadantenus striatis, inanibusque, quibus genicula supereminent paribus interuallis, è quorum alis ramusculi exoriuntur, à quibus flores exeunt violæ purpureæ magnitudine tribus referti coloribus. Sunt enim supernè purpurei, in medio candidi, & ima parte lutei, sed penitus inodori.

L O C V S.

Idem. Nascitur in campis, & passim feritur in hortis, & viridarijs.

Q U A L I T A T E S E T V I R E S.

Idem. Sunt qui hanc ad enterocellas pollere credant, atque ægrè spirantibus, & pulmonum inflammationibus opem ferre, quin etiâ scabiem sanare, & cetera cutis vitia delere.

IACCEA,



N O M I N A.

913

IACCEA, siue herba Trinitatis altera. Italis, *Iaccea*, seu *Minuti pensieri minori*.
Germanis, *Wild Geyssam Kraut*/ *Stieffmütterlin*.

IACCEA ALTERA.

F O R M A.

Crescit hæc minoribus, ac breuioribus *Matth.*
tum folijs, tum floribus, qui tamen non tri-
bus, sed duobus tantum constant coloribus,
candido videlicet, & lutescente.

L O C U S.

Nascitur pariter iisdem in locis, & feritur
in hortis.



Mmm

Bvglos-

BYGLOSSVM, siue Borrage, Græcis, βούρραρον. Mauritanis, *Lifenaltiaur*, siue *Lesenaltiaur*. Italis, *Borragine*. Germanis, *Durretsch*. Hispanis, *Borraia*, *Borraienes*, *Borraies*. Gallis, *Borraiche*.

BYGLOSSVM, SIVE BORRAGO.

FORMA.

Matth. Folij exit latis, atq; oblongis, asperis, eminentibus vbiq; bullis, tenuissimis armatis aculeis, qui totam plantam hispidam ac rigidam reddunt, aculeato vndeunque ambitu. Caule est cubitali, & quandoque maiori, pingui, coneano, aculeis vbiq; scatente, ramis multis brachiato, floribus in stellæ modum radiantibus, cæruleo colore, & quandoque candido, nigro è medio prominente apice, semine nigro, striatoq;.

LOCVS.

Idem. Nascitur per se passim in hortis.

QUALITATES.

Galen. 7. Humidæ, calidæq; temperiei est. Itaque vinis iniectum lætitiæ, ac hilaritatis causa esse creditum est. Sed & his qui ob faucium asperitatem tussunt, coctum in mellicrato conuenit.



VIRES.

Diosc. Herbam abscessibus vtilem esse volunt. Herbx, & radici vis sanè magna est, quin etiam & floribus ad animi deliquium, & cæteros cordis affectus, atque melancholicos morbos, & præsertim eorundem decoctum ex vino, aut ex aqua paratum. Succus foliorum potus valet, contra lethalia pharmaca, & venenorum animalium ictus. Stillatitia totius plantæ aqua delirij, quæ cum febre fiunt, mirifice subuenit, quin etiam oculorum inflammationes mulcet, tam interius, quam exterius imposita.

BYGLOS-

NOMINA.

915

BVGLOSSVM vulgare, Italis, *Buglossa*. Germanis, *Dähsenjung*. Gallis, *Buglose*.

BVGLOSSVM VVLGARE.

VIREs.

Duo eius sunt genera, Hor. *Matth.*
tense, quod maius, & minus
est, & sylvestre quod pariter
duas habet species. Altera
quidem minori hortensi si-
milis, Altera flore nigro.

FORMA HORTENSIS.

Folia profert longa sym- *Idem.*
phyti maioris modo, hirsuta,
aspera, hispidaq;, tenuissimis
aculeis scatentia, caule ses-
quicubitali, rotundo, robu-
stoq;, hispido, ac pungente, à
quo rami complures exeunt
sursum spectantes, in quorum
summis partibus flores emi-
cant purpurei borraginis mi-
noribus, semine nigro. Radix
illi est borraginis, crassior, &
carnosior, lentore quodam
prædita, ac crassiori, pingui-
orque libro. Minor autem fo-
lia oblonga profert, sed lon-



gè angustiora, breuioraque, hirsuta, sed aculeis vacantia, cætera similia sunt.

LOCVS.

Seruntur passim in hortis.

Idem.

QUALITATES ET VIREs.

Eadem omnia præstare possunt, quæ Borrago.

Idem.

Mmm 2

BVGLOS-

BVGLOSSVM alterum sylvestre flore nigro, albo & purpureo. Italis, *Buglossa saluatica del fior negro, bianco & porporeo.*

BVGLOSSVM ALTERVM SYLVESTRE
FLORE NIGRO.

F O R M A.

Matth. Extat & sylvestre, genus hortensi minori per omnia simile, sed in omnibus agrestius, * & flore nonnunquam nigro, nonnunquam etiam albo exornatur, ut plurimum vero purpureos. habet flores. *

L O C V S.

Idem. Nascitur in campestribus.

Q U A L I T A T E S E T
V I R E S.

Idem. Viribus iisdem pollet, quibus ambæ hortensium species.



C Y N O.

Buglossa

STRE

CYNO

NOMINA.

917

CYNOGLOSSVM vulgare, Italis, Pariter Cinoglossa, seu Lingua canina. Germanis, Hundszung. Gallis, Langue de chien.

CYNOGLOSSVM VVLGARE.



FORMA.

Folia edit lata, longa q; hor- *Matth.*
tensis, ac maioris buglossi mo-
do, numerosa ab vna radice
prodeuntia, tactu subaspera,
ac pilosa, caulem cubitalem,
teretem, robustum, ac pari-
ter subasperum, & à medio
ramosum, flores purpureos
Echij æmulos, è quibus par-
ua prodeunt lappæ, aculeo
quodam è medio prominen-
te, magno naturæ artificio,
quæ maturelcentes vestibis
pertinaciter adhærent.

LOCVS.

Nascitur passim, ferè vbiq; *Idem.*
secus vias, & in agrorum mar-
ginibus.

QUALITATES.

Manifesto refrigerat, & *Idem.*
siccat.

VIREs.

Folia recentia imposita mirum in modum vulnerum inflammationes ar-
cent, ac etiam alias quascunque.

Mmm 3

CALTHA,

CALTHA, Italis, Fior rancio, siue Fior d'ogni mese. Officinis, Calendula. Germanis, Ringelblum. Gallis, Poussij.

C A L T H A.

F O R M A.

Matth.

Folijs exit oblongis, minime acuminatis, Leucoij quadantenus similibus, latioribus, ac longioribus, caulem edit singularem, subpinguem, sesquidrantalem, ramosum. Flores in caulium summitatibus aureos, speciososq; , odore cum grauitate haud iniucundo, è quibus semen prouenit in capitulis apertis; quod si diducatur aicularum vnguibus quadantenus simile spectatur. Radice nititur alba, rectaque.

L O C V S.

Idem.

In tota Hetruria sponte per se nascitur, secus itinera. Atqui in compluribus Italiae locis, & in Germania in hortis ad coronamenta seritur.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Excalfacit, attenuat, aperit, digerit, & prouocat, quamuis gustu adstrictione non vacare deprehendatur.

V I R E S.

Idem.

Constat, multis admodum sceminarum factis periculis, herbam valere plurimum ad mentes ducendos, epoto eius succo, aut herba ipsa recente diutius deuorata. Succus viciae pondere, cum drachma pulueris terrestrium lumbricorum, potu ictericos iuuat. Sunt qui dicant huiusce herbae usu iuuari maxime oculorum aciem. Constat tamen stillatitiam floridae plantae aquam oculorum roborem, & inflammationem arcere, si in oculos instilletur, aut linteolis applicetur, in ea madefactis. Siccatae puluis, dentium cauernis impositus dolorem sedat.

HIPPO-



NOMINA.

919

HIPPOGLOSSVM, Græcis, ἵππογλωσσον. Italis, Bislingua, sine Bonifacia. Germanis, Zäpfflin Kraut. Hispanis, Lengua de Cavallo. Gallis, Bislingua.

HIPPOGLOSSVM.

FORMA.

Frutex est folijs rusci maioribus, polygonati similibus, secundum longitudinem frequenter striatis, e quorum medio ligula quædam foliofa assurgunt, sub quibus rubentes exoriuntur bacca, vt in rusco. Radicem habet albam, geniculatam, ac duram.

LOCVS.

Nascitur in syluosis, montibus. Idem.

QUALITATES, ET VIRES.

Capitis dolorem, corona diosc. ex comis imposita minuit. Matth. Datur radix vtiliter ad omnes vteri affectiones, & præsertim præfocatis ab vtero mulieribus, cochlearis mensura. Est quoque ad puerorum

enterocellas præstantissimum auxilium si diutius radicis puluis sesquidrachmæ pondere quotidie ex maioris symphiti decocto propinetur.

Mmm 4

ANTIR-



ANTIRRHINUM, * vulgo Caput canis & Caput vituli, Nares vituli. * Græcis, *Αντίρρινον*. Italis, *Antirrino*. Germanis, *Drant*; * *Söwenmäuler*; *Hundstöpf*; *Drackenhaupt*. * Hispanis, *Cabeça de ternera*. Gallis, *Mouron violet*.

ANTIRRHINUM.

G E N E R A.

Matth. Quatuor nos observauimus genera, quorum facies ex sequentibus iconibus patebunt.

F O R M A.

Idem. Folijs omnes sunt oblongis, in altero latioribus, in altero verò angustioribus, caulibus ramosis, floribus in quibusdam purpureis, in cæteris verò candidis. Semen profertur minutum nigrumq; receptaculis quibusdam inclusum, quæ vitulorum capita per quàm bellè referunt.

L O C V S.

Matth. Nascitur in aruis, & in collibus. * In Italijs & Gallijs, præsertim prouincialis & Narbonensis inter Oliueta.*

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Ad sanationes inutile est.
sim. me. Ipsum ad similes est cum Bunionis facultatis.



V I R E S.

Diosc. Tradunt perunctos huius semine ex oleo vetustiores fieri, nec vlllo medicamento lædi posse, si quis appensum gesserit. Quin etiam principum gratiam sibi conciliari posse putant hoc tantum amuleto..

ANTIR-

ANTIRRHINUM IL.

* Floribus est conspicuum
ex purpura albicantibus seu
incarnatis vulgo dictis, rictu
luteo, leonini oris æmulo.*



Mmm 5

ANTIR-

medica-
tiam sibi

ANTIR-

*Rarissime cubiti altitudinem assequitur, ceteris partibus quoque minus est multo quam hortensia. flosculos gerit albos pusillos, & semen vituli nares referens sed admodum minutum.

L O C U S.

Crescit in arvis & vinetis.*



ANTIR-

N O M I N A.
ANTIRRHINVM IIII.

923



* F O R M A.

Folia & flores prioribus sunt similia, sed minora omnia. Flosculi non in summitate sed secundum foliorum exortus per intervalla prodeunt, purpurascens, ex quibus fiunt capitula membranacea, vitulinæ, aut simiæ calvaria figura, in quibus semen minutum, ut in reliquis.

L O C V S.

Vbiis hortorum, incultorumque marginibus sponte plurimum innascitur.

A P P E N D I X.

Quibusdam placet esse Archigenis Orontium, quasi Aurantium, quod Aurigenam morbum siue Ictericum leuet.*

A D I A N.

ADIANTVM, Græcis, *Αδαντρον*. Officinis, *Capillus Veneris*. Arabibus, *Borseguasfen*, seu *Bersanfan*, seu *Chulbare albir*. Italis, *Capel venere*. Germanis, *Strawen-Har*. Hispanis, *Culantrillo de poço*. Gallis, *Capil venere*.

FORMA.

ADIANTVM.

DIOSC. Pusilla gerit folia coriandri similia, in summo incisuris diuisa, cauliculi quibus exoriuntur, nigro colore nitet, validi, pretenues, palmū alti, radice superuacua, neq; caulem, neq; florem, neq; semengerit.

LOCVS.

Idem. Umbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

QUALITATES.

Galen. 6. Adiantum in caliditate quissim. me. dem, & frigiditate symmetrū est, verum desiccatur, & extenuatur, & discutit.

VIRE.

DIOSC. Decoctum herba potū prodest difficulter spirantibus, suspiriosis, lienosis, felle suffusis, & urinæ angustijs, calculos frangit, aluum sistit, serpentium moribus auxilio est, cōtra stomachi fluxiones in vino bibitur. Menfes, & secundas ciet, sanguinis reiectiones inhihet. Illinitur recens contra serpentium morsus. Alopecias desat, strumas discutit. Furfures, & manantia capitis vlcera ex lixiuio emendat, cum ladano, & myrthino oleo defluentes capillos continet. Idem præstat eius decoctum ex vino, & lixiuio paratum. coturnices, & gallinaceos pugnatiores facit in cibis eorum additum. Aluum subducit, bilem, & pituitam deiecit, crassaque excrementa, quæ diu in interioribus inhaesere. sanguinem clarificat, animam dilatat, & iecur, & ventriculum purgat præsertim si obstructione laborent. Decoctum eius feminas à partu purgat. Eius cinis agilopas curat. Dilatilibra e pota commodissime aluus subducitur.

Mesue.



TRICHO-

NOMINA.

925.

TRICHOMANES, Græcis, Τριχομανές. Officinis, Polytricum. Italis, Politrice.
Germanis, Streimbrech. Hispanis, Politrice. Gallis, Polytricen.

TRICHOMANES.



FORMA.

Est filici simile, sed exilius, DIOSC.
folijs lenticulæ, tenuibus, in
ordinem vtrinque digestis,
in se aduersis, ramulis tenui-
bus, acerbis, subnigris, pellu-
cidisque.

LOCVS.

Nascitur eisdem in locis Idem.
quibus Adiantum. Et præ- Matth.
fertim in puteis, & antiquis
parietibus.

QUALITATES ET
VIRE.

Eadem quæ Adiantū præ- DIOSC.
stare posse constat.

XANTHI-

XANTHIVM, siue strumaria, Officinis, *Lappaminor*. Græcis, *Ξυδρον*. Italis, *Lappa minore*. Germanis, *Wettlers Leusi*/seu *Spitz Kletten*/ *Ygel Kletten*. Hispanis, *Lappa menor*. Gallis, *Petit Gloutteron*, seu *Grappellas*.

XANTHIVM.

FORMA.

DIOSC. Caule ex cubitali, anguloso, pingui, crebris ex eo prodeuntibus alis. Folia habet atriplicis, insecta, nasturtium odore imitantia, fructum grandis oliuæ modo, & vt platani pilula aculeatum, qui contactu vestibus adhærescit.



LOCVS.

Idem. Nascitur læto solo, & pingui, & lacubus exiccatis.

QUALITATES.

Gale. 8. Fructus discutiendi vim obtinet.
simp. me.

VIREs.

DIOSC. Fructus flauos facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput nitro ante perfrictum illinatur. Alij in vino tundunt, & ita asseruant. Semen aptissimè tumoribus imponitur.



ÆGILOPS.

Italīs,
Hispa-

NOMINA.

927

ÆGILOPS, siue festuca, Græcis, *αἰγίλω*. Arabibus, *Dausfir*, *Dauser*, siue *Dafer*.
Italīs, *Egilopa*, siue *Orzo saluatico*.

ÆGILOPS, SIVE FESTUCA.

FORMA.

Folia habet tritici, sed molliora, in summo capite semina bina, ternave, rubra, quibus arista quasi capillacea ex-
eunt.

LOCVS.

Nascitur in agris inter segetes.

QUALITATES.

Digerendi vim possidet id Gale. 6. quod ex gustu patet. leuiter simp. me. enim est aeris.

VIRES.

Herba cum farina illita. Diosc. gilopis medetur, duritias discutit. succus farinae admixtus siccatur, & eorundem gratia reponitur.

ÆGILOPS



bus im-

ILOPS,

ÆGILOPS altera, Avena sterilis. Italis, Vena Vana. Ananienfibus, Squall.
Gallis, Avoine sterile.

ÆGILOPS ALTERA.



POLY-

Squala.

NOMINA.

929

POLYGALA, Græcis, Πολύγαλον. Italis, Poligala.

POLYGALA.

FORMA.

Palmi altitudinem petit, fo- Diosc.
lijs Lenticulæ, gustu adstricto.

LOCVS.

Prouenit in collibus apri- Matth.
cis, & incultis locis.

VIRES.

Pota lactis abundantiam fa- Diosc.
cit.



POLY-

Nnn

OSYRIS,

OSYRIS, Græcis, *ὄσυρις*. Italis, pariter, & Hispanis, *Linaria*. Germanis, *Harthe*.
 frau. Gallis, *Linatre*.

OSYRIS.

F O R M A.

Diosc. Frutex est niger, ramulos fe-
 rens tenues, lentos, fractuque
 cōtumaces, & in his folia qua-
 terna, quina, senave, ceu lini,
 nigra in initio, deinde colore
 mutato rubescentia.

L O C U S.

Matth. Nascitur ferè ubiq; in cam-
 pis, & agrorum aggeribus.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 8. Amara illi inest qualitas, &
 simp. me. obstructiones expediendi fa-
 cultas, quare & in iocinore,
 consistentes obstructiones ad
 iuvat.

V I R E S.

Diosc. Decoctum eius potum iu-
 vat arquatos.

A P P E N D I X.

Tametsi hoc loco *Linariæ* herbæ vulgo vocatæ imaginem appinximus vul-
 gum secuti, non ob id tamen ipsam legitimam *Osyridem* facimus.

SMILAX



NOMINA.

931

SMILAX aspera, Græcis, *Σμίλαξ τριανταφυλλία*. Italic, *Rouo ceruino*, siue *Hedera spinosa*. Germanis, *Scharpffe Binden*. Gallis, *Tan*, siue *Smilax aspre*.

SMILAX ASPERA.



FORMA.

Folia habet Periclymeni, Diosc. aut hederæ, aculeato dorso, Matth. sarmenta tenuia, multa, rubi, aut paliuri modo aculeata. Arbores scandit ab imo ad summum perreptans, sese conuoluens eis. Fructum habet racemosum, qui maturus rubescit, gustuq; leuiter mordet. Clauiculis plena est, quibus arboribus se circunvoluit.

LOCVS.

Nascitur in palustribus, & Galen. asperis. Ac etiam in Syluis. Matth.

QUALITATES.

Folia gustata aliquid habent Gale. 7. acrimoniæ, & alioqui si illis v. simp. me. taris calefaciunt.

VIRES.

Folia, & acini, ante, & post Diosc. epoti venenorum antidota sunt. Tradunt si infantibus nuper in lucem editis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum venena nocitura. Admiscen- tur quoq; & Alexipharmacis.

Nnn 2 SMILAX

SMILAX laevis, Graecis, *Σμυλαξ λαία*. Italis, *Vilucchio maggiore*. Germanis, *Witteden*, aut *Zaunpflocken*. Hispanis, *Correguela maior*. Gallis, *Liset*, seu *Campanette*.

SMILAX LAEVIS.

FORMA.

Diosc. Folia Hederae similitudinem habent, molliora, leuiora, tenuiora, sarmenta habet asperę smilacis similia, sed nullis spinis horrentia, conuoluitur arboribus, vt prior. fructum parit lupini modo nigrum, exiguum, florib⁹ in cacumine perpetuis, multis, rotundis, folia per autumnum decidua sunt.

LOCVS.

Idem. Nasctur prope arbores quibus conuoluitur.

QUALITATES.

Galen. 7. Facultate quodammodo simp. me. praedicta similis est.

VIRES.

Diosc. Semine cum dorycnio potu ternis singulorum obolis, varia, & tumultuosa in somnis obuerfari traduntur.



CENSURA.

Non ausim ego affirmare an hec planta legitimam smilacem laeuem referat.

LXXV-

LVPVLVS, Italis, Lupulo, Bruscauolo, seu Forancefo. Germ. Hopffen. Gall. Houblon.

LVPVLVS.



G E N E R A.

Duum est generum. Satium, *Matth.*
& sponte proueniens, at facie
inter se non differunt, præter-
quam magnitudine, & exilita-
te. * Distinguitur etiam in ma-
rem & feminam.*

F O R M A.

Mas planta est arbores scan- *Idem.*
dens, & cõtexendis ppgulis aptif-
sima, folijs vitigineis, brionia
modo diuifis, alperis cucume-
ris modo. Sarmenta habet præ-
longa, aspera, hirsuta, & qua-
dantenus aculeata. Folliculos
edit, racemosos & numerosos,
exiles, cõpactili quadam serie
dependentes, in quib⁹ atrum,
& amarum concluditur semen.

L O C V S.

Satium Germanis colitur in *Idem.*
campis, syluestre in sepibus, &
frutetis sponte nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Lupuli flores, folliculi, ac ra- *Idem.*
dices excalfaciunt, siccant, ex-
tenuant, aperiunt, absterunt,
expurgant, sanguinẽ mundant.
Atqui turiones cum plus humi-

ditatis habeant parum quidem tum excalfaciunt, tum siccant.

V I R E S.

Turiones aluum emolliunt in cibum sumpti, vbi prius probè fuerint elixi. *Matth.*
Florum, & folliculorum decoctum datur potandum commodè contra hausta
venena, scabiem, Gallicam luem, ac ceteros quosq; affectus, qui extimam cu-
tim inficiunt. Datur idem contra diutinas febres ab infarctu prouenientes. Se-
men tritum, & potui datum semidrachma pondere interaneorum animalia ne-
cat. menses prouocat, & vrinam pellit. Lupulus flauam bilem detrahit. *Mesue.*

F O R M A .

Fœmina differt à mare,
quod flosculos edat subpalli-
dos penè Cannabis fœmina
flosculis similes, sed maiores,
insipidos aut subdulces, qui
in pollinem subtilissimum lu-
teum tandem abeunt & sine
fructu pereunt, folia quoque
rotundiora nec tam profun-
dis incisuris dissecata, ut mas,
& iuxta radicem potissimum
protus sine incisuris spectan-
tur, paululum saltem per am-
bitum serrata.

L O C V S .

Nascitur in sepibus ut pri-
or Lupulus, cui plerumq; et-
iam sociatur.

N O T A .

Non desunt, qui mare ap-
pellitent Lupulum qui steri-
les habet flores, & fœminam
cui folliculares fructus absq;
flore innascuntur, id quod etiam in Cannabi & alijs herbis faciunt, fœcundas
fœminino sexui, masculino steriles adscribendo.*



R V S C V S .

NOMINA.

935

Rvscvs, Græcis, *Myrsin ægla*, & *ἑρμαίον*. Italis, *Brusca*, & *Pongitopi*. Germanis, *Brusch*, *Meusdorn*. Hispanis, *Ius barba*, & *Gilbarbera*. Gallis, *Brus*.

Rvscvs.

FORMA.

Folium fert myrti, latius, in *Diosc.* formam lanceę mucronatum. Bacca per maturitatem rubescunt, rotundæ à medio folio dependentes, osseo intus nucleo. cubitales rami ab radice exeunt, vitilium modo lenti, fractu contumaces, foliosi; radice graminis simili, acerba, & subamara.

LOCVS.

In asperis, & præcipitiis *Idem*. locis nascitur.

QUALITATES.

Excalfacit radix, siccat, aperit, abstergit, extenuat. *Matth.*

VIRES.

Folia, & bacca in vino pe- *Diosc.* tæ vrinam cient, menses pellunt, vesicę calculos frangunt, stillicidio vrinæ medentur, do-

lores capitis sanant, & regium morbum. Decoctum radice in vino potum eod-
dem præbet effectus. Cauliculi recentes asparagorum vice in cibo sumuntur;
amari autem sunt, sed vrinam mouent.

Nnn 4

LAVRVS



LAVRVS Alexandrina, Græcis, Δάφνη Αλεξανδρεῖα. Arabibus, Gay Alexandria.
Italīs, Lauro Alessandrino. Gallis, Laurier Alexandrin.

LAVRVS ALEXANDRINA.

F O R M A.

Diosc. Folio est Hippoglossi, paulò maiore, molliore, & candi-
diore, semine inter folia ru-
bro, ciceris magnitudine, ra-
mos spargit in terra dodranta-
les, interdum longiores. Ra-
dice Rusco simili, maiore,
molliore, odorata.

L O C V S.

Idem. Inuenitur in montosis.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 6. Temperature euidenter est
simp. me. calidæ, simul & gustantibus a-
cris, & subamara.

V I R E S.

Diosc. Difficiles partus accelerat,
radice pota in vino dulci sex
drachmarum pondere, & stil-
licidio vrinæ auxiliatur, sed
sanguinem extrahit.

* C E N S V R A.

Polygonati potius esse speciem rei herbariæ peritiores existimant.*



DAPHNOI-

DAPHNOIDES, Græcis, *Δαφνοειδής*. Arabibus, *Daphnides*. Italis, *Laureola*. Gal-
lis, *Laureole*. Germanis, *Groß Kellershalß*.

DAPHNOIDES.



FORMA.

Cubiti altitudine fruticat, DIOSC.
ramis flexilibus, obsequiosis-
que multis à medio sursum
versus foliosis, cortex supra
modū viscosus ramos vestit,
folia lauri, graciliora, & mol-
liora, fractu cōtumacia, quo-
rum gustu os, & fauces in-
cendūtur. Flores candidi. Bac-
ca cū ematuruerit nigra. Ra-
dix inutilis.

LOCVS.

Nascitur in montosis. *Idem.*

QUALITATES.

Est viribus & ipsa persimi- *Gal. li. 6.*
lis Lauro Alexandrinæ. *simp. me.*

VIREs.

Pituitam extrahit foliū re- DIOSC.
cens, vel aridum in potu, vo-
mitum, & menses ciet: caput
inanit commanducatum, iter

nutrimenta mouet. Baccæ quindecim potæ aluū resoluunt. Folia recentia *Matth.*
contusa illinuntur vtiliter ischiadicis, quousq; ruborem, aut vesicas excitent.

APPENDIX.

* Appinimus vulgo dictum Daphnoides, cū nō esset ad manus viua plan-
ta, cuius iconem autor exhibet. Profert illud coccum gnidium, quod in Offici-
nis habetur contentum in baccis rubris. Flosculi vere primo emergunt copio-
si, purpurascens, odorem spirantes non ingratus.*

Nnn 5

CHAMÆ-

CHAMÆDAPHNE, Græcis, Χαμαδάφνη. Italis, Laureola minore.

CHAMÆDAPHNE.

FORMA.

DIOSC. Virgas emittit cubitales, singulari ramulo constantes, rectas, tenues, læves, folia lauri similitudine, læviora multo, ac viridiora, semen rotundum, rubens, annexum folijs.

LOCVS.

Matth. Prouenit in montibus, & in syluis.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Viribus & ipsa est Daphnoidis persimilibus.

VIRE.

DIOSC. Trita folia illinuntur capitis doloribus, & stomachi ardores mulcent. Bibuntur cum vino ad sedanda tormina, potus cum vino succus menses, & vrinas ciet. Idem facit pello appositus.



*APPENDIX.

Reperi quidem similem aliquando plantam in montibus Silesiæ altissimis versus Morauiam, sed folijs crassis, duris, & caule satis denso, baccis nigris, quapropter verifimile est potius ad Daphnoidem referendam esse, nec immerito de hac stirpe tanquam incognita nonnulli dubitant.*

ELLEBO.

ELLEBORVM, siue Veratrum album. Græcis, ΕΛΛΕΒΟΡΟΣ λευκός. Arabib. Cher-
bachem, seu Charbechabaid. Italis, Elleboro bianco. Germ. Weiss Nieswurk. Hisp.
Verde gambie blanco, seu Yerna de batesle. Gallis, Veraire, seu Ellebore blanc.

ELLEBORVM ALEVM.



FORMA.

Folia fert plâtaginis aut be DIOSC.
tę sylvestris similia, sed breui-
ra, nigriora, rubescentia, cau-
lem cauum quadrantalem, tu-
nicis conuolutum, quas abdi-
cat cum arescere incipit. Ra-
dicibus nititur multis, tenui-
bus, ab oblongo, & exiguo ca-
pite cepaceo exeuntibus. Flo Matth.
ribus in toto ferè caule spica-
tis fuluo colore.

LOCVS.

Prouenit copiosum in mon DIOSC.
tibus & asperis.

QUALITATES.

Elleborus vterque tum al- Gal. li. 6.
bus, tum niger, extergentis si- simp. me.
mul & excalfacientis est facul-
tatis, quamobrem ad alphas,
imperigines, scabies, leprasq;
accommodi sunt, porro niger
gustu calidior est, albus verò
amarior.

VIRES.

Radix vomitione varios ex DIOSC.
trahit humores. Menses impo-
sitū pellit. Sternutamenta ex-
citât. Mures interficit. Vomi-

tiones concitant subditi ex oleo balani cum aceto. Mortiferū est medicamen- Mesue.
tum, quod sæpe homines strâgulet. Cæterum prisci medici album elleborum Matth.
propinabant comitialibus, melancholicis, vertiginosis, insanientibus, lymphaticis,
côuulsis, podagricis, resolutis, hydropicis, elephantiacisque, sed iam eius
exoleuit vsus, vt in puluere propinetur. Eius autem diluto quamplurimi sine
incommodo vtuntur. Radix in lixiuio decocta pediculos, & lendes necat. De-
coquitur in lacte ad muscas perimendas. Mures quoque necat, & gallinas. Pa-
ratur à radicū succo in Hispania venenum, quo venatores sagittas illinunt,
quibus qui feriuntur, breui tēpore pereunt, nisi cydonia poma vorauerint, aut
eorundem biberint suçcum.

ELLEBO-

ELLEBORVM nigrum, Græcis, *Ελλέβορος μέλας*. Arabibus, *Cherbachem*, seu *Carbech asued*. Italis, *Elleboro nero*. Germanis, *Christwurz*. Hispanis, *verde gambre nero*, seu *Elleboro*. Gallis, *Viraire*, & *Elleboire noire*.

ELLEBORVM NIGRVM.

FORMA.

Diosc. Folia ei viridia, platani similia, minora tamen, subaspera, nigriora, plurib. diuisuris incisa, caulis asper, flores in purpurea albicantes, racematim coherentes, semen cnici. Radicibus coheret nigris, tenuibus à capitulo cepaceo cōfibratis.

LOCVS.

Idem. In collibus asperis, & siccis locis nascitur.

QUALITATES.

Gal. li. 6. Extergentis simul & excalescentis est facultatis, est enim ex tertio ordine excalescentium, & desiccantium, gustuque albo calidior habetur.

VIRE.

Diosc. Ventrem purgat, bilem detrahit, pituitamque: prodest morbis comitialibus, melancholicis, infanientibus, articularijs doloribus, & resolutis. Menses inditum trahit, partus necat, fistulas purgat impositum, & tertia die detractum. Demittitur in aurem contra grauitatem auditus, & vsq; in alterum, aut tertium diem finitur. Scabiem illitum sanat, vitiligines, lepras, imperigines, ex aceto medetur. Dentium dolores collutione mitigat. Imponitur vtiliter hydropicorum ventribus farina hordeacea & vino exceptum.

ELLEBO-



N O M I N A.

941

ELLEBORVM alterum, Nobis Elleborum fœmina, seu pseudoelleborum.

ELLEBORVM NIGRVM ALTERVM.

F O R M A.



Folia gerit digitis nouē ad *Matth.*
pediculum vſque diſſecta, aco-
niti *Cynoctoni* ferè modo, ſed
longiorib. diuiſuris, nigrican-
tia, digitis circumquaſ; ferra-
tis. Caulem edit vegetū, ſuba-
ſperumque. Flores alterius ſi-
miles, ſed herbaceo colore,
aut quadatenus ſubpalleſcen-
tes, quinque, aut pluribus e-
mergentibus è medio corni-
culis acuminatis, vtrinſ; com-
preſſis, in quibus ſemen con-
tinetur. Radicib. cohæret nu-
merofis, tenuib⁹, palmari lon-
gitudine, ac per omnia alteri-
us ſimilibus, odore graui, nau-
ſeam commouente, ſapore a-
maro.

C E N S V R A.

Sunt qui putent hanc plan-
tam *Plinij* eſſe *Conſiliginem*,
cuius ſententiæ eſt clariffimus,
ac doctiffimus *Fraccaſtorius*,
quæ etiam eiufdem *Plinij* *Enneaphyllon* eandem facit. Verùm nos nec hæc, nec
illam eſſe putamus, quòd nullus ſit autor qui ne vna tantum nota conſiliginis
faciem & hiftoriam deſcribat, quodq; *Plinius* nuſquam meminerit *Enneaphyl-
lon* conſiliginem Latinis vocari, eamq; vrentis facit facultatis, & lumborum,
coxendicumq; doloribus vtilem: conſiliginem verò ad Pulmonis tantum mor-
bos valere ſcribit.

P S E V D O-

PSEUDOELLEBORVM, Græcis, Ψευδοελλέβορος. Italis, Elleborofalso.

PSEUDOELLEBORVM.

FORMA.

Matth.

Afforgit hæc planta ad duū palmorum altitudinem. Cauliculus emittit tenues, ac molles, folia longiuscula tenuia, Abrotani quadantenus æmula. Flores Buphthalmi, paulo tamē maiores, è quibus capitula prodeunt oblōga, ruborum moris similia. Radicibus cohaeret nigris, nigrum veratrum æmulantibus, tenuioribus tamen, & nigrioribus.

LOCVS.

Idem.

Plurimū prouenit in Boemia, in Pragenſi præſertim agro.

QUALITATES,
ET VIRES.

Huiusce plantæ radicibus tum Medici, tum pharmacopœi, qui Boemiam incolunt, vtuntur paſſim pro legitimo nigro veratro, *non ſine errore, *ac priuatim ad ſuorum pecorum morbos.



OPHRIS,

OPHRIS, Italis, *Elleboro bianco falso*. Germanis, *Zweiblatt*.

O P H R I S.

F O R M A.



Duo tantum hæc folia pro- *Matth.*
fert, albi veratri quadantenus
similia, inter quæ caulis erum-
pit tenuis, calyculis oblongis,
parvisque refertus, balauftio-
rum effigie, è quibus flosculi
exeunt candidi parvarum lin-
guarum faciem referētes. Ra-
dice nititur gracili, compluri-
bus tamen adnatis, alba, & o-
dore præstanti.

L O C V S.

Nascitur in montibus, & in *Idem.*
conuallibus.

Q U A L I T A T E S.

Manfa radix glutinosum len *Idem.*
torem reddit, subdulci sapo-
re, Quare calida fuerit, & hu-
mida.

V I R E S.

Præfertur vniuerfa planta ad denigrandos capillos, fracturas sanandas, &
vulnera glutinanda.

SESAMOI-

SESAMOIDES paruum, Σησαμοειδὲς μικρὸν, Græcis dicitur.

SESAMOIDES PARVUM.

FORMA.

DIOSC. Cauliculos edit dodranta-
les, folia coronopi minora, hir-
sutiora, & in cauliculorum ca-
cumine capitula florum penè
purpureorum, medio eorum
albo, semen sesamæ, fulvum,
amarum. Radix tenuis.

LOCVS.

Idem. Nascitur in asperis.

QUALITATES,
ET VIRES.

Idem. Semen bitem, piritamque
detrahit ex aqua mulsâ potum
dimidio acetabulo, illitum ex
aqua tumores, ac tubercula
discutit.



*SESAMO-

*SESAMOIDES paruum flore magis completo.



Ad intybacea potius ego
referrem hanc plantam, cum
radix lacte non pauco turgat
& multis quoq; doctis & her-
bariæ rei peritissimis hæc sen-
tentia ardeat. Flores Cicho-
rio figura respondent & alij
simplici foliorum textura cō-
stant, alij densius stipantur,
colore eleganti ceruleo, sta-
mina in medio lutea habentes,
e quibus relinquitur se-
men subnigrum angulosum
pulillum, squammatis capi-
tulis inclusum, quod an pur-
gandi vim obtineat, nemi-
nem experiendo cognouisse
arbitror, Vnum hoc scio in
parua quantitate exhibitum
nihil efficere, sapore est o-
mnino dulci nihil vel mini-
mum amaritudinis obtinen-
te.*

Ooo

Cvccv-

CUCUMIS sylvestris, Græcis, *ἑκινός*. Officinis, *Cucumer aspinus*. Arabibus, *Chefe allimar*, *Kate allhenei*, seu *cheta alhamar*. Italis, *Cocomero saluatico*. Germanis, *Wilder Cucumer* seu *Esels Cucumer*. Hispanis, *Cogombrillos amargos*. Gallis, *Cogombre sauvage*.

CUCUMIS SYLVESTRIS.

F O R M A.

Matth.

Folia illi sunt satiuo cucumeri similia, sed rudiora, hirsutiora, asperioraq; , auersa parte subalbicantia. Flores ex alarum cavitatibus, quæ in sarmentis habentur, prodeunt aut rei, stellarum figura, retro extuberante fructu, satiuo cucumeris modo, qui tandem auctus, & oblongus factus, glandis magnitudinem superat, aut dactylos æquat. Is hispidus adeo est, ut quasi aculeatus sentiatur, qui maturus factus candicat, & sponte, aut leuiter impulsus non sine impetu, a pediculo disjungitur, & tormenti instar, nigrum, maturumq; semen vnâ cum succo in legētium manus ei aculatur. Radicem habet doctâtalem, ac etiam longiorem, brachiali crassitudine, candidam, succosam, & insigniter amarâ, quemadmodum planta est tota, & fructus.

L O C V S.

Diosc. Nascitur in sabuletis, & rudieribus.

Matth. Incultis & yginosis locis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. 3.

simp. me.

Vniuersa planta in vsu est. Succus summè quidem amarus est, leuiterq; calidus, ut ex secundo sit ordine exaltantium. Digerendi etiam vim possidet & subtilium est partium. Radix similem succo facultatem obtinet. abstergit namq; digerit, & emollit. Porro cortex ea potentius desiccatur.

V I R E S.

Diosc. Instillatus foliorum sacculus aurium dolori cōuenit. Illita ex polenta radix veterem omnem tumorem discutit. Imposita cum Resina terebinthina, tubercula rumpit, Ischiadicis infunditur. Arida farina impetigines, lepras & vitiligines abstergit, nigris cicatricibus colorem reddit, & maculas in facie delet. Radicis succus selquioboli pondere, & ite cortex acetabuli quarta parte bilem, pituitamq; deijciunt, præsertim in hydropicis. Deiectiones autem ciera stomachi iniuriâ mouet. Elaterium verò e fructuum sucto paratum menses ciet, partus enecat in pello subditum, naribus cum lacte infusum morbo regio medetur, & diuturno capitis dolore liberat. Efficacissimè anginis illinitur, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

STAPHIS



NOMINA.

947

STAPHISAGRIA, seu herba pedicularis, Græcis, *Staphis agria*. Arabibus, *Alberas*,
Muiba Zagi, sine *Muibe Zegi*. Italis, & Officinis, *Stafusaria*. German. *Bisimma*,
 Hispanis, *Fabaraz*, & *Paparra*. Gallis, *Herbe aux poux*.

STAPHISAGRIA.

FORMA.



Folia habet Labruscæ diui. Diosc.
 fa, & cauliculos rectos, mol-
 les, nigrosq; Florem fert Gla-
 sti, & folliculos virides, simi-
 les ciceri, & in his nucleum
 triangulum, scabrum ex ni-
 gro subfuluescentem, intus
 album, gustu acrem.

LOCVS.

Nascitur in opacis. Copio. Plinius.
 sissima autem provenit in Matth.
 Dalmatia, Istria, Apulia, &
 Calabria.

QUALITATES.

Vehementer acrem obti. Galen. 7.
 ner facultatem, sed & vrendi smp. me.
 vimaliquam habet.

VIRES.

Pota quindecim seminis Diosc.
 grana trita ex mellicrato cras-
 sum humorem per vomitum
 purgant, atqui sumentes ambulare debent, & aquam mulsam continuo pota-
 re, quoniam pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex o-
 leo illita phthiriasi prodest: item prurigini, & pforis. cit commanducata pluri-
 mam pituitam. coquitur in aceto, eoq; in dolore dentium os vtiliter colluitur.
 reumatismum gingivarum sistit. vlcera oris manantia cum melle sanat.

000 2

THAPSIA,

THAPSIA, Græcis, Θάψια Italis, Thapsia. Mauritanis, Hiantum, siue Drix. Gal-
lis, Turbit blanc.

THAPSIA.

FORMA.

Diosc. Totanatura ferulæ similis
est, graciliore caule, folijs fœ-
niculi umbella anethi in ca-
cumine à singulis furculis e-
rumpente, flore luteo, semen
quale ferulæ latiusculum, sed
aliquanto minus. Radix foris
nigra, intus candida, magna,
acris, crassiore libro vestita.

LOCVS.

Matth. Nascitur plurima in Apu-
lia Gargano monte.

QUALITATES.

Galen. 6. simp. me. Acrem habet, & vehemen-
ter excafacientem faculta-
tem cum humiditate. Quam-
obrem ex alto vehemèter ex-
trahit, & quod extraxit dige-
rit, vis eius post annum mul-
tum resoluitur.

VIRE.

Diosc. Tam cortex radices, quam succus purgandi vim habet, & lacteus succus in
aqua multa potus, nam vtrinque bilem extrahunt. Radices quaterni oboli cum
tribus seminibus anethi drachmis, succi terni oboli, lactis obolus vnus propinan-
tur. Quod eo amplius assumitur periculosum est. Conuenit hæc purgatio suspi-
rios, & diuturnis laterum doloribus, reiectionibusq; succus illitione, aut ra-
dix recens affricu alopecias expleat Radix, & succus cum thuris, & ceræ æquis
portionibus sugillata, liuoresq; tollunt. Vitia cutis in facie emendant. Cum
melle illitus succus lepras tollit, & tubercula discutit, cum sulphure perunctus.

SPARTI-



NOMINA.

949

SPARTIVM, Græcis, Σπάργιον. Italis, Sparro. Germanis, Psrimmen. Hispanis Sparrio. Gallis, Genest de Espagne.

SPARTIVM.

FORMA.

Frutex est longas ferens vir Diosc.
gas, sine folijs, firmas, fractu
cōtumaces, quibus vites vin-
ciuntur. Semen Lenticulæ in
foliulis phasiolorum modo
nascens. Florem, vt albæ vio-
læ luteum.

LOCVS.

Plurimum prouenit in Hi- Matth.
spania, aridis, & siccis locis.

QUALITATES.

Semen, & virgarum succus Galen. 3.
non instrenuè trahentis est simp. me.
facultatis.

VIRES.

Purgant per superna vehe- Diosc.
menter elleborivice citra pe-
riculum flores, & semina qui-
nis obolis in aqua mulsa po-
ta. Semen deiectionem mo-
ta.

met. Ramis in aqua maceratis, mox tuis extractus succus, ischiadicis auxiliatur,
si cyathi medium ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerant, & infundunt
Ischiadicis clystere: strigmenta autem elicit cruenta.

Ooo 3

GENISTA,



GENISTA, Italis, *Ginestra*, Hispanis, *Genestra*, *Giesta*, *sive Giestrina*. Germanis, *Ginst*, Gallis, *Geneffe*.

GENISTA.

FORMA.

Mesue. Arbor est montana, è cuius caudice complurimæ oriuntur virgæ, rectæ, flexiles, fractu contumaces, acuminatæ, quibus vites & fasciculi ligantur. Flores edit flauos lunari figura, è quibus siliquæ prodeunt oblongæ viciæ modo, in quibus semen illi quoq; simile.

LOCVS.


Matth. Oritur in montibus, & collibus.

QUALITATES.

Mesue. Planta tota perturbat, prouocat, incidit, attenuat, cordiq; & ventriculo nocet.

VIRES.

Idem. Epotum semen pituitam
Matth. vtrinque valentissimè purgat, & ab articulis quoq; humores trahit. Renum excrementa pellit, vrinam ciet efficacissimè, & calculos dirumpit tam in renibus, quàm in vesica, prohibetq; ne in posterum renascantur calculi. Flores contriti strumas auferunt, si cum melle rosaceo aut forbili ouo sumantur. Fit ex ijs oximel, cuius vsu indurati lienēs resoluuntur. Profunt ischiadicis, podagricis, calculosisq; si postquam sumpserint euomant.



NARCIS-

NOMINA.

957

NARCISSVS, Græcis, Νάρκισσος. Arabibus, Narces, seu Nargies. Italis, Narciso. Germanis, Hornungsblumen / Narcissen Rößlin. Gallis, Narcisse, Campanette, seu Launette.

NARCISSVS.

GENERA.

Complura narcissi visuntur atthM. genera, vt ex appictis hic iconibus seriatim palam fiet.

FORMA PRIMI.

Folia profert porro similia, Diosc. sed multo minora, & angustiora, caulis vacuus, & sine folijs supra dodrantem attollitur, flos albus, intus croceus, in quibusdam purpureus, radix intus alba, rotunda, bulbosa, semen velut in tunica nigra longum. Flores suauis sunt odore.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & Diosc. seritur in hortis. Matth.

QUALITATES.

Radix vsq; adeo exsiccandi Galen. 3. facultate pollet, vt & maxima simp. me. vulnera conglutinet, vel ad


incisiones vsq; quæ circa tendones accidunt. Habet verò quiddam absterforium, & attractorium.

VIRES.

Radix cocta, siue estur, siue bibitur vomitoria est, ambustis igni prodest cum Diosc. exiguo melle trita, præcisos nervos illitu glutinat, vitia cutis in facie, vitiliginosq; cum semine vrticæ, & aceto emaculat, cum eruo, & melle vlcera fordes expurgat, abscessus concoctioni repugnantes rumpit, infixæ corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.

Ooo 4

NAR-



NARCISSVS II. * Narcissus flore pleno, Græcis, Νάρκισσος πολιάκθος. Germanis, Gefüllter Narzissen Rößlin. Arabibus, Modaph.

NARCISSVS II.

F O R M A.

Non differt hic à priore,
neque facie, neque viribus,
sed tantum floribus, quos
admodum speciosos promit,
candidos quoq; sed quorum
medium habent foliola.*



NARCIS-

NOMINA.

933

NARCISSVS III. *Narcissus totus luteus. Hispanis, *Campanilla*. Gallis, *Coquelurde*. Germanis, *Gelb Josephstabi*/Hornungsblumen.

NARCISSVS III.

FORMA.

Flores promit luteos speciosos, nolæ effigie, folijs luteis, sed pallidioribus circumdatos, qui interdû duplices vel triplices etiam spectantur, quibus decidentibus relinquitur capitulum semina intus nigra asseruans, quæ principio latiuscula, tēporis progressu rotundiora fiunt. Folijs & radice à priore parum discrepat.

LOCVS.

Scatent hoc flore nemorosa prata. Inuenitur etiam in montibus prorsus luteus ferius florens.*



Ooo 5

NARCIS-

NARCISSVS IIII. *Græcis, λειριονάρκισος & πολύανθος. Italis, Hyacintho del padre nostro.

NARCISSVS IIII.

FORMA.

Flores speciosos plures, lactei candoris, folijs lenis constantes, Ornithogali floribus ferè similes, sed maiores proferunt, insidentes pediculis suis longis, in quos diuiditur summitas caulis, qui emergit inter folia oblòga Narcissi. Radix est Ornithogali pluribus bulbulis adnatis se propagās.

LOCVS.

Rarus est, ideoq; horti cultiores hūc sibi vendicarunt.*



NARCIS-

NOMINA.

955

NARCISSVS V. *Lilionarcissus, Turcis, Tulipan, Caffe Lale, Zampul.

NARCISSVS V.

FORMA.



E bulbo Colchici æmulo folia nascuntur Liliacea, aliquantum cōcava carinatæ, oris sinuatis, ex horum medio caulis assurgit assumitq; folia, quib. vestiatur, plerumque terna. Eius summitas ornatur flore venustissimo, lilij effigie, colorū varietate mire discrepante. Nam vel purpureus, vel coccineus, vel violaceus, vel aureus, vel flauus, ceusq; vel prorsus candidus habetur. Sunt qui cæruleum se vidisse affirmant. Quin & varij colores in vnico flore spectantur, quorum diuersitates omnes describere non est huius loci, præsertim cum indies augeat ista varietas. Subnascitur semen foliaceum aurei coloris, vt Lilij rufi, clatrum oblongo membraneoq; folliculo.

Locvs.

Habetur in hortis.*

NARCIS.

NARCISSVS VI. *Leuconarcissiflorum bifolium. Germanis, Schneeröffen.

F O R M A.

Palmari cauliculo Vere pro-
dit inter folia gemina, flore
exili lacteolo, tribus tantū fo-
lijs constante, aut senis si tria
exigua illa herbacea medium
flores obtinentia simul nume-
rentur. Bulbosa nititur vt re-
liqui Narcissi, sed parua radi-
ce.

L O C V S.

Nascitur in pratis & salti-
bus vmbrosis.*

NARCISSVS VI.



NARCIS-

NOMINA.

957

NARCISVS VII. *Leuconarcissolirion vulgare, Viola alba Theophrasti aut eiusdem Opition. Germanis, Weiß-Hornungsblum/Merzenblumen.

NARCISVS VII.

FORMA.

Floribus præcedēti cognata est, vt & reliquis partibus, sed per omnia maior & vegetior.

Locvs.

Nascitur sponte in nemoribus Germaniæ copiosè, nec non alibi, vt in Salena monte & agro Aurelianensi.*



NARCIS-

NARCISSVS VIII. *Lilionarcissus Bononiensis. Tulipā minor. Græcis, *λινάριον* & *πολλύλον*.

F O R M A.

Inconditam quandam effigiem hoc loco exhibuerat autor sine descriptione, quæ tamen videbatur esse Tuliparū Bononiensium (vt appellatur hoc nostro tempore) Diuaricantur enim harum nonnunquam caules, fiuntq; triplices & sæpe quadruplices, sustinentes in summo flores stellatos, luteos, odoratos, qui tandē abeunt in triquetra capitula continentia semen latum, rufum, vt Liliū. Bulbus nucleum oblongū allij æquat, sed membrana lutea nitidaq; tegitur.

L O C V S.

Apud nos in hortis iauentur, & sponte nascitur in montibus circa Bononiam, *

NARCISCVS VIII.



R I C I N V S.

NOMINA.

939

RICINVS, Græcis, *Κικινηδάριον*. Italis, *Mirafsole*, & *Girasole*. Arabibus, *Cherua*. Germanis, *Wunderbaum* / *Türckischer Hanff*. Hispanis, *Figueira dell' inferno*. Gallis, *Palma Christi*.

RICINVS.



FORMA.

Prouenit parua fîcus alti- **Diosc.** tudine, folio platani, maiore, leuiore, & nigriore, ramis, caudicibusq; cauis in arundinis morê, semine in uuis asperis, quod corticib. exutû, ricinum animal representat.

LOCVS.

Seritur in hortis, & in viri- **Matth.** darijs. In Ægypto sponte nascitur.

QUALITATES.

Semen quemadmodû ex- **Gal. li. 7.** purgat, detergit, & digerit, **simp. me.** sic quoque folium, sed vnde- quaq; debilius. Oleum quod ex semine conficitur, tum calidius, tum tenuiorû partiû est, quàm oleum commune, ac proinde etiam discutit.

VIREs.

Grana triginta numero **Diosc.** purgata, trita, potaq; pituitas, bilem, aquamq; per aluû extrahunt, vomitionesq; mouent, sed iniucunda admodû est, & molesta purgatio, sto-

machum vehementer subuertens. Tusa & imposita vitia cutis in facie, varosq; expurgat. Folia cum hordeacea farina trita inflammationes oculorum, tumoresque leniunt. Turgentes mammas cohibent. Eadem ex aceto illita ignes sacros restinguunt. Confert semen coli, & articulorum doloribus si ex veteris **Mesue.** galli iure hauriatur. Oleum quod ex semine elicitor infunditur commodè ad colicos cruciatus, inunctum autem tum scabiem, tum capitis vlcera sanat. Medetur sedis inflammationibus, & conuersis, ac præclusis fœminarum locis. Inungitur vtiliter indecoris cicatricibus, & aurium doloribus.

APPENDIX.

Suspicio in Dioscoridis exemplari subesse mendam. Grana enim triginta seminis non sine periculo vitæ dari possunt. Quo sit ut cum Oribasio legam tria grana, non triginta.

TIHY.

TITHYMALVS, Græcis, Τιβύμαλ &. Arabibus, *Xauser*, seu *Ethula*. Italis, *Titimalo*, & *Tortumaglio*. Germanis, *Wolffsmilch*. Hispanis, *Lecce treña*, seu *Lecce tre-gua*. Gallis, *Tithymale de montaigne*.

DIOSC.

GENERA.

Septē tithymalorū habent genera, nēpe Characias, Myrrites, seu Myrsinites, Paralip, Helioscopius, Cyparissias, Dendroides, & Platiphylos.

FORMA CHARACIÆ.

Idem.

Caulēs supra cubiti altitudinē attollunt, rubri, lacteo succo, atq; acri madētes, folijs oleæ circū ramos, angustiorib. & lōgioribus, radice crassa lignosa. Pendet in caulium cacuminib⁹ coma iunci, sub qua caueolæ foliolis balnearum similes, in quib. semen continetur.

LOCVS.

DIOSC. Nascit⁹ in asperis, & mōtib⁹.

QUALITATES.

Gal. li. 8. Vincentem habent oēs asimp. me. crē, calidamq; facultatē, inest verò & amaritas. Validissimus itaq; est eorū liquor. Secundū locū tenēt, semē & folia. Radix verò dictarū facultatū particeps est, sed non ex æquo adurunt, & exulcerant quamuis corporis partem.

TITHYMALVS CHARACIAS.



VIREs.

DIOSC. Succus aluum purgat, trahit pituitā, bilem q; binis obolis in posca sumptus, & cum aqua nullā vomitiones mouet. Recens lac perunctum in sole capillos ex oleo euellit, renascentesq; flauos & exiles efficit, denique omnes perimit. Dentium cauernis inclusum leuat dolores. Tollit illitu impetigines, fornicantes verucas, & thymos. Valet aduersus pterygia, carbunculos, vlcera, phagedænas, gangrenas, fistulasq; Semen, & folia lactei succi effectum præbēt dimidio acetabulo pota. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota, per inferna trahit, Acetum in quo decocta fuerit, collutione dentiū dolores mulcet. Omnia genera cordi, iocinori, & vētriculo maximē nocēt, vala disrumpunt, intestina abradunt, vniuersum excalfaciunt corpus, adeò vt inde febres facili concitentur.

TITHY-

TITHYMALVS Myrsinites, Græcis, Τιθύμαλος μυρσινίτης, ἢ Μυρσινίτης. Italis, Tithymalo Myrsinite.

TITHYMALVS MYRSINITES.



FORMA.

Folijs crescit myrti proxi- DIOSC.
mis, sed maioribus, firmis, in
cacumine acutis, & pungenti-
bus. Ramulos ab radice mit-
tit dodrantes. Fructum fert
alternis annis, nuci similem,
mordacigustu.

LOCVS.

Nascitur in asperis.

Idem.

QUALITATES, ET
VIRE.

Succus, radix, semen, folia Idem.
consimilem antedicto sortiu-
tur facultatem, sed ad citan-
das vomitiones validior, atq;
efficacior est.

Ppp

TITHY-

TITHYMALVS Paralios, Græcis, Τιθύμαλος παραλίος. Italis, Titimalo marino.

TITHYMALVS PARALIOS.

FORMA.

DIOSC. Ramis nascitur subrubentibus, dodrantalibus, rectis, quinis, senisve à radice exeuntibus, folijs lini, angustis, parvis, oblongis, in versus quosdam digestis, capite in cacumine orbiculato, densò, in quo semen, vt eruum vario colore emicat. Flos albus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget.

LOCVS.

Idem. Prouenit in maritimis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Idem. Similes ad vsus reconditur.



TITHY-

N O M I N A.

963

TITHYMALVS Helioscopius, Græcis, Τίθυμαλος ἡλιοσκόπιος. Italis, *Titimalo*
Helioscopio. Germanis, Sonnenwende Wollfsmilch.

TITHYMALVS HELIOSCOPIVS.

FORMA.



Folij3 prouenit Portulacæ *Diosc.*
tenuioribus, rotundioribus
que, ramulis prodeuntibus
à radice quaternis, aut qui-
nis, rubentibus, dodrantali-
bus, tenuibusq; lactis copio-
si plenis, capite anethi, semi-
ne in capitibus incluso.

LOCVS.

Circa oppida nascitur, po. *Idem.*
tissimum in ruderibus.

QUALITATES, ET
VIREs.

Ezdem illi quæ superiori. *Idem.*
bus sunt vires, non tamen vl-
que adeo validæ.

Ppp 2

TITHY-

TITHYMALVS cyparissias, Græcis, Τιβύμαλος κυπαρίσσιος. Italis, Esulaminore.
Germanis, Cypresse Wolfssmilch.

TITHYMALVS CYPARISSIAS.

F O R M A.

Diosc. In caulem exit dodrantalem, vel maiorem, subrubrum, ex quo folia pini similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora, in totum nascentem pinum emulatur, candido succo madet.

L O C V S.

Matth. Nascitur ferè vbique circa oppida, & secus vias.

Q U A L I T A T E S, E T
V I R E S.

Idem. Eadem illi vis quæ superioribus.

A N N O T A T I O.

Mihi profectò mirum videtur, quòd Dioscorides hoc tithymali genus κυπαρίσσιαν appellauerit, cum pinum nò cyparissum, referat.



TITHY-

NOMINA.

965

TITHYMALVS Dendroides, Græcis, Τιβύμαλος Δενδροειδής. Italis, Timalo arboreo.

TITHYMALVS DENDROIDES.



FORMA.

Ampliter opacat, in cacu-
dosc. cumine frondosam spargens
comam, succo lacteo præ-
gnantem, cauliculis rubenti-
bus, folijs myrti tenuioribus,
fructu Characiæ.

LOCVS.

Nascitur in petris.

QUALITATES, ET
VIRE.

Eiusdem est effectus, cuius Idem.
superiores.

Ppp 3

TITHY-

TITHYMALVS Leptophyllos, Græcis, τιθύμαλος λεπτόφυλλος. Germanis, Die kleinste Wolffsimlich.

TITHYMALVS. LEPTOPHYLLOS.

FORMA.

Matth. Patet eius facies ex hîc appicta figura.

LOCVS.

Idem. Nascitur incultis locis, & asperis.

QUALITATES, ET VIRES.

Idem. Facultatibus ijsdem pollet, quibus & reliqua genera.



PITYVSA.

PITYUSA, Græcis, Πιτύουσα. Arabibus, Scebram, & Pthias. Officinis, Esula maior. Italis, Esola maggiore. Gallis, Turbit noir.

PITYUSA.



FORMA.

Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus, folijs pini, acutis, exilibus, flore paruo, velut purpureo, semine instar lenticulae lato. Radice crassa, candida, succo referta. Quibusdam in locis prægrandis reperitur.

LOCVS.

Nascitur in montibus, ac Matib. etiam in campestribus.

QUALITATES.

Purgat similiter, vt Tichy. Gale. 3. mali, cæterisque viribus illis simp. me. est adfimilis.

VIREs.

Detrahit per aluum radix Diosc. drachmis duabus data in aqua mulla. Item seminis drachma: succi cum farina subacti cochlearium in catapotio datur; modus foliorum drachmæ tres. Multa verò lumentibus affert incommoda.

Mesue.

PPP 4

LATHY-

LATHYRIS, Græcis, *Λαβύς*. Arabibus, *Mendana*, seu *Mahendane*. Italis, *Cataputia minore*. Officinis, *Cherua minore*. Germanis, *Springkraut* / *Körner* / seu *Treibkörner*. Hispanis, *Tartago*. Gallis, *Esfurge*.

LATHYRIS.

F O R M A.

DIOSC.

Caulem emittit, cubitali altitudine, digitali crassitudine inanem. Gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga amygdalinis proxima, latiora, & lauiora, quæ autem in summis ramulis exierunt minora cōspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructu in summis furculis gerit, triplici loculamento insignē, rotundum, ceu capparin, in quo grana intercurrentibus membranis inter se distincta continentur, eruis maiora, rotunda, quæ dum corticibus exuuntur candida sunt & gustu dulcia. Radix illi tenuis, & nullius vsus. Totus frutex lacteo succo turgit, vti Tithymalus.

L O C V S.

Matth.

Nascitur passim in hortis, & secus itinera exoluto solo.

Q U A L I T A T E S.

Galen. 7.

Sunt qui dicant hanc esse

sim. me.

Tithymali speciem, tum quod similem illis succum habeat, tum quod eodem illis modo purget totaq; illis facultate similis sit, nisi quod semen gustantibus videatur dulce, quod sanè etiam maximè purgatoriam vim obtinet.

V I R E S.

DIOSC.

Grana sex, aut septem in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, aluum purgant, sed aqua frigida postea sorbenda. Trahunt autem bilem, pituitas, & aquas. succus Tithymali modo potus, eosdem effectus præbet. Decem duodecimve feminis grana à putaminibus delibrata, vomitum potenter citant. Itaq; ijs vtiliter propinantur qui philtia deuorant, aut alia veneficia.

PEPLVS.



NOMINA.

969

PEPLVS, Græcis, Πέπλος. Italis, *Pepla*. Germanis, *Hundsmitz*.

PEPLVS.

FORMA.

Frutex est lactei succi ple-
dioso.
nus, folijs paruis, vt rutæ, pau-
lò rarioribus, rotunda coma
ferè dodrantali, humi resper-
sa, semine sub folijs paruo, ro-
tundo, minore quàm candidi
papaueris. Vnicam habet ra-
dicem, ipsamque superua-
cuam.

LOCVS.

Nascitur inter vites, & in *Idem*.
hortis.

QUALITATES.

Succum habet similem Ti-
galen. 8.
thymalis, cum in alijs, tum *sim. me.*
quia purgat eum illi.

VIRES.

Semen acetabuli mensura Diosc.
ex hydromelitis cyatho po-
tum, bilem, ac pituitam pur-
gat.

Ppp s PEPLIS.



PEPLIS, Græcis, Πέπλος. Italis, *Peplo*.

PEPLIS.

F O R M A.

Diosc. Frutice est latè opaco, succi candidi pleno, folijs satiuæ portulacæ, rotundis, infernè rubentibus, semine sub folijs rotundo, vti in *Peplo*, feruenti gustu, radice singulari, tenui, superuacua.

L O C U S.

Idem. In maritimis maximè nascitur.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 3. Succum obtinet, velut *Thymali* validum, non tamen admodum vtilem.

V I R E S.

Diosc. Vires habet *Peplo* similes.



SCAMMO-

SCAMMONTIA, Græcis, Σκαμμονία. Mauritanis, *Scammonea*. Italis, *Scammonia*.

SCAMMONTIA.



FORMA.

Ramos ab radice mittit *Diosc.* trium cubitorum, multos, pingues, & nonnihil crassitudinis præferentes, folijs helixine, seu hederaceis, mollioribus tamen, & triangulis, flore candido, rotundo in calathi modum cauo, graueolente. Radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo prægnante.

LOCVS.

Nascitur in Mysia Asia *Idem.* regione, quin etiam in Syria & Iudæa.

QUALITATES.

Exuperat in ea acredo, *Mesue.* quare corporis spiritus accendit, flatus mordaces gignit, immoderatas alui fluxiones facit, intestina abradit, tormina, & dysenteriam excitat.

VIRE S.

Succus per inferna bilem & pituitam extrahit. Illinitur vtiliter Ischyadicis *Diosc.* Radix in aceto decocta, & cum hordeacea farina trita. Succus cum melle, aut oleo illitus tubercula discutit. Decocto in aceto perunctæ lepræ abiguntur. Diuturni capitis dolores ex aceto perfunduntur.

*SCAMMO-

*SCAMMONIA Monspeliensium, vel marina, Periploca repens.

SCAMMONIA MONSPELIENSIVM.

F O R M A.


Folij & floribus Apocyno similis est, superficie duorum cubitorum & fortasse multo altior alicubi, radice cubitali, crassitudine minimi digiti, intus subflava, foris fusca, subrufa modice, friabili, inter mandendum crepitante parum, & si diutius ori teneatur acris est cum aliqua dulcedine. Nervus intus est flauus, qui fractus minimis foraminibus plenus est, caules siue rami cœcaui, qui primo ortu sunt erecti, postea repunt vt in volubili.

Q U A L I T A T E S.

Calida est vltra tertium gradum.

V I R E S.

Quidam vtuntur huius herbe succo, vbi Scammonio destituuntur, & Massilienses ferunt eodem & colophonia Scammonium adulterare tam exacte vt vix cognosci queat.*



CHAMÆ-

NOMINA.

973

CHAMELEA, Græcis, *Χαμελέα*. Mauritanis, *Mezereon*, seu *Almezerion*. Italis, *Chamelea*. Germanis, *Zylandr*. Gallis, *Boys gentil*.

CHAMELEA.

FORMA.

Surculosa fruticat, ramis dodranta- DIOSC.
libus, folia oleę similitudinem habent,
tenuiora, & amara, quę gustata lin-
guam mordent, & arteriam deradunt.

LOCVS.

Nascitur in montibus.

Matth.

QUALITATES.

Vincetem habet qualitatem ama- Galen. 8.
ram, quamobrem admodum fordida *sim. me.*
vlcera, & quę maximas habent crustas
cum melle purgare potest.

VIRE.

Pituitam, bilemque detrahit, folijs DIOSC.
in catapotio deuoratis. Folia cum mel-
le trita fordida vlcera, & crustosa re-
purgant. Cauendum ab eius vsu, nisi *Matth.*
ea admista fuerint, quę eius delete-
riam facultatem superare possunt, de
quibus scripsit Melue.

*CENSURA.

An sit Arabum Mezereon non parum adhuc dubitatur, cum Mesues hoc
dicat esse ex herbis lactarijs. *

THYME-



THYMELÆA, Græcis, Θυμelaia. Italis, Timelea.

THYMELÆA.

FORMA.

Diosc. Virgas ædit pulchras, multas tenues, binum cubitorum, folijs Chameleæ, angustioribus, & pinguioribus, viscosis, gummosisque si mordeantur. Flore candido. Fructu myrti modo rotundo, qui inter initia viret, & tandem rubescit. Involucrum fructus durum, foris nigrum, intus album.

LOCVS.

Idem. Prouenit in altis montibus, & asperis.

QUALITATES ET VIRES.

Idem. Semen per inferna bilem, pituitas, aquasque detrahit, si viginti granorum pars interna bibatur, verum fauces adurit. Itaque cum hordeacea farina, aut in uia acino dari debet. Herba stomacho infesta.

CENSURA.

Decipiuntur qui Cneoron Theophrasti, cuius duo ab eo produntur genera. Alterum quidem Chameleam, alterum Thymelæam esse contendunt.



SAMB-

SAMBUCVS, Græcis, *Αμύν*. Arab. *Iasacti*. Italis, *Sambuco*. Germanis, *Folder*. Hispanis, *Sabuco*, seu *Caninero*. Gallis, *Suscau*, seu *Suyer*.

SAMBUCVS.

GENERA.

Quatuor habet genera. Do- Matth.
mesticum, Montanum, Aqua-
ticum & Minus, quod Ebulus
vocatur.

FORMA DOMESTICI.

Arbor est surculos mittens DIOSC.
arundinaceos, teretes, cauos, Matth.
candicantes, proceros, medul-
la intus candida, ac fungosa,
folia iuglandis terna, quater-
nave ex interuallis circa ramos
exeunt græneolètia, minutim
in ambitu secta, & in ramulo-
rum cacuminibus cauliculisq;
circinata spectantur umbellæ,
quæ florè candidum pariunt,
odore non ingrato, mox aci-
num in nigredine subpurpu-
reum racemosum, succo ma-
dentem, vinosumque.

LOCVS.

Nascitur passim, vbique in Matth.
sepibus, & circa vrbes.

QUALITATES.

Desiccandi, conglutinandi, Gale. 6.
modiceq; digerendi faculta- simp. me.
tem obtinet.

VIRES.

Vis illi detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia olerum modo decoquunt DIOSC.
tur ad pituitam, bilemque detrahendam, caules teneri in patinis cocti eadem
efficiunt. Radix in vino decocta, & in cibis data hydropicos adiuuat; prodest, &
viperarum moribus, eodem pota modo. Vulvas emollit infidentium deco-
cto. Patefacit earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino decocti eodem
funguntur munere. Præterea folia ex hordeacea farina illita inflammationes
mitigant, ambustis, & canum moribus illita profunt. Vlcera quæ dehiscunt in
fistulam agglutinant. Illinuntur vtiliter podagricis cum seuo taurino, aut hir-
cino. Stillatitia è floribus aqua fronti, & sincipiti illita, capitis dolores mulcet, Matth.
succus è radicis cortice expressus, vomitum valentissimè commouet, & aquam
intercutem pellit.

SAMBUCVS.



SAMBUCVS montana, Græcis, ἀνθή ῥοεινὴ. Italis, *Sambuco montano*.

SAMBUCVS MONTANA.

F O R M A.

Matth. Virgis folijsque vrbano similis est, sed minori longè proceritate adolefcit. Flores non in umbellis, sed racematim coherent. Quin etiam baccæ in vix modum dependent, rubro perpetuo colore, vinosa ac fucci plenæ.

L O C V S.

Idem. Nascitur in montosis, & algentibus locis.

Q U A L I T A T E S , E T
V I R E S.

Idem. Vires illi vrbano per omnia similes, imbecilliores tamen.



SAMBUC-

SAMBVCVS aquatica, Italis, *Sambuco aquatico*. Germanis, *Schwelefen*.

SAMBVCVS AQUATICA.

FORMA.

Virgis est sambuci domesti. *Matth.*
ci æmulis, geniculatis, alba in-
tus medulla, sed caduca, & fra-
gili materie. Folijs vitigineis.
Flore albo Sambuci modo,
odore non iniucundo, à quo
bacca prodeunt rubentes,
oxyacanthæ magnitudine, vi-
noso, ac amaro succo refertæ.

LOCVS.

Nascitur in aquosis, & vli- *Idem.*
ginosis locis.

QUALITATES, ET
VIRES.

Bacca deuorata vomitio-
nes citant. Succovis est abster-
soria.



Qgg

FRAN-

FORMA.

Matth.

Arbor est mediocris, pceritatis, folio ferè corni, aut virgæ sanguineæ, cortice Alni, albis maculis exterius resperfo, interius verò adeo flavescente, vt si mandatur croceo colore inficiat, Rhabarbari modo. Flores edit albos, fructum paruum pisi magnitudine, per medium diuisum, aded vt duabus simul baccis constare videatur. Is primo exortu viret, deinde rufescit, postremò verò nigricat. Duo intra se habet osicula lupinorū figura, sed lentibus paulò grandiora. Ligni materies omnino fragilis, imbecillaq; est.

LOCVS.

Idem.

Nascitur passim in Boemia syluis, & nemoribus.

QUALITATES, ET VIRE.

Idem.

Cortici vis inest cum aluum exoluens, tum quoq; adstringens. Quare Rhabarbari modo operatur, quæ in extimo tantū cortice habetur, exoluit. in intimo verò adstrictoria viget facultas. Pilem eius decoctum, & pituitam expellit. Quinetiam hydropicorum aquas ducit. Decoquitur cortex cum aperientibus medicamentis ad cachexiam, icteritiam, & aquam intercutem. Daturq; potandum decoctum quatuor vnciarum pondere per quam commodè. Sed prius corpus expurgari debet. Soluit aluum absq; incommodo, belle iecur expurgat, & roborat, aperit omnium viscerum obstructions, & vasa à crassorum excrementorū infarctu expedit. Delibrantur cortices in ipso veris principio, & in vmbra siccantur. Recentium enim nullus debet esse vsus, quod vomitiones moueant. Decoctū quod exijs paratur quiescat prius oportet, anteaquam propinetur duobus, aut tribus diebus, quousq; flauus color niger fiat, alias vomitiones mouere quandoq; solet.

EBVLVS,



NOMINA.

279

EBVLVS, Græcis, *Kamaidurn*. Arabibus, *Kameadhis*. Italis, *Ebulo*, seu *Nebbio*. Germanis, *Atrich*, seu *Niderholzer*. Hispanis, *Hierguos*, seu *Subugo pecquenno*. Gallis, *Hieble*.

EBVLVS.



FORMA.

Sambuco longè humilior Diosc. est, magisq; herbaceo generi assignandus, caule quadrangulo geniculato, folijs amygdala ex intervallo longioribus, geniculatim expansis, pinnatisq; graucolentibus, in ambitu serratis, muscario sambuci, flore & acino eiusdem. Radice nititur longa crassitudine digitali.

LOCVS.

Nascitur in plateis, & arc. *Matth.* is, secus vias, & in templorum claustris.

QUALITATES, ET
VIRE.

Ea omnia præstat, quævr. Diosc. banafambucus.

Qqq 2

APIOS,

APIOS, Græcis, *ἄπιος*. Italis, *Apios*.

APIOS.

F O R M A.

Diosc. Iunceos ramulos duos, siue tres spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur, folijs rutæ sylvestris, oblongioribus tamen, & angustioribus, herbaceis. Semine paruo. Radice in formam pyri turbinata. Succo sæcunda, cortice exterius nigro, intus verò candida substantia.

L O C V S.

Theoph.
lib. 9. c. 10.
de p. hist.

Nascitur in montibus.

Q U A L I T A T E S.

Idem.

Datur ad expurgandū corpus, quod altera radicis parte superius, altera inferius purget.

V I R E S.

Diosc. Superior eius pars vomitione bilem, pituitamque extrahit, inferior per aluum. Totā vtrinque purgationes mouet. Purgat vtraque parte succus sesquibolo potus.

PSEUDO-



NOMINA.

991

PSEUDOAPIOS. Italis, *Apio falso*. Germanis, *Erdnüss*.

PSEUDOAPIOS.

FORMA.



Multipli crescit caule, cu- *Matth.*
 bitali, ac sæpè maiori, humi
 procumbente, pisi ferè mo-
 do, folijs oblongis, & subaspe-
 ris. Floret Iunio præsertim
 mense floribus puniceis, pisi
 æmulis, odoratis, racematim
 coherentibus, è quibus silicu-
 la oriuntur, in quibus semen
 concluditur. Radices habet
 fici, aut pyri figura ternas, qua
 ternasve è staminibus depen-
 dentes, filipendula modo, ni-
 gra exterius cute, & alba in-
 tus pulpa, nulla purgatoria vi
 prædita.

LOCVS.

Nascitur cum in campis, *Idem.*
 tum in vineis.



Q99 3

Colo-

COLOCYNTHIS, Græcis, Κολοκύνθη. Arabibus, Chandel, Hanel, seu Halandal. Italis, & Officinis, & Hispanis, Coloquintida. Germanis, Coloquint / seu Wilt der Kürbiss. Gallis, Coloquinte, seu Courge sauvage.

FORMA.

Matth.

Folia, & sarmenta emittit Anguria vulgo vocata, per terrā repētia, diuisa, fructum in speciem medioeris pilæ conglomeratum, vehementer amarum.

LOCVS.

Idem.

Seritur in hortis.

QUALITATES.

Galen. 6.

simp. me.

Colocynthis gustu amara est, sed quæ amarissimo medicamento epoto ad sunt opera, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem, quam validam in se se continet, nimirum cum ijs quæ expurgat, ante & ipsa per aluum excerni præuertens.

VIRE.

Diosc.

Medulla fructus purgatoriā vim habet, si quatuor obolis in aqua mulsa, melle cocto, myrrha, & nitro excipiantur, & cogatur in catapotium. Arefactæ pilæ puluis clysteribus infusus prodest nervorum resolutioni, coxendicū doloribus, & coli vitijs, vt q̄ bilem, pituitā, & strigmenta, interdum etiam cruorē eliciunt. Fœtus ad mota pila enecat, si aqua mulsa,

Mesue.

aut passum, in eadē incoquatur, & sub dio refrigescat. potu crassum humorē, & alui strigmenta detrahit. Stomacho supra modū aduersatur, subdita pro balano alui excrementa eijcit. Virentis succo vtilissimè ischiadici perfricantur. Potu cerebrum, & nervos expurgat, quin etiā musculos, thoracē, & pulmonem. Quare vertiginosis, comitialibus, resolutis, convulsis, hemierania, diuturnoq; capitis dolore affectis, asthmaticis, & agrè spirantibus vtiliter in catapotijs exhibetur. Collachrymantes adiuvat oculos, & diutina tussi laborantes. Est præterea vis eius efficax ad omnes frigidos articulorum dolores. Pellit aquas tā pota, quā clysteribus infusa. Fit è fructu oleum ad retardandam canitiem, denigrandos capillos, & eorum defluuium cohibendum, si exempta è fructu pulpa, cavitās oleo repleatur, & in cineribus calidis coquatur, eo mulcentur aurium dolores, atq; sonitus discutiuntur. Quin etiam oleo ipso, & felle bubulo, interaneorum vermes necantur, si calida umbilico illinantur.

EPITHY-



NOMINA.

983

EPITHYMUM, Græcis, *Επιθυμον*. Mauritanis, *Efitimo*, seu *Efichemo*. Italis, *Epithymo*. Hispanis, *Cabellos*, seu *flores del Tomilho*. Gallis, *Teigne de Tym*.

EPITHYMUM.

FORMA.

Capillamenta sunt Epithy. *Matth.*
num tenuiora, quæ thymo ad
nascuntur flauo colore, flori-
bus, & capitulis, perinde ac in
cuscuta vocata.

LOCVS.

Nascitur, & viuitt super thy. *Idem.*
mi plantas apricis præsertim
locis, & ab austro perflatis.

QUALITATES.

Thymi facultatem habet, *Galen. 6.*
ad omnia tamen efficacius est. *simp. me.*
Desiccatur enim & excafcit or-
dine tertio.

VIRES.

Potum cum melle pituitam *Diosc.*
bilemque atram per inferna de-
trahit. Priuatim prodest me-
lancholicis, & inflatis aceta-
buli mensura, ad quatuor

drachmas cum melle, sale, & aceti exiguo. Valentius cæteris alijs medicamen-
tis atram bilem expellit, citra ullam molestiam. Efficax est ad cerebri morbos,
nempe melancholiam, Epilepsiam, diurnos capitis dolores, aliasque arrabilia-
rias ægritudines. Cõfert cordis tremoribus, & animi deliquijs, opitulatur eam
ob causam omnibus lienis affectibus. Item renum vitijs, & hypocondriaca me-
lancholia vexatis optimè confert Epithymi vsus. Datur quoque vtilissimè aduer-
sus carcinomata, Elephantiasim, & vlcera maligna, & atra, & quartana febre af-
fectos liberat.

Q99 4

CVSCV-


CVSCVTA, Italis, *Cuscuta*. Germanis, *Glackssiden*. Gallis, *Couche in'icy*.

CVSCVTA.

FORMA.

Matth.

Eius est natura, ut in frutices, & herbas Epithymi modo, prosiliat, & viuat, earum admiculo fulta, nulla radice nixa, sed velut ab alarum sinu prodeuntibus cirris capillamentisve longissimis. Hæc statim ab exortu plantis sese implicat, & adeo crebris inuolucris his se circumuoluit, ut breui plantas ipsas strangulet, atque enecet. Folijs nullis vestitur, flores tamen edit albos complurimos, quibusdam in capitulis, à quibus semen tenuè prodit, sed superuacuum. cirri rufescunt, vitium capreolis crassitudine, & facie pares.



LOCVS.

Idem.

Nascitur ferè vbique, atqui in sæpibus, aut propè eas frequens visitur varijs, ac diuersis plantis connexa.

QUALITATES, ET VIRE.

Idem.

Excalfacit ordine primo, siccaturq; secundo, abstergit, & quadam cum adstrictione roborat. Iecoris obstructions aperit. Infarcti lienis vitia expedit, venas pituitosis, atq; biliosis exonerat excrementis, vrinas pellit, & regium morbum sanat. Puerorum febribus auxiliatur, sed diuturno vsu ventriculum grauat, quæ tamen noxa tollitur admisto Anisi semine.

CENSURA.

Non rectè sentiunt qui Plinij, Cassytam in Syria nascentem nostratam Cuscutam faciunt.

ALYEVV,

ALYFVM, Græcis, ἄλυπος. Italis, Alipo.

ALYFVM.

FORMA.



Surculosa herba est, subru- diosc.
bra, gracilibus ramulis, tenui-
bus folijs, flore molli, leui, &
copioso, radice beta, tenui a-
cri succo referta, semine Epi-
thymi.

Locvs.

Gignitur in maritimis ma- Idem.
ximè Libiæ quàm largissima,
quanquam alibi quoque plu- Matth.
rima prouenit.

QUALITATES,
ET VIRES.

Semē atram bilem deijcit, Idem.
si mēsurā Epithymo pari cum
sale, & aceto sumatur. Verūm
interanea leuiter exulcerat.

Qqq s

Vitis

VITIS sylvestris, vulgo Dulcamara. Græcis, ἀμπελὶς ἀγρία. Italis, Vite saluatica.
Germanis, Ze lenger je lieber.

VITIS SYLVESTRIS.

F O R M A.

DIOSC. Sarmenta mittit prælonga vitis viniferae modo, aspera, lignosa, folijs hortensis Solani longioribus, ac latioribus, racemoso flore, & capillaceo, fructu exiguis vuis simili, post maturitatem rubente, rotunda acinorum facie.

L O C V S.

Matth. Nascitur in dumeris, sepibus, syluis, & montibus.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Racemi absterge di vim habent, sed & adstrictione quam extrema germina tenet.

V I R E S.

DIOSC. Feruefacta radix in aqua, & in ciathis duobus vini aqua marina diluti pota, humore alui ciet. Ideo hydropicis datur. Vuae eius vitia cutis in facie, & maculas omnes expurgant. Enascentes viticulae cibi gratia sale condiuntur.



VITIS

Vitis alba, sive Bryonia. Græcis, ἀμπέλκις ἡ ἀλβή. Mauritan. Fesfre, Alfesfre, Fesse-
ra, seu Alfesera. Italis, Brionia, seu uacca saluatica. Germa. Stickschurck, seu Zenn-
schelstirb. Hispanis, Neuxa, sive Anorca. Gallis, Colubrine, seu Couluree.

VITIS ALBA.



FORMA.

Folijs viticulis, pampinisq; **Diosc.**
satiā vitē imitatur, sed hir-
sutiora sunt omnia. Ea quos
prope nata frutices, suis cla-
uiculis complectitur. Fructus
rubens in vva dependet, quo
coria pilis spoliatur. In Ger- **Matth.**
mania, & Vngaria fructū ferr
nigrum.

LOCVS.

Prouenit passim secus vias, **Idem.**
& propter sepes.

QUALITATES.

Prima germina adstringūt
modicē cū quadā acrimonia,
& subamarore. Radix abster-
gentem, desiccantem, & te-
nuum partium, ac moderatē
calidam vim obtinet, corym-
bi depilatorij sunt.

VIREs.

Folia, fructus, & radix vlce- **Diosc.**
rum phagædenis, cancrenis,
chironijs, putrentium tibiārū
radio efficaciter cum sale illi-
nuntur. Radix corpus abster-
git, & cutē erugat, vitia cutis

in facie varosque, lentigines, & cicatrices nigras emendat: cum Eruo, Creta
Chia, & fænogreco, suggillata tollit, & redutias cōmittit, suppurationes rum-
pit. Infracta ossa extrahit trita, & imposita. Datur comitialib. in potu drachmæ
pondere quotidie anno toto. Prodest attonitis, vertiginosisque eodem modo
sumpta. Auxiliatur contra viperarum ictus pota duarum drachmarum ponde-
re: subposita partus, & secundas trahit, & pota ciet vrinam. Lienem confumit,
ternis obolis triginta diebus ex aceto bibita. Illinitur ad eadē cum fico, ad mul-
iebres quoque infessus decoquitur, siquidem vuluas purgat, sed abortum fa-
cit. Succus cum aqua mulsā potus pituitam extrahit. Ad psoras & lepras, semen
efficaciter illinitur. Idem vrinam trahit & cerebrum mundat, vilcerum ob-
structiones aperit, renes à calculis expedit.

VITIS

VITIS nigra, Græcis, ἀμπέλῳ μέλαινα. Arabibus, Fesire sentanim Als fese fese, siue Faserfim. Gallis, Vite nera, seu Tamaro.

VITIS NIGRA.

F O R M A.

Matth. Folia fert hæderæ, sed maiora, smilaceis, pxiima, caules etiam cognatos, capreolis suis arbores, quasi ad minicula cōprehēdit. Fructus racematim coherent, qui inter principia virent, & post maturitatem rufescunt, & quandoq; nigrescunt. Radix foris nigra, intus buxæo colore nitet.

L O C V S.

Idem. Nascitur in dumetis, in sepibus, & in syluis.

Q U A L I T A T E S.

Gal. li. 6. Viti albæ ad omnia similis,
simp. me. nisi quod imbecillior.

V I R E S.

DIOSC. Viticulæ quæ primo germi-
natu erumpunt in olera reci-
piuntur, menses pellunt, vri-
nam cient, lienem absumunt, vertiginosis, comitialibus, & resolutis profunt.
Radix eadem quæ vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis
iumentorum ceruicibus commodissimè illinuntur. Quin etiam luxatis articu-
lis. Nihil eius radicis succo valentius fuerit ad strumas sanandas, si cum vini ac
mellis æquali potione is hauriatur. Præstat ad idem quoque eadem radix, si tu-
ta, & melle excepta illinatur.

M O M O R.



MOMORDICA, seu Viticella. Italis, Balsamina, Viticella, Momordica, seu Pomo di Gierusalem. Germanis, Balsamtraut Männlin. Gallis, Marueilles.

BALSAMINA, SIVE MOMORDICA.



FORMA.

Planta est, quæ prælogis, te- *Matth.*
nibusq; viticulis vltro, citro-
que reptantib. proximas plan-
tas cõprehendit, folijs vitis al-
bæ, aut viniferæ similibus, sed
longè minoribus, magisq; per
ambitum dinisis, capreolis te-
nuibus ex alarum sinu prode-
untibus, quibus sese appositis
implicat adminiculis. Florem
promit cucumeri similem, par-
uum, subluteum. Fructû vtrin-
que turbinatum, gallinacei fe-
rè oui magnitudine, cute car-
nosa, acutis tuberculis scatente.
Huic maturo puniceus co-
lor, qui præterea facile dissilit
vltimam maturitatẽ adeptus.
Semen includit Anguriæ vo-
catæ simile, minus tamen, con-
tectum cute crassâ pingui, lu-
brica, & perquàm rubente.

LOCVS.

Nusquam nisi sata in Italia *Idem.*
prouenit, vbi in hortis, & ficti-
libus colitur.

QUALITATES,
ET VIRES.

Folia vulnera recentia glutinant. Fructu in oleo immaturo insolato, paratur *Idem.*
oleum præstantissimum ad arcendas vulnerum mammillarumque inflamma-
tiones, & dolores mulcendos. Valer idem Siphone infusum ad exulceratos, in-
flammatosq; vteros. Doloribus hæmorrhoidum quoque mirificè auxiliatur,
in quem vsum Fructus oleo Amygdalino dulci, aut de semine lini macerantur.
Idem medetur ambustis tam igne, quàm aqua: punctis, sauciatisq; neruis vti-
liter illinitur: quin etiam vulnerum cicatrices delet, & vesparum ictus sanat. Fo-
liorum puluis cochlearis mensura ex equiseti decocto potum, intestinorum
vulneribus medetur.

BALSAMI-

BALSAMINA altera. Italis, *Balsamina maggiore, siue semina*. Germanis, *Balsamin*
*fraut Weib*le.

F O R M A.

Matth.

Caulis illi est crassus sesqui-
 cubitalis, pinguis, & succo
 prægnaus, ramis multis abun-
 de vegetibus. Folia profert Sa-
 licis modo longa per ambitū
 serrata, flores prægrādes pur-
 pureos retro inflexè caudica-
 tos. E quibus poma suborin-
 tur, alterius Balsaminæ haud
 admodum dissimilia, turbi-
 nata, hirsuta, viridi primū co-
 lore, & per maturitatem lu-
 tescente: internum semē len-
 ticulæ faciem exprimit. Ra-
 dice nititur numerosa, crassa,
 robustaque.

L O C V S.

Idem.

Seritur in hortis, & horti-
 bus.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Idem.

Putat quidam (id quod et-
 iam scribunt) & hanc ipsam
 esse cum altera viribus. Verum nos nullam eius experientiam habemus.

BALSAMINA ALTERA.



FILIX.

NOMINA.

991

FILIX, Græcis, Πτέρις. Arabibus, Sarax, seu Sarachis. Italis, Felce. Germ. Waldfarn. Hispanis, Helechoyerua. Gallis, Osmunda Regale, seu Fougere masse.

FILIX.



GENERA.

Duo eius habetur genera, Diosc. Mas & Fœmina.

FORMA MARIS.

Filici folia, sine caule, sine Idem. fructu, sine flore ex vno pediculo cubitali longitudine exeunt, multifida, è laterib. priuata, & expansa velut ala, subgravi odore. Radice per summa cespitum nigra, oblonga, filices multos fundente, substringenti gustu.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & Idem. saxosis. Quin etiam alibi vñ Matth. brosis locis.

QUALITATES.

Mas radicem habet maxi- Gal. li. 8. mè vtilem: latum enim hum- simp. me. bricum interficit. Est enim a-

mara, paulum habens adstrictionis, valentem desiccandi facultatem obtinet, nec tamen mordax est.

VIRE S.

Radix ex aqua multa pota quatuor drachmarum pondere latas vètris tineas Diosc. excutit. Laborantes lienis in cœmeco recreat. Radix cum pota, tum cum axungia illita, vulneribus sagitta arundinea factis, medetur. Est enim inter eam, & Matth. arundinem non parua inimicitia.

FILIX

FILIX fœmina, Græcis, Φηλόπλες. Italis, Felce femina.

F O R M A.

Diosc. Filix fœmina folijs est alterius filicis, surculosis, altioribusq; & quæ non singulati, ut illa pediculo fulciantur. Radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flavescent, aliæ etiamnum rubræ inveniuntur.

L O C U S.

Matth. Nascitur in sylvis, & in montibus, & ferè ubique, maximè frigido solo.

Q U A L I T A T E S,
E T V I R E S.

Diosc. Radices pellunt cum melle sumptæ lata interaneorum animalia: cum vino aut drachmis tribus teretes tineas eijciunt. Datæ fœminis sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortum, si supergrediantur. Farina humidis ulceribus, & cicatrici repugnantibus inspargitur. Tumorum cervicibus medetur. Foliarecentia in oleribus cocta manduntur ut ventrem emolliant.



F I L I C V.

NOMINA.

993

FILICVLA, Græcis, Πόλυπώδιον. Mauritanis, *Bisberg. Aibeig. siue Bessaigi.* Italis, *Polipodio.* Germanis, *Engelsfuss. Baumsarn. siue Droppswurz.* Hispanis, *Filipodio. & Polipodio.* Gallis, *Polypode.*

FILICVLA, SEV POLYPODIUM.

FORMA.

Palmari altitudine assurgit, filici similis, subhirsutis, & robustioribus folijs, aduersa parte fuluescentibus, maculis resperfis. caulē, florem, fructumq; nullum profert. radicibus nititur per summa cespitem vagantibus, polyporum piscium cirris similibus, vnde illi nomen, fibris, pilisq; propē innumeris refertis, colore exterius subfuluente, interius verō viridi, sapore dulci, & austero simul.

LOCVS.

Nascitur in muscosis petris, & vetustis arborum caudicibus, præsertim Quercuum.

QUALITATES.

Dulcem simul, & causticam habet vincentem qualitatem, vt facultatis sit admodum.

VIRE S.

Purgandi vim habet, coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Arida farina aquæ mulæ insperfa detrahit bilem, & pituitam. Trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus rimas quæ inter digitos sunt. Bilem præsertim atram extrahit.

Rrr

Asuari-
DRO-
us.



Foliare-

FILICV-

DRYOPTERIS, Græcis, *Δρυόπτερις*. Italis, *Felce Quercina*. Germanis, *Wannfaru*. Gallis, *Fuchiere des chesnes*.

DRYOPTERIS.

FORMA.

Diosc. Filici similis, sed multo minori foliorum incisura. Radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis in dulcedinem vergentibus.

LOCVS.

Idem. Nasctur in veterum Quercuum musco.

QUALITATES.

Gal. 6. Gustu mistam facultatem præfert, dulcem, acrem, amarum, in radice vero item acerbam, facultatem habet septi-

VIRES.

Diosc. Psilothrum est cum radicibus trita. Illinitur enim postquam corpus exudauerit, mox sudor abluatur, & recens imponitur.



CNICVS.

NOMINA.

995

CNICVS, Græcis, *Knidos*. Mauritanis, *Kartan*, seu *Chartham*. Italis, *Zoffarano* *Saracinesco*. Officinis, *Cartamum*. Germanis, *Wilder Safran*. Hispanis, *Alacor*, & *semente de Pappagayos*. Gallis, *Saffran bastard*, & *Saffran sauvage*.

CNICVS.

FORMA.



Singularem emittit caulem *Matth.* sesquipedalem, & quandoq; maiorem, teretem, rectū, sub albicantē, striatumq; firmū, atq; lignosum, ramis à medio caule copiosis dodrantalibus. Folia oblōga, crassiuscula, robusta, glabra, in mucronē desinentia, infirmis aculeis circumuallata, & sine pediculis ē ramis pdeuntia. spectantur in ramorū summitatibus acanacea capitula in latū turbinem fastigiata, oblōgis ac spinosis squamis radiantib⁹ circūquaque, ima parte foliolis, aculeis pariter rigentibus, & lyderis faciem referentib. Flores medijs ē capitibus erumpunt, capillacci, ac graciles, vt in cæteris acanaceis, aureo colore, ad rubrum inclināte, crocinis staminibus æmuli. Semē inest album, angulosum, lēgi putamine ac duro, alba intus medulla. Radice nititur oblōga, fibrata, sed superuacua.

LOCVS.

Seritur in hortis & campis. *Idem.*

QUALITATES.

Semine duntaxat ad purgationes vtimur, tertij est ordinis exalfacientium, *Galen. 7.* si quis foris eo vti volet. *simp. me.*

VIREs.

Seminis rufi & delibrati medulla ex aqua mulsā aut iure gallinacei aluū purgat pota. seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendæ alui facultate donat. Idē pituitam, & aquas extrahit, quo fit vt coli dolore affectis, & hydropicis opē mirificè præstet nō modo haustum, sed etiā clysmate infusum. Seminis medulla, à putaminibus repurgata, & saccharo elegantis modo excepta pectus, & pulmones abstergit, vocem clarificat, & prolificum semen auget.

Rxi 2

MERCY-

MERCVRIALIS, Græcis, *Διυκόλας*. Italis, *Mercorella*. Germanis, *Bingeltraut*. Hispanis *Mercuriale*, & *virtigua morta*. Gallis, *Mercuriale*.

MERCVRIALIS.

G E N E R A.

Diosc. Duum est generum, Mas alterum. Alterum fœmina.

F O R M A M A R I S.

Idem. Frutex est dodrantalis, aut maior, folijs Ocimi, helxinæ cognatis, sed minoribus, ramis duplici geniculorum modo cinctis, alarum cauis multis; fructu è foliorum sinu pendente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis vnâ cohærentibus.

L O C V S.

Matth. Nasçitur in hortis, vineis, vrbium plateis, & inter rudera.

Q U A L I T A T E S.

Gale. 7. Mercuriali vtuntur omnes ad ventris purgationes duntaxat. verum enim vē-
simp. me. ro, si quis eius facere periculum volet in cataplasmate, sanè eam digerentis admodum facultatis esse experietur.

V I R E S.

Diosc. In oleribus manditur ad aluum ciendam, cocta in aqua epoto iure bilem, aquamq; detrahit. Constat, vt mares gignantur, hunc facere, vt fœminæ illam si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur. Obseruatum quoque est tolli verrucas omne genus illitis vtriusque folijs, aut eorum succo. Malis item quæ serpunt succus cum aceto medetur. Fœmineis locis supposita menses ciet.

MERCY-



NOMINA.

997

MERCVRIALIS fœmina, Græcis, *Λιγώρις θήλυς*. Italis, *Mercorella femina*. Germanis, *Vingeltraut Weibc*. Gallis, *Mercuriale femelle*.

MERCVRIALIS FOEMINA.



FORMA.

Caule, ramis, folijs per o. *Matth.*
omnia alteri similibus pro-
uenit. verum fructu dif-
fert, quod in hac racemo-
sum spectetur & semine co-
piofo.

LOCVS.

Nascitur simul cum ma- *Idem.*
re ijsdem locis.

QUALITATES, ET
VIREs.

Ad simili Mari facultate *Idem.*
præstat, nisi quod hæc à
purgatione bibita fœmi-
nas gignat, illa mares.

RET 3

CYNO-

CYNOCRAMBE, siue Canina brassica. Græcis, *Kivoxgá, ελν.* Italis, *Mercorella bastarda.* Germanis, *Wild Dingelkraut.* Gallis, *mercureiale sauvage.*

CYNOCRAMBE MAS.

FORMA.

Diosc. Cauliculum binū dodrantum altitudine emittit, mollem subalbidum, folia mercuriali, aut hederæ similia, certis interstitijs, subalbida, fermen folijs adhæret paruum rotundum.

Locvs.

Matth. Nascitur omnibus ferè locis in vineis, campis, & propter vrbiū mœnia. * frequentissima vero in syluis prouenit.*

QUALITATES,
ET VIRES.

Diosc. Folia cum caulibus pota aluum cient, oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam, & bilē, & aquas detrahit.



*CYN-

*CYNOCRAMBE FOEMINA.

FORMA.



Tenerior est & mollior
quam mas, quum prodi ve
ris initio flosculos racemo-
sos vt Mercurialis vulgaris
fœmina proferens. Tem-
poris progressu decidenti-
bus flosculis euadit multo
durior, & foliorum longi-
tudine tantum à mare dif-
cernitur.

LOCVS.

Locis montosis & syluis
innascitur.*

RIT 4

HELIO-

HELIOTROPIVM maius, Græcis, *ἡλιότροπον μέγα*. Officinis, *Verrucaria*. Italis, *Eliotropio maggiore*.

HELIOTROPIVM MAIVS.

GENERA.

Diosc. Heliotropium duū est generum, Maius, & Minus.

FORMA MAIORIS.

idem. Folia habet Ocimi, hirsutiora, candidiora, & maiora, ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis concaui. Flos in cacumine candidus aut subfulvus, incurvatus, ut scorpionis cauda. Radix tenuis est, & inutilis.

LOCVS.

Diosc. Nascitur in asperis. *Quint.* etiam in ædificiorum plateis, in hortis, & agris incultis, & sabulosis.

QUALITATES, ET VIRES.

Diosc. Herba ex aqua decoctum fasciculo manus plenæ, potu pituitam, bilemque per aluum extrahit. Prodest in vino potum, quin etiam ad motum, ad scorpionum ictus. Ad alligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam vnā ante accessiones feminis grana quatuor cum vino pota quartanas finire, tria verò tertianas. Illitum semen fornicantes verrucas, penilesque, & thymos exiccat. Folia podagricis, luxatisque vtilissimè illinuntur. Menses cient, partus trita, & imposita pellunt. Epotum horum decoctum vnā cum cumino renum calculos pellit, ac frangit, & intestinorum animalia necat. Formicæ quoque necantur earum foraminibus Heliotropio obturatis. Foliorum succus carcinomatis, ac contumacibus vlceribus mirificè auxiliatur. *illius.*

HELIO-



N O M I N A.

1007

HELIO-TROPIUM minus, Græcis, Ηλιοτρόπιον μικρόν. Italis, *Heliotropio minore.*

HELIO-TROPIUM MINVS.



FORMA.

Heliotropium paruum fo- Diosc.
lijs est antedicto proximis, ro-
tundioribus, semine acrochor-
donum, verrucarumq, modo
pensili, rotundo.

LOCVS.

Nascitur in palustribus, & Idem.
iuxta lacus.

QUALITATES,
ET VIRES.

Herba cum suo semine po- Diosc.
ta adiecto nitro, hyssopo, na-
sturtio, & aqua laticineas, re-
retesque excutit. Pensiles ver-
rucas, quæ acrochordones vo-
cantur, cum sale illita tollit.

* Huius herbæ baccis vtun-
tur infectores lanarum in Gal-
lia Narbonensi, vocantque *la-
Morella.**

RIT 5

SCORPIO-

1002

N O M I N A.

SCORPIOIDES, Græcis, Σκορπιοειδής. Italis, Scorpioide.

SCORPIOIDES.

F O R M A.

Matth. Herbula est folijs paucis,
femine caudæ scorpionis ef-
figie.

L O C V S.

In hortis tantum hâc plan-
tam satam vidimus.

Q U A L I T A T E S.

Idem. Excalfacit ordine tertio,
desiccat verò secundo.

V I R E S.

Gal. li. 8. Illita scorpionum ictibus,
simp. me. præsentaneo est auxilio.



VITIS

VITIS vinifera, Græcis, Ἀμπέλῃ δινοφέῃ. Italis, *Vite vinifera*. Arabibus, *Harin Karin*, seu *Karm*. Germanis, *Weinreb*. Gallis, *Vigne*.

VITIS VINIFERA.



FORMA.

Vitium omnium genera, ac formas adeò tam clavis, quàm obscuris viris, tam nobilibus, quàm ignobilibus, tam deniq; vrbanis, quàm rusticis innotuerunt, vt nemo sanè sit, qui nò de vitium generibus, earundemq; historiam scire, ac distinctè loqui possit.

QUALITATES.

Folia refrigerant, & adstringūt. DIOSC.
Idem præstant & capreoli.

VIRES.


Folia & triti capreoli capitis dolores illitu mitigant, & inflammationes stomachi, ardoresque cum hordeacea farina. Potus eorū succus dysentericis, sanguinem excrementibus, stomachicis, & gravidarum malacijs medentur. Eadem efficiūt madefacti in aqua capreoli, & poti. Lachryma quæ veluti gummi in caudicibus concreuit, ex vino pota calculos pellit, illita lichenas, & pforas, leprasque nitro prius perficetas sanat. Eadem cum oleo pilis sepius illitis psilothri effectum habet, maximeque sanies quæ ex accensis sarmentis exduuit, qua perunctæ verrucarum infectiones extrahuntur. Vinaceorum & sarmentorum cinis ex aceto illitus detractis in sede con-

Matth.

Gal. 2. de alim. fac.

dylomatis & thymis medetur. Prodest luxatis, & viperarum moribus, & contra lienis inflammationem illinitur, cum rosaceo, ruta, & aceto. Acerbæ vix succus admiscetur vtiliter coeliacorum & dysentericorum cibis, quinetiam medicamentis quæ ad sanguinis reiectiones parantur. Id quod etiam præstant acinorum nuclei in farinam triti, & ventri, stomachoquæ illiti. Vix pensilis matura, manibus confracta, & illita, recentibus ambustionibus mirifice auxiliatur, statim enim dolorem mulcet. Vix probè maturæ inter fructus autumnales principatū in cibis obtinent. Itaque fugacibus omnibus magis nutriunt, minimumq; prauis succi habent. Pensiles si prius maturæ sunt, & dulces, cæteris minus ventriculum inflant, & alium conuenienter emolliunt.

Quartius ultimi libri, Finis.



1005
ITER BALDI CI-
VITATIS VERONAE
MONTIS, IN QVO MIRABILI
ORDINE DESCRIBITVR MONTIS
ipfius, atque aliarum quarundam
ipfum contingentium par-
tium fitus.

RECENSENTVR PRAETER-
*ea quaedam insignes plantae, ac herbae ibi na-
scentes, quae vsui Medico plus ca-
teris conferunt.*

Recens in lucem editum

*Ab honestissimo viro FRANCISCO CALCEGLARIO Vero-
nensi Pharmacopola, in Campana aurea officina.*



Francofurti ad Moenum.

M. D. LXXXVI.

CLARISSIMO DOMINO
PETRO ANDR. MATTHIOLO SE-
NENSI, SERENISSIMI PRINCIPIS FER-
dinandi Archiducis Austriae, &c. Consiliario,
atque Medico primario,

Franc. Calceolarius Pharmacopola Veronensis, S. P. D.



OPUSCULUM meum, quod antea Italico sermone edideram, tibi
Latinum factum (ut petis) mitto, cum tuo de plantis compendio in
lucem edendum: siquidem communi hac lingua nunc conscriptum,
omnibus in Europa nationibus tuo auspicio facile innotescet, cum
tua mirifica monumenta per vniuersum ferè orbem circumferan-
tur. Etenim non in Italia solum, sed apud ceteras nationes, tanta
tu autoritatis exas, tamq[ue] late tua fama, nomenq[ue], diffunditur, ut
nedum libri de materia medica, sed & cuiusvis generis descripti,
merito tibi dicari, & nuncupari possint, quòd à tuo tantum clarissimo nomine facile prote-
gantur. Accessit etiam, ut hoc tuae auctoritati voluerim commendatum, illa iam diu animo
in harenis meo tua in me beneuolentia opinio, tot experimētis tuorum in me officiorum com-
probata: qua quidem me inducit ad credendum, opusculum hoc meum non solum tibi carum
futurum, sed tuo patrocinio apud omnes studiosos, & bonos viros non modicam gratiam ini-
turum. Commodum sūe (ut scribis) huic libello in tuo de plantis Compendio futurum esse
locum non diffido: nam ad medicam materiam re ipsa cognoscendam, non parum asseret
commoditatis, atque etiam quasi comitem prestabit, quo plantarum studiosi in montem il-
lum stirpium ferè secundissimum ducantur, illasq[ue] certis locis reperiant. Siquidem ab vrbe
in montem cunctas ipsius itineris partes explicat, & quo commeatu in eo perficiendo sit o-
pus. Locaq[ue] omnia speciatim ostendit, in quibus diuersarum plantarum genera virescunt, ac
florent, hac tamen serie, ut copiosiores tantum eorundem locorum stirpes connumerentur,
ne cum plura genera eodem in loco orientur, studiosorum ingenia confundant. Quod verò
copiosius reperitur, id locum sibi vendicabit, eiq[ue] nomen tribuet, & nostram consideratio-
nem ad se conuerteret. Præterea cum plura loca iisdem plantis abundent, is modus descriptio-
ni adhibebitur, ut eo adnotato, qui prius in itinere obuius fuerit, cetera deinceps prætereantur:
ni sint aliqua præstantiorum fortasse generum, de quibus ob earum dignitatem, me-
miniisse oporteat, in quocunque habeantur loco; alioqui quantum possumus breuitati stude-
bimus. Vtinam verò de ceteris montibus, atque locis, qui plantis raris, & mirificis abun-
dant, similes extarent historiae, quæ non solum indagatores ad loca illa perlustranda animat-
rent, sed iter ostenderent, ac materiam medicam tot difficultatibus plenam sua pristina cla-
ritate te duce, restituerent. Namque tuis doctissimis commentarijs theoriam continenti-
bus, instructi homines discendi cupidi, ad alteram partem in scientijs omnibus necessariam,
nempe experientiam ipsam, facilius sese addicerent: cuius in plantarum notitia primas
partes esse tu bene nosti: qui illam tam diligenter adhibueris: Optarem sane ceterarum e-
iusmodi regionum, posse me tibi historiæ conscribere tuo ipsius compendio alioqui numeris o-
mnibus absoluto adnectendas. At verò id à me scio non requires, quod præstari ab vno homi-

ne non

ne non possit: quare velim, ut animi mei propensam erga te voluntatem (ut tua est humanitas) gratam suscipias: cupio enim pro virili modo omnibus, tibi semper gratificari. Ceterum Baldus mons non modico simplicium medicamentorum numero refertissimus est: in quibus ego conquirendis, examinandisq, non mediocres impendi sumptus, atque labores, doctissimis semper ac peritissimis viris adiunctus. Inter quos fuere Iulius Moderatus, Antonius Tolomeus, Aloisius Anguillarius, Vlysses Aldrouandus, & alij complures in Academijs Italicis studiosi. Præteream præclarissimos illos senes Hieronymum Fracastorium, & Lucam Ghinum, qui (quicquid in hac scientia profecerim) mihi autores, ducesq, exitere. Taceo Excellentissim. Montefaurum, Iulianum Fumanellum, & alios præstantissimos huiusce civitatis medicos, qui tantum laboris per inuita, asperaq, ipsius montis loca, quandoque mecum subire non sunt grauari, ut varios ac mirificos naturæ effectus in plantis contemplarentur. Quibus non minus grata fuit mea herbarum observatio, quam mihi illorum de plantis doctrina iucunda, adeo ut iam possim multa de rei plantaria controuersijs in medium proferre, atque ex sententia determinare, quæ breuitati studens & vitanda arrogantia causa prætermittam: quamvis (proh dolor) hoc tempore à quocunque vix in re plantaria tyrunculo hoc iam usurpetur, ut vel peritissimis contradicere audeat ignarus quisque. Huius autem Libelli forma tanquam cuiusdam catalogi earum omnium plantarum erit, quæ in celeberrimo hoc monte reperiuntur: suis locis particulatim descriptarum, ut cuilibet aditus, & lustratio locorum omnium, atque herbarum inuentio facile pateant. Erit igitur in tuo hoc stirpium compendio satis congruens, quoniam illi plantas communiter exponenti ac figuris veras imagines ostendenti, loca inueniendarum illarum describens, tanquam famulus erit atque minister. Quin etiam commodissimè in tam præclaro herbarum omnium volumine, faciliè hoc exiguum meum poterit illustrari, atque à calumnijs omnibus quæ aliquam posse videntur caliginem obducere, tueri: ut non minus hac loci mihi facta liberalitas, concessio, atque tutela cara sit futura, quam hac mea voluntas tibi in hoc ministerio tuis scriptis suggerendo grata. Bene vale.

Verone Idibus Februarij. M. D. LXXI.

PETRVS

PETRVS ANDR. MATTHIOLVS
SENENSIS MEDICVS,

Franc. Calceolario Pharmacopæo Veronenfi. S. P. D.



QUOD iam diu desiderasti compendiu à nobis conscriptum de Plantis omnibus, de quibus diffusè satis in commentarijs nostris in Dioscoridem meminimus, in eorum studiosorum vsu, qui indagandis, noscendisq. legitimis simplicibus nauant operam, iam pridem absolui, ac propediem typis excudendum mittam. Quamobrem tuu opusculum quod de itinere è Verona in Baldum montem omnium se-rè fama per celebrem, & plantarum refertissimum ad me misisti, illi statim adnectendum curabo. Scio enim me hoc tuo libello apud multos bonos viros beneuolentiam longè maiorem initurum, si etiam præter descriptas plantas, locum ostendam ubi eæ copiosissime ac non vulgares inueniantur. Ceterum id magis eos, & tibi, & mihi beneuolos reddet, quod in ipso tuo opusculo nō solum itinerandi normam tradideris, sed vniuersas quoq. plantas descripseris, quæ vnicuiq. montis ipsius loco ab imo ad summum gradatim enascuntur. Erit enim hoc omnibus adeo gratum, vt ubi senserint te ab inuidis morderi, existimationem tuam, probitatem, sinceritatem, atq. doctrinam modis omnibus tuebuntur, ita vt tibi honori, et studiosis vtilitati libellus iste tuus sit futurus, præsertim cum me ipsum habeas promotorem, ac defensorem. Scio enim abs te non solum me amari plurimum, sed præ cæteris etiam observari. Ego verò vt de mea in te pro-pensione, ob tuarum, nempe sinceritatis, fidei, solertie, peritiae, diligentiaq. meritum aliquid dicam in obrectatorum tuorum censuram: admiror sanè quàm maximè valeas in componendis absq. omni fraude medicamentis, & ijs præsertim, quæ à clarissimis olim medicis magnis Imperatoribus parabantur, vt latius & diffusius in commentarijs nostris in Dioscoridem, de tua admirabili Theriaca libro sexto præfati sumus. Scio tamen meis laudibus ibidem conscriptis, & tibi, & mihi inuidos complures comparatos, qui aliorum virtutibus insidiantur. At cum inuidia virtuti perpetuò sese opponat, & tandem inuidos ipsos quodam veluti marasmo conficiat, eorum maledicentiam minimè curare debemus. Scio ego non deesse pharmacopæos, non in Italia solum, sed in alijs quoq. exteris regionibus, qui legitimorum simplicium peritiam habent, & in componendis, parandisq. medicamentis exercitatisimi sunt, adeo vt possint rectè & Theriacam, et cætera generosa antidota parare: de quorum laudibus possem quoq. multa scribere si mihi cum ijs perinde ac tecum intercederet consuetudo, & medicamentorum, quæ ab ijs parantur, certam aliquam haberem notitiam.

riptum
menta-
studio-
simpli-
pedicem
sculum
um se-
tim ad-
os bene-
locum
magis
itine-
ue uni-
um hoc
tionem
itur, ita
im cum
mea-
te pro-
leg, me-
e quam
præfer-
ut la-
mirabili
conscri-
tutibus
inuidos
de cura-
lin alijs
t, & in
sint re-
bus pos-
conſue-
rem no-
titiam.

ritiam. Sed cum id haud mihi fateri liceat, alijs eorum laudes describendas re-
linquo, & te præ ceteris laudandum, promouendumq; mihi proponam: seruata
tamen ceterorum fama, fide, peritia, ac ſedulitate. Ceterum ſi quis (quiſquis
ille fuerit) de mea fide dubitauerit, tutus ad te accedat, tecum loquatur, tuaque
omnia videat & examinet, non tamen malignis, ac diſtorſis oculis, ſed claris
& apertis. Hoc ſi fecerit, cognosceſt quidem apertiſſimè, non immerito à Mat-
thiolo laudari Calceolarium, & eius antidota præ ceteris commendari. In-
trent penetrentq; qui ſelectiſſima omne genus medicamenta noſcere, ac mani-
bus tractare cupiunt in tuum Muſeum; in quo prætioſa, ac rara recondis.
Apertum enim illud inuenient (quæ tua eſt cum omnibus liberalitas) & te ad
omnia videnda oſtenſorem habebunt. Quid dicet cum viderint, quæ ego vidi,
Et probaui apud te tantum? Mirabuntur ne? proſecto mirabuntur, & præ ſtu-
pore obmuteſcent. cum inſpexerint Coſtum, Amomum, Aſpalatum, Calamum
odoratum, Folium, & quod magis mirum eſt, etiam Opobalſamum. Videbunt
præterea foſſilium complurium varia genera, ipſaq; admodum rara, & permul-
ta quoque naturæ miracula, nempe plantas animaliaq; in lapides multiplices
verſa, & alia non minus monſtroſa, à te adeo diligenter aſſeruata, & in ordi-
nem diſgeſta, ut omnes, qui tam rara tamq; præcioſa monumenta inſpexere, ſum-
mopere ſtupeant. Taceo rara admodum animalia, quæ inibi ſummo artificio
arefacta ſpectantur. Taceo peregrinas, & nouas plantas, fructus, radices ſemi-
na, quæ è remotiſſimis terrarum locis delata ſunt, ne maiorem tibi inuidiam
pariam. Quæ omnia magno ſumptu, & labore tibi comparaſti non tam lucri
faciendi cauſa, quàm iuuanda Reipublice, & famæ conſequendæ deſiderio.
Prætereo quoque, quæ in tuo Myropolio mirifica aſſeruas antidota. Theriacam,
inquam, iam omnibus celebrem, Mithridaticam antidotum illam regiam,
atque antidotum etiam illam noſtram, & noſtrum de Scorpionibus oleum,
quæ tibi & mihi tam diligenter, fideliterque paraſti, ut nihil addi poſſit. Præ-
clarus es pharmacopæus, præclarus, & acerrimus ſimplicium indagator, ac
cenſor, cur ergo curas vitilitigantium inſidias? Velim omnino ne cures, cum
tibi nihil offere queant. Non deſunt tibi (mihi crede) medicæ materiæ peri-
ti, qui ſua tantum autoritate te ipſum, & tua omnia tuebuntur. Scio ego
non deſſe erudiſſimos medicos, quibus ex commentariorum noſtrorum le-
ctione ingens tua probitas, ac in parandis Antidotis peritia innotuit, qui con-
ſectis diſſicillimis, ac longis itineribus ad te proſecti ſunt, nō modo ut te de ſa-
cie cognoscerent, ſed ut à te veluti ab Andromacho, & Galeno, Theriacam, &
alia complura generoſa antidota conſequi poſſent. Inter quos licebit mihi nunc
hic cōmemorare Ioan. Baptiſtam Nocetum Pōtremolenſem & Ioan. Baptiſtam
Oliuū Cremonenſem Medicos ſanè ac viros, ſingulari doctrina illuſtres, & ma-
teria medicæ peritos, qui ſuis literis ſe multū mihi debere ſaſi ſunt, quòd ex cō-

mentarijs nostris illis innotueris, te inuiserint, & præclarissima antidota abs te acceperint. Taceo laudes, quibus multis encomiis te prosequuti sunt, & quæ de his, quæ apud te viderunt, enarrant. Miranda enim sunt quæ de te scribunt, ac de tuorum medicamentorum miraculis. Præmittam & ego quoque, quæ de mirificis Theriacæ tuæ operibus dici possent, quod tamen non facerem nisi id prius in commentariis nostris in Dioscoridem præstitissem. Quin etiam cum Antidotus ipsa iam ubiq; de se, suaq; ipsius præstantia dicat, loquatur, & prædicet, non est ut de ea plura præfari contendam. Hoc tantum addam, ne scire Matthiolum, ubi ei parem adinuenias. Facinus esset magnum si ea velim in hominum vsum promouere, quæ scirem non carere impostura: quidam fortasse faciunt. Quin etiam haud minus facinus esset, si quæ scirem ad conseruandam tuendamq; hominum vitam profutura, eadem non promouerem, & laudibus non commendarem, sed ne longius tuas prosequar laudes, & ne tam amplo meæ in te beneuolentiæ animo inuidorū aures obtundam, cætera tacere decreui, de quibus præclarissimi Medici Veronenses, qui omnibus ferè horis tecum versantur & viuunt, longè melius ac diffusius quam ego testari poterunt. Tu vero, ut semper soles, diligenter cura, ut antidotum & oleum nostrum de scorpionibus contra venena, & virulentorum animalium ictus, quorum parandi rationem in commentariis nostris descripsimus, ad finem deducantur. Si quidem tametsi Romæ non desint, qui hæc iam passim parent in multorum Heroum gratiam, & vsum, sunt tamen eorum plerique, qui sæpe suis literis ad me datis antidota ipsa à me petant, quod sibi omnino persuadeant, quæ à nostris prodeunt manibus cæteris fore præstantiora. Bene vale.

Tridenti, idibus Ianuarij. M. D. LXXI.

ITER

ITER BALDI MONTIS, FRANCISCO CALCEOLARIO

VERONÆ IN OFFICINA CAMPANÆ

aurea Pharmacopola Auctore.

BALDVS Mons in Italia celeberrimus in faucibus alpium quibus Rhetia ab Italia diuiditur, altissimus, latissimusque refidet, in ipsis Veronenfis, & Tridentini agri confinibus. Hic itaque cacumen ~~ad præ~~ extollens, ceteros vicinos montes altitudine superat, atque excellit, adeo ut amœnitate, situ, pulchritudineque non sit quouis altero inferior. Radices habet, qua Solem orientem spectat in Athesis fluminis littore: qua verò ad occidentem in amœnissimis Benaci oris. Ab Austro deinde campestre quendam planitiem, & ab Aquilone alios alpium montes contingit. E cuius summo iugo magna cum lustrantium voluptate atque admiratione à sinistra parte furibundum spectatur flumen, quod à praruptis & altissimis scopulis erumpens, per angustum admodum, & anfractuosum iter rapidissimo cursu descendit ad valles. Ex aduerso autem latere humiliores visuntur colles, & ferulissimæ quoque valle culae, quas maxima campestris antecedit planities, spaciola admodum, æqualis, inculta tamen & nulla arbore impedita, adeo ut planè mare latum representet. Huius secundum latus Athesis flexuoso itinere permeat, qui quamuis magnus sit fluuius, ob distantiam tamen è summo montis vertice prospicientibus paruus riuus apparet, & in ciuitatem ingredi cernitur. Visitur & Ciuitas ipsa Veronæ, adeo, ut eius situs, forma, ædificia, ambitus totus, ac quæque eiudem partes distinctè ac particulatim internosci queant. Quod si contigerit cælum perspicua serenitate clarescere, vniuersa agri Veronenfis planities libere perspicui potest. Visuntur quoque vicinæ vrbes, & oppida, quæ aded lucidè insipientium oculis apparent, ac si Belgici pictoris penicillo, omni cum arte, ac venustate, aliqua in tabella, aut potius linteo depicta spectarentur. Ab altera verò parte Benacus occurrit Lacus, qui quamuis sex milia passuum distet, aded tamen vicinus, ob culminis altitudinem videtur, ut si quis velocissimo cursu, minime sibi temperans deorsum contenderet, existeret quidem, veritus ne in eum collabaturus irrueret. Spectantur hinc circum lacum ipsum horridi admodum, ac inaccessi montes, saxæque crepidines, ac rupes, scopuli eminentissimi ac nudi: propius verò non procul à littore amœnissimæ videntur oræ oleis, & myrtis refertæ: quin & viuentes colles odoratis, ac densis admodum lauris vestiti. Pagi quoque multi, atque oppida. Insulae, Peninsulae, navigationes, piscationes, vnde iamiam placidissimæ, mox in altum elata: littora fremere, navigantes ad portus properare ex ipso montis inge cernuntur. Præterea, quod fortasse nonnullis mirum videbitur, sereno in montis cacumine existente Cælo, paulò tamen inferius densissimis nubibus obscuro, non solum tonitrua horrenda, coruscationesque quandoque fiunt, sed & grandines, & pluuia impetuosa admodum bombo, in

bo, in ipsum decidunt lacum, non sine magna nauigantium iactura. Quæ quidem omnia tam pulcherrima, admiranda, delectabiliaq; spectacula faciunt, ut præ stupore nonnulli veluti attoniti fiant. Quenadmodum enim nullus spectantium oculus horum prospectu satiari potest, ita nec lingua reperiri, quæ omnia rectè narrare ac exprimere posset. In ipso autem monte tanta est locorum, & rerum varietas, quod prorsus longum foret omnia ex ordine recensere. Sunt enim valles ex puro saxo non paruas, acclines, decliuesq; scopulosæ, atq; admodum squallidæ: è contra verò spaciosissima, amplissimaq; pratorum pascua, numerosa herbarum, & florum varietate referta, & ex his quidem plana quedam, atq; umbrosa, quedam declinua atq; aprica. Extant etiam amplissimorum fontium frequentes, ac limpidissimæ scaturigines, non solum in imis montis ipsius locis, sed in medijs, atq; etiam in summis eiusdem iugis, è quibus tam copiose emanant aquæ, ut earum potu numerosæ pecudum greges satis superq; satiari queant: ad quorum scaturiginum fontes non gregarij pastores modo, & syluani homines, verum & qui conquirendis plantis insudant, expositis in gramine cibus, sese refocillare solent, paucis adiunctis obsonijs. Prætereo, ne longior sim, frondosas, ac densas sagorum, quercuum atq; ilicium syluas, quin etiam quasdã castaniferis tantum arboribus stipatas, atq; nonnullas, in quibus syluestres proueniunt pinus, atq; excelssimæ abietes atq; larices. Cæterum quid dicã de aeris, cæliq; varietate? Mira profecto. Siquidem qui montem circumquaq; perlustrant, breuibus etiam interuallis, magnã aeris inæqualitatē experiuntur, aded, ut pleriq; non modo regionem, sed clima se mutasse opinentur. quod hæc quidē pars exorienti Soli, illa verò Occidēti aduersa fuerit: quedam, quæ Sole torreatur, alia quæ umbras perpetuas habeat. Hic niuib; ac glacie perpetuis estare tota alget locus, ibi verò estus est magnus. Alijs verò quibusdã in partibus, omni ferè anni tempore vernalis quædã adest temperies; qua quidē locorum ac situum diuersitate, fit quidem q; tanta etiam plantarum varietas in hoc mote proueniat, quanta vsquam in Italia tota reperitur. Distant igitur à Verona huiusce admirabilis montis radices viginti milibus passuum: ab his verò imis ad summam, quinque aut sex milibus. Discedendo itaq; Verona ad montem Baldum, statim extra urbem iter est per campestrem, latissimamq; planitiem, vbi copiose virescunt.

Tithymalus { Characias.
Paralus.
Helioscopius.
Cyparissias.

Pityusa.

Sed paulò vterius reperiuntur.

Paliuri genera plura, quorundam opinione descripta.

Blattaria.

Cotinus Plinij Rosola, vulgo dicta.

Geranium multorum generum.

Eryngium.

Lupinus domesticus & syluestri.

Anchuse tria genera.

Millegrana ab aliquibus Epipactis dicta.

Securidaca.

Dipsacus.

Attractylis.

Rubea.

Tlasi multorum generum.

Plantago aquatica.

Sium.

Glaucium.

Sisymbrium aquaticum duplex.

Xiphium.

Ocimoides.

Interca

Interea peruenitur ad pagum quendam, qui distat ab vrbe quinq; milia passuum super dextra Athesis parte in campestris planitie latere positus: cuius nomen multis innotuit gentibus. & præsertim Transalpinis militibus, qui è Germania profecti in Galliam Cisalpinam contendunt. Buxolengus ei nomen est ita à viuo colle appellatus, qui totus Buxo arbore vestitur. hinc itaq; vltorius proficiscendo, quæ sequuntur hic plantæ reperiuntur.

Botrys.
Hypecoum Matth.
Amellus Vergilij.
Alisma.
Acanthus.
Eriothodanum maius & minus.
Astragalus.
Terebinthus.
Abrotonum album.
Mahaleb.
Helichrysum.
Flammula Iouis.
Onofina.
Berberus vulgaris.
Holostium.
Rhamnus tertius.

Spergula. i. Apparine.
Trageponum flore purpureo, & luteo.
Bellis maior & minor.
Anthemis flore albo, & rubro.
Adonis Matthioli.
Cotula fetida.
Aparine.
Gallium flore albo & luteo.
Alyssum quorundam.
Althea.
Colchicum.
Pseudomyagrum.
Lagopus.
Aegyplos.
Polium alterum.
Lycium.

Hinc peruenitur ad quandam meam possessionunculam, quæ Riuele (quasi Ripa) nostra vulgari lingua vocatur, vbi fuit antiquitus in summo colle Arx loci natura tunc temporis munitissima, de qua in historia Veronenfi frequens fit mentio, cuiusq; adhuc diruta visuntur vestigia, atq; ruina. Hic quoq; suos habet fines vallis Lagarina, qua iter est, quo Tridentum, & in Germaniam itur. Ad hanc usq; Arcem creditur Athesim olim peruenisse, antequam fauces illæ montis hominū industria diducerentur, quæ la Chiufa vulgo dicuntur. Quoniam autem merces ratibus per Athesim allata, ad hanc usq; arcem, ad ripam tanquam in portum conuehebantur, facile locus hic Ripæ nomen adinuenit, vnde nos Riuele corrupta appellatione vulgari idiomate appellamus.

Hinc per quandam vallem iter dirigitur, frugiferis campis, & pratis, atque gelidissimis fontibus, vtilissimisque refertissimam, in qua, in ipso itinere inueniuntur stirpes non pauca; quæ hæc sunt.

Pulsatilla Matthioli.
Ligustrum.
Reseda Plinij.
Polygala.
Dryopteris.
Polypodium.
Tribulus terrestris.
Amellus.
Vincetoxicum, seu Asclepias, vt quidā
Alliaria.

(volunt.

Psyllium folijs Coronopi.
Polemonia.
Olyra.
Lupinus sylvestris.
Chondrilla.
Digitalis lutea, & purpurea.
Cacalia.
Centaurea media.
Ageratum.
Aristolochia vtraque.

Galiopsis.
Eupatorium Diosc.
Oenanthe. i. Filipendula.
Euphrasia.
Heliotropium maius.
Ballote.
Populus virag.
Alnus.
Periclymenum.
Chamaepitys.
Hermodactylus Mes.

Stachys.
Lunaria odorata.
Draba.
Atriplex sativa & sylvestris.
Iberis.
Crocus sylvestris.
Fruentum Saracen. Matthioli.
Thymra.
Elleborus niger.
Daphnois.
Bryonia.

In postremo huiusce vallis loco, pagus est Caprini, vbi ab imo Baldus mons incipit attolli. Quo in loco opus est in montem ascensurus, sibi com meatum comparare, nisi eum secum è Verona tulerint, quinetiam de vestimentis sibi providere, ad sustinendum si opus fuerit die quidem imbrem & ventos, nocte verò frigus: vltius enim pagi non sunt, vbi necessaria nasci possint, sed tantum pastorum tuguria & sylvanorum hominum case. quam ob causam non esset ab re etiam iumenta habere, quæ tentorium militare, & alia utensilia deferrent. Ceterum transmissio Caprini pago, hæc in propinquis locis reperiuntur.

Viola arborescens.
Scabiosa.
Morsus diaboli.
Consolida Regalis.
Viola alba Theophr.
Oxys.
Anagallis viraque.
Iaccea nigra.
Sideritis Avillea.
Mitridatica.

Alectorolophos. seu cristæ galli.
Pes asferimus.
Xanthium.
Symphytum maius.
Alopecuros.
Delphinium. i. flos Regius maior & minor.
Dictamnium album.
Flos Solis Matthioli.
Anthyllis.

In ipso autem ascensus initio, inuenitur Corone templum Deiparæ virginis dicatum: magnæ sanè religionis, ac nō minus loci ferè inaccessibleis natura, mirabile, quod in quibuscunque festis diebus D. Mariæ virgini consecratis, ac sollemnibus, magna admodum hominum confluit multitudo. Cæterum cōfluentibus transeundum primum est ab vnus montis iugo in alterum per longum admodum subliceum pontem: deinde verò ascendendum accliu admodum calle, adeoque angusto, vt vix singuli commodè incedere valeant, quo sæpe fit vt obuijs factis vix locus ad transitum super sit. Ab ipsa solummodo natura angustus iste transitus factus est in montis ipsius latere in marmore, quod vtrinque instar parietum ad perpēdiculum excurrit. A calle verò ipso ad summum montis fastigium tantæ altitudinis ipsum est latus, vt vix telum validissimo arcu excussum summum locum attingat: ab eodē verò ad imum, quingenti aut fortasse plures intercedunt passus. At quod iter hoc spectantibus terribilius est, proficilcentibusq; laboriosius, tātō magis ad ascensum inuitat animi voluntas videnti ac perlustrandi tā solitarie religionis Fanū: & quoniā in calle ipso nascuntur.

Saxifraga maior Matthioli.

Daucus Creticus.

Corydalis splis

quibus-

quibusdam dicta, atque etiam pyrethrum, non frustra iter illud perficitur. A
coronæ deinde templo recedendo multæ sese offerunt stirpes. nempe.

<i>Palma Christi diuersarum generum.</i>	<i>Spina alba.</i>
<i>Chamaleon albus.</i>	<i>Virga aurea.</i>
<i>Gratia Dei.</i>	<i>Batrachium Apulegij.</i>
<i>Conyca omne genus.</i>	<i>Gingidium.</i>
<i>Seseli Aethiopicum.</i>	<i>Elatine.</i>
<i>Myrrhis.</i>	<i>Pityne Theophr.</i>
<i>Cicuta.</i>	<i>Auricula muris.</i>
<i>Perfoliata.</i>	<i>Triticum vaccinum.</i>
<i>Aiſon multorum generum.</i>	<i>Seseli Creticum.</i>
<i>Phalaris.</i>	<i>Lamium Plinij.</i>
<i>Oxylapathum.</i>	<i>Hastula regia flore albo.</i>
<i>Sejanum.</i>	<i>Hornithogalum.</i>
<i>Rhus.</i>	<i>Phyllirea.</i>
<i>Castanea.</i>	<i>Verbasci plura genera.</i>
<i>Oxyacantha magna.</i>	<i>Ophioglosson.</i>
<i>Thalictrum.</i>	<i>Sannicula Diapensia.</i>
<i>Caryophyllata montana Matthioli.</i>	<i>Sanguisorba.</i>
<i>Bisforta.</i>	<i>Arum minus.</i>
<i>Egipytos.</i>	<i>Seseli Peloponense.</i>
<i>Campanula Fuchsi.</i>	<i>Phalangium copiosum.</i>
<i>Pecten Veneris.</i>	<i>Cardiaca.</i>
<i>Pes asserinus.</i>	<i>Eruca.</i>
<i>Centaurium minus.</i>	<i>Clymenum Plinij.</i>
<i>Epimedium.</i>	<i>Tilia.</i>
<i>Clymenum Matth.</i>	

Post Coronam haberi potest hospitium in pago Ferrario, à quo parum inui-
cem absunt Prabazarius, Maon atq; Nouetia loca sanè cæteris altiorib⁹ cultio-
ra, atq; mitiora. Hinc item ascenditur in latissima ac vberima prata, fontibus
pulcherrimis referta; vbi numerosæ, ac magnæ ouium, & armentorum greges
aluntur, à Maio mense in Septembrem vsq; Hæc inter spacia nascuntur.

<i>Peplus.</i>	<i>Bellis ceruleus.</i>
<i>Norminum sylvestre.</i>	<i>Hyoscyamus albus.</i>
<i>Trinitas.</i>	<i>Phuparum.</i>
<i>Aconitum Pardalianches quorundam.</i>	<i>Sagitta Matthioli.</i>
<i>Solanum maius, seu Bella donna.</i>	<i>Onobrichis.</i>
<i>Afarum.</i>	<i>Lonchitis aspera.</i>
<i>Crocus martius.</i>	<i>Sferra cauallo.</i>
<i>Polygonatum angustifolium.</i>	<i>Seseli peloponense.</i>
<i>Prunella, i. consolida minor.</i>	<i>Hastula regia flore luteo.</i>
<i>Erysimum.</i>	<i>Primula veris.</i>
<i>Picris maior & minor.</i>	<i>Ambrosia duorum generum.</i>
<i>Orchis multorum generum.</i>	<i>Amellus.</i>
<i>Antirrhinum duarum specierum.</i>	<i>Allium anguinum Matth.</i>
<i>Tussillago duorum generum.</i>	

Sss 4

Per

Per hæc itaq; prata proficiscentes in Atilonem perueniunt, vbi à dextra val-
lis est ingens, quæ à summo ferè montis iugo vsque ad Athesim profundissima
permeat in qua imbrium aque, atq; fontium circum scaturientium excurrunt:
Quæ quidè vallis à loco superius citato, vernacula lingua, La valle de Artillon
nuncupatur. Hæc itaq; ab his qui plantarum cognitione delectantur cōmemo-
randa, ac celebranda fuerit, q̃ in ea cōplura præstantissimarum plantarū gene-
ra abundè proueniant, quæ nō dixerim in Italia solùm, sed fortasse in vniuersa
Europa vix reperirentur. Equidè ego hoc profectò asserere possum, me hæc in
vallem non venisse vnquam, quin non aliquam pulcherrimam; nec antea vi-
sam repererim plantam: Hic autè etsi plura plantarum genera ex iam cōmemo-
ratis nascentur, earū tamen, ne prolixior sim, haud iterū meminero, verū de
his tantum sermonem faciam, de quibus hæcenus non scripseram. Et sunt hæc.

Scordonia.

Pilosella. { *Maior.*
 Minor.
 Media.

Phu minimum.

Gnaphalium.

Semperuium vtrunque.

Pulmonaria.

Nardus Celtica.

Sideritis prima.

Rubus Idæus.

Onagra.

Solidago Saracenica.

Bifolium.

Petasites quorundam.

Sannicula Cordi.

Digitalis.

Virga sanguinea.

Arbutus.

Clematis altera.

Senetium minus.

Senetium minus.

Sambucus racemosa.

Sorbus torminalis.

Sorbus syluestris Matth.

Aconitorum diuersa genera.

Chrysanthemum flore albo.

Noli me tangere.

Titthymalus maior.

Angelica.

Napellus flore albo.

Cirsium.

Vua visina.

Filix viraque.

Tilia arbor.

Clynopodium.

Erica viraque.

Meum.

Viola lutea.

Panax Chironium.

Saxifragia alba.

Diapensia.

Tormentilla.

Taxus arbor.

Arisarum.

Cyclaminus duorum generum.

Phyllirea.

Myrtillus Matthioli.

Chamaecerasus.

Tora.

Nardus montana.

Tragium Germanicum siue vuluaria.

Cyanus matus, & minus.

Dryopteris.

Satureia.

Muscus terrestris.

Herba paris.

Combreum Plinij.

Daucus cretensis.

Elychnis syluestris.

Campanula cerulea.

Hysopus Montana.

Costum amarum vulgare.

Rhylon.

Anti-

tra val-
dissima
arunt:
rtillon
nemo-
i gene-
nuerfa
hac in
ite vi-
nemo-
um de
nt ha.

Antitor.
Lunaria racemosa.
Betonica.
Viola marianna.
Orobanchemag.
Lucciola.
Gentianula flore purpureo.
Luparis, aconiti species.

Napellus veriformis.
Sigillum Salomonis.
Carum.
Genista alpina.
Dentaria.
Martagum.
Fragaria.
Lampfana.

In superiori huiusce vallis parte quædam pastorum sunt tuguria, vbi Veronensis agri & Tridentini fines habentur, à quibus nō longè abest Sylua ingens resiniferarū arborum, Tiliæ, Betulæ, Carpini, Anagyris vtriusq; Aquifolij atq; aliarum arborum, refertissima, in qua Monticolæ, ac Syluani homines resinam ferè omne genus, nempe Larignam, Pineam, Abiegnam, Piceamq; colligunt, quin etiam, & è Larice Agaricum. Circum hæc pastorum atregias prata similiter habentur, in quibus album Veratrum, albusq; Chamæleon, Calamintha montana, Gentiana, & Napelli genera omnia abunde proueniunt.

Dum autem hinc ad summum montis iugum ascenditur, reperitur longo satis spacio Silermontanum, & Sesei Peloponense. Cuius radices impostores quidā legitimi costi vice suis in Theriacis vsurpare voluerunt. Hic vera reperitur Cistus atque Hypocistis. A dextra relinquuntur altissima, atq; asperissima montis summitates quæ ab Vr̄sis, Lupis, Syluestribus capris & id genus feris quadrupedib. frequentatur. Quibus in locis inter durissimos lapides enascuntur tria illa plantatum genera, de quibus quoq; superius meminimus. Nempe Montana, & Celtica nardus, atq; Cretensis daucus.

Hinc haud longè Mons distat, quem maiorem appellant, quod cætera Baldi montis fastigia excellat. in cuius summa parte planities est herbosa, nec omnino inæqualis, è qua amplissima spectatur regio. pagis & oppidis numerosis referta. Mantuam, Ferrariam ac etiam Patauiam vsque sese diffundens: Ex altera verò parte omnes citra, vltraq; Benacum oræ, à Ripæ Tridentinæ oppido, vbi Benacus ipse Lacus initia sumit, ad Pischeriam vsq; vbi ad exorientem Mintium fluuium terminatur, oculis subiectæ sunt: quæ quidem amœnitatē, venustate, pulchritudine, omnq; deliciarum genere adeo nitent, vt nihil delectabilius inueniri possit. Ibi enim ferè vbiq; viridaria habentur, in quibus Armenica mala, Aurantia, Limonia, & quæ Adami poma vulgus appellat, perpetua fronde virent. adè vt toto ferè anno perpetuo vere fruantur accolæ, cum non solum odoratissimis floribus, sed fructibus, hæ præciosissima arbores onusta perpetuo ferè spectentur. Hic secus itinera sepes vbiq; ferè sunt ex Lauris artificiosissime concinnatæ, nullo ramusculorum discrimine. Nec hoc mirum videri debet, cum Laurus frequentissima in collibus, & nemoribus sua sponte proueniat. cæterum & illud quoq; omnem superat admirationem, odor, nempe suauissimus, qui afflatu quodam mirabili ab Aurantiorum & Myrti floribus spirat. Si quidem hæc Hesperidum plantæ absq; multa cultorum opera in agris & collibus propagantur, & in eam se attollunt proceritatem, qua alijs in locis, & Salices, & Vlmi prouenire solent. De viridarium horum prouentu ac vbertate, vix quispiam crediderit, quippe ex vno tantum terræ ingero Medicorum

tum Malorū confito, centum, & quinquaginta, & quandoq; plures ducatos coloniarum annuatim recipiunt. Succurrit nunc dum de his verba facio, me pluries non sine admiratione obseruasse in hoc ipso agro viniferas vites, numerosis admodum oleis ipsisque pulcherrimis, & speciosis, adalligatas, & sub ipsis copiosas crescere segetes. aded vt vno tantum agro, frumentum, oleum, & vinum recipiant. Hic fontes multiplices inspicias crysalli instar limpidos, & riuulos labentes, qui per pagos illos grato murmure excurrunt; propè quos adificia magni sane vsus erecta sunt tum ad frumenta molenda, oleum exprimendum chartamque parandam, tum ad ferrum excoquendum. & malleis ducendum effigandumque, cuius metalla his in locis copiosa habentur, atque, vt vno verbo dicam, ora Benaci lacus, quantulacunque sit, cæteras Cisalpinæ Galliæ oras amœnitate, prouentu, pulchritudine, ac omni deliciarum genere facile antecellit: Sed hæc obiter dicta velim, vt plantarum cognoscendarum studiosos, qui ad montem Baldum videndum proficiscuntur, ad hanc quoque fertilissimam, amœnissimamque oram inuisendam inuitarem. Quod si fecerint, non solum magna cum voluptate dies noctesque transigere poterunt, sed prompta illis erit occasio tres singulares videndi plantas. Etenim in Turri vallecula, citralacum posita Mandragoram copiosam inuenient: Ad Diuum verò Vigiliatum montem habebunt, cuius totum latus Rhododendris stipatum cernitur, floribus tum albis, tum rubris, admodumque speciosis. Quin etiam in minoritarum monachorum insula, floridam, ac pulcherrimam videbunt Palmam, quæ quidem hac in nostra regione arbor spectata rara admodum est. Sed vt iam ad rem propositam redeamus. In ipso itaque monte maiori, de quo dicebamus nascuntur.

Lunaria racemosa.
Pseudo doricum.
Sannicula varia species.
Leontopodium Matthioli.
Geranium argenteum.
Alchimilla argentea.
Polium primum.
Orobanchæ valde magnum.
Auricula muris.
Calamintha.
Aquileia fusca.

Cynocrambe.
Cnicorum Matthioli.
Picea sylvestris ab incolis appellata.
Mugbus Matthioli.
Pinus sylvestris montanus.
Lampiana.
Fabaria.
Scorpioides.
Lunaria Græca.
Chamelea.
Thymelea.

Propè montem ipsum maiorem vallis est de ossibus dicta, eam (vt puto) ob causam, quod in altera propinqua vallecula circum theatri instar, omni ex latere, lapides complurimi excelsi ac perforati extent, ac promineant, quæ humanæ caluariæ speciem, ac cætera ossium genera representent. cur autem lapides hi excuati, attriti que videantur, aliunde provenire non crediderim, quàm ab ingentibus frigoribus. Siquidem locus is rarè à solis radijs incalescit. Nam cum hic essem Iulio mense ardente iam Syrio, & niues, & glaciem copiosam inueni. Hic circumquaque copiosa est.

Iberis.

tatos co-
e pluries
merosis
pfs co-
e vinum
riuulos
edificia
endum
endum
no ver-
allia o-
cilè an-
diosos,
artilissi-
nt, non
rompta
ula, ci-
Vigili-
nitur,
minori-
ulmam,
Sed vt
o dice-

ro) ob
i ex la-
huma-
api des
iam ab
m cum
nueni.

Iberis.

Iberis.
Ilex.
Filipendula duplex.
Mentha vtraque.
Menthastrum.
Solanum maius. i. herba bella donna.
Eptaphyllum.
Aparine.
Simphytum petraum.
Acacalis.
Anyllis.
Anemones multorum generum.
Chondrilla multiplex.
Hedera terrestris.

Carduus vulgaris.
Libanotis.
Verbenaca.
Apocynum.
Pistolocchia, i. Capnos magna.
Sphondilium.
Serpyllum vtrunque.
Panax Heracleum.
Collutea.
Pent. phyllum album.
Vmbilicus Veneris alter.
Phyteuma Matthioli.
Sambucus montana.

Paulò vltra ossium vallem in ipso primo descensu, per vniuersum ferè latus, cui vallis vaecaria nomen est, pratorum spacia sunt, minutissimarum herbarum tam plena varietate, vt subnigricantem ferè colorem repræsentent, mira interim florum emergente varietate: quæ quidem nullo cespite aut lapide impedita adeo firmæ, vegeta q̃, assurgunt, vt quamuis die tota à pecudibus depascantur, resumentes noctu quicquid diu deperdiderunt, primo statim mane florentes, & prorsus intactæ sese ostendunt, nullo erosionis vestigio apparente adeò, vt longè magis valeant, ac adolescant, quàm quæ in hortis, sepibus & muris obductæ diligenter excoluntur. In his itaq; locis pululant, ac florescunt.

Artherica.
Galiopsis.
Caryophyllata montana Matth.
Gentiana.
Thapsia.
Peucedanum.
Nerium alpinum.
Potamogetum.

Ferula.
Anonis.
Carduus lacteus.
Herba gattaria.
Gramen Parnasi.
Ageratum.
Piarmica.
Paonia.

Medijs huic pratorum spacijs locus est paruus, ac planus, montis lateribus, ne scio an ab arte, aut natura excisis in semicirculi modum. Ibi interiori, ac superiori parùm loco ex ipso viuo saxo, aqua clarissima prorumpit, quæ non sine grato murmure in planitiem delabens, magnum, ac nitidissimum alueatum conficit fontem. quæ verò super defluunt aquæ à summis fontis ipsius labris exigua planitiem illam circum eunt ac deinde diuersos in riuulos diuisæ, per virentes defluunt herbas. Pastores hunc fontem Brigaldellum vocant. Insignis quidem, ac celeberrimi nominis fons hic est, tum ob aquarum scaturientium vbertatem, tum quòd potu omnium opinione cæterorum fontium saluberrimus habeatur: qua propter quoscunque in ipsum aduenientes montem, itinere defatigatos suo murmure ad se inuitat, & ad gratissimas umbras circumstantes allicit. Circum huiusce fontis riuulos Imperatoria copiosa prouenit, & aliæ quoque plantæ. Cæterùm haud longè à vaecaria valle adiacet Ime, seu vallis Bassiana, vbi proueniunt.

Abutilon.

Abutilon.
Cruciata.
Barba capra.
Aconitum luteum roseo flore.
Radix rhodia.
Capnus.

Rubea sativa.
Iacca.
Alisma.
Cirsium.
Centaurium magnum copiosum.

Post vallem Bassianam vallis frigida paulò inferius est. In quibus vallibus præta iridem habentur. verùm non adeo pulchra, lataq; vt in valle vaccaria. Cur autem ita vocentur hæc valles, quid asseram non habeo. Scio tamen in frigida ipsa valle prouenire hæc, quæ sequuntur simplicia.

Polygonatum angustifolium.
Clymenum Pliny.
Eritrodanum.
Elaphosbolium.
E. hium.
Genista Germanica.
Chelidonium minus.
Cirsium.

Daphnois.
Chamaelea.
Coronopus serpinus Marth.
Hypericum.
Ascyrum.
Androsenum.
Cori.

Ad hæc vsque loca non vulgares illæ reperiuntur plantæ, de quibus superius hæcenus meminimus, nec reliquum est, vt de iisdem vterius sermonem faciamus. Qui verè in montem veniunt, & si redeant Veronam aut eodem, quo venerunt itinere, aut alia, qua velint via, plura tamen simplicia, quæ vsui aliquo esse possint, quàm quæ à nobis conscripta sunt, profectò non inuenient: quare de itinere redeundi, nihil mihi scribendum fuit, ne verbosius quàm par sit, historiam hanc prosequi videar. Brevitati ergo indulgens, vt ab initio mihi proposui de reversionis itinere nil aliud scribam, quàm quod poterit vnusquisque pro suo arbitrio vel hunc vel illum tramitem sibi deligere. Cæterum ego quidem breuem hunc plantarum libellum, in Baldo monte, nascentium, scripsisse volui, vt nonnullorum precibus obtemperarem, atq; etiam in publicum vsum edere. quem si quis legere, & secum habere nò dedignabitur, is quidem per se ad stirpes sibi comparandas in montem ipsum ascendere poterit: indeque simplicia fere omnia asportare, quæ in communem pharmacopæorum vsum esse debent, eaq; præsertim quæ non vbiq; reperiuntur. Quandoquidem noster iste Mons, nò secus ac pulcherrimus hortus in quæ coloni ex diuersis regionibus còplurimas raras attulerint plantas, sua sponte refertissimus, fecundissimusq; habetur. Poterit quoq; meum hoc opusculum non solum his, qui medicæ materiæ dant operam, quiq; medicam facultatem profitentur, sed & quibuscunque qui rem plantariam excolunt, esse non solum vtile, sed etiam iucundum. Nam perceptis prius apud Dioscoridem plantarum historijs, notis, ac saporibus, atq; amplius ex doctissimis, refertissimisque Matthioli commentarijs, ac ex nouo eiusdem plantarum compendio, in quo pariter extant plantarum icones ad viuum expressæ, quod secum quocunque venerint deferre poterunt: quin etiam si contigerit ibi esse quenquam plantas conquirentem, vbi non vna, sed cuiuscunque generis sexcentæ vel plures breui etiam spacio conspiciuntur.

1019.
spiciuntur, poterit proculdubio sponte, & per se se illas iam instructus inuenire, atque cognoscere. Similiter quandocumque alicui studiosorum aliorumve bonorum virorum comitatu, aut animi refocillandi gratia, aut speciosa, raræque alicuius plantæ visendæ desiderio in suo natali solo, ad hæc amœna loca se conferre libuerit, id illis vnus huiusce nostræ admonitionis auxilio, factu facile futurum spero. vbi forte perito, atque exercitato duce carerent. Neque (vt ego reor) eos suscepti laboris pœnitebit, cum senserint, atque nouerint non modò delectationem ferè incredibilem, sed maximam inde se percepisse vtilitatem. Tantam enim re vera, animi tranquillitatem latitiamque ex hoc itinere percipient, quantam mente concipere, aut verbis exprimere nemo vnquam possit. Cuius rei fidem facere possent Clariss. ac Reuerendiss. Antistes Hieronymus Lipomanus, Franciscus Ianuarius, Iacobus Moschaleus. ambo non solum nobilitate clari, sed benignissimi quoque, & mei amantissimi. quin etiam Excellentiss. Fumanellus & Gerrinonus acerrimus simplicium indagator, ac nobilissimi Veronensium complurimi, & aliarum Civitatum Proceres illustresque viri, rei plantariæ studiosi, qui solitarios hos tractus peragantes, tantum delectationis, & voluptatis capiunt, vt ad vitales spiritus exhilarandos, & ad animum vel curis, vel studijs, lacessitum subleuandum, potiore locum non inuenientes, istuc quotannis summa cum iucunditate sese conferunt. Inuiferunt quoque mecum, ac perlustrarunt vniuersum hunc montem Ioannes Baptista Oliuus Cremonensis, & Nocerus Pontremolensis, medici excellentissimi & non simplicium modo, sed compositorum quoque medicamentorum admodum studiosi. Cæterum vt iam finem dicendi faciam, qui, rariores, præciosioresque expetunt plantas, quàm, quæ in Baldo monte proueniunt, ij in Cretam, Cyprum, Syriam, Egyptum, atque orientalem Indiam nauigare poterunt, vt superioribus annis faciebat honestissimus Cecchinus Martinellus Venetjs pharmacopæus in Angeli officina, vir quidem apprimè medicæ materiæ peritus, nec vnquam satis laudatus. Id, quod ego quoque facerem, si per illum in quo nunc sum vitæ statum, liceret.

FINIS.

CATALOGVS PLANTARVM QVAE IN HAC EPITOME CONTINENTVR.

A.

A Bies	43. 49	Agaricum	413	Anchusa	734
Abrotonum mas	459	Ageratum	795	Anchusa altera	735
femina	460	Ageratum minus	796	tertia	736
Abfinthium	452	Agnus castus	105	Androsamum	677
Abfinthium marinum	455	Agrimonia offic.	756	Androsaces	638
456		Atuga	679	Androsaces altera	639
Montanum	453	Albucum	371	Anemone	386
Ponticum	454	Alcea	669	Anemone II.	387
Scriphium	455. 457	Alchimilla	908. 909	III.	388
Scriphium vulgo dictum		Alisma	674	IIII.	389
458		Alliaria	589	V.	390
AEgyptium	457	Allium	328	Anemones diuersi flores	391
Santonicum	457	Allium anguinum, alpinum		Anetum	517
Abutilon	601. 668	329		Angelica	899
Acacia	103	Allium vrsinum	330	Angelica syluestris	900
Acacia altera	104	Alnus	68	Anguria	297
Acantium	435. 441	Aloe	450	Anijum	515
Acanthus	442	Aloe America	451	Anonis	443
Acer maior	63	Alfina	850. 851	Anjerina	758
Acetabulum	858	Althaea	667	Anibenis siue Chamamilla	
Acetosa	230. 231	Althaea altera, siue Abutilon	645	Anthyllus	680
Achillea	750	668		Antirrhinum	920
Acorum verum	5	Alypum	985	Antirrhinum II.	921
Acorum falsum	6	Alyssum	558	III.	922
Aconitū pardalianches	822	Amaracus	490	IIII.	923
Pardal. Theoph.	823	Amaracus tenuifolia	491	Antora, siue Antitora	837
Pardal. minus	824	Amarantus	791	838	
II. 827. III. hyemale		Amarantus cristatus	792	Aparine	557
828. IIII. 829. V. 830		Ambrosia	596	Aphace	319
VI. 831. VII. 832		Ambrosia altera	597	Apiastrum	574
VIII. 833. IX. 834		Ammi, Ameos Officin.	522	Apios	980
Acuta spina	85	Ampeloprasum	323	Apium hortense	526
Adiantum	924	Amygdale	169	Palustre	527
Adonis	647	Anagallis aquatica	396	Apocynum	841
Adonis flore pallido	648	femina	395	Apocynum repens	842
AEgylops, siue festuca	927	mas	394	Apollinaris herba	807
AEgylops altera	928	Anagyris.	671	Aquifolium	84
AEthiopsis	886	Anagyris altera	672		

INDEX PLANTARVM.

Aquileia, sue Aquilina 404	Avena sterilis 928	syneftris 233
405	Aurantia mala 150	Canina 998
Arabis 341.342	Auricula muris 408	Bryonia 987
Aracus 802	Vrſi 706	Bubonium 904
Arbor lude 140	B.	Bugloſſum 914
Arbutus 168		Bugloſſum vulgare 915
Argentaria petrea 909	Ballote 572	ſyneſtre 916
Ariſarum 369	Balfamina 989	Bulbocafтанum 609
Ariſarum alterum 370	Balfamina altera 990	Bulbus vomitorius 373
Ariſſolochia clematis, Sara- 312	Barbula hirci 312	Buphtalmum 651
cenica, tertia Plinij, longa 313	Barbula hirci II. 313	Buphtalmum flore purpu- 652
vulgaris 421	Bardana 887	reo 340
longa 420	Batifecula 288	Burſa paſtoris 101
quarta 422	Been rubrum 24	Buxus C.
rotunda 419	Bellis maior 653	
Armeniacae maiora 146	media, ſyluatica, monta- 654	Capa 324
minora 147	na 655	Capa Aſcalonia 327
Artemiſia 595	minor 656	ſiſilis 326
Arum 365	minima 656	ſectilis 325
Ariſſos 366	Bellidus ſpecies 656	Calamintha 481
Arum minus 367	Berberus vulgaris, ſine Cre- 86	Calamintha aquatica 483
Arundo 72	ſpinus 255	montana 482
Arundo paluſtris 73	Beta 256	Calamus odoratus 30
Aſarum 19	Beta rubra 681	Caltha, calendula offic. 918
Aſarina 20	Betonica 69	Caltha paluſtris 594
Aſcyrum 676	Betula 683	Cannabis 670
Aſclepias 559	Biſſorta 684	Canna Indica 731
Aſparagus 259	Biſſorta minor, alpina 885	Capillus veneris 924
Aſparagus ſyneſtris 260	Blattaria 234	Caput canis, vituli 920
Aſphodelus ſæmina 372	Blitum 236	Capparis 375
mas 371	Blitum album 235	Capparis ſyneſtris, ſabagi- 376
Aſplenium 640	rubrum minus 237	nea vel leguminoſa 11
Aſter Atticus 904.905.906	ſyneſtre 598	Cardamomum 864
907	Botrys 643	Cardiacæ 445
Aſtrantia Alpina 533	Botrys, lunaria 368	Carduus D. Mariae 437
Attractylis 561	Bonus Henricus 914	Carduus non aculeatus 438
Arhanafia 650	Borrage 883	aculeatus 445
Atriplex 240	Brache cuculi 250	lacteus, & lactarius 562
Atriplex ſyneſtris I. 241	Brasica capitata 252	benedictus 509
II. 242	Cauliſſora, Cypria, Pom- 249	ſyneſtris 71
III. 243	peiana 248	Carota 63
marina 244	Criſpa, Sabellica 253	Carpinus 995
Auellana Indica 178	levis 253	Cartamum, Cnicus
Avena 191	marina.	Carum

1021

INDEX

Carum	516	Chameleon albus	428	phytum.	
Caryophyllata	725	niger	429.435	Consolida media	702
Caryophyllata palustris vel		niger alter	430	minor	703
aquatica	726	Chamaleuce	594	regalis	521
Caryophyllata montana	727	Chamamelon siue Chama-		saracenicæ, vide Virga au-	
Caryophylli	349	milla	645	rea.	
Caryophylli Indici	406	Chamamelū Romanum	646	Conyza	612
Caryophylli Indici minores		Chamapit hys	679.680	Conyza minor	613
407		Chameriphes, vide Palma		Conyza tertia	614
Caryophylli flores domestici		minor.		Conyza alia	615
350		Chelidonium maius	402	Conyza species aster	907
sylostres	351	minus	403	Corallina	871
Cassia poetica, Monspelien-		Cherua minor offic.	968	Coriandrum	523
sium	26	Chrysanthemon	793	Coris	678
solutiua	25	Chrysanthemon minus	794	Coris Monspelensium	699
Castanea	118	Cicer	204	Cornus	158
Castanea equina	119	Cicer sylvestre	205	Coronopus	276
Castangula	866	Cichorium	284	Coronopus sylvestris	277
Caucalis	305	Cichorium verrucarium	287	Cortusa	728
Caulorapum	251	Cicuta	839	Corydalis	892
Cauda equina offic.	770	Cirsium	903	Costus vulgaris	28
Cedrus	57	Cistus	94	Costi radices	27
Cedrus Phœnicia	58	Cistus femina	95	Cotinus	123
Lycia	59	Citra mala	148	Cotonea mala	142
Celtica nardus	13	Clematis	694	Cotonea maiora	143
Celtis siue Lotus	155	Clematis flore multiplici	695	Crasula purpurea	412
Centaurium maius	425	Clematis altera	696	Crespinus	86
minus	426	tertia	697	Crispula	340
luteum, perfoliatum, dia-		Clinopodium	563	Crithmum	272
phyllum	427	Clinopodium alterum	564	Crithmum II.	273
Cepœa	673	Clymenum	712	III.	274
Cerasa, siue Cerasia	137	Cnicus	995	III.	275
Cercis	140	Cochlearia	271	Crocodilium	435
Cerefolium	302	Coccum insectarium	773	Crocum	33
Cervaria, ceruicellum	513	Coccifera Ilex	774	Crocus sine flore	34
Cetrach vide Scolopendrium.		Colchicum	845.846	Cruciatæ	417
Chamacerasus	138	Colocasia	209	Cucioptera	129
Chamæcyparissus	460	Colocynthis	982	Cucumis longus	295
Chamadaphne	938	Colubrina	683	satius	294
Chamegelsimum	37	Colutea	540	sylvestris, asininus officin.	
Chameiris	4	Colutea scorpioides	541	946	
Chamedrys, Trissago	567	Condrilla	290	Cucurbita	292
Chamedrys altera	568	Condrilla altera	291	Cucurbita Indica	293
Chamalea	973	Consolida maior, vide Sym-		Cuminum sativum	518
				sylue-	

1023

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.257

INDEX

Gir. Melanthium	551	Herba pedicularis	947	Impia	606
Gladiolus	730	Herba Iudaica seu pagana		Intubus	282
Gladiolus Indicus	731	748		Intubus crispus	283
Glastum	409	Herbatorum Chimistarum	836	Intubus sylvestris	284. 285
Glycyrrhiza	423	Herba torminalis	606	Iphyum	372
Glycyrrhiza vulgaris	424	Herba paralyfis	883	Irio 343. Irio alter	344
Gnaphalium	605	Herba Trinitatis	912	Iris	1
Gnaphalium vulgare	606	Hermodactylus	847	Iris sylvestris maior	2
Gossypium	203	Hermodactylus offic. falsus	845	minor	3
Gramen	741	Herniaria, Herniola	690	Iris humilis	4
Gramen Manna	742	Hieracium	524	Isatis domestica	409
Gramen II. floridum	743	Hieracium minus	525	sylvestris	410
Parnasi	744	Hippoglossum	919	Iua muscata	587
Aculeatum	745	Hippolapathum	232	Iuncus	789
Grana Paradysi offic.	11	Hippoclinod vel leuistiu	529	Iuncus floridus	781
Gratiola, Gratia Dei	464	Hirculus	14	odoratus	29
H		Hirundinaria	559	Iuniperus	53
Halimolobos repens	814	Holostium, siue Holesium	707	Iuniperus maior	54
Halymus	83	Hordeum	188	K.	
Harmola	496	Horminum	628	Kali	246. 247
Hastula regia	371	Horminum sylvestris	629	L.	
Hedera	398	Hyacinthus	798	Labrum Veneris	43. 432
Hedera helix siue minor	399	Hyacinthus orientalis	800	Lactuca	293
Hedera terrestris	400. 401	Orientalis alter	801	Lactuca florens	299
Helenium	35	Tripolitanus	799	sylvestris	300
Helianthemum Peruvianum	503	Hydropiper	352	Ladanum siue Ledum	97
proliferum	504	Hyoscyamus	807	Lagopus	724
Helichrysum	787	Hyoscyamus albus	808	Lampiana	233
Helichrysum Italicum	788	tertius	809	Lantana vide Viburnum	
Creticum	789	Peruvianum	810	Lapathum	228
Heliotropium maius	1000	Hypocum	806	Lapathum rubrum Cretense	229
minus	1001	Hypericum	675	Lappa minor offic.	926
Helxine	849	Hypocistis	96	Larix	45. 46
Helxine dissampelos	753	Hysopum	463	Lathyrus	908
Hemerocallis	616	I.		Lauendula	18
Hemerocallis altera	617	Iacea	912	Laurus	60
Hemionitis	641	Iacea altera	913	Laurus Alexandrina	936
Hepatica montana	764	Isaminum	36	sylvestris	61
Heptaphyllum montanum	909	Iberis	184	Ledum	97
Heptaphyllum porphyranthe		Ilex	113	Lens	210
mon	762	latifolia	114	Lens minor	211
Herba cancri	340	coccifera	774	Lens palustris	852
Herba gattaria	484	Imperatoria	532	Lens palustris altera	853
Herba Paris	835	Imperatoria Alpina	533	Lentiscus	50

LEONTO-

PLANTARVM.

606	Leontopetalon	565	Lupini	216	Moldauica	576
282	Lepidium	377	sylvestres	217	Melongena	820
283	Lepidium Aegineta & Pli-	Lupulus	933	Mentha	477	
285	nij	378	Lupulus scemina	934	Mentha altera	478
372	Leucoium album & purpu-	Lychnis	569	Mentha Græca	480	
344	reum	619	Lycium Italicum	100	Menthastrium, siue mentha	
1	aureum	620	Lysimachia	686	sylvestris	479
2	Leuconarcissiflorion	957	Lysimachia altera	687	Mercurialis	99
3	Leuconarcissiflorion bifolium		N.		Mercurialis scemina	997
4	956	Magistrantia	532	Mespilus prima	153	
409	Lenificum vulgare	529	Mahaleb	91	vulgaris	154
410	Libanotis	544	Maiorana	490	Meum	7
587	Lichen	782	Mala	141	Milium	193
789	Ligusticum	505	Mala Armeniaca maiora si-		Milium Indicum	194
781	Ligusticum alterum	506	ue præcocia	146	Milium Solis	659
29	Ligustrum	89	minora	147	Millefolium maius	877
53	Lilionarcissus	955	Aurantia	150	Millefolium stratiotes	876
54	Lilionarcissus Bononiens.	958	Citria siue medica	148	Millegrana	690
	Lilium	570	Cotonea	142.143	Millemorbis	866
247	Lilium conuallium	618	Limonia	149	Moly	498
432	Linonia mala	149	Punica vulg. Granata	131	Momordica	989
293	Limonium	721	Infana	820	Morsus Diaboli	397
299	Limonium alterum	722	Malua	238	Morus	179
300	Linum	200	Malua arborea maior	mo-	Morofycus	180
97	sylvestre	201.202	scutos	239	Musa	127
724	Liquiricia	423	Malus Punica	130	Musa cum fructu	128
233	Lithospermum minus	659	Malum terre	419	Muscari	373
	Lithospermum sylvestre, ar-		Mandragoras	818	Muscus arboreus	31
228	uense vel nigrum	660	Mandragoras mas	819	Muscus marinus	871
229	Lolium	198	Marrubium	573	Muscus marinus alter	872
926	Lolium murinum	768	Martagon	571	Muscus terrestris	32
546	Lonchitis aspera maior	664	Marum	493	Mutelina	8
908	minor	665	Matricaria offic.	649	Myrica	74
18	Lonchitis aspera Marantha		Medica mala	148	Myriophyllum	896
60	666		Medium	729	Myriophyllum alterum	897
936	Lotus	155	Melanthium sativum	551	Myrrhis	898
61	Lotus Africana	157	sylvestre	552	Myrtillus	135
97	Vrbana	893	sylvestre alterum	553	Myrtus	132
210	sylvestris	894	Melegeta offic.	11	Myrtus Tarentina	133
211	Lunaria minor	755	Melilotus	492	exotica	134
852	Lunaria minor Chimiflarum		Melissa, Melissophyllum Meli-		N.	
853	642		tena	574	Napellus	836
50	Lunaria minor, botrytis	643	Melissa Molucca siue Cöstan-		Napus	222
	Luparia	827	tinopolitana	575	Nares vituli	920
					Tir 2	Narcissus

1025

INDEX

Narcissus I.	951	Onosma	633	Peplus	969
II. Flore pleno	952	Ophioglossum	364	Pepon	296
III. totus luteus	953	Ophris	943	Perfoliata	888
IIII. 954. V.	955	Opition Theophr.	957	Periclymenum	713
VI. 956. VII.	957	Opopanax	499	Periplocarepens	972
VIII.	958	Origanum	466	Perisca	144
Nardus Celtica 13. alia	14	Origanum. Monspeliensium		Periscaria rubra	145
Indica.	12.	468.		Periscaria	352
Italica.	17	Onitis	467	Periscaria altera	353
montana 15. alia	16	Vulgare	469	Personata	887
Nasturtium.	335	Orontium Archigenis.	923	Pes leonis	908
Natryx.	444	Oryza	192	Pes leporinus	724
Nerium, seu Rhododendrum.		Ornithogalum.	315	Petasites.	592
843.		Orobanche	311	Petasites flore albo	593
Nicotiana.	810	Osyris	930	Petroelinum vulgare siue	
Nigella.	551	Oxalis maior	230	Apium hortense.	526
Nuces auellana, pontica, seu.		minor.	231	Petroelinum Macedoni	528
prænestina.	177.	P.		Pencedanum.	550
Nux Indica	173	Peonia mas	657	Phalangium	580
Iuglans.	172	Peonia femina.	658	Phalaris.	661
Metella	175	Palma	124	Phasioli	212
Myristica	174	Palma Christi maior.	626	Phellodrys	117
Numularia.	755	minor.	627	Phenix	768
Nymphaea alba.	634	Palma humilis minor	125	Phyllirea	90
lutea 635. parua.	636	Panices Chironium	501	Phyllitis.	579
parua alia.	637	Panax Chiron. minus	502	Phyllum	621
O.		Panax Asclepium.	500	Phu 21. minus	22
Ocimastru Valerianthon 24.		Heracleum	499	Phu minimum	23
Ocimoides, siue Ocimastrum.		Panicum.	195	Phu peregrinum	24
739.		Panicum sylvestre.	196	Picea	47
Ocimoides flore pleno.	740	Papauer erraticum.	802	Pilosella	708
Ocimum.	308.	Satiuum.	803	Pilosella maior	709
Ocimum II.	309.	Multiplaci flore.	804	Pimpinella minor	776
III. minus.	310.	Corniculatum.	805	Pimpinella sanguisorba	777
Oenanthe.	609.	Parietaria offic.	849	Pimpinella sanguisorba ma-	
Oenanthe II. & III.	610.	Paronychia	785	ior.	778
III. aquatica, repēs.	611	Paronychia altera.	786	Pimpinella saxifraga	775
Olea domestica, sativa.	110	Parthenium	649	Pinus.	39
sylvestris.	109	Pastinaca domestica.	507	Pinus maritima primum ge-	
Oleaster	ibid.	Sylvestris	508	nus.	43
Oleaster Germanicus.	81	Pecten Veneris.	304	Secundum genus	44
Olusatrum.	530	Pelecinum	631	Pinus sylvestris montana	40
Ononis	443	Pepleos	376	Altera Mugo	41
Ononis lutea.	444	Peplia.	970	Tarentina, Cembro, &	
				Cermo-	

P L A N T A R V M.

1027

969	Cermelo	42	Pruna cerea pracocia & se-	Rapcaulis	251	
296	Piper	345	rotina	164	Rapunculus	221
888	Piper Aethiopicum	346	Prunella	703	Rapum	218
713	Indicum	347	Prunus	163	Rapum longum	219
972	Pistachia	170	Prunus sylvestris	165	sylvestre	220
144	Pistacia agrestia	171	Pseudoambrosia	596	Refta bonis	443
145	Pistolochia	422	Pseudoapios	981	Rhabarbarum	414
352	Pisum	213	Pseudocostus	28	Rhamnus	78
353	Pisum minus	214	Pseudodithamnium	474	Rhamnus II. 79. III. 80	
887	Pityusa	967	Pseudohelleborum	942	Rhamni species	81
908	Platanus	62	Pseudobermodactylus	848	Rhaphanus	223
724	Platanus Germanica	63	Pseudolotus	156	Rhaphanus longus	224
592	Plantago maior	261	Pseudomelanthium	554	Rhaphanus rusticus, mon-	
593	media	262	Pseudomyagrum	901.902	tanus	225
siue	longa	263	Pseudonardus	17	Rhodia radix	769
526	aquatica	264	Pseudonardus semina	18	Rhododendrum	843
528	Polemonij species	24	Pseudopyrethrum	543	Rhus	121
550	Polium	586	Pseudostachys	578	Rhus minimus Plinij	136
580	Polium alterum	587	Pseudoscomorus	181	Ribes vulgare	88
661	Poligala	929	Pseudostrobilium	356	Ricinus	959
212	Polygonum mas	688	Psyllium	811	Rosa	98
117	semina	689	Ptarmica	354	Rosa sylvestris	99
768	minus	690	Ptarmica altera	355	Rosmarinum	544
90	marinū & cocciferum	691	Pulegium	471	Rosmarinū coronarium	545
579	Polygonatum	692	Pulmonaria	783	sylvestre	546
621	Polygonatum vulgatum	693	Pulmonaria altera	784	sylvestre minus	547
22	Polypodium	993	Pulsatilla	392	Rubia sativa	662
23	Polyspermon	237	Pulsatilla lutea	393	sylvestris	663
24	Polytricum offi.	925	Pyra	152	Rubus	751
47	Poma Adami	151	Pyrethrum verum	542	Rubus idaeus	752
708	Amoris	821	Pyrethrum alterum, pseudo-		Rumex	228
709	Pontiana	810	pyrethrum	543	Ruscus	935
776	Populus alba	65	Pyrola	723	Ruta	494
777	nigra	66	Q.		Ruta capraria	497
a ma-	Lybica seu alpina	67	Quercus	111	Ruta sylvestris	495
778	Porrum	321	Quinquefolium	759	sylvestris Harmola	496
775	Porrum sectile	322	Quing. folium album	761	muraria	785
39	Portulaca domestica	257	minus	760	S.	
um ge-	sylvestris	258	palustre fragiferum	762	Sabina	55
43	Potamogeton	873	R.		Sabina sterilis	56
44	Potentilla	758	Radix Scythica	424	Sagitta	874
na 40	Poterium	440	Ranunculus	380	Sagitta maior	875
41	Primula veris	653.883	Ranunculus II. 381. III. 382		Salix	107
ro, &	Primula veris altera	884	III. 383. V. 384. VI. 385		Salix amerina	105
cermo-					Ttt 3	Puffila

INDEX

Puffilla, humilis, salicula	108	Semen sanctum	457	Solanum hortense	812
repens	108	Sempervivum seu Sedum ma-		haticacabum	813
Salicornia	247	ius 854. minus	855.	somniferum	815
Salvia 475. minor	476	minimum	856.	somniferum alterum	816
Sambucus	975	arborescens	857	maius	817
Sambucus aquatica	977	Sena	538	Soldanella vide Brassica ma-	
montana	976	Sena Alexandrina	539	rina.	
Sanguinaria	340	Senecio	869	Soldanella Alpina	254
Sanguis Draconis	229	Senecio maius	870	Sol Indicus	503
Sanguisorba	777-778	Serpentaria maior	359	Sonchus	278
Sannicula	763	Serpentaria minor	365	Sonchus levis	279
Sannicula alpina siue gutta-		Serpillum	488	levis 11.	280
ra	764	Serpillum alterum	489	flore caruleo	281
Sannicula altera	706	Serratula	682	Sorba	160
Sannicula quinq. folia	704	Sertula campana	492	Sorbus sylvestris vel aucupa-	
Satureia	486	Sesamoides parvum	944.945	lis	161
Satureia altera	487	Sesamum	197	terminalia	162
Satyrion basilicum, vide		Seseli Aethiopicum	512	Spartium	949
Palma Christi		Aethiopicum vulgare	513	Sparganium	732
Saxifraga	716	Mafiliense	510.511	Spatula fetida	733
Saxifraga II.	717	Peloponnense	514	Spherocephalus	435
III. 718. IIII.	719	Sferra cauallo	642	Sphondylium	548
magna 720. hircina	775	Sideritis	746	Spica Celtica	14
Scabiosa 710. minor	711	Sideritis secunda vulgaris	747	Spica Nardi	13
Scammonia	971	Siliqua Aegyptia	25	Spina alba	434. 435. 436
Scammonia Monspelienf.	972	Siliqua	139	Spina acuta	85
Scariola minor	284	Siliqua sylvestres	140	infectoria	82
Sclarea	630	Siliquastrum	140.347.348	Spinachium	245
Scolopendria offic. falso	579	Sinapi	332	Split	892
Scolopendrium	640	Sinapi alterum	333	Stachys	577
Scolymus	437	III.	334	Stachys agria	947
Scolymus sylvestris	439	Sifer	226	Staphylo dendron	171
Scordium	588	Sifer alterum	227	Stellaria	908
Scorpioides	1002	Sisymbrium hortense	267	Stellaria argentea	909
Scorodoprasum	331	sylvestre	268	Sternutamentaria	354
Scorconera Hispanica	314	aquaticum	269	Stoe. has	465
Scrophularia	866.867	aquaticum alterum	270	Stoechas citrina	790
Scylla	374	Sium verum	265	Stafusaria offic.	947
Sebestena	166	vulgare	266	Stramonium	175
Securidaca maior	631	Smilax aspera	931	Stratiotes millesolium	876
minor	632	hortensis	318	Strumarium	926
Securidaca quorundam	642	levis	932	Struthia mala	143
Sedum	854.855	Smyrnum	530	Styrax	38
Segale	190	Smyrnum Creticum	531	Suber	115
				Suber	

P L A N T A R Y M.

Suber angustifolium	116	Tragum	779	Vinca peruinca	694
Succisa	397	Trasi	316	Vincetoxicum	559
Sycomorus	180	Tribulus	714	aliud flore nigro	560
Symphytum maius	700	Tribulus aquaticus	715	Viola purpurea	910
petraeum	699	Trichomanes	925	arborescens	911
tuberosum	701	Trifolium asphaltites	581	Viola alba Theophr.	957
T.		pratense	582	Viperina	314
Tamarix	74	pratense alterum	583	Virga aurea	748
Tanacetum	650	acetosum	584	Virga aurea folijs non serra-	
Tassus barbassus offic.	878	Trinitas	585	tu	749
Tatula	176	Trissago, seu chamadrys	567	Pastoris	433
Taxus	840	Triticum	185	Sanguinea	159
Telephium	411	Tubera	317	Viscum	555
Telephium purpureo flore	412	Tussilago	590	Viscum polycoccon	556
Terebinthus	51	Tussilaginis flores	591	Vismaga	303
Testiculus I. 622. II. &		Tussilago aliera, siue Farfu-		Vitex	105
III. 623. IIII. 624		gium	594	Viticella	909
V.	625	maior	592	Vitis alba	987
Tenarium	566	Tulipa minor	958	nigra	988
Thamavindi	126	Typha	607	Idea	135
Thapsia	948	V.		Idaarubra	136
Theriacaia	356	Valeriana montana aut pa-		Sylvestris	986
Thlasi I. 336. II. scorodo-		lustris	23	Vinifera	1003
thlasi 337. III. saxati-		Valeriana rubra	24	Vlmus	70
le 338. IIII. Creticum		Venenam terra	419	Vmbilicus Veneris	764. 858
siue Cappadocium	339	Veratrum album	939	Vmbilicus Veneris alter	859
Thymelae	974	Verbasum	878	Vnedo	168
Thymus	485	Verbasum II. mas	879	Vngula Caballina offic.	590
Tilia mas 92. femina 93		III.	880	Vnifolium	744
Tinus	61	hylofite	881	Vrtica	861
Tithymalus Characias	969	aliud	882	Vrtica II. 862. III.	863
Cyparissias	964	Verbasum aureo flore Diosc.		Vsnen	246
Dendroides	965	885		Vua spina, siue crispa	87
Helioscopius	963	Verbenaca	797	Vuaversa, siue lupina	835
Leptophyllos	966	Veronica	461	X.	
Mirsinites.	961	Veronica femina	462	Xanthium	926
Paralios	962.	Verrucaria offic.	1000	Xyris	733
Tor maior 825. minor 826		Vesicaria, seu halicacabum		Z.	
Tormentilla	685	repens	814	Zazyntha	287
Toxicum	825	Vetonicum	350	Zea	189
Tragacantha	446	Viburnum	122	Zedoaria Auicenna	837
Tragoriganum	470	Vicia	320	Zyzypa	167

F I N I S.

